

糟屋演習林植物目録

初島, 佳彦
九州帝國大學

<https://doi.org/10.15017/1523942>

出版情報：九州大学農学部演習林報告. 4 (別刷), pp.1-247, 1943. 九州帝國大學農学部糟屋演習林
バージョン：
権利関係：

(六) 演習林産植物目録

PTERIDOPHYTA 羊齒植物

Ophioglossaceae ハナヤスリ科

1 *Botrychium japonicum* Und. in Bull. Torr. Bot. Club. (1898) p. 533

和名 オホハナワラビ

生育地 樹蔭に生じ稀なり。(大倉、新建、荒平、生ヶ谷)

生活形 G (深地下植物)

備考 本州、濟州島、臺灣に分布す。

Hymenophyllaceae コケシノブ科

2 *Trichomanes bipunctatum* Poir., Encycl. VIII. (1808) p. 69

和名 アヲホラゴケ

生育地 森林内の岩面に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 E (着生植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣、熱帯アジア、濠洲、ポリネシヤに分布す。

3 *Trichomanes orientale* C. Christ., Ind. (1906) p. 644

和名 ハヒホラゴケ、コガネシノブ

生育地 森林内の岩面に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 E (着生植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那、ヒマラヤに分布す。

Polypodiaceae ウラボシ科

4 *Asplenium incisum* Thunb. in Trans. Linn. Soc. (1794) p. 342

和名 トラノヲシダ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(新建、御手洗水、飯盛)

生活形 H (浅地下植物)

備考 高さ二十糎内外の小形羊歯にしてカムチャツカ、樺太、北海道、千島、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、臺灣に分布す。

5 *Asplenium tripteropus* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLIV. (1930) p. 9

和名 イヌチャセンシダ

生育地 森林内の岩面に生じ稀なり。(新建、大倉)

生活形 E (着生植物)

備考 一見チャセンシダに酷似するも葉柄は三角にして各角には翼あり。本州中南部、四國、九州、臺灣に分布す。

6 *Asplenium Wilfordii* Mett., Kuhn, Linn. XXXVI. (1869) p. 94

和名 アラガネシダ

生育地 森林内の岩面に生じ稀なり。(荒平)

生活形 E (着生植物)

備考 本州中南部以南、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣に分布す。

7 *Asplenium Wrightii* Eat. MSS. in Herb. ex Hook. Sp. III. (1860) p. 113

和名 クルマシダ

生育地 森林内の蔭地に生じ極めて稀なり。(荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、九州、臺灣に分布す。

8 *Athyrium polypodiforme* Tagawa in Acta Phytotax. et Geobot. I, 2. (1932)
p. 159

Syn. *Aspidium polypodiforme* Makino in Bot. Mag. Tokyo VI. (1892) p. 46
nom. nud.

和名 ウラボシノコギリシダ

生育地 森林内の蔭濕地に生じ稀なり。(御手洗水、新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州に分布す。

9 *Athyrium rigescens* Makino in Bot. Mag. Tokyo XIII. (1899) p. 27

和名 タニイヌワラビ

生育地 谷間の蔭濕地に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島?に分布す。

10 *Athyrium Vidalii* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1925) p. 110

和名 ヤマイヌワラビ

生育地 谷間の蔭濕地に生じ稀なり。(穴口、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 概形前者に類似するも葉は廣三角形を呈するを以て區別容易なり。
本州、中國、九州に分布す。

11 *Athyrium viridifrons* Makino form. *Okuboanum* Makino in Journ. Jap. Bot. VI.-7. (1929) p. 10

和名 オホヒメワラビ 方言 キノケ

生育地 谷間の蔭濕地に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 高さ一米にも達する大形羊齒にして全株軟弱なり。本州、四國、九州に分布す。

12 *Blechnum nipponicum* Makino in Bot. Mag. Tokyo XI. (1897) p. 82

和名 シシガシラ

生育地 稍々乾燥せる森林内に生じ稀なり。(穴口)

生活形 H (淺地下植物)

備考 千島、北海道、本州、四國、九州、琉球に分布す。

13 *Coniogramme fraxinea* Diels in Engl. et Prantl, Pfl.-fam.I.-4. (1899) p. 262

和名 イハガネゼンマイ
 生育地 谷間の湿地に生じ少々普通なり。(生ヶ谷、大倉、新建、荒平)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 高さ一米にも達する大形羊歯にして樺太、千島、北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、滿洲、支那、ヒマラヤ、セイロン、比島、瓜哇、スマトラ、濠洲、ハワイ、マダガスカル、アフリカに分布す。

- 14 *Cornopteris decurrenti-alata* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLIV. (1930) p. 8
 syn. *Diplazium Hookerianum* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1924)
 p. 105

和名 シケチシダ
 生育地 谷間の陰湿地に生じ稀なり。(新建、大倉)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州伊豆半島以南、四國、九州、臺灣、支那に分布す。

- 15 *Cyclophorus lingua* Desv., Prod. (1827) p. 224

和名 ヒトツバ
 生育地 森林内の岩面又は樹幹の下部に着生し少々普通なり。(生ヶ谷、大倉、新建)
 生活形 E (着生植物)
 備考 本州中南部以南、熱帯アジア迄分布す。庭園及築山等を使用せらる外薬用に供せらる、葉は煎服して腫物、止血、利尿及び精氣を益するに用ふる外淋病等に用ふ。

- 16 *Davallia Mariesii* Moore, herb. apud Bak. in Ann. Bot. V. (1891) p. 201

和名 シノブ
 生育地 樹上に着生し稀なり。(大倉)
 生活形 E (着生植物)

備考 根莖を束ね吊し觀賞す。本州、四國、九州に分布す。

17 Diplazium Conilii Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVII. (1913) p. 253

和名 ホソバシケシダ

生育地 森林内の蔭濕地に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 シケシダに似るも一般に小形にして葉は狭し。北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

18 Diplazium japonicum Bedd., Ferns. Br. Ind. Suppl. (1876) p. 12

和名 シケシダ

生育地 谷間の蔭濕地に生じ少々稀なり。(新建、荒平、大倉)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、熱帯アジアに分布す。

19 Diplazium lanceum Presl, Tent. (1836) p. 113

和名 ヘラシダ

生育地 森林内の蔭濕地に生じ少々普通なり。(御手洗水、生ヶ谷、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、小笠原、琉球、臺灣、熱帯アジアに分布す。

20 Diplazium Naganumanum Makino in Bot. Mag. Tokyo XIII. (1899) p. 14

和名 ヒカゲワラビ

生育地 谷間の蔭濕地に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 高さ一米内外に達する大形羊齒にして本州中南部、四國、九州に分布す。

21 Diplazium siroyamaense Tagawa in Acta Phytotax. et Geobot. II. (1933)

syn. *Diplazium Wheeleri* (non Diels) Kodama in Bot. Mag. Tokyo XXVII.
art. jap. (1913) p. 303

和名 シロヤマシダ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 葉の全長一米内外に達する大形羊齒にして本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

22 *Diplazium squamigerum* Christ in Bull. Soc. Fr. 52 Mem. I. (1905) p. 51

和名 キヨタキシダ

生育地 森林内の稍々蔭濕地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

23 *Diplazium Wichurae* Diels in Engl. et Prantl, Pfl.-fam.I.-4. (1899) p. 226

和名 ノコギリシダ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣、支那(東部、中部)に分布す。

24 *Drymoglossum microphyllum* C. Christ., Ind. (1905) p. 246

和名 マメツタ

生育地 岩面又は樹幹に着生し稍々普通なり。(大倉、新建、荒平、生ヶ谷)

生活形 E (着生植物)

備考 本州、四國、九州、濟州島、支那、比島、印度北部、ビルマ、セイロン、瓜哇等に分布す。

25 *Dryopteris acuminata* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLII. (1928) p. 217

和名 ホシダ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那に分布す。

- 26 *Dryopteris cycadina* C. Christ. var. *melanolepis* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLV. (1931) p. 99

和名 イハヘゴ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、九州、濟州島、臺灣に分布す。

- 27 *Dryopteris decursivo-pinnata* O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. (1891) p. 812

和名 ゲジゲジシダ

生育地 森林内の蔭地に生じ稍々稀なり。(御手洗水)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那南部に分布す。

- 28 *Dryopteris elegans* Koidzumi in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1924) p. 108
syn. *Dryopteris oligophlebia* C. Christ., Ind. (1905) p. 280

和名 ヒメワラビ

生育地 水邊に生じ稀なり。(新建、生ヶ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 稍々陽性の羊齒にして本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

- 29 *Dryopteris erythrosora* O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. (1891) p. 812

和名 ベニシダ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、御手洗水、大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、小笠原、琉球、朝鮮、滿洲、支那、ルソン島

に分布す。

- 30** *Dryopteris gracilescens* O. Kuntze var. *glanduliferum* Makino in Makino et Nemoto, Cat. Jap. Pl. Herb. Tokyo Imp. Mus. (1914) p. 426
- 和名 ハシゴシダ
- 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、御手洗水)
- 生活形 H (浅地下植物)
- 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣、支那に分布す。
- 31** *Dryopteris lacera* O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. (1891) p. 813
- 和名 クマワラビ
- 生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建、荒平、大倉)
- 生活形 H (浅地下植物)
- 備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。
- 32** *Dryopteris Makinoi* Koidz. in Mayebar, Fl. Austro-higoensis (1931) p. 5 et in Acta Phytotax. et Geobot. V.-I. (1932) p. 26
- 和名 マルバベニシダ
- 生育地 森林内の蔭地に生じ少々稀なり。(新建)
- 生活形 H (浅地下植物)
- 備考 本州中南部、四國、九州に分布す。
- 33** *Dryopteris Matsumurae* C. Christ., Ind. (1905) p. 277
- 和名 シラガシダ、キヨスミヒメワラビ
- 生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、荒平、新建)
- 生活形 H (浅地下植物)
- 備考 本州中南部、四國、九州に分布す。
- 34** *Dryopteris ochtodes* C. Christ., Ind. (1905) p. 280
- 和名 イブキシダ
- 生育地 水邊に生じ稀なり。(新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、支那南部、臺灣、馬來、モ
ルッカ、印度に分布す。

35 *Dryopteris pseudo-erythrosora* Kodama in Matsum. Icon. Pl. Koisikav. I-6,
t. 83. (1913)

和名 サイコクベニシダ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 一見マルバベニシダの生長良さものに似るも莖には黄金色の毛茸
を密生せるを以て一見區別することを得。本州中南部、四國、九
州に分布す。

36 *Dryopteris sparsa* O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. II. (1891) p. 813

和名 ナガバノイタチシダ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、支那南部、馬來、印度、
セイロンに分布す。

37 *Dryopteris uniformis* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIII. (1900) p. 145

和名 ヲクマワラビ

生育地 森林内の蔭地又は石垣等に生じ少々普通なり。(新建、生ヶ谷、
穴口)

生活形 H (淺地下植物)

備考 一見クマワラビに似るも少々小形にして莖の鱗片は黒褐色(彼は
赤黄色)を呈するを以て一見區別し得べし。本州、四國、九州、
濟州島に分布す。

38 *Hypolepis punctata* Mett. Kuhn. Fil. Afr. (1868) p. 120

和名 イハヒメワラビ
 生育地 岩石上に生じ稀なり。(荒平)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州中南部、九州、濟州島、臺灣、熱帯アジア、濠洲、ポリネシヤ、南米に分布す。

39 *Leptogramme totta* J. Smith in Hooker, Journ. Bot. IV. (1841) p. 52

和名 ミゾシダ
 生育地 森林内の蔭地に生じ稍々普通なり。(生ヶ谷、大倉、荒平、新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、臺灣、支那、印度、瓜哇、アフリカに分布す。

40 *Lunathyrium pycnosorum* Koidz. in Acta Phytotax. et Geobot. I. (1932) p. 31

syn. *Athyrium pycnosorum* Christ. in Bull. Herb. Boiss. II. (1902) p. 827

和名 ミヤマシケシダ、ハクマウキノデ
 生育地 谷間の蔭濕地に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、アムール、支那、ヒマラヤに分布す。

41 *Microlepia marginata* C. Christ., Ind. (1905) p. 212

和名 フモトシダ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(新建、御手洗水、荒平)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣、支那、印度ヒマラヤに分布す。

42 *Microlepia pilosella* Moore, Ind. (1861) p. 298

和名 イヌシダ

生育地 石垣其他崖地等に生じ稀なり。(新建)

生活形 H(浅地下植物)

備考 全長二十糎内外の少々陽性の羊齒にして北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那中部、臺灣に分布す。

43 *Odontosoria chinensis* J. Smith var. *tenuifolia* Makino in Bot. Mag. Tokyo X. (1896) p. 152

和名 ホラシノブ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 H(浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、臺灣、支那、馬來、印度に分布す。

44 *Onychium japonicum* Kuntze in Bot. Zeit. (1848) p. 507

和名 タチシノブ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 H(浅地下植物)

備考 少々陽性の羊齒にして本州中南部、四國、九州、濟州島、小笠原、臺灣、支那、ヒマラヤ、比島、瓜哇に分布す。

45 *Plagiogyria japonica* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLII. (1928) p. 206

和名 キジノヲシダ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H(浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、臺灣、印度、瓜哇に分布す。

46 *Polypodium ellipticum* Thunb. var. *typicum* Makino in Bot. Mag. Tokyo. XXIII. (1909) p. 72

和名 イハヒトデ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球に分布す。

47 *Polypodium ensatum* Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. (1794) p. 341

和名 クリハラン 方言 ヒトツバ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(生ヶ谷、荒平、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣、支那、印度、アッサム、ビルマに分布す。

48 *Polypodium hastatum* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 335

和名 ミツデウラボシ

生育地 林縁又は岩石上に生じ稀なり。(御手洗水、生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 陽性の羊齒にして葉形に變化多し。北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那(西部、中南部)、比島、セイロン、ヒマラヤ等に分布す。

49 *Polypodium lineale* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 335

和名 ノキシノブ 方言 イハシノブ

生育地 樹上又は岩石上に着生し普通なり。(大倉、御手洗水、荒平、生ヶ谷)

生活形 E (着生植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムール、ウスリ、琉球、臺灣、小笠原、馬來、セイロン、印度、アフリカ、歐洲南部等に分布す。

50 *Polypodium Makinoanum* Hatusima, nom. nov.

Syn. *Polypodium scolopendrium* Makino et Nemoto, Cat. Jap. Pl. Herb. Nat. Hist. Tokyo Imp. Mus. (1914) p. 443, non C. Chr.

Loxogramme Fauriei Copeland in Philip. Journ. Sci. Bot. XI. Pl. 1. fig. 5 (1916) p. 45

Polypodium Fauriei (Copel.) Nemoto et Makino, Fl. Jap. ed. 2. (1931) p. 87 non H. Chr.

和名 サジラン

生育地 森林内の岩面に生じ稀なり。(荒平、新建)

生活形 E (着生植物)

備考 本州、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布す。

51 *Polypodium Wrightii* Mett. ex Diels in Engl. et Prantl, Pfl.-fam. I.-4. (1899)
p. 316

和名 ヤリノホクリハラン、ヤリノホラン

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 九州、琉球、臺灣に分布す。

52 *Polystichum aculeatum* Schott., Gen. Filic. (1834) t. 9

var. *japonicum* Christ, Ber. Schweiz. Bot. Ges. III. (1893) p. 26

和名 キノデ 方言 ヤブソテツ

生育地 森林内の蔭地に生じ普通なり。(生ヶ谷、新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣に分布す。

var. *Makinoi* Tagawa in Acta Phytotax. et Geobot. I.-1. (1932) p. 88

syn. *Polystichum aculeatum* Schott. var. *nigropaleaceum* Makino in Journ. Jap.
Bot. II.-6. (1922) p. 21, non Christ

和名 カタキノデ

生育地 森林内の蔭地に生じ少々稀なり。(荒平、大倉)

生活形 H (淺地下植物)

備考 一見前者に似るも葉の光澤少々少く葉柄の鱗片は下向す。本州、九州に分布す。

var. *ovato-paleaceum* Kodama in Bot. Mag. Tokyo XXIX. (1915) p. 329

和名 ツヤナシキノデ

生育地 谷間の森林内に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 前者に比するに葉面は光澤なく葉柄の鱗片は幅廣く黄金色を呈す。
本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

53 *Polystichum aristatum* Presl, Tent. (1836) p. 83

和名 ホソバカナワラビ

生育地 森林内の蔭地に生じ普通なり。(生ヶ谷、荒平、新建、上ノ山)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、琉球、臺灣、支那、馬來、印度に分布す。

54 *Polystichum caryotideum* Diels in Nat. Pflanzenfam. I. abt. 4. (1899) p. 4

var. *macropterum* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1925) p. 115

和名 ヒロハメヤブソテツ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 羽片は卵状鎌形を呈す。本州、四國、九州、支那に分布す。

55 *Polystichum devexiscapulae* Koidz. in Acta Phytotax. et Geobot. I.-1. (1932)

p. 33

和名 ナガバヤブソテツ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 一見ヤブソテツに酷似し羽片は楔脚なるを特徴とす。本州中南部、
四國、九州に分布す。

56 *Polystichum falcatum* Diels in Engl. et Prantl, Pfl.-fam. I.-4. (1899) p. 194

和名 オニヤブソテツ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建、荒平、生ヶ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 海岸近くの山野に多き稍々陽性の羊齒にして北海道、本州、四國、

九州、朝鮮、支那、小笠原、臺灣、印度北部、アフリカ北部、マダガスカル、布哇に分布す。

57 *Polystichum Fortunei* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1925) p. 116

和名 ヤブソテツ

生育地 森林内の蔭地に生じ少々稀なり。(荒平、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 羽片は薄質狭細なり。本州、四國、九州、濟州島、小笠原、臺灣、支那に分布す。

58 *Polystichum polyblepharum* Presl, Epim. Bot. (1849) p. 56

和名 ヒメカナワラビ、 キヨズミシダ

生育地 森林内の蔭地に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、支那、臺灣に分布す。

59 *Polystichum simplicius* Tagawa in Acta Phytotax. et Geobot. I.-1. (1932) p. 90

syn. *Polystichum aristatum* Sw. var. *simplicior* Makino in Bot. Mag. Tokyo XV (1901) p. 65

和名 ハカタシダ

生育地 森林内に生じ稀なり。(御手洗水、荒平、上ノ山)

生活形 H (浅地下植物)

備考 ホソバカナワラビに比し小羽片は大きく根莖は横臥す。(彼は長く匍匐す) 本州中南部、四國、九州に分布す。

var. *majus* Tagawa, l. c.

和名 オニカナワラビ

生育地 森林内に生じ稀なり。(新建、荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 ハカタシダに酷似するも葉面は卵状披針形(彼は卵形)を呈し、

頂羽片なし(彼は有す)。本州南部、九州に分布す。

60 Polystichum Standishii C. Christ., Ind. (1905) p. 79

和名 リヤウメンシダ

生育地 水邊に生じ少々稀なり。(新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 水邊を好む羊齒にして葉の両面同色なり。北海道、本州、九州、
濟州島?、琉球、臺灣、支那(廣東、東京)に分布す。

61 Polystichum tripterum Presl, Epim. (1849) p. 55

和名 ジフモンジシダ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、臺灣に分布す。

62 Polystichum varium Presl, Epim. (1849) p. 57

和名 イタチシダ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(御手洗水、生ヶ谷、大倉、
荒平、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 少々陽性の羊齒にして本州中南部、四國、九州、朝鮮、臺灣、支
那、印度東部に分布す。

63 Pteridium aquilinum Kuhn var. **japonicum** Nakai in Bot. Mag. Tokyo
XXXIX. (1925) p. 106

和名 フラビ

生育地 少々乾燥せる林内又は原野に生じ少々稀なり。(生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 陽性の羊齒にして北は樺太より南は支那南部迄分布す。基種は世

界各地に廣く分布す。新芽及地下莖は食用に供す。

64 *Pteris cretica* Linn., Mant. I. (1767) p. 140

和名 オホバノキノモトサウ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(大倉、荒平、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、印度 (マドラス、ベンガル)、セイロン、ビルマ、布哇、アフリカ、熱帯及暖帯アメリカ、歐洲南部に分布す。

65 *Pteris longipinnula* Wall., List. n. 108 (1828)

和名 オホバノハチヂャウシダ

生育地 水邊に生じ稀なり。(荒平、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、九州に分布す。

form. *inaequalis* Makino in Bot. Mag. Tokyo X. (1895) p. 150

和名 オホバノアマクサシダ

生育地 水邊に生じ稀なり。(御手洗水)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、九州、小笠原、琉球、臺灣に分布す。

66 *Pteris multifida* Poir., Encycl. V. (1824) p. 104

和名 キノモトサウ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、支那に分布す。

67 *Pteris quadriaurita* Retz., Obs. VI. (1791) p. 38

和名 アマクサシダ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(大倉、荒平)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 熱帯アジアに廣く分布し本邦にては本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣に分布す。

68 *Vittaria japonica* Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 169

和名 シシラン
 生育地 岩面に着生下垂し極めて稀なり。(荒平)
 生活形 E (着生植物)
 備考 本州中南部、九州、臺灣に分布す。

69 *Woodwardia japonica* Sw., Mem. Ac. Turin. V. (1793) p. 411

和名 オホカグマ 方言 ヤブソテツ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水、生ヶ谷)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 稍々陽性の大形羊齒にして本州中南部、四國、九州、臺灣、支那、東京、交趾支那に分布す。

70 *Woodwardia orientalis* Sw. in Schrad. Journ. 1800-2. (1801) p. 76

和名 コモチシダ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水、生ヶ谷)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣に分布す。

Gleicheniaceae ウラジロ科

71 *Dicranopteris dichotoma* Bernh. in Schrad. N. Journ. 1.-2. (1806) p. 8 et 49

和名 コシダ 方言 コメシダ
 生育地 乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉)
 生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、比島、支那南部、印度支那、ポリネシヤに分布す。

72 *Dicranopteris glauca* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLI. (1927) p. 693

和名 ウラジロ 方言 モロモキ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口、極樂、大倉、新建)

生活形 N (灌木)

備考 高さ二米に達するものあり。本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那に分布す。

Schizaeaceae カニクサ科

73 *Lygodium japonicum* Sw. in Schrad, Journ. II. (1801) p. 106

和名 カニクサ、ツルシノブ 方言 ビンビンカヅラ

生育地 林縁に生じ稀なり。(御手洗水、大倉、荒平、生ヶ谷)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那南部、比島、馬來、印度ヒマラヤ、セイロン、瓜哇、濠洲に分布す。

Osmundaceae ゼンマイ科

74 *Osmunda japonica* Thunb. in Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal. II. (1780)

p. 209

和名 ゼンマイ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 新芽は食用となす。北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、ヒマラヤに分布す。

Equisetaceae トクサ科

75 *Equisetum arvense* Linn., Sp. Pl. ed. I. (1753) p. 1061

- 和名 スギナ 方言 マツナグサ
 生育地 原野に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 俗稱ツクシは食用に供するも其他利用の途なき雑草なり。本邦にありては千島、樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮に産し海外にありては滿洲、支那、アムール、カムチャツカ、ダフリカ、シベリヤ、歐洲、北米、アフリカ北部、カナリー島、ヒマラヤに分布す。

Lycopodiaceae ヒカゲノカヅラ科

76 *Lycopodium cernuum* Linn., Sp. Pl. ed. 2. (1763) p. 1566

- 和名 ミヅスギ
 生育地 水邊に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 Ch (近地表植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、臺灣、支那、印度支那、馬來、印度、比島、ポリネシヤ、濠洲、ニュウジランド、中央アメリカ、西印度、アフリカ南部、アドレスに分布す。

77 *Lycopodium serratum* Thunb. var. *javanicum* Makino in Bot. Mag. Tokyo XII. (1898) p. 13

- 和名 タウゲシバ
 生育地 乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水、生ヶ谷、新建)
 生活形 Ch (近地表植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、馬來、印度、瓜哇に分布す。

var. *Thunbergii* Makino, l. c.

- 和名 ホソバタウゲシバ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水)
 生活形 Ch (近地表植物)
 備考 樺太、千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那北部、
 滿洲、布哇に分布す。

Selaginellaceae イハヒバ科

78 *Selaginella caulescens* Spring, Monogr. II. (1849) p. 158

- 和名 カタヒバ 方言 イヌシノブ
 生育地 森林内の岩面等に着生し稀なり。(荒平、大倉)
 生活形 E (着生植物)
 備考 熱帯アジアに廣く分布し本邦にては本州中南部、九州、濟州島、
 琉球、臺灣に分布す。

79 *Selaginella integerrima* Spring, l. c. p. 79

- 和名 ヒメクラマゴケ
 生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(極樂)
 生活形 Ch (近地表植物)
 備考 本州、四國、九州、琉球に分布す。

80 *Selaginella involvens* Spring, l. c. p. 63

- 和名 イハヒバ、イハマツ 方言 イハシバ
 生育地 少々乾燥せる林内の岩面に生じ稀なり。(御手洗水)
 生活形 E (着生植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムール、ウスリ、東
 部蒙古、支那北部、ヒマラヤ、臺灣、比島、瓜哇に分布す。

81 *Selaginella Savatieri* Baker in Journ. Bot. (1884) p. 87

- 和名 タチクラマゴケ
 生育地 谷間の蔭濕地に生じ少々稀なり。(上ノ山)

生活形 Ch (近地表植物)

備考 一見ヒメクラマゴケに似るも莖は稍々斜上性にして分岐疎なり。
本州各部、四國、九州に分布す。

SPERMATOPHYTA 種子植物

Gymnospermae 裸子植物

Cephalotaxaceae イヌガヤ科

82 *Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. II. (1846) p. 108

和名 イヌガヤ 方言 ホノメカシ、カヤ

生育地 潤葉樹の下部に生じ稍々普通なり。(荒平、新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州、四國、九州、支那に分布す。

Pinaceae マツ科

83 *Pinus densiflora* Sieb. et Zucc., Fl. Jap. II. (1842) p. 22

和名 アカマツ

生育地 谷間に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦(多)、穴口、生ヶ谷、御手洗水(多)、上ノ山)

生活形 MM (喬木)

備考 北海道南部、本州、九州、朝鮮、滿洲に分布す。近海山野にてクロマツと混生する場所には兩者の中間の性質を具有する所謂間ノ子松を見る。本演習林内にては寧之の間ノ子松多し。アカマツに近きものをアイアカマツ、クロマツに近きものをアイグロマツ、中間に位するものをアイノコマツと稱する方適當なるべし。

84 *Pinus Thunbergii* Parl. in DC. Prod. XVI.-2. (1868) p. 388

和名 クロマツ

生育地 稍々乾燥せる峯通りに多し。(大倉、荒平(稀)、生ヶ谷)

生活形 MM (喬木)

備考 本州、四國、朝鮮南部、九州(吐喇七島の寶島及中之島迄)に分布す。本種の間ノ子松に對する關係はアカマツの場合と同じ。

Cupressaceae ヒノキ科

85 *Juniperus rigida* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. II. (1866) p. 109

和名 ネズ、ムロ、ネズミサシ 方言 イラマツ

生育地 少々乾燥せる松林内に生じ普通なり。(穴口(多)、鬼ヶ浦、生ヶ谷、上ノ山(稀)、御手洗水)

生活形 M (亞喬木)

備考 樹高十米餘に達する亞喬木なるも生長遅し。北海道、本州、九州北部、朝鮮、滿洲、支那北部、ウスリに分布す。

Angiospermae 被子植物

Dicotyledoneae 雙子葉植物

Archichlamydeae 古生花被區

Saururaceae ハンゲシヤウ科

86 *Houttuynia cordata* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 234

和名 ドクダミ 方言 ドクダミサウ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州各部、四國、九州、朝鮮、支那、臺灣、比島、シヤム、印度(北部、東部)に分布す。葉及地下莖は古來民間藥として有名なり。

Piperaceae コセウ科

87 *Piper Futokadzura* Sieb. in Sieb. et Zucc., Fam. Nat. II. (1846) p. 107

和名 フウトウカヅラ

生育地 森林内の岩面、樹幹に着生し稀なり。(大倉、荒平、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布す。

Chloranthaceae チヤラン科

88 *Chloranthus serratus* Roem. et Sch., Syst. III. (1818) p. 461

和名 フタリシヅカ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 G (深地下植物)

備考 一見ヒトリシヅカに酷似するも葉は二三層にして光澤なし。
北海道、本州、四國、九州に産す。

Salicaceae ヤナギ科

89 *Salix gracilistyla* Miquel in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 26

和名 ネコヤナギ、タニガハヤナギ 方言 カハヤナギ

生育地 谷間の水邊に生じ稀なり。(穴口)

生活形 N (灌木)

備考 本種の葉は茶の代用となす。北海道、本州、四國、九州(屋久島迄)、
朝鮮、滿洲、支那中部に分布す。

90 *Salix Sieboldiana* Blume, Bijdr. (1825) p. 517

和名 ヤマヤナギ 方言 マルバヤナギ

生育地 乾燥せる峯通りに生じ稀なり。(大倉、桂木)

生活形 N (灌木)

備考 本州南部、四國、九州に分布す。

Myricaceae ヤマモモ科

91 *Myrica rubra* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. II. (1846) p. 230

- 和名 ヤマモモ
 生育地 少々乾燥せる林地に生じ少々普通なり。(生ヶ谷、御手洗水)
 生活形 MM (喬木)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣、支那、馬來、
 比島、印度に分布す。

Juglandaceae クルミ科

- 92 *Platycarya strobilacea* Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Muench. III.-2. (1843)
 p. 743
 和名 ノグルミ、ノブノキ
 生育地 谷間の森林に生じ少々稀なり。(穴口、生ヶ谷、新建、荒平)
 生活形 MM (喬木)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、支那北部、臺灣に分布す。

Betulaceae カバノキ科

- 93 *Carpinus laxiflora* Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1850) p. 309
 和名 アカシデ
 生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州、四國、九州 (屋久島迄)、朝鮮に分布す。
- 94 *Carpinus Tschonoskii* Max. in Mel. Biol. XI. (1881) p. 314
 和名 イヌシデ、ソロ 方言 オモノキ
 生育地 谷間の森林に生じ少々稀なり。(新建、飯盛、生ヶ谷)
 生活形 MM (喬木)
 備考 北海道、本州、四國、九州 (大隅半島南部迄)、朝鮮に分布す。
- 95 *Ostrya japonica* Sarg. in Garden & Forest VI. (1893) p. 383
 和名 アサダ

- 生育地 峯通りの森林に生じ稀なり。(新建、生ヶ谷(稀))
 生活形 MM (喬木)
 備考 比較的低地に生ずるは甚だ興味あり。北海道? 本州、四國、九州
 支那中部? に分布す。

Fagaceae フナノキ科

- 96 *Castanea crenata* Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Muench. IV.-3. (1846) p. 324

- 和名 クリ
 生育地 谷間の森林又は原野に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口)
 生活形 MM (喬木)
 備考 北海道、本州、四國、九州(屋久島迄)に分布す。

- 97 *Lithocarpus edulis* Rehd. in Journ. Arn. Arb. I.-2. (1919) p. 125.

- 和名 マテバシヒ、マテガシ 方言 マテジヒ
 生育地 稍々乾燥せる森林内に生じ稀なり。(穴口)
 生活形 MM (喬木)
 備考 九州、琉球に分布し、堅果は食用とす。

- 98 *Lithocarpus glabra* Nakai in Cat. Sem. Herb. Bot. Univ. Tokyo. (1916) p. 8

- 和名 シリブカガシ 方言 アマガシ、オチヨウズガシ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(御手洗水)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州、四國、九州、琉球に分布す。

- 99 *Quercus acuta* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 175

syn. *Cyclobalanopsis acuta* Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) p. 78

- 和名 アカガシ 方言 クマガシ
 生育地 峯通りの森林に生じ普通なり(新建、桂木)
 生活形 MM (喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣に分布す。

100 *Quercus acutissima* Carr. in Journ. Linn. Soc. VI. (1862) p. 33

和名 クヌギ

生育地 少々乾燥せる峯通りの森林内に生じ少々稀なり。(生ヶ谷、飯盛)

生活形 MM (喬木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、ヒマラヤ、ベルシヤに分布す。

101 *Quercus aliena* Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1850) p. 298

和名 ナラガシハ 方言 ゴウゴウシバ

生育地 少々乾燥せる林地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口、新建)

生活形 MM (喬木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那北部に分布す。

102 *Quercus donarium* Nakai, Fl. Sylv. Korea. III. fig. 16 (1917) p. 29

和名 テリハコナラ

生育地 谷間の森林に生じ極めて稀なり。(飯盛)

生活形 MM (喬木)

備考 一見コナラに似るも葉は長大にして表面深綠色、光澤ありて鋸齒は鋭く内曲す。殻斗は少々深く果實も短大なり。
本種は最初朝鮮智異山麓に發見され其後朝鮮一帯、對馬に發見せられしも九州本土にては最初の發見ならんか。

103 *Quercus glauca* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 175

Syn. *Cycloöalanopsis glauca* Oerst., l. c. p. 78

和名 アラカシ、クロカシ 方言 カシ

生育地 少々乾燥せる林地に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口、新建)

生活形 MM (喬木)

備考 本州、四國、九州、濟州島、臺灣、支那、ヒマラヤ、印度南部に分布す。

104 Quercus myrsinaefolia Blume in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1850) p. 305

syn. *Cyclobalanopsis myrsinaefolia* Oerst., l. c. p. 78

和名 シラカシ、ホソバガシ

生育地 谷間の森林内に生じ極めて稀なり。(荒平、御手洗水)

生活形 MM (喬木)

備考 本州、四國、九州、濟州島に分布す。

var. **salicifolia** Makino in Journ. Jap. Bot. VI-4. (1929) p. 7

和名 ヤナギシラカシ 方言 ササバガシ

生育地 谷間の森林内に生じ極めて稀なり。(御手洗水)

生活形 MM (喬木)

備考 九州の特産にして葉は廣線形又は線狀披針形なり。

105 Quercus serrata Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 176

和名 コナラ 方言 ナラ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(新建、生ヶ谷、穴口、
極樂、飯盛)

生活形 MM (喬木)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

106 Quercus stenophylla Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIV. (1910) p. 17

syn. *Cyclobalanopsis stenophylla* Schottky in Engl. Bot. Jahrb. XLVII.

(1912) p. 657

和名 ウラジロガシ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水、新建)

生活形 MM (喬木)

備考 本州中南部、四國、九州(奄美大島迄)、濟州島に分布す。

107 **Shiia cuspidata** Makino in Journ. Jap. Bot. V.-6. (1928) p. 23

syn. *Pasania cuspidata* Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. XVIII. (1866) p. 76

Pasaniopsis cuspidata Kudo in Syst. Bot. Useful Plants of Japan (1922)

p. 131

和名 ヲジヒ、ツブラジヒ、タイコジヒ 方言 シヒ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(穴口、新建、荒平、上ノ山)

生活形 MM (喬木)

備考 スダシヒに酷似するも小枝は細く、堅果は少々球形を呈し樹皮は深く裂けず。本州中南部、四國、九州、琉球、濟州島に分布す。

Ulmaceae ニ レ 科

108 **Aphananthe asper** Planchon in DC. Prod. XVII. (1873) p. 208

和名 ムクノキ 方言 ムク

生育地 谷間の森林に生じ普通なり。(生ヶ谷、新建、飯盛、荒平)

生活形 MM (喬木)

備考 直径一米以上に達する喬木にして一見エノキに似るも樹皮は灰褐色(彼は灰白色)にして剝離するを以て一見區別することを得。北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

109 **Celtis Léveilléi** Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXVIII. (1914) p. 264 & 265

syn. *Celtis Bungeana* Blume var. *heterophylla* Léveillé in Fedde, Repert. X. (1912) p. 476

Celtis Biondii var. *heterophylla* Schneid. in Sarg. Pl. Wils. III. (1916) p. 282

Celtis Leveillei Nakai var. *heterophylla* Nakai in Journ. Arn. Arb. V. (1924) p. 73

和名 コバノテウセンエノキ

- 生育地 峯通り 又は谷間の 岩石地帯に生じ稍々稀なり。(荒平、飯盛、上ノ山)
- 生活形 M (亞喬木)
- 備考 一見エノキに似るも大木とならず葉の先端は尾狀に尖り、樹皮は稍々滑澤なり。九州(豊後、筑前、肥前)、對馬、朝鮮に分布す。

110 *Celtis sinensis* Persoon, Syst. Pl. I (1805) p. 292

syn. *Celtis sinensis* Persoon var. *japonica* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXVIII. (1914) p. 264

- 和名 エノキ
- 生育地 谷間の森林に生じ普通なり。(御手洗水、荒平、新建、大倉、生ヶ谷)
- 生活形 MM (喬木)
- 備考 本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

111 *Zelkova serrata* Makino in Bot. Mag. Tokyo. XVII. (1903) p. 13

- 和名 ケヤキ
- 生育地 谷間の森林に生じ極めて稀なり。(御手洗水、荒平)
- 生活形 MM (喬木)
- 備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那北部に分布す。

Moraceae クハ科

112 *Broussonetia Kaempferi* Sieb. in Verh. Bot. Gen. XII. (1830) p. 28

- 和名 ツルカウヅ 方言 カゴカヅラ
- 生育地 谷間の森林に生じ稍々稀なり。(新建、荒平、生ヶ谷、上ノ山)
- 生活形 L (蔓性植物)
- 備考 九州、臺灣、支那に分布す。

113 *Broussonetia Kazinoki* Sieb., l. c.

- 和名 カウヅ 方言 カゴ

生育地 谷間の森林に生じ稍々稀なり。(大倉、荒平、生ヶ谷、上ノ山)

生活形 N (灌木)

備考 大木となれるものは枝稍々蔓性を呈す。本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

114 Cudrania cochinchinensis Kudo et Masamune var. **gerontogea** Kudo et Masamune, *Plantarum Formosanarum* I. (1932) p. 27

syn. *Vanieria cochinchinensis* Lour. var. *gerontogea* Nakai in Bot. Mag.

Tokyo XLI. (1927) p. 516

和名 クワクワツガユ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(上ノ山、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 四國、九州、琉球、臺灣、支那に分布す。

115 Fatoua villosa Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLI. (1927) p. 516

和名 クハクサ

生育地 畑地に生じ稀なり。(新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布す。

116 Ficus erecta Thunb., *Dissert. Bot. Ficus* (1786) p. 5 et 9

和名 イヌビハ 方言 イセヅキ

生育地 疎林内に生じ稍々普通なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、御手洗水)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣、印度に分布す。

var. **Sieboldii** King in *Ann. Bot. Gard. Calc.* I. pt. 2. (1888) p. 142

和名 ホソバイヌビハ

生育地 松林内に生じ少々稀なり。(大倉、荒平、生ヶ谷)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州、四國、九州、臺灣に分布す。

117 *Ficus nipponica* Franch. et Savat., Enum. Pl. Jap. I. (1875) p. 436

和名 イタビカヅラ 方言 ッタカヅラ
 生育地 森林内の樹幹又は岩面に着生し少々普通なり。(新建、御手洗水、荒平、生ヶ谷)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州、四國、九州、濟州島、琉球に分布す。

118 *Ficus stipulata* Thunb., Dissert. Ficus (1786) p. 5 & 8

syn. *Ficus Thunbergii* Maxim. in Mel. Biol. (1881) p. 339

和名 ヒメイタビ
 生育地 岩面に着生し稀なり。(御手洗水、荒平)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 一見オホイタビに酷似するも全株小形にして葉の裏面には褐毛を有す。本州中南部、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

Urticaceae イラウサ科

119 *Achudenia japonica* Maxim. in Mel. Biol. IX. (1877) p. 627

和名 ヤマミヅ
 生育地 谷間の蔭湿地に生じ極めて稀なり。(新建)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 高さ二十糎内外の液質草本にして本州中南部、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

120 **Boehmeria frutescens** Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. (1794) p. 330

- 和名 マヲ、カラムシ 方言 シロヲ
 生育地 林縁の陽地に生じ稍々普通なり。(生ヶ谷、大倉)
 生活形 N (灌木)
 備考 熱温帯亞州の原産にして本邦にては本州、四國、九州、朝鮮、臺灣にて野性狀を呈す。

121 **Boehmeria Miqueliana** Tanaka in Bult. Sci. Facul. Terkul. Kjušu Imp. Univ.

I.-4. (1926) p. 198

syn. *Boehmeria japonica* Miquel in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 131

- 和名 ヤブマヲ
 生育地 林縁等に生じ稀なり。(穴口)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮に分布す。

122 **Boehmeria pseudo-Sieboldiana** Honda in Bot. Mag. Tokyo XLV. (1931)

p. 469 ?

- 和名 イヌヤブマヲ
 生育地 林縁又は岩石地帯に生じ稀なり。(御手洗水)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 一見ヤブマヲに似るも葉は長くナガバヤブマヲの如し。
 本州(上總國)、九州(肥後)に産す。

123 **Boehmeria Sieboldiana** Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1856) p. 220

- 和名 ナガバヤブマヲ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

124 *Boehmeria spicata* Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. (1794) p. 330

和名 コアカソ

生育地 林内の蔭地に生じ少々普通なり。(生ヶ谷、新建、大倉)

生活形 N (灌木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

125 *Debregeasia edulis* Wedd. in Arch. Mus. Paris, IX. (1856) p. 462

syn. *Debregeasia japonica* Koidz. in Fl. Symb. Orient.-Asia. (1930) p. 26

和名 ヤナギイチゴ

生育地 崖地に生じ極めて稀なり。(荒平)

生活形 N (灌木)

備考 高さ二米内外に達し實は食し得べし。本州中南部、九州、臺灣、支那に分布す。

126 *Elatostema laetevirens* Makino in Journ. Jap. Bot. II. 5. (1921) p. 18

和名 ヤマトキホコリ

生育地 林内の蔭湿地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 トキホコリに比し多年生にして高さ三十糎以上となり莖は單一なり。本州、九州に産す。

127 *Elatostema umbellatum* Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1852) p. 2

和名 ヒメウハバミサウ

生育地 谷間の蔭湿地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、濟州島に分布す。

128 **Nanocnide japonica** Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1855) p.155

- 和名 カテンサウ
 生育地 谷間の蔭湿地に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 高さ二十糎内外にして葉は菱形を呈す。本州、四國、九州、琉球、朝鮮南部、臺灣、支那に分布す。

129 **Oreocnide fruticosa** (Gaudichaud) comb. nov.

syn. *Boehmeria fruticosa* Gaudichaud in Freycinet, Voy. (1826) p. 500

Villebrunea fruticosa Nakai in Bot. Mag. Tokyo XII. (1927) p. 514

- 和名 イハガネ
 生育地 森林内の蔭地に生じ極めて稀なり。(荒平)
 生活形 N (灌木)
 備考 九州、琉球、臺灣、支那、比島、ヒマラヤ、アフリカ東部、濠洲に分布す。

130 **Pilea viridissima** Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIII. (1909) p. 87

- 和名 アヲミヅ
 生育地 森林内の蔭湿地に生じ稀なり。(新建、荒平、大倉)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州、九州、朝鮮に分布す。

131 **Polychroa radicans** (Wedd.) comb. nov.

syn. *Pellionia radicans* Wedd. in DC. Prod. XVI.-1. (1869) p. 167

- 和名 オホサンセウサウ
 生育地 森林内の蔭地に生じ少々普通なり。(新建、荒平)
 生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、臺灣に分布す。サンセウサウに似るも葉は大形にして先端は稍々鋭尖頭をなす。

132 Polychroa scabra Hu in Journ. Arn. Arb. V. (1924) p. 228

syn. *Pellionia scabra* Benth., Fl. Hongk. (1861) p. 330

和名 キミヅ

生育地 谷間の蔭湿地に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 Ch (近地表植物)

備考 莖は稍々灌木状を呈するものあり。本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣、支那に分布す。

133 Urtica Thunbergiana Sieb. et Zucc., Fam. Nat. II. (1846) p. 214

和名 イラクサ 方言 イラ

生育地 森林内の蔭湿地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、九州、臺灣に分布す。

Santalaceae **ビヤクダン科**

134 Thesium chinense Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. VII. (1837) p. 157

和名 カナビキサウ

生育地 原野に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 高さ三十糎内外の半寄生植物にして多く禾本科の根に寄生す。本州、九州、琉球、臺灣、朝鮮、支那(南部を除く)、滿洲、アムール、ウスリ、ダフリカに分布す。

Loranthaceae ヤドリギ科

135 **Korthalsella opuntia** Merr. in Bot. Mag. Tokyo XXX. (1916) p. 68

syn. *Viscum opuntia* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 64

Viscum japonicum Thunb. in Trans. Linn. Soc. III. (1794) p. 329

Bifaria japonica Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. France 43. (1896) p. 173

Korthalsella japonica Engl., Nat. Pflanzenfam. Nachtr. 1. (1897) p. 138

Pseudodixus japonicus Hayata in Bot. Mag. Tokyo XXIX. (1915) p. 166

Korthalsella bifaria Merr. in Bot. Mag. Tokyo XXX. (1916) p. 68

Bifaria opuntia Merr., Enum. Philip. Fl. Pl. II. (1923) p. 113

Pseudodixus opuntia Tanaka in Bult. Sci. Facul. Terkult. Kjušu Imp. Univ. I.-4, (1925) p. 197

和名 ヒノキバヤドリギ

生育地 樹枝に着生し稀なり。(御手洗水)

生活形 E (着生植物)

備考 本州南部、四國、九州、朝鮮南部、小笠原、琉球、臺灣、支那、比島、馬來、印度に分布す。

136 **Loranthus Yadorigi** Sieb. in Sieb. et Zucc., Fam. Nat. I. (1845) p. 193

和名 オホバヤドリギ

生育地 樹上に着生し稀なり。(上ノ山)

生活形 E (着生植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣に分布す。

140 *Persicaria glandulosa* Nakai et Ohki in Bot. Mag. Tokyo XL. (1926) p. 52

syn. *Polygonum nodosum* Pers. ex Meiss. in DC. Prodr. XIV. (1856-57)

p. 118

和名 オホイヌタデ

生育地 畑地又は林縁に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦、荒平)

生活形 T (一年生植物)

備考 世界各地に分布し本邦にては樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

141 *Persicaria hastato-sagittata* Nakai in Mori, Enum. Pl. Cor. (1922) p. 132

syn. *Polygonum hastato-sagittatum* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVII.

(1903) p. 119

和名 ナガバノヤノネグサ

生育地 林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮に分布す。

142 *Persicaria Hydropiper* Spach, Hist. Nat. Veg. X. (1841) p. 536

syn. *Polygonum Hydropiper* Linn. var. *vulgare* Meiss. in DC. Prodr. XIV.

(1856-57) p. 109

和名 ヤナギタデ

生育地 水邊に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 世界の温帯、暖帯に廣く分布し本邦にては北は樺太より南は臺灣迄分布す。

143 *Persicaria japonica* H. Gross in Nakai, Veg. Isl. Quelp. (1914) p. 41, n. 550

syn. *Polygonum japonicum* Meiss. in DC. Prodr. XIV. (1856-57) p. 112

和名 シロバナサクラタデ 方言 タデ
 生育地 水邊に生じ少々稀なり。(新建、上ノ山)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮南部、臺灣に分布す。

144 *Persicaria nipponensis* Nakai in Mori, Enum. Pl. Corea. (1922) p. 133

syn. *Polygonum nipponicum* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIII. (1909) p. 89

和名 ヤノネグサ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州、四國、九州、濟州島に分布す。

145 *Persicaria Posumbu* H. Gross in Nakai, l. c. p. 41, n. 553 (a)

syn. *Persicaria Posumbu* Nakai var. *tenera* Ohki in Bot. Mag. Tokyo XL.
 (1926) p. 52

和名 ハナタデ
 生育地 森林内の蔭濕地に生じ少々普通なり。(大倉、新建、荒平
 (多)、生ヶ谷)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、臺灣、印度東部に分
 布す。一見イヌタデに酷似するも葉は少々廣く且短くして先端
 尖り、花穂は疎にして甚だ長し。

146 *Persicaria Sieboldi* Ohki in Bot. Mag. Tokyo XL. (1926) p. 54

syn. *Polygonum Sieboldi* Meiss. in DC. Prod. XIV. (1856) p. 133

和名 アキノウナギツカミ 方言 ビキノツラカキ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムール、支那北部に分布す。一見ウナギツカミに似るも全株壯大にして秋期開花す。

147 *Persicaria Thunbergii* H. Gross var. *typica* (Ohki) comb. nov.

syn. *Polygonum Thunbergii* Sieb. et Zucc. var. *typicum* Franch. et Savat., Enum. II. (1876) p. 476

Persicaria Thunbergii Nakai var. *typica* Ohki in Bot. Mag. Tokyo XL. (1926) p. 56

和名 ミゾツバ

生育地 水邊に生じ普通なり。(穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、臺灣に分布す。

148 *Reynoutria japonica* Houtt. var. *typica* Ohki in Bot. Mag. Tokyo XL. (1926) p. 49

syn. *Polygonum cuspidatum* Sieb. et Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. II. (1846) p. 208

Polygonum Reynoutria Makino in Bot. Mag. Tokyo XV. (1901) p. 84

Reynoutria Henryi Nakai in Rigakkai (Tokyo) XXIV. (1926) p. 6

和名 イタドリ 方言 カツボン

生育地 稍々濕氣多き谷間に生じ稀なり。(新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 稍々陽性の多年生草本にして高さ二米に達するものあり。北海道、本州、四國、九州、濟州島、臺灣に分布す。

149 *Rumex Acetosa* Linn., Sp. Pl. ed. I. (1753) p. 337

和名 スイバ、スカンボ 方言 ギシギシ

生育地 原野又は水邊に生じ稍々普通なり。(穴口)
 生活形 H(淺地下植物)
 備考 歐洲、アジヤ、米國北部に分布し本邦にては樺太、北海道、
 本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

150 Rumex japonicus Houtt., Nat. Hist. Pl. VIII. (1777) p. 394, t. 47. fig. 2

和名 ギシギシ 方言 ウシギシギシ
 生育地 原野の水邊に生じ稀なり。(穴口)
 生活形 H(淺地下植物)
 備考 千島、樺太、北海道、本州、四國、九州、濟州島に分布す。
 本植物の根は藥用に供す。

151 Tavara filiformis Nakai in Rigakkai XXIX. 4. (1926) p. 8

syn. *Polygonum virginianum* Linn. var. *filiforme* Nakai in Bot. Mag. Tokyo
 XXIII. (1909) p. 380

和名 ミヅヒキ 方言 オホタデ
 生育地 森林内の蔭地に生じ稍々稀なり。(新建、大倉、荒平、生ヶ谷)
 生活形 H(淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

152 Tavara neo-filiformis Nakai l. c.

syn. *Polygonum neo-filiforme* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXVI. (1922)
 p. 117

Persicaria neofiliformis Ohki in Bot. Mag. Tokyo XL. (1926) p. 57

和名 シンミヅヒキ 方言 オホタデ
 生育地 森林内の蔭地に生じ稍々稀なり。(新建、大倉、荒平、生ヶ谷)
 生活形 H(淺地下植物)
 備考 一見前種に酷似するも葉は光澤を有し幅濶く先端は鋭く尖る。
 本州、九州、朝鮮、支那に分布す。

Amarantaceae ヒユ科

153 *Achyranthes japonica* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXIV. (1920) p. 40

- 和名 キノコヅチ 方言 ヌストグサ
 生育地 谷間の蔭地に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口、大倉、
 荒平、新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣に分布す。
 本植物の根は薬用に供す。

Phytolaccaceae ヤマゴバウ科

154 *Phytolacca japonica* Makino in Bot. Mag. Tokyo XV. (1901) p. 142

- 和名 マルミノヤマゴバウ
 生育地 森林内の蔭湿地に生じ稀なり。(大倉)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

Aizoaceae ツルナ科

155 *Mollugo pentaphylla* Linn., Sp. Pl. ed.-1. (1753) p. 89

- syn. *Mollugo stricta* Linn., Sp. Pl. ed.-2. (1762) p. 131

- 和名 ザクロサウ
 生育地 陽地に生じ稀なり。(穴口)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 舊世界の熱帯、暖帯に廣く分布する一年生の雑草にして本邦
 にては本州各部、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

Caryophyllaceae ナデシコ科

- 156 *Cucubalus baccifer* Linn. var. *japonicus* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd.
Bat. III. (1866-67) p. 142

和名 ナンバンハコベ

生育地 谷間の陽地に生じ稀なり。(大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 莖は稍々蔓性を呈する多年生植物にして樺太、千島、北海道、
本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、ウスリに分布す。

- 157 *Dianthus superbus* Linn. var. *longicalycina* Williams in Journ. Linn.
Soc. XXIX. (1893) p. 411

和名 カハラナデシコ

生育地 原野に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分
布す。

- 158 *Stellaria aquatica* Scopoli, Fl. Carn. ed.-2, 1. (1760) p. 319

和名 ウシハコベ

生育地 伐採跡地に生じ稍々普通なり。(大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムール、ウスリ、
支那、琉球、臺灣、印度、北アフリカ、歐洲に分布す。

- 159 *Stellaria diversiflora* Maxim. in Mel. Biol. IX. (1873) p. 44

和名 サハハコベ

生育地 森林の蔭濕地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州に分布す。

160 *Stellaria Francheti* Honda in Bot. Mag. Tokyo XLIII. (1929) p. 541

- 和名 ミヤマハコベ、 マルバハコベ
 生育地 谷間の蔭湿地に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

161 *Stellaria media* Cyrill, Char. Comm. (1784) p. 36

- 和名 ハコベ 方言 チョンチョングサ、ハコベ
 生育地 伐採跡地に生じ稀なり。(穴口)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 世界の暖地に廣く分布し本邦にては北は樺太より南は臺灣迄分布す。

Nymphaeaceae ヒツジグサ科

162 *Brasenia Schreberi* Gmel., Syst. p. 853

- 和名 ジュンサイ
 生育地 水中に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 北海道、本州、九州、臺灣、朝鮮、滿洲、アメリカ北部、印度北部、濠洲、アフリカに分布す。

163 *Nymphaea tetragona* Georgi var. *angusta* Casp. subv. *orientalis* Caps.
 in Miq. Ann. Lugd. Bat. II. (1866) p. 251

- 和名 ヒツジグサ
 生育地 水中に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 北海道、本州、九州、朝鮮、支那に分布す。

Ceratophyllaceae マツモ科

164 *Ceratophyllum demersum* Linn., Sp. Pl. ed. 1. (1753) p. 992

- 和名 マツモ、キンギヨモ
 生育地 水中に生じ普通なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 世界の温帯より熱帯に亘り広く分布し本邦にては 北海道、
 本州、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

Ranunculaceae ウマノアシガタ科

165 *Cimicifuga acerina* Tanaka var. *obtusiloba* Nakai, MSS. in Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed.-2. (1931) p. 321

syn. *Cimicifuga japonica* Spreng, Syst. II. p. 628

- 和名 キケンショウマ、オホバショウマ
 生育地 造林地内に生じ稀なり。(穴口、新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 葉は三出にして小葉は心脚なり。本州、四國、九州に分布す。

166 *Cimicifuga foetida* Linn. var. *intermedia* Regel, Pl. Radd. I. (1861) p. 121

- 和名 サラシナショウマ
 生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(大倉)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 樺太、北海道、本州、九州に分布す。

167 *Clematis apiifolia* DC., Syst. I. (1818) p. 149

- 和名 ボタンヅル

生育地 森林内に生じ普通なり。(生ヶ谷、御手洗水、荒平、新建、大倉)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 大なるものは莖の直径三匁に達するものあり。本州、四國、九州、朝鮮南部、琉球、支那(北部、中部)に分布す。

168 *Clematis Benthamiana* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. XXIII. (1886-88) p. 2

和名 サキシマボタンヅル
 生育地 原野又は林縁に生じ稀なり。(生ヶ谷)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 一見センニンサウに似るも小葉は稍々圓く大形なり。
 本州、九州、琉球、支那に分布す。

169 *Clematis lasiandra* Maxim. in Mel. Biol. IX. (1877) p. 586

和名 タカネハンシャウヅル
 生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(大倉、新建、荒平)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 四國、九州に分布す。

170 *Clematis paniculata* Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. (1794) p. 337

和名 センニンサウ 方言 タンジヤクカヅラ
 生育地 林縁又は藪林に生じ普通なり。(生ヶ谷)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、支那に分布す。

171 *Clematis Pierotii* Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. (1868) p. 1

和名 コバノボタンヅル
 生育地 森林内に生じ稀なり。(新建、大倉)
 生活形 L (蔓性植物)

備考 本州、四國、九州、濟州島、琉球に分布す。

172 *Isopyrum trachyspermum* Maxim. in Mel. Biol. XI. (1883) p. 636

和名 トウゴクサバノヲ

生育地 谷間の蔭濕地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 高さ十糎内外の小草にして本州中南部、北九州に分布す。

173 *Pulsatilla cernua* Berch. & Presl, Rostl. I. Ranunculac. p. 22

syn. *Anemone cernua* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 238

和名 オキナグサ

生育地 原野に生じ稀なり。(穴口、上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、濟州島に分布す。

174 *Ranunculus Vernyii* Franch. et Savat., Enum. Pl. Jap. I. (1874) p. 8

syn. *Ranunculus Vernyii* Franch. et Savat. var. *japonicus* Nakai in Bot.

Mag. Tokyo XLII. (1928) p. 251

和名 キツネノボタン

生育地 水邊に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 千島、北海道、本州、小笠原、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

175 *Semiaquilegia adoxoides* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVI. (1902) p. 119

和名 ヒメウツ

生育地 原野に生じ普通なり。(高辻)

生活形 G (深地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

176 *Thalictrum Thunbergii* DC., Syst. I. (1818) p. 183

syn. *Thalictrum Thunbergii* DC. var. *hypoleucum* Nakai in Bot. Mag.

Tokyo XLII. (1928) p. 3

和名 アキカラマツ

生育地 原野に生じ稀なり。(飯盛、穴口)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

Lardizabalaceae アケビ科

177 *Akebia pentaphylla* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVI. (1902) p. 30

和名 ゴエフアケビ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(飯盛、御手洗水)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。一見アケビに似るも小葉は長大なり。

178 *Akebia quinata* Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser.-2, XII. (1839) p. 107

和名 アケビ

生育地 谷間の森林内に生じ普通なり。(穴口、新建、飯盛、荒平、生ヶ谷)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州、九州、朝鮮、支那に分布す。

179 *Akebia trifoliata* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1925) p. 310

和名 ミツバアケビ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、穴口、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 上記三者中最も北部迄分布す。北海道、本州、九州に分布す。

180 *Stauntonia hexaphylla* Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser.-2, XII. (1839) p. 10

和名 ムベ、トキハアケビ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、穴口、新建、荒平)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州、九州、濟州島、琉球、臺灣、香港に分布す。

Berberidaceae メギ科

181 *Nandina domestica* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 147

和名 ナンテン

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(穴口、上ノ山)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、九州、琉球、支那に分布す。

Menispermaceae ツツラフチ科

182 *Cocculus trilobus* DC., Syst. I. (1818) p. 522

和名 アヲツツラフチ 方言 アヲカツラ

生育地 森林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、上ノ山)

生活形 L (蔓性植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、比島に分布す。

183 *Sinomenium acutum* Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. III. (1913) p. 387

和名 オホツツラフチ 方言 ツツラカツラ

生育地 谷間の森林に生じ普通なり。(荒平(多)、飯盛、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、支那に分布し、根莖を薬用とす。

184 *Stephania japonica* Miers. in Ann. Mag. Nat. Hist. Ser.-3. XVIII. (1866)

p. 14

和名 ハスノハカヅラ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣、支那、比島、馬來、セイロン、ヒマラヤ、アフリカ、濠洲、ポリネシヤに分布す。

Magnoliaceae モクレン科

185 *Illicium anisatum* Linn., Sp. Pl. ed. 2. (1762) p. 664

syn. *Illicium anisatum* Thunberg, Fl. Jap. (1784) p. 235, non Linn.

Illicium japonicum Sieb., Syn. (1830) p. 50

Illicium religiosum Sieb. et Zucc., Fl. Jap. Fam. Nat. I. (1835) p. 185

和名 シキミ 方言 ハナシバ

生育地 峯通りの森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮(濟州島及南部諸島)、琉球、臺灣、支那、印度に分布す。

186 *Kadsura japonica* Juss. in Ann. Muss. Par. XVI. (1810) p. 340

和名 サネカヅラ 方言 ビンツケカヅラ

生育地 森林内に生じ普通なり。(生ヶ谷、荒平、飯盛、大倉、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

187 *Schizandra nigra* Maxim. in Mém. Biol. VIII. (1872) p. 370

和名 マツブサ

生育地 森林内に生じ稀なり。(大倉、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 北海道、本州、九州、濟州島に分布す。一見サネカヅラに似るも葉は短潤にして先端は尖り裏面は粉白なり。

Lauraceae ク ス 科

188 *Actinodaphne lancifolia* Meiss. in DC. Prodr. XV. 1. (1864) p. 211

和名 カゴノキ 方言 ナマズタブ

生育地 峯通りの森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、新建)

生活形 MM (喬木)

備考 樹皮の一部は圓形に剝離し斑紋を生ず。本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

189 *Benzoin glaucum* Sieb. et Zucc., Abh. Akad. Münch. IV. pt. III. (1846) p. 205

syn. *Lindera glauca* Blume, in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1850) p. 325

和名 ヤマカウバシ 方言 ナタノハオラシ

生育地 稍々乾燥せる森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、御手洗水、大倉、新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 稍々陽性の亞喬木にして五米以上に達することは稀なり。本州中南部、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

190. **Benzoin Thunbergii** Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Münch. IV. III. (1846)

p. 265

syn *Lindera Thunbergii* Makino in Bot. Mag. Tokyo XIV. (1900) p. 185

Benzoin erythrocarpum Rehder in Journ. Arn. Arb. I, 2. (1919) p. 144

和名 カナクギノキ

生育地 谷間の森林内に生じ普通なり。(生ヶ谷、大倉、新建、荒平)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮に分布す。

191 **Cinnamomum Camphora** Sieb., Syn. Pl. Oec. (1830) p. 23

syn *Cinnamomum Camphora* Nees et Eberm., Handb. Med. Pharm. Bot.

II. (1831) p. 430

和名 クスノキ

生育地 森林内に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 MM (喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣、支那に分布す。

192 **Cinnamomum pedunculatum** Nees, Syst. (1836) p. 79 excl. syn.

和名 ヤブニクケイ 方言 ニクケイタブ

生育地 森林内に生じ普通なり。(御手洗水、荒平、新建)

生活形 MM (喬木)

備考 極めて耐蔭力大なる喬木にして本州、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那に分布す。

var. **lancifolium** Hatusima, var. nov.

Folia minima lanceolata 3-5 cm. longa 0.8-1.8 cm. lata

Hab. in laurilignosis Shindate (leg. S. Hatusima No. 2408! Oct. 4, 1932)

和名 ホソバヤブニクケイ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 MM (喬木)

備考 新建の谷間の森林内に生じ樹高八米位ありて果枝の葉は披針形を呈し普通品に比し著しく小さし。

193 Machilus japonica Sieb. et Zucc., Fam. Nat. II. (1846) p. 202

和名 アヲガシ 方言 シラタブ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 MM (喬木)

備考 タブに比し葉は細長く樹皮は灰白色を呈す。本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣に分布す。

194 Machilus Thunbergii Sieb. et Zucc., l. c. p. 202

syn. *Machilus rimosa* Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat. I. (1851) p. 330

和名 タブ 方言 ムシクイタブ

生育地 谷間の森林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、御手洗水、新建)

生活形 MM (喬木)

備考 耐蔭性大なる喬木にして本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、臺灣、支那に分布す。

195 Neolitsea aciculata Koidzumi in Bot. Mag. Tokyo XXXII. (1918) p. 258

syn. *Tetradenia foliosa* Nees in Wall. Pl. As. Rar. II. (1831) p. 61

和名 イヌガシ、マツラニクケイ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建、荒平、御手洗水)

生活形 M (亞喬木)

備考 耐蔭力大なる亞喬木にして本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

196 *Neolitsea sericea* Koidzumi in Bot. Mag. Tokyo XL. (1926) p. 343

syn. *Tetradenia glauca* Matsum., Ind. Pl. Jap. II. pt. 2. (1912) p. 140

Neolitsea glauca Koidzumi in Bot. Mag. Tokyo XXXII. (1918) p. 257

Neolitsea Sieboldii Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLI. (1927) p. 520

和名 シロダモ

方言 タブ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建、生ヶ谷)

生活形 MM (喬木)

備考 耐蔭力大なる喬木にして直径三十糎内外に達す。本州中南部、九州、濟州島、臺灣に分布す。

Papaveraceae ケシ科

197 *Corydalis incisa* Pers., Syn. II. (1807) p. 269

和名 ムラサキケマン

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、濟州島に分布す。

Brassicaceae (*Cruciferae*) ナタネ科

198 *Arabis hirsuta* Scop., Fl. Carn. ed.-2. II. (1772) p. 30

和名 ヤマハタザホ 方言 ノガラシ (ハタザホにも通ず)

生育地 少々乾燥せる森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 高さ五十糎内外の二年生草本にして 歐洲、アジア (北部、東部) に廣く分布し本邦にては樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

199 *Capsella Bursa-pastoris* Medic, Pflanzeng. I. (1792) p. 85

var. *auriculata* Makino in Journ. Jap. Bot. II-5 (1921) p. 17

和名 ナヅナ

生育地 伐採跡地に生じ稀なり。(高辻、穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州中部、九州、朝鮮に分布す。

var. *pinnata* Makino, l. c.

和名 オホナヅナ 方言 ジャコシヤゴ

生育地 陽地に生じ稀なり。(高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 一見ナヅナに似るも下葉は羽状に深裂す。樺太、北海道、本州、琉球、臺灣、朝鮮、歐洲、アフリカ、濠洲、アメリカ北部に分布す。

200 *Cardamine hirsuta* Linn., Sp. Pl. ed. I. (1753) p. 655

和名 タネツケバナ

生育地 水邊に生じ稀なり。(穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 東部アジア、歐洲に分布し本邦にては北は樺太より南は臺灣迄分布す。

var. *latifolia* (Makino) comb. nov.

syn. *Cardamine flexuosa* With. var. *latifolia* Makino, Shokubutsu-Dzukan (1925) p. 447

和名 ミヅタネツケバナ

生育地 谷間の水邊に生じ少々普通なり。(新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 タネツケバナに比し葉の裂片は長大、綠色柔軟にして毛なし。九州、本州に分布す。

201 *Cardamine impatiens* Linn., Sp. Pl. ed.-I. (1753) p. 655

和名 ジャニンジン

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、琉球、濟州島に分布す。

202 *Nasturtium indicum* DC., Syst. II. (1825) p. 199

syn. *Nasturtium sublyratum* Franch. et Savat., Enum. Pl. Jap. II.

(1879) p. 281

和名 イヌガラシ

生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、琉球、朝鮮、臺灣、支那、比島、馬來、セイロン、印度に分布す。

Crassulaceae ベンケイサウ科

203 *Sedum bulbiferum* Makino Illustr. Fl. Jap. I.-10 (1891) t. 60

和名 コモチマンネングサ

生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮南部に分布す。

Saxifragaceae ユキノシタ科

204 *Chrysosplenium japonicum* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIII. (1909) p. 71

和名 ヤマネコノメサウ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、九州に分布す。

205 *Deutzia crenata* Sieb. et Zucc., Fl. Jap. I. (1835) p. 19

syn. *Deutzia scabra* Thunb. var. *crenata* Makino in Bot. Mag. Tokyo
XII. (1898) p. 341

和名 ウツギ、ウノハナ 方言 ウツギ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 N (灌木)

備考 北海道、本州、九州、支那(山東省)に分布す。

206 *Deutzia hebecarpa* Nakai in Matsum. Icon. Pl. Koishikav. I.-5. (1913) p. 127

和名 ツバメウツギ

生育地 水邊に生じ極めて稀なり。(穴口)

生活形 N (灌木)

備考 ウツギに酷似するも葉は單柄、廣卵形にして蒴果は短毛を密
生す。本州(隱岐)、九州北部に分布す。

207 *Hydrangea luteo-venosa* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1925) p. 4

和名 コガクウツギ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(穴口)

生活形 N (灌木)

備考 ガクウツギに比するに葉は小形にして光澤あり。本州、四國、
九州、琉球に分布す。

208 *Mitella stylosa* Boiss. in Bull. Herb. Boiss. (1897) p. 688

syn. *Mitella longispica* Makino in Bot. Mag. Tokyo VIII. (1894)
p. 8 nom. nud.

和名 チヤルメルサウ

生育地 谷間の水邊に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州に分布す。

209 Schizophragma hydrangeoides Sieb. et Zucc., Fl. Jap. I. (1835) p. 60

和名 イハガラミ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

Pittosporaceae トベラ科

210 Pittosporum Tobira Aiton, Hort. Kew. ed. 2. (1811) p. 27

和名 トベラ

生育地 森林内に生じ稀なり。(荒平、生ヶ谷)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州、小笠原、九州、琉球、朝鮮南部、支那に分布す。

Hamamelidaceae マンサク科

211 Distylium racemosum Sieb. et Zucc., Fl. Jap. I. (1835) p. 178

和名 イスノキ、ユス 方言 ユス

生育地 森林内に生じ稀なり。(新建、荒平、上ノ山)

生活形 MM (喬木)

備考 樹幹の直徑一米以上に達する喬木にして本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布す。

Spiraeaceae シモツケ科

212 Stephanandra incisa Zabel in Gart. Zeit. IV. (1885) p. 510

和名 コゴメウツギ

- 生育地 造林地内に生じ少々稀なり。(新建)
 生活形 N(灌木)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

Pomaceae ナ シ 科

213 *Amelanchier asiatica* Endlicher in Walp. Rep. II. (1843) p. 55

- 和名 ザイフリボク 方言 ナマス
 生育地 少々乾燥せる松林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、御手洗水、上ノ山)
 生活形 M(亞喬木)
 備考 樹幹の直径十糎以上に達するも通常灌木状を呈するもの多し。本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

214 *Micromeles japonica* Koehne, Gatt. Pomac. (1890) p. 21

- 和名 ウラジロノキ 方言 ウラジロ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、新建、飯盛)
 生活形 M(亞喬木)
 備考 本州、四國、九州に分布す。

215 *Pourthiaea laevis* Koidzumi in Fl. Symb. Orient.-Asia. (1930) p. 52

syn. *Photinia laevis* DC., Prod. II. (1825) p. 631

- 和名 カマツカ、コバノカマツカ(新稱) 方言 ヤマナシ
 生育地 少々乾燥せる林内又は峯通りに生じ普通なり。(生ヶ谷、新建、大倉、荒平、飯盛、鬼ヶ浦)
 生活形 M(亞喬木)
 備考 オホカマツカに似るも早春出る葉は帯紅色(彼は綠色)にして葉は小形、少々無毛、梨果又小形なり。本州、九州、朝鮮に分布す。

var. **villosa** Koidz., l. c.

syn. *Photinia laevis* DC. var. *villosa* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXIX.
(1925) p. 313

- 和名 オホカマツカ、ウシコロシ、ケカマツカ 方言 ヤマナシ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ少々稀なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

Rosaceae イバラ科

216 *Agrimonia pilosa* Ledebour var. **japonica** Nakai, Veg. Mt. Apoi (1930)

p. 54, no. 195

syn. *Agrimonia japonica* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XLIV. (1930) p. 104

- 和名 キンミツヒキ
 生育地 林縁に生じ少々稀なり。(生ケ谷、新建、鬼ケ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲、アムール、ウスリ、
 ダフリカ、支那 (中部、北部)、臺灣に分布す。

217 *Duchesnea indica* Focke in Engl. et Prantl, Pfl.-fam. III.-3. (1888) p. 33

- 和名 ヘビイチゴ
 生育地 林内の蔭地に生じ少々普通なり。(生ケ谷、新建)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、滿洲、支那、
 印度、ヒマラヤ、アフガニスタンに分布す。

218 *Duchesnea major* Makino in Journ. Jap. Bot. II. 5. (1921) p. 19

- 和名 ヤブヘビイチゴ
 生育地 森林内の蔭濕地に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (淺地下植物)

備考 ヘビイチゴに比するに小葉は濃綠色、卵形にして長六厘内外に達す。北海道、本州、九州に分布す。

219 Geum japonicum Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 220

和名 ダイコンサウ

生育地 林内の蔭濕地又は林縁に生じ稀なり。(生ヶ谷、大倉、荒平、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 肥沃なる土地を好む多年生草本にして樺太、北海道、本州、四國、九州に分布す。

220 Potentilla discolor Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. (1831) p. 25

和名 ツチグリ

生育地 原野に生じ稀なり。(上ノ山、生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 葉の裏面白色の綿毛を密生す。九州、朝鮮、支那、臺灣に分布す。

221 Potentilla fragarioides Linn. var. **Sprengeliana** Max. in Mel. Biol. IX. (1873) p. 160

和名 キジムシロ

生育地 稍々乾燥せる林内又は原野に生じ稀なり。(上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、シベリヤ、支那、印度に分布す。

222 Potentilla Freyniana Bornm. in Mitt. Thüring. Bot. Ver. n. s. XX. p. 12

和名 ミツバツチグリ

生育地 森林内又は林縁に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムールに分布す。

223 *Potentilla Kleiniana* Wight et Arn., Prod. (1834) p. 300

- 和名 ヲヘビイチゴ
 生育地 水邊の濕地に生じ稀なり。(事務所内)
 生活形 H(淺地下植物)
 備考 本州中南部、九州、朝鮮、滿洲、支那、印度に分布す。

224 *Rosa fujisanensis* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) p. 151

- 和名 フジイバラ
 生育地 森林内に生じ稀なり。(飯盛)
 生活形 N(灌木)
 備考 一見ヤマイバラに似るも小葉は遙かに小形にして花の直径二
 厘内外なり。本州中南部、九州に分布す。

225 *Rosa Onoei* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIII. (1909) p. 149

syn. *Rosa hakonensis* Koidz. in Fl. Symb. Orient.-Asia. (1930) p. 26

- 和名 ヤブイバラ、ニホヒイバラ
 生育地 林縁に生じ稀なり。(飯盛、鬼ヶ浦、生ヶ谷)
 生活形 N(灌木)
 備考 稍々蔓性を呈する灌木にして一見フジイバラに似るも葉は更
 に小形、薄質にして花梗は纖弱且白毛を密生す。本州、四國、
 九州に分布す。

226 *Rosa polyantha* Sieb. et Zucc. in Abh. Muench. Akad. IV. 3. (1845) p. 128

- 和名 ノイバラ
 生育地 林縁稀に森林内に生じ稀なり。(大倉、荒平、生ヶ谷、上ノ山)
 生活形 N(灌木)
 備考 森林内にありては十米に達するものあり。北海道、本州、
 四國、九州、朝鮮、南滿洲、支那北部に分布す。

var. **adenochaeta** Nakai in Bot. Mag. Tokyo XL. (1926) p. 569

和名 ックシサクラバラ

生育地 林縁に生じ稀なり。(穴口)

生活形 N(灌木)

備考 本州、九州、朝鮮に分布し、一見前者に酷似するも花は帯紅白色にして花梗は線毛のみを密生す。(彼は白毛を有し線毛は稀なり)

227 **Rosa sambucina** Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXI. (1917) p. 130

和名 ヤマイバラ

生育地 森林内に生じ稍々普通なり。(新建、荒平(多))

生活形 L(蔓性植物)

備考 幹の直径三糎、高さ十米以上に達し、徑三糎内外の白色の美花を開く。本州、四國、九州に分布す。

228 **Rosa Wichuraiana** Crepin. ex Franch. et Savat., Enum. I. (1875) p. 135

和名 テリハノイバラ 方言 アライゲ、ハヒイゲ

生育地 陽地に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)

生活形 N(灌木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那に分布す。

229 **Rubus Buergeri** Miquel in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. (1867) p. 36

和名 フユイチゴ 方言 カンイチゴ

生育地 森林内の蔭地に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、新建)

生活形 L(蔓性植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮南部、臺灣、支那に分布す。

230 **Rubus dulcis** Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXVIII. (1914) p. 284
syn. *Rubus palmatoides* O. Kuntze, Method. Spec. Rub. (1879) p. 93

和名 ナガバキイチゴ

生育地 森林内又は林縁に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。モミヂイチゴに似るも葉の中裂片は特に長く花瓣は稍々狭長なり。

231 *Rubus hakonensis* Franch. et Savat., Enum. Pl. Jap. I. (1875) p. 124

和名 ミヤマフユイチゴ

生育地 林縁に生じ稍々普通なり。(生ヶ谷、上ノ山、大倉、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、支那中部に分布す。

232 *Rubus hirsutus* Thunb., Diss. Rub. (1813) p. 7

和名 クサイチゴ

生育地 林縁に生じ普通なり。(生ヶ谷、大倉、荒平、新建)

生活形 N (灌木)

備考 草本状灌木にして本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

233 *Rubus minusculus* Levl. et Vnt., Bull. Soc. Agr. Sarth. LX. (1905) p. 63

和名 ヒメバライチゴ

生育地 林縁に生じ稀なり。(新建、大倉)

生活形 N (灌木)

備考 草本状灌木にして前者に似るも小葉は遙かに小形にして全株無毛なり。本州中南部、四國、九州に分布す。

234 *Rubus palmatus* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 217

和名 キイチゴ、モミヂイチゴ 方言 キイチゴ

生育地 疎林内又は林縁に生じ稀なり。(荒平、新建)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

235 Rubus phoenicolasius Maxim. in Mél. Biol. VIII. (1871) p. 384

和名 ウラジロイチゴ、エビガライチゴ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(大倉)

生活形 N (灌木)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那北部に分布す。

236 Rubus Sieboldi Blume, Bijdr. (1825) p. 1110

和名 ホウロクイチゴ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(荒平、御手洗水)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、支那中部に分布す。

237 Rubus triphyllus Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 215syn. *Rubus parvifolius* Linn., Sp. Pl. ed.-1. (1753) p. 1197

和名 ナハシロイチゴ 方言 ゴグアツイチゴ

生育地 陽地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、大倉、生ヶ谷)

生活形 N (灌木)

備考 本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、南滿洲、支那に分布す。

238 Rubus Wrightii A. Gray, Bot. Jap. (1859) p. 387

和名 クマイチゴ 方言 オニイチゴ

生育地 陽地に生じ稀なり。(大倉、新建、荒平)

生活形 N (灌木)

備考 北海道、本州、四國に分布す。

Amygdalaceae サクラ科

239 Prunus donarium Sieb. in Verh. Batav. Gen. XII. (1830) p. 68syn. *Prunus serrulata* Lindl. in Trans. Hort. Soc. London VII. (1830) p. 238

Prunus serrulata Lindl. var. *spontanea* Makino in Bot. Mag. Tokyo
XXVI. (1912) p. 176

- 和名 ヤマザクラ
生育地 森林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、大倉、生ヶ谷、新建、荒平)
生活形 MM (喬木)
備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

240 *Prunus spinulosa* Sieb. et Zucc., Fl. Jap. Fam. Nat. I. (1845) p. 122

- 和名 リンボク、カタザクラ 方言 クロザクラ
生育地 森林内に生じ極めて稀なり。(荒平)
生活形 M (亞喬木)
備考 本州中南部、四國、九州、琉球に分布す。

Fabaceae (*Leguminosae*) マメ科

241 *Albizzia Julibrissin* Durazz. in Mag. Tosc. III. pt. IV. (1792) p. 11

- 和名 ネムノキ 方言 カウカイ
生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口、新建)
生活形 MM (喬木)
備考 本州、四國、九州、朝鮮南部、臺灣、支那、印度に分布す。

242 *Astragalus sinicus* Linn., Mant. I. (1767) pl. 103

- 和名 レンゲ、レンゲサウ
生育地 水邊に生じ稀なり。(穴口)
生活形 H (淺地下植物)
備考 朝鮮、支那、臺灣に分布するも現在は本邦各地に栽培せられ
野生状をなす所多し。

243 *Caesalpinia japonica* Sieb. et Zucc., Fl. Jap. Fam. Nat. I. (1845) p. 117

- 和名 ジャケツイバラ 方言 サルカゲイゲ
 生育地 谷間の森林に生じ少々稀なり。(極楽、大倉、荒平、新建)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、琉球、支那、印度、マダカ
 スカルに分布す。

244 *Cassia mimosoides* Linn. var. *nomame* Makino in Journ. Jap. Bot. I.-5.

(1917) p. 17

- 和名 カハラゲツメイ、ネムチャ
 生育地 陽地に生じ稀なり。(極楽)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州、四國、九州、琉球、臺灣、支那北部、滿洲、ウスリ、
 朝鮮に分布す。

245 *Desmodium caudatum* DC., Prod. II. (1825) p. 337

- 和名 ミソナヲシ、ウジクサ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 N (灌木)
 備考 高さ一米以下の灌木にして本州中南部、四國、九州、濟州島、
 琉球、臺灣、支那、馬來に分布す。

246 *Desmodium Gardneri* Benth. in Miq. Pl. Jungh. (1852) p. 226

- 和名 オホバヌスビトハギ、トキハヤブハギ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 ヌスビトハギに比し葉は大形且光澤あり。本州中南部、四國、
 九州、臺灣、印度、セイロンに分布す。

247 *Desmodium Oldhami* Oliv. in Journ. Linn. Soc. (1867) p. 165

- 和名 フデカンザウ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那北部及中部に分布す。

248 *Desmodium racemosum* DC., Prod. II. (1825) p. 337

- 和名 ヌスビトハギ
 生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建、生ヶ谷、鬼ヶ浦)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、ダフリカ、支那、琉球、臺灣、印度に分布す。

249 *Dumasia truncata* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. I. (1845) p. 119

- 和名 ノササゲ 方言 クラウカヅラ
 生育地 林縁に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、新建)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州中南部、九州に分布す。

250 *Dunbaria villosa* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVI (1902) p. 35

- 和名 ノアヅキ、ヒメクズ
 生育地 林縁又は原野に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣に分布す。

251 *Falcata japonica* Komarov in Acta Hort. Petrop. XXII. (1903) p. 630

- 和名 ヤブマメ
 生育地 林縁に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)
 生活形 L (蔓性植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、ダフリカ、ウスリ、支那北部に分布す。

252 *Indigofera pseudo-tinctoria* Matsum. in Bot. Mag. Tokyo XVI. (1902) p. 62

和名 コマツナギ

生育地 陽地に生じ稀なり。(生ケ谷)

生活形 N (灌木)

備考 陽性の灌木にして本州中南部、九州、支那に分布す。

253 *Lespedeza cuneata* G. Don, Gen. Syst. II. (1832) p. 307

和名 メドハギ 方言 メンド

生育地 少々乾燥せる松林内に生じ稀なり。(御手洗水)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、印度支那、ヒマラヤ、印度、濠洲に分布す。

254 *Lespedeza homoloba* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXVII. (1923) p. 76

和名 オホマルバハギ(新稱)、ヤブハギ

生育地 陽地に生じ普通なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、御手洗水、大倉)

生活形 N (灌木)

備考 一見ミヤマハギに酷似するも小葉は大形にして總狀花序は葉より遙かに長く、萼の裂片は鈍頭なり。本州中南部、四國、九州に分布す。

255 *Lespedeza pilosa* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. I. (1845) p. 121

和名 ネコハギ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ケ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那中部に分布す。

256 *Lespedeza serpens* Nakai in Lesp. Jap. et Kor. (1927) p. 75

和名 ハヒメドハギ

生育地 池畔の草生地に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 概形メドハギに似るも伏臥性にして花は淡紫色なり。本州中南部、九州に分布す。

257 *Lotus corniculatus* Linn. var. *japonicus* Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.

(1864) p. 23

和名 ミヤコグサ、コガネバナ

生育地 陽地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、穴口、事務所)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四国、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

258 *Maackia floribunda* Takeda in Note Roy. Bot. Gard. Edinb. no. XXXVII.

(1913) p. 10

和名 ハネミノエンジュ、ツクシイヌエンジュ 方言 マゲキ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(穴口)

生活形 M (亞喬木)

備考 イヌエンジュに比し小葉は小形、無毛にして莢は上部縫線に沿ひて翼あり。本州中南部、九州に分布す。

259 *Medicago denticulata* Willd., Sp. III. (1800) p. 1414

和名 ウマゴヤシ

生育地 陽地に生じ稀なり。(事務所、高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 歸化品にして現在は各地に分布す。

260 *Microlespedeza Makinoi* Tanaka in Bult. Sci. Fakul. Terkult. Kjusu

Imp. Univ. I.-4. (1925) p. 204

和名 ヤハズサウ

生育地 草生地、路傍に生じ普通なり。(鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮、満洲、支那、ウスリ、アムール、
臺灣に分布す。

261 *Pueraria Thunbergiana* Benth. in Journ. Linn. Soc. London. Bot. IX.

(1865) p. 122

syn. *Pueraria hirsuta* Matsum. in Bot. Mag. Tokyo XVI. (1902) p. 91

和名 クズ 方言 クズマキ、クズマキカヅラ

生育地 森林内又は林縁に生じ普通なり。(生ヶ谷、大倉、新建、荒平)

生活形 L (蔓性植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、印度
に分布す。

262 *Rhynchosia acuminatifolia* Makino in Journ. Jap. Bot. II.-4. (1920) p. 14

和名 トキリマメ、オホバタンキリマメ

生育地 松林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、飯盛)

生活形 L (蔓性植物)

備考 タンキリマメに似るも全株毛茸少く、小葉は鋭尖頭にて葉質
稍々薄し。本州中南部、九州に分布す。

263 *Rhynchosia volubilis* Lour., Fl. Cochinch. (1790) p. 460

和名 タンキリマメ 方言 マメカヅラ

生育地 森林内に生じ稀なり。(御手洗水、生ヶ谷)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那に分布す。

264 *Vicia hirsuta* Koch, Synopsis. Fl. Germ. ed. 1. p. 191

和名 スズメノエンドウ 方言 コマメ

生育地 原野、林縁に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 アジア北部、歐洲、アフリカに分布し、本邦にありては本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

265 *Vicia sativa* Linn., Sp. Pl. ed.-1. (1753) 736

和名 カラスノエンドウ 方言 タエンドウ

生育地 林縁に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 歐洲、アフリカ北部、アジアに分布し本邦にては本州中南部、九州、琉球、臺灣に分布す。

266 *Vicia unijuga* Al. Br. in Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 12

和名 ナンテンハギ

生育地 林縁の陽地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、シベリヤ、支那に分布す。

267 *Wistaria brachybotrys* Sieb. et Zucc., Fl. Jap. I. t. 45. (1839) p. 92syn. *Kraunkia floribunda* Taub. var. *brachybotrys* Makino in Bot. Mag.

Tokyo XXV. (1911) p. 18

和名 ヤマフヂ

生育地 森林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、荒平、穴口)

生活形 L (蔓性植物)

備考 フヂに比し小葉は卵形多毛にして總狀花序は短大なり。
本州、四國、九州に分布す。

268 Wistaria floribunda DC., Prod. II. (1825) p. 390

syn. *Kraunthia floribunda* Taub. var. *typica* Makino in Bot. Mag. Tokyo
XXV. (1911) p. 17

和名 フヂ

生育地 林縁、水邊等に生じ稍々稀なり。(穴口)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州、四國、九州、琉球に分布す。

269 Wistaria japonica Sieb. et Zucc., Fl. Jap. I. t. 43. (1839) p. 88

syn. *Milletia japonica* A. Gray in Mém. Am. Acad. N. S. VI. (1859) p. 386

和名 ナツフヂ、ドヨウフヂ 方言 コフヂ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部に分布す。

Geraniaceae フウロサウ科

270 Geranium Thunbergii Sieb. et Zucc., Fl. Jap. Fam. Nat. I. (1839) p. 28

和名 フウロサウ、ゲンノショウコ

生育地 森林内の蔭地又は林縁に生じ普通なり。(大倉、生ヶ谷、
新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。全草を蔭
干して下痢止めに用ふ。

Oxalidaceae カタバミ科

271 Oxalis repens Thunb., Diss. Oxal. (1781) p. 16

syn. *Oxalis corniculata* Linn., Sp. Pl. ed. 1. (1753) p. 435, pro parte

和名 カタバミ

方言 コガネグサ、スユクサ

生育地 陽地に生じ少々普通なり。(生ヶ谷、高辻)

生活形 H (浅地下植物)

備考 舊世界の暖地に廣く分布し本邦にては北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

var. **stricta** (Linn.) comb. nov.

syn. *Oxalis stricta* Linn., Sp. Pl. ed. I. (1753) p. 435

Oxalis corniculata Linn. form. *erecta* Makino in Iinuma S. D. II. (1910) p. 664

和名 タチカタバミ

生育地 陽地に生じ少々普通なり。(高辻)

生活形 H (浅地下植物)

備考 概形前者と同一なるも莖は直立性なり。本州、九州、朝鮮に分布す。

var. **rubrifolia** (Makino) comb. nov.

syn. *Oxalis corniculata* Linn. var. *rubrifolia* Makino in Journ. Jap. Bot. III.-1. (1926) p. 2

和名 アカカタバミ

生育地 陽地に生じ少々稀なり。(高辻)

生活形 H (浅地下植物)

備考 概形カタバミに似て一般に小さく葉は濃紫色を呈す。本州、九州に分布す。

Rutaceae ヘンルウダ科

272 **Boenninghausenia japonica** Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXVI. (1922) p. 25

和名 マツカゼサウ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。有毒植物にして葉は血止、切傷を治するに用ふ。

273 *Fagara ailanthoides* Engl. in Engl. et Prantl, Pfl.-fam. III-4. (1897) p. 118

和名 カラスザンセウ 方言 アヲダラ

生育地 谷間の森林内に生じ少々稀なり。(新建)

生活形 MM (喬木)

備考 本州中南部、小笠原、四國、九州、濟州島、臺灣、支那に分布す。葉を煎じて感冒、マラリヤを治すに用ふ。又當地方にては本種の材を鯛網の浮子に用ふ。

274 *Fagara mantchurica* Honda in Bot. Mag. Tokyo XLVI. (1932) p. 633

syn. *Fagara schinifolia* Engl. in Engl. et Prantl, Pfl.-fam. III-4. (1897) p. 118, non Salisbury

和名 イヌザンセウ

生育地 林縁に生じ少々稀なり。(新建、荒平)

生活形 N (灌木)

備考 本州、四國、九州、琉球、朝鮮、支那に分布す。

275 *Skimmia repens* Nakai var. *typica* Makino in Journ. Jap. Bot. VIII. 3.

(1932) p. 17

syn. *Skimmia repens* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLI. (1927) p. 504

和名 ツルシキミ

生育地 峯通りの森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 N (灌木)

備考 ミヤマシキミに酷似するも葉は少々小さく莖の下部は匍匐性にして山地性なり。本州、四國、九州に分布す。果實は味辛辣にしてシキミアニン及シキミンを含有し有毒なり。

276 *Zanthoxylum piperitum* DC., Prodr. I. (1824) p. 725

和名 サンセウ

生育地 谷間の森林内に生じ少々稀なり。(新建、荒平、御手洗水)

生活形 N(灌木)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。果實は調味料に用ふる外、蛔蟲驅除薬又は解毒、殺蟲劑として用ふ。

277 *Zanthoxylum planispinum* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. I. (1845) p. 115

和名 フユザンセウ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建、大倉)

生活形 N(灌木)

備考 本州、四國、九州、琉球、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

Simarubaceae ニガキ科

278 *Picrasma quassioides* Benn., Pl. Jav. Rar. (1838) p. 198

和名 ニガキ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(穴口、荒平)

生活形 M(亞喬木)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、臺灣、支那、印度に分布す。莖葉共に苦味強く且有毒成分を含有す。而して其樹皮の滲出液は驅蟲劑とし又苦味健胃劑として用ふ。

Polygalaceae ヒメハギ科

279 *Polygala japonica* Houtt., Nat. Hist. Veget. X. (1779) p. 89. t. 62. f. 1

和名 ヒメハギ

生育地 少々乾燥せる林内又は草生地に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、大倉、上ノ山)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、ウスリ、支那、琉球、臺灣に分布す。地下莖は祛痰劑としてガネ根の代用とす。

Euphorbiaceae タカトウタイ科

280 *Daphniphyllum glaucescens* Blume, Bijdr. (1825) p. 1153

和名 ヒメユヅリハ 方言 コユヅリ、コメユヅリ

生育地 森林内に生じ稍々普通なり。(御手洗水、荒平、新建、生ヶ谷)

生活形 M (亞喬木)

備考 耐蔭力大なる樹木にして本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那、セイロン、瓜哇に分布す。

281 *Daphniphyllum macropodium* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. (1867) p. 129

和名 ユヅリハ

生育地 森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、新建)

生活形 MM (喬木)

備考 ヒメユヅリハに似るも葉は長大なり。本州中南部、四國、九州、朝鮮、支那に分布し、葉及樹皮の煎汁を驅蟲劑とす。

282 *Euphorbia Helioscopia* Linn., Sp. Pl. ed.-1. (1753) p. 459

和名 トウダイグサ 方言 ドクグサ

生育地 畑地に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 歐洲、アジアに廣く分布し本邦にては本州中南部、九州、濟州島、琉球に産す。有毒植物なれど民間水腫藥とし又其莖汁は疣黒子を除くに用ふ。

283 *Euphorbia humifusa* Willd., Enum. Hort. Berol. Suppl. p. 27

和名 ニシキサウ

生育地 陽地に生じ稀なり。(高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムール、蒙古、支那、シベリヤ、臺灣に分布す。葉莖より得らるゝ乳汁を疣に用ひて之を除去する効ありと云ふ。

284 *Euphorbia maculata* Linn., Sp. Pl. ed. 1. (1753) p. 455

和名 コニシキサウ

生育地 陽地に生じ稀なり。(穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 北米原産の匍匐性草本にして日本各地に分布す。

285 *Excoecaria japonica* Muel.-Arg. in Linnaea, XXXII. (1863) p. 123

syn. *Sapium japonicum* Pax & K. Hoffmann in Engl., Pfl.-reich.
Heft-52. (1912) p. 147

和名 シラキ

生育地 谷間の森林に生じ少々稀なり。(荒平、新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、支那に分布す。

286 *Glochidion obovatum* Sieb. et Zucc., Fam, Nat. I. (1845) p. 143

和名 カンコノキ 方言 ヒヒラギ

生育地 林縁に生じ稀なり。(生ヶ谷、飯盛、御手洗水)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球に分布す。

287 *Mallotus japonicus* Muell-Arg. in *Linnaea*, XXXIV. (1865) p. 189

- 和名 アカメガシハ 方言 アカメ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那に分布す。
 葉を搗き或ひは果實を煎じて腫物に貼付或ひは洗條す。

288 *Phyllanthus flexuosus* Muell-Arg. in DC., *Prodr.* XV.-2. (1866) p. 324

- 和名 コバンノキ
 生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(大倉、新建)
 生活形 N (灌木)
 備考 本州中南部、四國、九州、支那に分布す。

289 *Phyllanthus Matsumurae* Hayata, *Rev. Euphorb.* (1904) p. 11

- 和名 ヒメミカンサウ
 生育地 草生地に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州各部、九州に分布す。

Anacardiaceae ウルシ科

290 *Rhus javanica* Linn., *Sp. Pl. ed.-1.* (1753) p. 265

- 和名 ヌルデ、フシノキ 方言 フシノキ
 生育地 陽地に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、御手洗水)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 支那の原産と稱せらるも現在はアジアの暖地に廣く分布し本邦にては北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。
 本種より五倍子を採集し、收斂劑及び止血劑、止痢劑、解毒劑として用ふ。

291 *Rhus succedanea* Linn., Mant. II. (1771) p. 221

- 和名 ハゼノキ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷)
 生活形 MM (喬木)
 備考 元來支那の原産と稱せらるるも往々野生状をなす所あり。材は黄色なるを以て寄木、木像嵌其他小なる器具類を造り又實より木蠟を採る。印度、ヒマラヤ、瓜哇、支那中部に分布す。

292 *Rhus sylvestris* Sieb. et Zucc., Fl. Jap. Fam. Nat. I. (1845) p. 140

- 和名 ヤマハゼ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、御手洗水、大倉、新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 ハゼに比し葉は粗毛を有し羽片は大形にして長橢圓形をなす。本州中南部、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

293 *Rhus trichocarpa* Miquel in Ann. Lugd. Bat. II. (1865) p. 84

- 和名 ヤマウルシ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 ヤマハゼに酷似するも核果は小形黄色の粗毛を密布す。千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

Aquifoliaceae モチノキ科

294 *Ilex crenata* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 78

- 和名 イヌツゲ 方言 ヨメガサラ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、上ノ山、穴口、新建)

生活形 N (灌木)

備考 樺太、千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。
當地方にては本種の枝を海中に沈下させ烏賊を採るに使用する。

295 *Ilex integra* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 77

和名 モチノキ 方言 トリモチノキ

生育地 森林内に生じ極めて稀なり。(新建、生ヶ谷)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州、小笠原、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣、支那に分布す。
樹皮より烏麴を製す。

296 *Ilex latifolia* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 79

和名 タラエフ 方言 オホバトリモチノキ

生育地 谷間の森林内に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、支那 (Tschekiáng) に分布す。

297 *Ilex macropoda* Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 105

syn *Ilex dubia* var *macropoda* Loes. in Acta Leop.-Carol. XXVII. (1901) p.

和名 アヲハダ

生育地 稍々乾燥せる峯通りの森林内に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。葉を茶の
代用とす。

298 *Ilex Oldhami* Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 105

和名 ナナメノキ 方言 アヲキシバ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、穴口、極樂、鬼ヶ浦)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、支那に分布す。

299 *Ilex pedunculosa* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. (1867) p. 106

和名 ソヨゴ

生育地 少々乾燥せる峯通りの森林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、御手洗水、新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。葉の煎汁を褐色の染料とす。

300 *Ilex rotunda* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 77

和名 クロガネモチ、フクラシバ

生育地 谷間の森林に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 MM (喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那に分布す。

301 *Ilex serrata* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 78

和名 イヌウメモドキ

生育地 少々乾燥せる松林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 N (灌木)

備考 ウメモドキに比し葉は無毛なり。四國、九州に分布す。

Celastraceae ニシキギ科

302 *Celastrus orbiculatus* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 42

syn. *Celastrus articulatus* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 97

Celastrus Tatarinowii Rupr. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. Ser.-2,

XV. (1857) p. 357

和名 ツルウメモドキ 方言 マユミカヅラ

生育地 林内に生じ普通なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

303 *Celastrus punctatus* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 97

syn. *Celastrus orbiculatus* Thunb. var. *punctatus* Rehder in Bail. Cycl.

Am. Hort. I. (1900) p. 267

和名 テリハツルウメモドキ

生育地 林縁に生じ稀なり。(上ノ山)

生活形 L (蔓性植物)

備考 前者に比し葉は稍々小さく光澤あり。九州、朝鮮南部、支那に分布す。

304 *Celastrus stephanotifolius* Makino in Journ. Jap. Bot. III. (1926) p. 46

syn. *Celastrus articulatus* Thunb. var. *pubescens* Makino in Bot. Mag.

Tokyo VII. (1893) p. 102

Celastrus articulatus Thunb. var. *stephanotifolius* Makino in Journ.

Jap. Bot. III. (1926) p. 24

和名 オホツルウメモドキ、シタキツルウメモドキ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 . ツルウメモドキに比し葉は大形にして裏面の中肋に毛茸を密生し幹は深裂せず灰白色を呈す。本州中部、四國、九州、朝鮮南部に分布す。

305 *Euonymus alatus* Sieb. var. *subtriflora* Franch. et Savat., Enum. Pl. Jap.

II. (1879) p. 311

syn. *Euonymus alatus* Miq. var. *striatus* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXI.

(1907) p. 138

和名 コマユミ

方言 マユミ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、新建)
 生活形 N (灌木)
 備考 南千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

306 *Euonymus oxyphyllus* Miquel in Ann. Lugd. Bat. II. (1865) p. 86

和名 ツリバナ
 生育地 峯通りの森林に生じ普通なり。(新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

307 *Euonymus radicans* Sieb. in Herb. ex Miq. Anz. Lugd. Bat. III. (1867) p. 202

syn. *Euonymus japonicus* Thunb. var. *radicans* Miq. in Ann. Mus.
 Bot. Lugd. Bat. II. (1865) p. 86

和名 ツルマサキ
 生育地 樹上に着生し稀なり。(荒平、大倉)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

308 *Euonymus Sieboldianus* Blume, Bijdr. (1825) p. 1147

和名 マユミ
 生育地 森林内に生じ稀なり。(大倉、新建、荒平)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 南千島、樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那、ヒマラヤに分布す。

Staphyleaceae ミツバウツギ科

309 *Euscaphis japonica* Dippel, Handb. Laubholz. II. (1892) p. 480. f. 229

syn. *Euscaphis japonica* Pax in Engl. et Prantl, Pfl.-fam. III.-5. (1896)
p. 262

和名 ゴンズイ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、臺灣、支那中部に分布す。

Aceraceae カヘデ科

310 *Acer formosum* Carr. in Rev. Hort. XXXIX. (1867) p. 300

syn. *Acer eupalmatum* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1925) p. 316

Acer roseomarginatum van Houtte var. *eupalmatum* Koidz. in Bot.
Mag. Tokyo XLIII. (1929) p. 382

和名 イロハモミヂ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(荒平、新建)

生活形 MM (喬木)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

311 *Acer rufinerve* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. I. (1845) p. 155

和名 ウリハダカヘデ 方言 ヤマアラギリ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建、御手洗水)

生活形 MM (喬木)

備考 本州、四國、九州に分布す。

312 *Acer Sieboldianum* Miquel in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1865) p. 87

syn. *Acer Sieboldianum* Miquel var. *typicum* Maxim. in Mel. Biol. XII.
(1886) p. 433

和名 イタヤメイゲツ、キバナハウチハカヘデ

生育地 稍々乾燥せる峯通りの森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 MM (喬木)

備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

Sabiaceae アヲカツラ科

313 *Meliosma myriantha* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. I. (1845) p. 158

和名 アハブキ

生育地 谷間の森林内に生じ極めて稀なり。(飯盛、御手洗水、新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、支那北部に分布す。

314 *Meliosma rigida* Sieb. et Zucc., l. c. p. 152

和名 ヤマビハ

生育地 急傾斜の岩石地帯に生じ稀なり。(荒平)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、支那南部、ヒマラヤに分布す。

Balsaminaceae ホウセンクワ科

315 *Impatiens Textori* Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. (1865) p. 76

和名 ツリフネサウ

生育地 谷間の水邊に生じ稀なり。(新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

Rhamnaceae クロウメモドキ科

316 *Berchemia racemosa* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. I. (1845) p. 147

和名 クマヤナギ

方言 クロガネカツラ

- 生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、支那に分布し、材は極めて硬し。

317 *Rhamnella franguloides* Wehrbauer in Engl. et Prantl, Pfl.-fam. III.-5.
 (1895) p. 406

- 和名 ネコノチチ
 生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮南部、支那に分布す。

Vitaceae フダウ科

318 *Ampelopsis brevipedunculata* Maxim. var. ***glabrifolia*** Honda in Bot.
 Mag. Tokyo XLV. (1931) p. 423

- 和名 テリハノブダウ 方言 イヌガラミ
 生育地 林縁又は林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州、九州、琉球に分布す。ノブダウに比し全株無毛葉面光澤あり。

319 *Parthenocissus Thunbergii* Nakai in Journ. Jap. Bot. VI.-8. (1930) p. 56
 syn. *Parthenocissus tricuspidata* Planch. in DC. Monogr. V. (1887) p. 452

- 和名 ッタ、ナツツタ
 生育地 岩面又は樹幹に着生し稍々普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、飯盛、荒平)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、南滿洲、琉球、臺灣、支那に分布す。

320 *Vitis flexuosa* Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. (1793) p. 103

和名 サンカクヅル、ギヤウジャノミヅ

生育地 林縁に生じ稍々普通なり。(荒平、大倉、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那に分布す。

321 *Vitis Thunbergii* Sieb. et Zucc. var. *sinuata* Rehder in Journ. Arn.

Arb. III.-4. (1922) p. 422

和名 キクバエビヅル 方言 ガラミ、ホンガラミ

生育地 林縁に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、荒平)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、支那に分布す。

Elaeocarpaceae ホルトノキ科

322 *Elaeocarpus japonicus* Sieb. et Zucc., Fl. Jap. Fam. Nat. I. (1845) p. 165

和名 コバンモチノキ

生育地 谷間の森林内に生じ極めて稀なり。(御手洗水)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、支那に分布す。

323 *Elaeocarpus Makinoi* Kanehira ex Hatusima in Bult. Exper. Forest

Kyushu Imperial University III. (1933) p. 119

syn. *Prunus elliptica* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 179

Elaeocarpus japonica (non Sieb. et Zucc.) Sieb., Syn. Pl. Oecon.

Jap. (1830) p. 63

Elaeocarpus photiniaefolia (non Hook. et Arn.) Sieb. et Zucc. in.

Abh. Münch. Akad. IV.-2. (1845) p. 164

Elaeocarpus ellipticus Makino in Bot. Mag. Tokyo XVIII. (1904)
p. 67 non Sm.

Elaeocarpus decipiens (non Hemsl.) Matsum., Ind. Pl. Jap. II.-2.
(1912) p. 344

Elaeocarpus elliptica Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXII. (1918)
p. 221

和名 ホルトノキ

生育地 谷間の森林内に生じ極めて稀なり。(御手洗水、生ヶ谷)

生活形 MM (喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布す。

Actinidiaceae サルナシ科

- 324** *Actinidia arguta* Planchon in Hook. Lond. Journ. Bot. VI. (1847) p. 303
syn. *Actinidia callosa* Lind. var. *arguta* Makino in Bot. Mag. Tokyo, XV.
(1901) p. 148

和名 サルナシ、シラクチヅル

生育地 森林内に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那北部、滿洲、ウスリに
分布す。果實は生食して美味なり。

- 325** *Actinidia hypoleuca* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXVII. (1913) p. 163

和名 ウラジロサルナシ、ウラジロマタタビ

生育地 森林内に生じ稀なり。(御手洗水、大倉、上ノ山)

生活形 L (蔓性植物)

備考 サルナシに似るも葉は稍々小形にして裏面は粉白なり。本州
中南部、九州に分布す。

326 *Actinidia polygama* Maxim. in Mem. Sav. Etr. Acad. Sci. St. Petersb.

IX. (1859) p. 64

和名 マタタビ

生育地 森林内に生じ稀なり。(大倉、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、ウスリ、支那北部に分布す。果實に熱湯をかけ蔭干にしたるものは疝氣、淋病を治し、葉は疝氣による腹痛を治す効ありと云ふ。果實は鹽漬として食用とし、果實共に猫の好んで食するものとして有名なり。

327 *Actinidia rufa* Planchon apud Miq. in Annal. Mus. Bot. Lugd. Batav.

II. (1867) p. 15

syn. *Actinidia callosa* Lind. var. *rufa* Makino in Bot. Mag. Tokyo XV.

(1901) p. 147

和名 ナシカヅラ、シマサルナシ

生育地 急傾斜の岩石地に生じ稀なり。(荒平)

生活形 L (蔓性植物)

備考 サルナシに似るも葉は稍々狭長にして厚く裏面の脈腋には小枝、新芽と共に褐毛を有す。本州中南部、四國、九州、琉球に分布す。

Ternstroemiaceae ツバキ科

328 *Camellia japonica* Linn., Sp. Pl. ed. 1. (1753) p. 698

和名 ヤマツバキ、ヤブツバキ

生育地 森林内に生じ普通なり。(御手洗水、生ヶ谷、荒平、新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那に分布す。

var. *longifolia* Nakai in Rigakkai XX. 4. (1922) p. 5

和名 ナガバヤマツバキ

生育地 森林内に生じ極めて稀なり。(御手洗水)

生活形 M (亞喬木)

備考 葉は廣披針形を呈す。九州の特産にして對馬にも分布す。

329 *Eurya japonica* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 191

和名 ヒサカキ 方言 シヤシヤギ

生育地 森林内に生じ普通なり。(生ヶ谷、大倉、荒平、鬼ヶ浦)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣、支那、印度に分布す。

330 *Ternstroemia gymnanthera* Sprague in Journ. Bot. LXI. (1823) p. 18

syn. *Ternstroemia japonica* Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. (1794) p. 335
pro parte

Taonabo japonica Szys. in Nat. Pfl.-fam. III.-6. (1893) p. 188

Ternstroemia Mokof Nakai, Fl. Sylv. Kor. XVII. (1928) p. 86

和名 モクコク

生育地 森林内に生じ極めて稀なり。(上ノ山)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那、印度支那、印度、ボルネオに分布す。

331 *Tristylidium ochraceum* Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. IXXXIX. (1918) p. 572

syn. *Cleyera japonica* Thunb., Nov. Gen. III. (1783) p. 69 pro parte

Cleyera ochracea DC. in Mém. Hist. Nat. Geneve I. (1822) p. 524 pro parte

Freziera ochracea Nakai, Veg. Isl. Quelpaert, (1914) p. 64. no. 893.

Sakakia ochracea Nakai in Fl. Sylv. Kor. XVII. (1928) p. 77

- 和名 サカキ
 生育地 森林内に生じ極めて稀なり。(御手洗水、上ノ山)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那、ビルマに分布す。

Hypericaceae オトギリサウ科

332 *Hypericum erectum* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 296

- 和名 オトギリサウ
 生育地 原野に生じ普通なり。(生ケ谷、大倉、鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、千島、北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲に分布す。

333 *Hypericum japonicum* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 295

- 和名 ヒメオトギリ
 生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ケ谷、穴口)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、比島、ヒマラヤ、セイロン、ニュージーランド、濠洲に分布す。

334 *Hypericum Makinoi* Lev. in Bull. Soc. Bot. Fr. (1906) p. 502

- 和名 アゼオトギリ
 生育地 谷間の蔭地に生じ極めて稀なり。(新建、穴口)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、九州に分布す。

Violaceae スミレ科

335 *Viola grypceras* A. Gray in Perry, Jap. Exped. II. (1856-57) p. 308

和名 タチツボスミレ

生育地 林内各所の蔭地に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口、御手洗水、大倉、荒平、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、九州、濟州島、琉球に分布す。

336 *Viola japonica* Langsd. ex Ging. in DC. Prodr. I. (1824) p. 295

和名 コスミレ

生育地 林内各地の蔭地に生じ普通なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、新建、大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣、支那、印度に分布す。

337 *Viola mandshurica* W. Beck. var. *ciliata* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXVI. (1922) p. 61

和名 スミレ

生育地 林縁、水邊等に生じ普通なり。(御手洗水、生ヶ谷、穴口)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムール、ダフリカ、支那、臺灣、印度に分布す。

338 *Viola nipponica* Maxim. in Mém. Biol. IX. (1876) p. 739

和名 アフヒスミレ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、九州に分布す。

339 *Viola obtusa* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912) p. 151

和名 ニホヒタチツボスミレ

生育地 林内に生じ稀なり。(穴口、生ヶ谷、飯盛)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 一見ナガバノタチツボスミレに似るも葉は稍々短く全株有毛
 なり。本州、九州に分布す。

340 *Viola ovato-oblonga* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXI. (1907) p. 59

和名 ナガバノタチツボスミレ
 生育地 林内の蔭地に生じ普通なり。(大倉、新建、荒平、生ヶ谷)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

341 *Viola phalacrocarpoides* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIII. (1909) p. 136

和名 フカスミレ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、新建、大倉)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州中南部、九州に分布す。

342 *Viola verecunda* A. Gray in Mem. Acad. Am. N. S. VI. (1858) p. 382

var. *semilunaris* Maxim. in Mém. Biol. IX. (1876) p. 750

和名 アギスミレ
 生育地 水湿地に生じ稀なり。(穴口)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 葉は稍々半月形を呈す。北海道、本州、九州に分布す。

var. *typica* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVII. (1913) p. 153

和名 ツボスミレ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(大倉、鬼ヶ浦)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、臺灣に分布す。

343 Viola violacea Makino, *Illustr. Fl. Jap.* I-II. (1891) t. 67

和名 シハイスミレ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、御手洗水、大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、濟州島に分布す。葉裏帯紫色を呈するを以て一見他の種と區別すること容易なり。

Flacourtiaceae イイギリ科**344 Cathayaia polycarpa** Ohwi in Mayebar, *Fl. Austro-higoensis* (1931) p. 86syn. *Idesia polycarpa* Maxim. in *Mél. Biol.* VI (1866) p. 19

和名 イイギリ 方言 ノギリ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 MM (喬木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那に分布す。

345 Xylosma Apactis Koidz. in *Bot. Mag. Tokyo* XXXIX. (1925) p. 316syn. *Apactis japonica* Thunb., *Nov. Gen. Pl.* III. (1783) p. 66*Xylosma japonicum* A. Gray in *Mem. Am. Acad.* VI. (1854) p. 381*Myroxylon japonicum* Makino in *Bot. Mag. Tokyo* XVIII. (1904) p. 53*Xylosma congesta* Merr. in *Philipp. Journ. Sci.* XV. (1919) p. 247

和名 クスドイゲ 方言 ヤネジヨロ

生育地 森林内の蔭地に生じ普通なり。(生ヶ谷、荒平)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州南部、四國、九州、濟州島、臺灣、支那、印度支那、比島に分布す。

Stachyuraceae キブシ科

346 *Stachyurus praecox* Sieb. et Zucc., Fl. Jap. (1836) p. 43

和名 キブシ、マメブシ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(新建)

生活形 N (灌木)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球(?)に分布す。

Wikstroemiaceae チンチヤウゲ科

347 *Daphne kiusiana* Miquel in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 134

和名 コセウノキ、カラスシキミ 方言 ヤマガンビ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(大倉、新建、荒平)

生活形 N (灌木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮南部に分布す。

348 *Wikstroemia trichotoma* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXV. (1901) p. 84

和名 キガンビ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(御手洗水、生ヶ谷、上ノ山)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部に分布す。花は水腫及祛痰薬として用ふ。

Elaeagnaceae グミ科

349 *Elaeagnus crispa* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 66syn. *Elaeagnus umbellata* Thunb., l. c.

和名 アキグミ

方言 ヒグミ

生育地 林縁に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、御手洗水)

生活形 N (灌木)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

350 *Elaeagnus glabra* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 67

和名 ツルグミ 方言 カヅラグミ

生育地 森林内に生じ少々稀なり。(御手洗水、荒平、上ノ山)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮南部、支那に分布す。

351 *Elaeagnus hypo-argentea* Hatusima, sp. nov.

Arborescens alte scandens. Rami et ramuli dense cupreo-lepidoti. Folia biennia. Petioli 4-10 mm. longi cupreo-lepidoti supra sulcati; lamina elliptica vel late lanceolata vel lanceolata, margine integra repanda, apice cuspidata vel acuta, basi acuta, 40-100 mm. longa 13-40 mm. lata, supra primo lepidibus fuscescentibus vestita demum glabrescentia viridia lucidaque, subtus argenteo-lepidota sed lepidibus fuscescentibus sparsim punctulata. Flores auctumnales axillares 1-3 penduli. Pedunculi 2 mm. longi cupreo-lepidoti, calycis tubus dilatatus 5-6 mm. longus, limbis late ovatis 3 mm. longis, extus argenteo-atque fusco-lepidotus. Fructus ellipsoideus ruber

Nom. Nipp. Uragin-turugumi

Hab. Kasugabaru, Prov. Chikuzen (leg. S. Hatusima, no. 5159!, Decem. 22, 1932)

Distr. Prov. Chikuzen; Nogōchi (leg. S. Hatusima, no. 3469, 3766); Mt. Inunaki (leg. S. Hatusima no. 3472); Mt. Seburiyama (leg. S. Hatusima no. 3468)

This new species is nearest to *Elaeagnus glabra* Thunb., but it differs in having much shorter dilatate calyx tubes and much narrower leaves which are silvery beneath.

和名 ウラギンツルグミ (新稱)

生育地 谷間の森林内に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 一見ツルグミに似るも花は短大にして葉裏は銀白色を呈す。

352 *Elaeagnus pungens* Thunb. var. *typica* Schneid., Illus. Handb. Laubholz.

II. (1909) p. 413

syn. *Elaeagnus pungens* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 68

和名 ナハシログミ

生育地 林縁又は松林内に生じ少々普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、新建)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

Lythraceae ミソハギ科

353 *Lythrum Salicaria* Linn., Sp. Pl. ed. I. (1753) p. 446

和名 エゾミソハギ 方言 ソウハギ

生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 アジア、歐洲に分布し本邦にては樺太、千島、北海道、本州、九州、朝鮮に分布す。一見ミソハギに似るも莖葉共に粗毛を布き葉は披針形を呈し少々心脚なり。

Trapaceae ヒシ科

354 *Trapa natans* Linn. var. *bispinosa* Makino in Iinuma, S. D. I. (1907)

p. 137

和名 ヒシ

生育地 水中に浮遊し稀なり。(鬼ヶ浦、上ノ山)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、九州、濟州島に分布す。

Oenotheraceae アカバナ科

355 *Circaea quadrisulcata* Maxim. in Franch. et Sav., Enum. I. (1875) p. 169

和名 ミヅタマサウ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(大倉、新建、荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

356 *Epilobium pyrriholophum* Franch. et Savat., Enum. I. (1875) p. 168

和名 アカバナ

生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

357 *Ludwigia ovalis* Miquel in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 95

和名 ミヅユキノシタ

生育地 水中に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、上ノ山)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州に分布す。

358 *Ludwigia prostrata* Roxb., Hort. Beng. (1814) p. 11

和名 チャウジタデ、タゴバウ

生育地 水中に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州各部、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、馬來、比島、印度其他アジアの熱帯に廣く分布す。

359 *Oenothera tetraptera* Cav., Ic. III. (1794) p. 40

和名 ツキミサウ

方言 ケイセイサウ

- 生育地 荒廢地に生じ普通なり。(高辻)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 メキシコ原産の二年生又は多年生植物にして現在は本邦各地に分布す。

Halorhagaceae アリノタフグサ科

360 *Halorhagis micrantha* R. Br. ex Sieb. et Zucc. Fam. Nat. I. (1845) p. 25

- 和名 アリノタフグサ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、御手洗水)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 アジア東部、濠洲、ニウージランドに分布し本邦にては北海道、本州、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

Araliaceae ウコギ科

361 *Aralia cordata* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 127

- 和名 ウド 方言 シカ
 生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(大倉、新建、荒平)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、滿洲に分布す。

362 *Aralia elata* Seem. in Journ. Bot. VI. (1868) p. 134

- 和名 タラノキ
 生育地 林縁に生じ稍々稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)
 生活形 N (灌木)
 備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、滿洲、アムールに分布す。

var. *canescens* Nakai in Journ. Arn. Arb. V. (1924) p. 31

和名 メダラ

生育地 林縁に生じ稀なり。(荒平、生ヶ谷)

生活形 N (灌木)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。葉の下面は白色又は褐色の絨毛を布き刺少し。

363 *Fatsia japonica* Decaisne & Planchon in Rev. Hort. III. (1854) p. 105

和名 ヤツデ 方言 オンノテ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 N (灌木)

備考 九州、小笠原、琉球、朝鮮南部に分布す。

364 *Hedera Tobleri* Nakai in Fl. Sylv. Korea. XVI. (1927) p. 42

syn. *Hedera japonica* Tobler, Gatt. Hedera (1912) p. 84

和名 キヅタ、フユヅタ

生育地 樹上に着生し普通なり。(生ヶ谷、新建、大倉、荒平)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮南部、琉球に分布す。

365 *Kalopanax autumnalis* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXVII. (1923) p. 58

和名 ミヤコダラ 方言 オニダラ

生育地 池畔の森林内に生じ稀なり。(穴口)

生活形 MM (喬木)

備考 一見ハリギリに酷似するも樹皮は彼よりも深裂し黒からず、花は秋期性にして葉は初めより無毛なり。本州中部、九州に分布す。

366 *Kalopanax sciadophylloides* Harms in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.

III. Abt. 8. (1894) p. 51

syn. *Acanthopanax sciadophylloides* Franch. et Savat., Enum. I. (1875) p. 195

和名 コシアブラ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水、鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 MM (喬木)

備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

367 *Panax japonicum* C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Petersb. I. (1843) p. 340

和名 トチバニンジン、チクセツニンジン

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 G (深地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

368 *Textoria trifida* Nakai in Honda, Jingusinchi-no-Shokubutuchôsa (1927) p. 34

syn. *Gilibertia trifida* Makino in Bot. Mag. Tokyo XV. (1901) p. 91

和名 カクレミノ

生育地 森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球に分布す。

Apiaceae (*Umbelliferae*) セリ科

369 *Centella asiatica* Urb. in Mart. Fl. Bras. XI.-1. (1879) p. 287

和名 ツボクサ

生育地 森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 汎熱帯性植物にして本邦にては本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、小笠原、琉球、臺灣に分布す。

370 *Chamaele decumbens* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVII. (1903) p. 14

和名 セントウサウ
 生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(新建、飯盛)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

371 *Cryptotaenia japonica* Hassk. in Retzia, I. p. 113

和名 ミツバセリ、ミツバ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(大倉、新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

372 *Hydrocotyle javanica* Thunb., Diss. Hydroc. (1798) n. 17. t. 2

和名 オホバチドメグサ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建、大倉、荒平)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布す。

373 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam., Encycl. III. (1789) p. 153

和名 チドメグサ 方言 ヒトツバ
 生育地 水邊に生じ普通なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州、九州、濟州島、臺灣に分布す。

374 *Hydrocotyle Wilfordi* Maxim. in Mel. Biol. XII. (1887) p. 463

和名 ノチドメ 方言 ヒトツバ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、穴口)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 チドメグサに似るも大形なる莖葉を有し稍々地上に立ち葉は幾分光澤少し。北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

375 *Ligusticum acutilobum* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. I. (1845) p. 203

和名 タウキ

生育地 谷間に生じ稀なり。(大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 高さ一米内外に達し本州、九州に分布す。根を煎用すれば血行を良くし、殊に婦人血の道諸病に用ふ。

376 *Oenanthe stolonifera* DC., Prodr. IV. (1830) p. 138

和名 セリ

生育地 水邊に生じ稀なり。(穴口)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、琉球、臺灣、印度、瓜哇に分布し、全草を食用に供す。

377 *Osmorhiza aristata* Makino et Yabe in Bot. Mag. Tokyo XVII. (1903) p. 14

和名 ヤブニンジン、ナガジラミ

生育地 森林の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

378 *Peucedanum decursivum* Maxim. in Mel. Biol. XII. (1886) p. 472

和名 ノダケ

生育地 森林内又は原野に生じ稍々普通なり。(生ヶ谷、大倉、御手洗水、鬼ヶ浦、荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。根は鎮痛、鎮咳、祛痰薬として用ひらる。

var. **albiflorum** Maxim., l. c.

和名 シロノダケ

生育地 林縁に生じ稀なり。

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、九州、朝鮮に分布す。本種は花白色なるを異にす。

379 *Pimpinella diversifolia* DC., Prodr. IV. (1830) p. 122

和名 ミツバグサ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、九州、臺灣、支那、ヒマラヤに分布す。

380 *Sanicula elata* Ham. var. **japonica** Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XLIV.
(1930) p. 95

和名 ウマノミツバ、オニミツバ

生育地 林内の蔭地に生じ普通なり。(生ヶ谷、大倉、荒平、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。根莖は利尿の効ありと云ふ。

381 *Torilis Anthriscus* Gmel., Fl. Bad. I. (1805) p. 613

和名 ヤブジラミ、ノニンジン

生育地 林縁の草生地に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、琉球、臺灣に分布す。

Cornaceae ミヅキ科

382 *Aucuba japonica* Thunb., Dissert. III. (1783) p. 62

和名 アヲキ
 生育地 谷間の蔭地に生じ普通なり。(穴口、新建、荒平)
 生活形 N (灌木)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮南部諸島、琉球に分布す。

383 *Cornus brachypoda* C. A. Meyer in Ann. Sci. Nat. 3. ser. IV. (1845) p. 74

和名 クマノミヅキ 方言 ホンミヅユス
 生育地 谷間の森林内に生じ普通なり。(生ヶ谷、新建、鬼ヶ浦、荒平、大倉)
 生活形 MM (喬木)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

384 *Cornus controversa* Hemsley ex Prain in Bot. Mag. CXXXV. (1909) t. 8261

和名 ミヅキ 方言 ジュルミヅユス
 生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)
 生活形 MM (喬木)
 備考 一見前種に似るも枝は稍々傘狀に水平に出で、小枝は帶紅色無毛にして葉は互生なり。北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

385 *Cynoxylon japonica* Nakai, Fl. Sylv. Korea. XVI. (1927) p. 69

syn. *Cornus Kousa* Bueg. ex Miquel in Ann. Lugd. Bot. II. (1865) p. 159

Benthamia Kousa Nakai in Bot. Mag. Takyō XXIII. (1909) p. 41

和名 ヤマボウシ 方言 トリアシ
 生育地 谷間の森林に生じ稍々稀なり。(荒平、大倉、新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

var. **viridis** Nakai, Fl. Sylv. Korea. XVI. (1927) p. 71

和名 コヤマボウシ

生育地 谷間の森林内に生じ少々稀なり。(大倉、荒平)

生活形 M (亞喬木)

備考 苞片は花時綠色にして披針形、果實となれば次第に大きくなり、且白くなる。九州北部、濟州島に分布す。

Metachlamydeae 後生花被區

Clethraceae リヤウフ科

386 Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Münch. IV. Abt. 3. (1846) p. 128

和名 リヤウブ 方言 リヤウボ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(大倉、新建、生ヶ谷、飯盛)

生活形 M (亞喬木)

備考 北海道、本州、四國、九州、濟州島に分布す。

Piloraceae イチヤクサウ科

387 Monotropa Morisoniana Michaux, Fl. Bor.-Americ. I. (1803) p. 266

syn. *Monotropa uniflora* Linn. var. *tripetala* Makino in Journ. Jap. Bot. III.-7. (1926) p. 28

和名 コギンリヤウサウ

生育地 峯通りの森林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、新建)

生活形 G (深地下植物)

備考 ギンリヤウサウに比し一般に小形にして瓣片は三枚よりなる。北米、アジヤ北部に分布し本邦にては本州、九州に分布す。

388 *Pyrola japonica* Klenze apd. Alefeld. in *Linnaea* XXVIII. (1856) p. 57

和名 イチヤクサウ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

Rhodoraceae (*Ericaceae*) シヤクナゲ科

389 *Rhododendron Kaempferi* Planchon in *Fl. des Serres*. IX. (1853) p. 77

和名 ヤマツツジ、アカツツジ、ツツジ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(大倉、生ヶ谷、鬼ヶ浦、御手洗水)

生活形 N (灌木)

備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

390 *Rhododendron reticulatum* D. Don, mss. ex G. Don, *Gen. Syst.* III.

(1834) p. 846

和名 コバナミツバツツジ 方言 リヤウボツツジ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水、荒平、新建)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

391 *Vaccinium bracteatum* Thunb., *Fl. Jap.* (1784) p. 156

和名 シヤシヤンボ 方言 ミソンチュー

生育地 乾燥せる松林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、御手洗水、大倉)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、支那に分布す。

392 *Vaccinium Oldhami* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1865) p. 161

和名 ナツハゼ 方言 ヤマナシ

生育地 乾燥せる松林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、穴口)

生活形 N (灌木)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮南部に分布す。

393 *Xolisma elliptica* Nakai, Trees & Shrubs Jap. I. ed.-2. (1927) p. 204

和名 ネヂキ、カシヲシミ

生育地 乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、御手洗水)

生活形 N (灌木)

備考 本州、四國、九州に分布す。

Ardisiaceae (*Myrsinaceae*) ヤブカウジ科

394 *Bladhia japonica* Thunb., Nova Genera Plantarum I. (1781) p. 7. tab. 1.

syn. *Ardisia japonica* Blume in Bijdr. XI. (1825) p. 690

和名 ヤブカウジ 方言 センリヤウ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、新建、飯盛、荒平)

生活形 Ch (近地表植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

395 *Bladhia lentiginosa* Nakai, Trees & Shrubs Jap. I. ed.-2. (1927) p. 283

syn. *Ardisia crispa* A. DC. in Trans. Linn. Soc. XVII. (1837) p. 124

和名 マンリヤウ

生育地 森林内の蔭地に生じ稍々普通なり。(生ヶ谷、荒平、大倉、新建)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、支那、瓜哇に分布す。

- 396** *Bladhia villosa* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 96. t. 19.
 syn. *Ardisia villosa* Mez in Engl. Pflanzenreich, Heft.-9. (1902) p. 152
 和名 ツルカウジ
 生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(上ノ山)
 生活形 Ch (近地表植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣に分布す。
- 397** *Maesa japonica* Mor. et Zoll., Syst. Verz. Ind. Archip. (1854) p. 61
 和名 イヅセンリヤウ
 生育地 谷間の森林内に生じ稍々普通なり。(御手洗水、大倉、穴口、
 新建、荒平)
 生活形 N (灌木)
 備考 本州中南部、四國、九州、臺灣、支那に分布す。
- 398** *Rapanea neriifolia* Mez in Engl. Pflanzenreich, Heft.-9. (1902) p. 361
 和名 タイミンタチバナ 方言 タニクマガシ
 生育地 岩石上に生じ稀なり。(御手洗水、大倉、荒平、新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、支那南部に分布す。

Primulaceae サクラサウ科

- 399** *Lysimachia clethroides* Duby in DC. Prod. VIII. (1844) p. 61
 和名 ヲカトラノヲ
 生育地 林縁に生じ稀なり。(大倉)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

400 *Lysimachia japonica* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 83

和名 コナスビ

生育地 草生地に生じ稀なり。(穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、臺灣、支那、印度、濠洲に分布す。

401 *Lysimachia leucantha* Miquel in Ann. Mus. Bot. Lugd. Batav. III. (1867)

p. 121

和名 サハトラノヲ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、穴口、生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、九州、朝鮮、滿洲、臺灣に分布す。

Ebenaceae カキ科**402** *Diospyros Kaki* Thunb. var. *sylvestris* Makino in Bot. Mag. Tokyo

XXII. (1908) p. 159

和名 ヤマガキ

生育地 森林内に生じ稀なり。(御手洗水)

生活形 MM (喬木)

備考 カキに比し果實は小、球形、徑約三釐、澁味強く種子多し。本州、九州に分布す。

403 *Diospyros Lotus* L. var. *glabra* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVI.

(1911) p. 396

和名 シナノガキ

方言 クロガキ

生育地 森林内に生じ普通なり。(新建)

生活形 MM (喬木)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球に分布す。

- 和名 クロバヒ、ソメシバ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ極めて稀なり。(生ヶ谷)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州中南部、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布す。

- 408 **Palura Tanakana** Nakai, Fl. Sylv. Korea. XIII. (1923) p. 34. t. IX
 syn. *Symplocos Tanakana* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXII. (1918) p. 227

- 和名 クロミノサハフタギ、シロサハフタギ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州(佐渡島以南の日本海側)、九州(北九州、肥前)、朝鮮南部
 に分布す。

Halesiaceae (Styracaceae) エゴノキ科

- 409 **Styrax japonicum** Sieb. et Zucc., Fl. Jap. I. (1835) p. 53

- 和名 エゴノキ 方言 コヤス
 生育地 森林内に生じ普通なり。(荒平、生ヶ谷、新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那中部に分布す。

Oleaceae モクセイ科

- 410 **Fraxinus Sieboldiana** Bl. var. **angustata** Blume in Mus. Bot. Lugd. Bat.
 I. (1850) p. 311

- 和名 マルバアヲダモ 方言 ホホノキ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(極樂、御手洗水)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

411 *Ligustrum Ibot* Sieb. in Verh. Batav. Gen. XII. (1830) p. 36

- 和名 ケイボタ
 生育地 林縁に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、極樂)
 生活形 N (灌木)
 備考 四國、九州、朝鮮に分布す。

412 *Ligustrum japonicum* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 17

- 和名 ネズミモチ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(生ヶ谷、穴口、鬼ヶ浦、御手洗水、荒平、新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州、小笠原、四國、九州、琉球、朝鮮南部、臺灣に分布す。

Loganiaceae マチン科

413 *Gardneria nutans* Sieb. et Zucc., Fl. Jap. Fam. Nat. II. (1846) p. 165

- 和名 ホウライカヅラ
 生育地 森林内に生じ稍々稀なり。(新建、荒平)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、琉球に分布す。

Gentianaceae リンダウ科

414 *Crawfurdia japonica* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. II. (1846) p. 160

- 和名 ツルリンダウ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、大倉、新建)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 蔓性の多年生植物にして千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

- 415** *Gentiana scabra* Bunge var. *intermedia* Kusnez. in Act. Hort. Petrop. XV.
2. (1898) p. 223

和名 ツクシリンダウ

生育地 稍々乾燥せる林縁に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 九州、濟州島に分布す。

- 416** *Gentiana Zollingeri* Fawc. in Journ. Bot. XXI. (1883) p. 183

和名 フデリンダウ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那北部に分布す。

- 417** *Swertia bimaculata* Hooker & Thomson ex C. B. Clarke in Journ. Linn.
Soc. XIV. (1874) p. 449

和名 アケボノサウ

生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷、大倉、新建、荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

- 418** *Swertia chinensis* Franchet in Bull. Soc. Bot. France XXXII. (1885) p. 26

和名 ムラサキセンブリ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 センブリに比し莖高く葉は廣く水邊生なり。本州中南部、九州、朝鮮、滿洲、アムール、シベリヤ、支那北部に分布す。

- 419** *Swertia japonica* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIV. (1910) p. 294

和名 センブリ

生育地 稍々乾燥せる林地に生じ稀なり。(生ヶ谷)

- 生活形 H (淺地下植物)
備考 本州各部、九州に分布す。

Apocinaceae ケフチクタウ科

420 *Anodendron affine* Nakai, Trees & Shrubs Jap. ed.-2, 1. (1927) p. 416

- 和名 サカキカヅラ 方言 イシワタカヅラ
生育地 谷間の森林に生じ稍々稀なり。(荒平、大倉、御手洗水、上ノ山)
生活形 L (蔓性植物)
備考 幹の直径三糎以上に達するものあり。本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、香港に分布す。

421 *Trachelospermum asiaticum* Nakai var. *intermedium* Nakai, l. c. p. 419

- 和名 テイカカヅラ
生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(生ケ谷、御手洗水、上ノ山、新建、荒平)
生活形 L (蔓性植物)
備考 本州、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣、支那東部に分布す。

Asclepiadaceae ガガイモ科

422 *Marsdenia tomentosa* Morr. et Decne. in Bull. Acad. Brux. III. (1836) p. 172

syn. *Marsdenia acuta* Tanaka in Bult. Fakul. Terkult. Kjusu Imp. Univ. I. 4. (1925) p. 202

- 和名 キジヨラン 方言 オホバカヅラ
生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(新建、上ノ山)
生活形 L (蔓性植物)
備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、臺灣に分布す。

423 *Pycnostelma chinense* Bunge in DC. Prod. VIII. (1844) p. 512

和名 スズサイコ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲、支那北部、ダフリカに分布す。

424 *Stephanotis japonica* Makino in Bot. Mag. Tokyo VI. (1892) p. 53

和名 シタキサウ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣に分布す。

425 *Tylophora aristolochioides* Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. (1865) p. 129

和名 オホカモメヅル

生育地 林縁に生じ稀なり。(荒平、生ヶ谷)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

Convolvulaceae ヒルガホ科

426 *Calystegia japonica* Choisy in Zoll. Syst. Verz. Ind. Arch. Pfl. II. (1855)
p. 132

和名 コヒルガホ 方言 ヤウヅル

生育地 林縁に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

427 *Cuscuta japonica* Choisy var. *thyrsoidea* Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis. I. (1859) p. 517

和名 ネナシカヅラ 方言 ネナシ

生育地 林縁に生じ稀なり。(新建、大倉、飯盛)

生活形 T (一年生植物)

備考 一年生寄生蔓草にして本州、四國、九州、琉球、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

Ehretiaceae (*Borraginaceae*) **ムラサキ科**

428 *Bothriospermum tenellum* Fisch. et Mey. var. *asperugoides* Maxim. in Mel. Biol. VIII. (1872) p. 561

和名 ハナイバナ

生育地 荒廢地に生じ稀なり。(高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州中南部、九州、朝鮮、滿洲に分布し 基種は 臺灣、支那、印度北部に分布す。

429 *Cynoglossum asperrimum* Nakai in Bot. Mag. Takyō XXXVII. (1923) p. 6

和名 オニルリサウ

生育地 林縁に生じ稀なり。(新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

430 *Ehretia thyrsoflora* Nakai var. *latifolia* Nakai, Trees & Shrubs Jap. I.-I. (1922) p. 329

和名 ヒロハチシヤノキ 方言 チシヤノキ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(大倉、新建、荒平、生ヶ谷)

生活形 MM (喬木)

備考 本州南部、九州に分布す。基種は本州、四國、九州、濟州島、支那中部に分布す。

431 *Trigonotis brevipes* Max. in Mel. Biol. XI. (1881) p. 273

和名 ミヅタビラコ

- 生育地 谷間の水湿地に生じ少々稀なり。(新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州各部、四國、九州、支那に分布す。

Verbenaceae クマツヅラ科

432 *Callicarpa japonica* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 60

- 和名 ムラサキシキブ
 生育地 林内各地に生じ普通なり。(荒平、極樂、生ヶ谷、新建)
 生活形 N (灌木)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

var. *Taquetii* Nakai, Trees & Shrubs Jap. I. ed. I. (1922) p. 336

- 和名 コバノムラサキシキブ
 生育地 林内に生じ少々稀なり。(御手洗水、新建)
 生活形 N (灌木)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部に分布す。

433 *Callicarpa mollis* Sieb. et Zucc, Fam. Nat. II. (1846) p. 155

- 和名 ヤブムラサキ、ケムラサキ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(新建、生ヶ谷、御手洗水、
 荒平、上ノ山)
 生活形 N (灌木)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮南部に分布す。

var. *ramosissima* Nakai, Trees & Shrubs Jap. I. ed.-2. (1927) p. 458

- 和名 コバノヤブムラサキ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水)
 生活形 N (灌木)

備考 枝の分岐密にして葉は小形三稜内外なり。本州中南部、九州、朝鮮南部に分布す。

434 *Clerodendron trichotomum* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 256

和名 クサギ

生育地 林縁に生じ稀なり。(生ケ谷、御手洗水、新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 稍々陽性の樹木にして北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

435 *Premna japonica* Miquel in Ann. Lugd. Bat. II. (1865) p. 97

和名 ハマクサギ 方言 コメゴメ

生育地 林内に生じ稀なり。(新建、御手洗水、生ケ谷)

生活形 M (亞喬木)

備考 稍々陽性の亞喬木にして本州中南部、四國、九州、臺灣に分布す。

Lamiaceae (*Labiatae*) ラドリコサウ科

436 *Agastache rugosa* O. Kuntze in Engl. et Prantl, Pfl.-fam. IV.-3a. (1897)
p. 234

和名 カハミドリ

生育地 谷間の草生地に生じ極めて稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

437 *Ajuga decumbens* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 243

和名 キランサウ、チゴクノカマノフタ

生育地 林縁に生じ稀なり。(穴口、新建、荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、九州、朝鮮、支那に分布す。

438 Clinopodium chinense O. Kuntze, Rev. Gen. (1891) p. 515

和名 クルマバナ

生育地 林縁の草生地に生じ普通なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、滿洲、アムール、支那に分布す。

439 Clinopodium gracile O. Kuntze, l. c. p. 514

和名 タフバナ

生育地 林縁の草生地に生じ普通なり。(新建、大倉、荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那に分布す。

440 Clinopodium multicaule O. Kuntze, l. c. p. 515

和名 ヤマタフバナ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

441 Lamium album Linn. var. **barbatum** Franch. et Savat., Enum. I. (1875)
p. 380

和名 ヲドリコサウ

生育地 谷間の森林内に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、ヒマラヤに分布す。

442 *Lamium amplexicaule* Linn., Sp. Pl. ed.-1. (1753) p. 579

- 和名 ホトケノザ
 生育地 畑地に生じ稀なり。(生ヶ谷、高辻)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 歐洲、アフリカ北部、アジアに廣く分布し本邦にては本州各部、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

443 *Leonurus macranthus* Maxim., Prim. Fl. Amur. (1859) p. 476

- 和名 キセフタ
 生育地 稍々乾燥せる森林内に生じ極めて稀なり。(新建)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那(北部、東部)に分布す。

444 *Lycopus Maackianus* Makino in Bot. Mag. Tokyo XI. (1897) p. 382

- 和名 サルダヒコ、コシロネ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(上ノ山、鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州各部、四國、九州、濟州島に分布す。

445 *Mentha arvensis* Linn. var. **vulgaris** Benth., Lab. Gen. et Sp. (1832-36)
 p. 174

- 和名 ハクカ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、北海道、本州、九州、琉球、朝鮮、滿洲、アムール、支那、シベリヤ、歐洲東部に分布す。

446 *Mosla punctulata* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLII. (1928) p. 475

和名 イヌカウジユ
 生育地 草生地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、大倉)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州各部、四國、九州、琉球、朝鮮、支那に分布す。

447 *Perilla frutescens* Brit. var. *typica* Makino in Journ. Jap. Bot. III.-2.
 (1926) p. 7

和名 エゴマ
 生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(新建、荒平)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 印度原産にして現在は東亞各地に廣く分布し野生状を呈す。

448 *Plectranthus inflexus* Vahl ex Benth. Lab. Gen. et Sp. (1832-36) p. 711

和名 ヤマハツカ
 生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(新建、荒平)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那東部に分布す。

449 *Plectranthus japonicus* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XLIII. (1929) p. 386

和名 ビキオコシ
 生育地 林縁の草生地に生じ稀なり。(荒平)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州各部、九州、朝鮮、アムール、支那北部に分布す。

450 *Prunella asiatica* Nakai, Kamikôchi-Tennenkinenbutu-Chosahôkoku (1928)
 p. 29

和名 ウツボグサ 方言 カゴサウ
 生育地 林縁、草生地に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦、上ノ山)
 生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、濠洲に分布す。莖葉は利尿劑として用ひらる。

451 *Salvia chinensis* Benth., Lab. Gen. et Sp. (1832-36) p. 725

和名 アキノタムラサウ

生育地 林内に生じ普通なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、穴口)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、支那(廣東)に分布す。

452 *Scutellaria laeteviolacea* Koidz. in Mayebara, Fl. Austro-higoensis (1931) p. 50

syn. *Scutellaria indica* Linn. var. *humilis* Makino in Iinuma, S. D. III. (1913) p. 847

和名 シソバタツナミ

生育地 林内に生じ稀なり。(生ケ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、九州に分布し葉裏は紫色を呈す。

453 *Scutellaria parvifolia* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1924) p. 92

syn. *Scutellaria indica* Linn. var. *parvifolia* Makino, l. c. p. 846

和名 コバノタツナミサウ

生育地 林内に生じ稀なり。(鬼ケ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、琉球に分布す。

454 *Teucrium Miquelianum* Kudo in Journ. Coll. Sci. Imp. Tokyo XLIII. (1921) p. 8

和名 ツルニガクサ

生育地 峯通りの森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 東部アジアに廣く分布し本邦にては北海道、本州、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

Solanaceae ナスビ科

455 *Physaliastrum chamaesarachoides* Makino in Journ. Jap. Bot. V.-6. (1928)

p. 24

和名 ヤマホホヅキ

生育地 森林内の蔭地に生じ稀なり。(大倉、新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州中南部、九州に分布す。

456 *Physaliastrum echinatum* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVIII. (1914)

p. 21

和名 イガホホヅキ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建、大倉、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮に分布す。

457 *Physalis Francheti* Mast. var. *Bunyardii* Makino in Journ. Jap. Bot.

III.-7. (1926) p. 27

和名 ホホヅキ

生育地 森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

458 *Solanum lyratum* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 92

和名 ヒヨドリジャウゴ

生育地 林縁に生じ少々普通なり。(生ヶ谷、大倉、荒平)

生活形 L (蔓性植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

459 Solanum Maximowiczii Koidz. in Acta Phytotax. et Geobot. I.-I. (1932)

p. 24

和名 マルバノホロシ、ナガバマルバホロシ

生育地 谷間の林内に生じ稀なり。(大倉、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、九州に分布す。一見ホソバナホロシに似るも葉は
少々厚く葉脚は缺刻状をなすことなし。

460 Solanum nigrum Linn., Sp. Pl. ed.-I. (1753) p. 186

和名 イヌホホヅキ

生育地 林縁に生じ稀なり。(穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 熱帯から温帯に亘り広く分布し本邦にては樺太、北海道、本州、
四國、九州、朝鮮、小笠原、琉球、臺灣に分布す。全草を解熱及び
利尿劑として用ひるもソラニン等を含有するが故有毒なり。

461 Tubocapsicum anomalum Makino in Bot. Mag. Tokyo XXII. (1908) p. 19

和名 ハダカホホヅキ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(大倉、新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣に分布す。

Rhinanthaceae (Scrophulariaceae) ゴマノハグサ科

462 Ambulia sessiliflora Baill.: Wettstein in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam.

IV. (1897) p. 36

和名 キクモ

生育地 水邊又は水中に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、穴口)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那、臺灣、馬來、印度、セイロンに分布す。

463 *Gratiola violacea* Max. in Mel. Biol. IX. (1875) p. 407

和名 サハタウガラシ

生育地 水邊に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、極樂)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、九州、朝鮮に分布す。

464 *Ilysanthes antipoda* Merr., Interpr. Rumph. Herb. Amboin. (1917) p. 467

syn. *Ilysanthes veronicifolia* Urb. var. *verbenaefolia* Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed.-1. (1925) p. 214

和名 スズメノタウガラシ

生育地 水邊に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州中南部、四國、九州、小笠原、臺灣、比島、支那、馬來、印度東部に分布す。

465 *Melampyrum roseum* Maxim. var. *ciliare* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXIII. (1909) p. 10

和名 ヒゲママコナ

生育地 乾燥せる松林内に生じ普通なり。(穴口、生ヶ谷、鬼ヶ浦、上ノ山)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州中部、九州北部、朝鮮南部に分布す。

466 *Phtheirospermum chinense* Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. (1831) p. 35

和名 コシホガマ
 生育地 乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、臺灣に分布す。

467 *Veronica agrestis* Linn., Sp. Pl. ed.-I. (1753) p. 13

和名 イヌノフグリ
 生育地 荒廢地に生じ稀なり。(高辻)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 歐洲、アフリカ北部、アジア北部全體に分布し本邦にては北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

468 *Veronica Anagallis* Linn., l. c. p. 12

和名 カハジサ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(高辻)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北半球の北部に廣く分布し本邦にては本州、九州、琉球、朝鮮、臺灣に分布す。

469 *Veronica arvensis* Linn., l. c. p. 13

和名 タチイヌノフグリ
 生育地 荒廢地に生じ稀なり。(高辻)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 歐洲原産の雜草にして現今は東亞各地に分布す。

Lentibulariaceae タヌキモ科

470 *Utricularia bifida* Linn., Sp. Pl. ed.-I. (1753) p. 18

和名 ミミカキグサ

- 生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、穴口)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州各部、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、馬來、比島、印度東部、
 カロリン、マリアン諸島、濠洲に分布す。

471 *Utricularia japonica* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVIII. (1914) p. 28

- 和名 タヌキモ
 生育地 水中に生じ稀なり。(穴口)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、北海道、本州、四國、九州に分布す。

Acanthaceae キツネノマゴ科

472 *Dicliptera japonica* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVII. (1903) p. 53

- 和名 ハグロサウ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(淺地下植物)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州、九州、濟州島、臺灣に分布す。

473 *Hygrophila lancea* Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. (1865) p. 123

- 和名 ラギノツメ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

474 *Justicia procumbens* Linn., Sp. Pl. ed.-1. (1753) p. 15

- 和名 キツネノマゴ
 生育地 林縁に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)
 生活形 T (一年生植物)

備考 本州各部、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那南部、馬來、セイロン、
印度、濠洲に分布す。液汁はリウマチスに塗て効ありと云ふ
又全草を搗碎きて腫物に貼り又其煎汁にて眼病を洗ひ又解
熱劑とす。

Phrymaceae ハヘドクサウ科

475 *Phryma oblongifolia* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo (1929) p. 400

和名 ナガバハヘドクサウ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州各部、九州に分布す。

Plantaginaceae オホバコ科

476 *Plantago major* Linn. var. *asiatica* Decne. in DC. Prodr. XII.-1. (1852)

p. 694

和名 オホバコ

生育地 道路附近に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、飯盛)

生活形 H (淺地下植物)

備考 東亞各地に廣く分布し本邦にては北は千島、樺太より南は臺灣
迄分布す。莖葉は陰干となし煎服せば胃病、疝氣、解熱、利尿、
眼病、淋疾に宜しく強壯劑ともなり其他藥効極めて多し。

Rubiaceae アカネ科

477 *Damnacanthus indicus* Gaertn. f. var. *genuinus* Makino in Bot. Mag.
Tokyo XI. (1897) p. 279

和名 アリドホシ

生育地 林内の蔭地に生じ稍々稀なり。(新建、荒平、上ノ山、生ヶ谷)

生活形 N (灌木)

備考 本州、四國、九州、濟州島、琉球、印度? に分布す。

- 478 *Damnacanthus major*** Sieb. et Zucc. in Abh. Münch. Akad. IV. 3. (1846)
p. 177

syn. *Damnacanthus indicus* Gaertn. f. var. *major* Makino in Bot. Mag.

Tokyo XVIII. (1904) p. 32

和名 ジュズネノキ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(荒平、上ノ山、穴口)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

- 479 *Galium gracile*** Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. (1831) p. 35

和名 ヨツバムグラ

生育地 水邊に生じ稀なり。(穴口)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

- 480 *Galium pseudo-asprellum*** Makino in Bot. Mag. Tokyo XVII. (1903) p. 110

和名 オホバノヤヘムグラ

生育地 谷間の草生地に生じ稀なり。(新建、大倉)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。一見ヤヘムグラに酷似するも輪葉は大形にして通常六片を有す(彼は八片)。

- 481 *Galium setuliflorum*** Makino var. *setuliflorum* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVII. (1903) p. 76

和名 ヤمامグラ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(生ケ谷、大倉、上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部に分布す。

482 *Galium strigosum* Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. VII. (1815) p. 141

和名 ヤヘムグラ

生育地 林縁に生じ稍々普通なり。(大倉、新建、生ケ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 アジア、歐洲、アフリカ北部、アメリカ北部に分布し本邦にては樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

483 *Galium trifidum* Linn., Sp. Pl. ed.-1. (1753) p. 108

和名 ホソバノヨツバムグラ

生育地 林縁に生じ稍々稀なり。(穴口、極樂、生ケ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 樺太、千島、北海道、本州、四國、九州、臺灣、朝鮮、滿洲、黑龍江流域、ダフリカ、シベリヤ、アラスカ、北米、歐洲に分布す。

484 *Galium vernum* Linn. var. *lacteum* Maxim. form. *lacteum* Makino in Journ. Jap. Botany V.-II. (1828) p. 47

和名 カハラマツバ

生育地 林縁に生じ稀なり。(穴口)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本品種は樺太、千島、北海道、本州、九州、朝鮮、蒙古、ウスリ、アムール、ダフリカに分布し基本種はシベリヤ西部、コーカシヤ、歐洲、アフリカ北部、北米に分布す。

**485 *Gardenia angusta* Merrill, Interpr. Rumph. Herb. Amboin. (1917) p. 485
syn. *Gardenia jasminoides* Ellis var. *grandiflora* Nakai, Trees & Shrubs
Jap. I. ed.-2. (1927) p. 518**

和名 クチナシ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、穴口、御手洗水)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、支那に分布す。

486 Oldenlandia diffusa Roxb. var. **longipes** Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXV. (1911) p. 152

和名 ナガエフタバムグラ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 本變種は本州中部、九州、濟州島に分布し基種は本州中南部、九州、濟州島、臺灣、比島、支那、馬來諸島、印度其他の舊熱帯に廣く分布す。

487 Oldenlandia hirsuta Linn. f., Suppl. (1781) p. 127

和名 ハシカグサ

生育地 林縁又は水邊に生じ少々普通なり。(新建、大倉、生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州各部、九州、朝鮮南部、臺灣、支那、ヒマラヤ、瓜哇に分布す。

488 Ophiorrhiza japonica Blume, Bijdr. (1825) p. 978

和名 サツマイナモリ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(御手洗水、荒平、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、九州、琉球に分布す。

489 Ourouparia rhynchophylla Matsumura in Bot. Mag. Tokyo XIV. (1900) p. 127

syn. *Uncaria rhynchophylla* Miquel, Cat. Mus. Bot. Lugd. Bat. (1870) p. 44

- 和名 カギカヅラ
 生育地 谷間の森林に生じ稍々稀なり。(生ケ谷、荒平、新建)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

- 490** *Paederia chinensis* Hance in Journ. Bot. VII. (1878) p. 228
 syn. *Paederia tomentosa* Maxim. in Bull. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb.
 XXIX. (1888) p. 173 non Blume

- 和名 ヘクソカヅラ
 生育地 林縁に生じ普通なり。(穴口、生ケ谷、御手洗水、鬼ヶ浦)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那、臺灣に分布す。

- 491** *Pseudopyxis depressa* Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 189

- 和名 イナモリサウ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(穴口、新建)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、九州に分布す。

- 492** *Rubia cordata* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 60

- 和名 アカネ
 生育地 谷間の草生地に生じ稀なり。(生ケ谷、大倉、飯盛)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州中南部、九州、朝鮮に分布す。

Caprifoliaceae スヒカヅラ科

- 493** *Lonicera affinis* Hook. et Arn., Bot. Beech. Voy. (1841) p. 264

- 和名 ハマニンドウ

生育地 森林内に生じ時々普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、極樂、大倉、荒平)

生活形 L (蔓性植物)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、支那南部に分布す。

494 *Lonicera gracilipes* Miq. var. *genuina* Makino in Bot. Mag. Tokyo XII. (1897) p. 17

和名 ヤマウグヒスカグラ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)

生活形 N (灌木)

備考 ミヤマウグヒスカグラに比し線毛なく葉の裏面は少々粉白粗毛を散生す。本州中南部、九州に分布す。

495 *Lonicera hypoglauca* Miquel in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1866) p. 270

syn. *Lonicera affinis* Miq. var. *hypoglauca* Rehder, Synop. Gen. Lonic. (1903) p. 158

和名 キダチニンドウ

生育地 林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、新建)

生活形 L (蔓性植物)

備考 一見ハマニンドウに酷似するも葉は枝條と共に褐色偃毛を布く。四國、九州、琉球、臺灣、支那南部に分布す。

496 *Lonicera japonica* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 89

和名 スヒカヅラ、ニンドウ 方言 ニンドウカヅラ

生育地 林縁に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、上ノ山)

生活形 L (蔓性植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

497 *Lonicera tenuipes* Nakai var. *subglabra* Honda in Bot. Mag. Tokyo XLV. (1931) p. 44

- 和名 コミヤマウグヒスカグラ 方言 ウグヒス
 生育地 少々乾燥せる峯通りの林内に生じ稀なり。(新建、大倉)
 生活形 N (灌木)
 備考 ミヤマウグヒスカグラに似るも枝條、花梗、葉柄共に線毛殆んどなし。本州、九州北部に分布す。
- 498 Sambucus Sieboldiana** Blume in herb. ex Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1866) p. 265
 和名 ニハトコ 方言 タズ
 生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(生ヶ谷、新建、荒平)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮南部に分布す。
- 499 Viburnum Awabucki** K. Koch in Wochenschrif. X. (1867) p. 108
 和名 サンゴジユ
 生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(荒平、新建)
 生活形 M (亞喬木)
 備考 耐蔭力大なる樹種にして本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布す。
- 500 Viburnum dilatatum** Thunb. f. **pilosulum** Nakai in Journ. Coll. Sci. Tokyo ed.-2, I. (1927) p. 603
 和名 ガマズミ 方言 ネソノキ
 生育地 林縁に生じ稀なり。(生ヶ谷、飯盛、新建)
 生活形 N (灌木)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。
- 501 Viburnum erosum** Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 124
 var. **punctatum** Franch. et Savat., Enum. Pl. Jap. II. (1876) p. 308. pt. 1.
 和名 コバノガマズミ 方言 ネソノキ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、
穴口、新建)

生活形 N (灌木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

var. **Taquetii** Rehder in Sarg. Pl. Wils. I. (1912) p. 311

和名 サイコクガマズミ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(穴口)

生活形 N (灌木)

備考 葉は狭小にして往々先端三裂す。本州、九州、濟州島、支那に
分布す。

502 Viburnum japonicum Spreng., Syst. Veget. I. (1825) p. 934

和名 ハクサンボク

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 N (灌木)

備考 本州(長門)、九州に分布す。

503 Viburnum Sieboldii Miquel in Ann. Lugd. Bat. II. (1866) p. 267

和名 ゴマキ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(新建)

生活形 M (亞喬木)

備考 本州、九州、濟州島に分布す。

504 Viburnum tomentosum Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 123

var. **cuspidatum** Maxim. in Mel. Biol. X. (1880) p. 662

和名 コヤブデマリ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(新建)

生活形 N (灌木)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

var. **glabrum** Koidz. in Sched. ex Nakai in Journ. Coll. Sci. Tokyo

XLII. 2. (1921) p. 29

和名 ケナシヤブデマリ

生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(飯盛、大倉)

生活形 N (灌木)

備考 ヤブデマリに比し葉の下面初めより無毛にして脈腋のみ褐毛を有す。本州、九州北部に分布す。

Valerianaceae ラミナヘシ科

505 **Patrinia scabiosaefolia** Link., Enum. Hort. Berol. I. (1821) p. 131

和名 ラミナヘシ、ラミナメシ 方言 ランナメシ

生育地 少々乾燥せる草生地に生じ普通なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、上ノ山)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、ダフリカ、シベリヤ、支那、臺灣に分布す。

506 **Patrinia villosa** Juss. in Ann. Mus. Par. X. (1807) p. 311

和名 フトコヘシ 方言 シロランナメシ

生育地 少々乾燥せる草生地に生じ普通なり。(鬼ケ浦、生ケ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

507 **Valeriana flaccidissima** Maxim. in Mel. Biol. VI. (1868) p. 372

和名 ヤマカノコサウ、ツルカノコサウ

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、臺灣に分布す。

508 *Valeriana officinalis* Linn. var. *latifolia* Miq., P. (1866-67) p. 31

- 和名 カノコサウ、ハルヲミナヘシ
 生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 樺太、北海道、本州、九州、朝鮮、満洲、支那北部、ダフリカ、ウズ
 リに分布す。

Cucurbitaceae ウリ科

509 *Gynostemma pentaphyllum* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVI. (1902) p. 179

- 和名 アマチャヅル
 生育地 森林内の蔭地に生じ少々稀なり。(新建、荒平、大倉)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮南部、琉球、臺灣に分布す。

510 *Trichosanthes cucumeroides* Maxim. in Franch. et Savat. Enum. I. (1875)
 p. 172

- 和名 カラスウリ 方言 ツチカヅラ
 生育地 谷間の森林に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、穴口、生ヶ谷)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州、九州、朝鮮南部、臺灣に分布す。

511 *Trichosanthes japonica* Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) p. 90

- 和名 キカラスウリ 方言 ゴウル
 生育地 林縁に生じ稀なり。(新建)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 カラスウリに比し葉は光澤を有し三乃至五深裂にして漿果は
 黄熟なり。北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球に分布す。

512 *Trichosanthes multiloba* Miquel in Ann. Lugd. Bat. II. (1865) p. 82

和名 モミヂカラスウリ 方言 コベ
 生育地 谷間の森林に生じ稀なり。(新建)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、臺灣に分布す。

513 *Trichosanthes shikokiana* Makino in Bot. Mag. Tokyo VI. (1892) p. 54

和名 オホカラスウリ
 生育地 谷間の森林に生じ極めて稀なり。(新建)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 四國、九州に分布す。カラスウリに比し葉は大形にして漿果は長し。

Campanulaceae キキヤウ科

514 *Adenophora verticillata* Fischer in Mem. Soc. Nat. Mos. VI. (1823) p. 167

var. *angustifolia* Regel, Tent. Fl. Ussur. (1861) p. 108

和名 ナガバシヤジン
 生育地 稍々乾燥せる原野に生じ稀なり。(飯盛)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 葉は披針形又は線狀披針形なり。本州中南部、九州、朝鮮、ウスリ、臺灣に分布す。

var. *typica* Regel, Tent. Fl. Ussur. (1861) p. 108

和名 ツリガネニンジン 方言 リンギキヤウ
 生育地 原野に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、飯盛)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、滿洲、支那、アムール、ダフリカ、蒙古、シベリヤに分布す。

515 *Codonopsis lanceolata* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873-76) p. 558

和名 ツルニンジン

生育地 林縁の草生地に生じ普通なり。(御手洗水、大倉、新建)
 生活形 L (蔓性植物)
 備考 北海道、本州、九州、朝鮮、満洲、支那に分布す。

516 *Lobelia radicans* Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. (1793) p. 330

和名 ミゾカクシ、アゼムシロ
 生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、極樂)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、満洲、支那、臺灣に分布す。

517 *Lobelia sessilifolia* Lam. in Trans. Linn. Soc. X. (1809) p. 260

和名 サハギキヤウ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、極樂)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、北海道、本州、九州、朝鮮、満洲、臺灣に分布す。

518 *Peracarpa circaeoides* H. Feer. in Engl. Bot. Jahrb. XII. p. 621

和名 タニギキヤウ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、本州、四國、九州、濟州島に分布す。

519 *Platycodon glaucum* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1924) p. 301

和名 キキヤウ
 生育地 稍々乾燥せる林野に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、上ノ山、大倉)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、満洲、支那、シベリヤ、アムールに分布す。

Asteraceae (Compositae) キ ク 科

- 520 Adenocaulon adhaerescens** Maxim., Prim. Fl. Amur. (1859) p. 152
 syn. *Adenocaulon bicolor* Hook. var. *adhaerescens* Makino in Bot. Mag.
 Tokyo XXIII. (1909) p. 17
 和名 ノブキ
 生育地 谷間の林内に生じ稀なり。(新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、九州、朝鮮、満洲、ウスリ、支那に分布す。
- 521 Adenostemma lavenia** O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. (1891) p. 304
 和名 スマダイコン
 生育地 水邊に生じ稍々普通なり。(生ケ谷)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣、比島、支那、印度支那、印度、アフリカに分布す。
- 522 Ainsliaea apiculata** Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. (1854) p. 126
 和名 キツカフハグマ
 生育地 稍々燥乾せる林内に生じ稀なり。(生ケ谷、鬼ヶ浦、御手洗水)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州、九州、朝鮮南部に分布す。
- 523 Artemisia japonica** Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 310
 和名 フトコヨモギ
 生育地 林縁に生じ普通なり。(生ケ谷、飯盛、桂木)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、満洲、ウスリ、ダフリカ、アムール、支那、臺灣に分布す。

524 *Artemisia lavandulaefolia* DC., Prod. VI. (1837) p. 110

和名 ヒメヨモギ

生育地 原野、林縁に生じ稀なり。(上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

525 *Artemisia vulgaris* Linn. var. *indica* Maxim. in Mel. Biol. VIII. (1872)
p. 536

和名 ヨモギ

生育地 原野、林縁に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州各部、四國、九州、臺灣、朝鮮、其他東亞の暖地に分布し葉は強壯藥、通經藥、解熱藥等に用ふ。

526 *Aster ageratoides* Turz. var. *adustus* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XL.
(1926) p. 148

和名 ノコンギク

生育地 峯通りの林内に生じ少々稀なり。(新建、荒平、飯盛、大倉)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

527 *Aster altaicus* Willd., Enum. Hort. Berol. (1809) p. 881

和名 ヤマデノギク

生育地 原野に生じ稀なり。(上ノ山、鬼ヶ浦、大倉)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、九州、朝鮮、臺灣、支那、蒙古、ダフリカ、ヒマラヤ、ペルシヤ、アフガニスタンに分布す。

528 *Aster fastigiatus* Fisch. in Mem. Mosc. III. (1812) p. 74

和名 ヒメシラン
 生育地 林縁に生じ極めて稀なり。(生ケ谷)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州各部、九州、朝鮮、満洲、ダフリカに分布す。

529 *Aster Lautureanus* Franch. in Mem. Soc. Sc. Nat. Cherb. XXIV. (1884)
 p. 222

和名 ヨメナ 方言 ハギナ
 生育地 原野、林縁に生じ普通なり。(生ケ谷、大倉、上ノ山、飯盛、穴口)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、満洲、支那、臺灣に分布す。

530 *Aster leiophyllus* Franch. et Savat., Enum. I. (1875) p. 223

和名 ヤマシロギク
 生育地 峯通りの林内に生じ少々普通なり。(生ケ谷、新建、荒平、飯盛)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、九州、朝鮮に分布す。

531 *Aster scaber* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 316

和名 シラヤマギク 方言 ヤマヂシヤ
 生育地 原野に生じ普通なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、上ノ山)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、九州、朝鮮、満洲、アムール、ウスリ、支那、臺灣に分布す。

532 *Atractylis lyrata* Sieb. et Zucc. var. *ternata* Koidz. in Fl. Symb. Orient.-
 Asia. (1930) p. 5

和名 ヲケラ
 生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ケ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、九州、朝鮮、滿洲に分布す。

533 *Bidens bipinnata* Linn., Sp. Pl. ed. I. (1753) p. 832

和名 センダングサ

生育地 林縁に生じ稀なり。(生ケ谷、大倉)

生活形 T (一年生植物)

備考 世界の暖地に廣く分布し本邦にては本州、四國、九州、朝鮮、小笠原、琉球、臺灣に分布す。

534 *Cacalia delfiniifolia* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. II. (1846) p. 190

和名 モミヂガサ 方言 ワタナ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

535 *Carpesium abrotanoides* Linn. var. *Thunbergianum* Makino in Journ. Jap. Bot. II.-6. (1922) p. 22

和名 ヤブタバコ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ケ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

536 *Carpesium cernuum* Linn., Sp. Pl. ed.-I (1753) p. 859

和名 サジガンクビサウ

生育地 少々乾燥せる林内の路傍に生じ普通なり。(新建、荒平、鬼ヶ浦、極樂)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州各部、九州、朝鮮、其他アジアの暖地、歐洲に分布す。

537 *Carpesium divaricatum* Sieb. et Zucc., Fam. Nat. II. (1846) p. 187

和名 ガンクビサウ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、荒平、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州各部、四國、九州、朝鮮、滿洲に分布す。

538 *Carpesium glossophyllum* Max. in Mel. Biol. IX. (1874) p. 282

和名 コヤブタバコ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(極樂)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

539 *Carpesium rosulatum* Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. (1866) p. 179

和名 ヒメガンクビサウ

生育地 林内の蔭地に生じ極く稀なり。(新建、荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

540 *Carpesium triste* Maxim. in Mel. Biol. IX. (1874) p. 287

和名 ガンクビヤブタバコ、ミヤマヤブタバコ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、ウスリに分布す。

541 *Centipeda minima* A. Br. & Aschers., Ind. Sem. Hort. Berol. App.
(1867) p. 6

和名 トキンサウ

生育地 路傍に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、琉球、臺灣、印度、
濠洲に分布す。

542 *Chrysanthemum indicum* Linn., Sp. Pl. ed. I. (1753) p. 889

和名 ハマカンギク、シマカンギク 方言 ノギク

生育地 林縁に生じ稍々稀なり。(生ケ谷、大倉、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 九州、朝鮮、滿洲、支那、臺灣、印度に分布す。

543 *Cirsium Buergeri* Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. (1866) p. 185

和名 ヒメヤマアザミ

生育地 林内の蔭地に生じ稍々普通なり。(鬼ケ浦、生ケ谷、大倉、
荒平、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州各部、九州に分布す。

544 *Cirsium Maackii* Maxim. var. *intermedium* Nakai in Bot. Mag. Tokyo
XXVI. (1912) p. 375

和名 ノアザミ 方言 アザミ

生育地 林縁に生じ稍々普通なり。(上ノ山、鬼ケ浦、生ケ谷、大倉、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州に分布し基種は朝鮮、滿洲、アムールに分布す。

545 *Cirsium Reinii* Matsum., Ind. Pl. Jap. III. (1912) p. 642

和名 マアザミ、キセルアザミ

生育地 水邊に生じ稍々稀なり。(鬼ケ浦、極樂、生ケ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、九州に分布す。

546 *Cirsium spicatum* Matsum., Shokubutsu-Meiji (1895) n. 889

和名 ヤマアザミ

生育地 谷間に生じ稀なり。(大倉)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、九州に分布す。

547 *Crepis japonica* Benth., Fl. Hongk. (1861) p. 194

和名 オニタビラコ

生育地 路傍に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、馬來、印度、濠洲に分布す。

548 *Eclipta alba* Hassk., Pl. Jav. Rar. (1848) p. 528

和名 タカサブラウ

生育地 路傍に生じ稍々稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 北半球の暖、熱帯に廣く分布し本邦にては本州各部、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

549 *Erigeron annuus* Pers., Syn. II. (1807) p. 431

和名 ヒメデヨラン

生育地 林縁に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦、大倉)

生活形 T (一年生植物)

備考 北米原産の一年生植物にして現今本邦各所に野生状をなす。

550 *Erigeron canadensis* Linn., Sp. Pl. I. (1753) p. 863

和名 ヒメムカシヨモギ 方言 トビクサ

生育地 荒廢地、池畔に生じ普通なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 北米原産の雜草にして現今は東亞各地に廣く分布す。

551 *Erigeron kamtschaticus* DC., Prodr. V. (1836) p. 290

和名 ムカシヨモギ

生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 北半球の温帯、寒帯に廣く分布し本邦にては樺太、千島、北海道、本州、四國、九州に分布す。

552 *Erigeron linifolius* Willd., Sp. III. (1800) p. 1955

和名 アレチノギク、ノヂワウギク

生育地 伐採跡地に生じ稀なり。(穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 南歐原産の雑草にして現今は全世界に分布す。

553 *Eupatorium Fortunei* Turcz. var. *simplicifolium* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLI. (1931) p. 511

和名 ヒヨドリバナ

生育地 林縁に生じ普通なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那、琉球、臺灣、印度北部に分布す。

form. *aureo-reticulatum* Nakai, l. c.

和名 キモンヒヨドリバナ

生育地 林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、九州に分布す。葉に網状黄色の斑紋あり。

554 *Eupatorium japonicum* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 308

和名 フヂバカマ

生育地 林縁に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、新建、生ヶ谷、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 脚葉は三深裂にして花は淡紅色なり。本州中南部、九州、支那、
印度北部に分布す。

555 *Eupatorium Lindleyanum* DC., Prodr. V. (1836) p. 180

和名 サハヒヨドリ

生育地 水邊に生じ普通なり。(生ケ谷、穴口、鬼ケ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲、支那、琉球、臺灣に分布す。

556 *Eupatorium variable* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIV. (1910) p. 59

和名 ヤマヒヨドリ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(大倉、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 九州特産なり。

557 *Gerbera Anandria* Sch. Bip. in Walp. Rep. II. (1844) p. 782

和名 センボンヤリ

生育地 稍々乾燥せる原野に生じ稀なり。(鬼ケ浦、生ケ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲、シベリヤ、支那に分布す。

558 *Gnaphalium japonicum* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 311

和名 チチコグサ

生育地 路傍に生じ普通なり。(鬼ケ浦、生ケ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、九州、琉球、臺灣、朝鮮、支那、濠洲に分布す。

559 *Gnaphalium multiceps* Wall., Cat. n. 2949 (1831)

和名 ハハコグサ

生育地 路傍に生じ稀なり。(極樂)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那、臺灣、印度北部に分布す。

560 **Hieracium Kramerii** Franch. et Sav., Enum. I. (1875) p. 273

和名 スキラン

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、極樂)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、九州に分布す。

561 **Lactuca debilis** Benth. et Hook. f., Gen. Pl. II. (1873-76) p. 526

和名 デシバリ 方言 タピラコ

生育地 路傍に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮、支那、臺灣に分布す。

562 **Lactuca dentata** (Thunb.) C. B. Robinson in Philip. Journ. Sci. III. (1908)
p. 218

syn. *Lactuca dentata* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIV. (1910) p. 75,

syn. nov.

Ixeris dentata Nakai, Fl. Sylv. Korea. XIV. (1923) p. 114

var. **albiflora** Makino in Bot. Mag. Tokyo XXIV. (1910) p. 76

syn. *Ixeris dentata* Nakai var. *albiflora* Nakai, l. c.

和名 シロバナニガナ

生育地 林内に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

var. **Thunbergii** Makino in Tokyo Bot. Mag. XXIV. (1913) p. 29

和名 ニガナ

生育地 林内に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、上ノ山)

生活形 T (一年生植物)

備考 千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

563 Lactuca denticulata Maxim. var. **typica** Maxim. in Mel. Biol. IX. (1874)
p. 359

syn. *Paraixeris denticulata* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXIV. (1920)
p. 156

和名 ヤクシサウ

生育地 路傍に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、荒平)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、臺灣に分布す。

564 Lactuca indica Linn., Mant. II. (1771) p. 278

syn. *Lactuca laciniata* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVII. (1903) p. 88

和名 アキノノゲシ

生育地 原野路傍に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、比島、印度、
スマトラ、ビルマ、瓜哇に分布す。

565 Lactuca sororia Miquel in Ann. Lugd. Bat. II. (1866) p. 189

syn. *Ixeris sororia* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1920) p. 155

Mycelis sororia Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXXI. (1922) p. 24

和名 ムラサキニガナ

生育地 林内蔭地に生じ稍々稀なり。(生ケ谷、穴口、荒平、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

566 *Lactuca stolonifera* Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873-76) p. 526

syn. *Ixeris stolonifera* A. Gray in Mem. Am. Acad. N. S. VI. (1858-59)
p. 396

和名 イハニガナ、ヒメヂシバリ

生育地 路傍に生じ稀なり。(生ケ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、九州に分布す。

567 *Lactuca tamagawaensis* Makino in Bot. Mag. Tokyo VI. (1892) p. 56

syn. *Ixeris graminea* (Fischer) Nakai in Bot. Mag. Tokyo XXXVI.
(1922) p. 23

和名 カハラニガナ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、九州に分布す。一見タカサゴサウに似るも葉は粉白狭
小にして花は黄色を呈す。

568 *Lapsania humilis* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVII. (1903) p. 87

和名 ヤブタピラコ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(穴口、大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、濟州島に分布す。

569 *Ligularia tussilaginea* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVIII. (1904) p. 52

和名 ツハブキ

方言 ツハ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、
穴口)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布す。

570 *Petasites japonicus* Miquel, P. (1866-67) p. 380

和名 フキ

生育地 谷間に生じ少々稀なり。(生ヶ谷、大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、九州、朝鮮、支那に分布す。

571 *Picris japonica* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 299

syn. *Picris hieracioides* Linn. var. *japonica* Regel, Pl. Radd. III. n. 218.
(1869)

和名 カウゾリナ

生育地 路傍に生じ少々普通なり。(生ヶ谷、新建、大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲、アムール、支那に分布す。

572 *Rhynchospermum verticillatum* Reinw. in Syll. Ratisb. II. (1828) p. 8

和名 シウブンサウ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、九州、濟州島、臺灣、支那、印度支那、印度、瓜哇に
分布す。

573 *Saussurea pulchella* Fischer var. ***pinnatifida*** Regel, Tent. Fl. Uss. (1861)

p. 94

和名 ヒメヒゴダイ

生育地 原野に生じ稀なり。(飯盛、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州に分布す。

574 *Senecio campestris* DC., Prodr. VI. (1837) p. 361

和名 サハラグルマ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、極樂、上ノ山)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、ダフリカ、アムール、ウスリ、支那、歐洲に分布す。

575 *Senecio nikoensis* Miquel in Ann. Lugd. Bat. II. (1866) p. 182

和名 サハギク、ボロギク

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

576 *Serratula coronata* Linn., Sp. Pl. ed.-2. (1763) p. 1144

和名 タムラサウ

生育地 水邊に生じ極めて稀なり。(穴口)

生活形 H (浅地下植物)

備考 歐洲北部、アジア北部に分布し本邦にては本州各部、九州、朝鮮に分布す。

577 *Siegesbeckia glabrescens* Makino in Journ. Jap. Bot. I-7. (1917) p. 25

和名 コメナモミ

生育地 谷間の草生地に生じ稍々普通なり。(生ヶ谷、穴口、大倉、荒平)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州各部、九州、朝鮮に分布す。

578 *Solidago Virgaurea* Linn., Sp. Pl. ed.-I. (1753) p. 880

和名 アキノキリンサウ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、穴口)

生活形 H (浅地下植物)

備考 歐洲北部及東部、シベリヤ、アメリカ北部に分布し本邦にては北は樺太より南は臺灣迄分布す。

579 *Sonchus asper* Linnaeus, Sp. Pl. ed. I. (1753) p. 794

和名 オニノゲシ

生育地 伐採跡地に生じ稀なり。(穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 近時移入せる歐洲原産の雜草にして各地に野生状をなす。

580 *Sonchus oleraceus* Linn., Sp. Pl. ed.-I. (1753) p. 794

和名 ノゲシ、ハルノノゲシ 方言 タンポポ

生育地 路傍に生じ少々普通なり。(高辻、生ケ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 殆んど全世界に分布し本邦にては樺太、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

581 *Taraxacum albiflorum* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXVII. (1923) p. 94

和名 シロバナタンポポ

生育地 路傍に生じ稀なり。(生ケ谷、事務所)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

582 *Xanthium sibiricum* Patr. ex Widder in Fedde, Repert. Beih. XX. (1923)

p. 32

和名 フナモミ

- 生育地 荒廢地に生じ稀なり。(高辻)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 殆んど全世界の温帯より熱帯に亘り分布し本邦にては北海道、
 本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

Monocotyledoneae 單子葉植物

Typhaceae ガマ科

583 Typha orientalis Presl, Epim. Bot. (1847) p. 239

- 和名 コガマ 方言 ロウソクグサ
 生育地 谷間の濕地に生じ稀なり。(大倉)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

Potamogetonaceae ヒルムシロ科

584 Potamogeton Franchetii A. Benn. et Baag. in Journ. Bot. XLV. (1907) p. 234

- 和名 ヒルムシロ
 生育地 水中に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 カムチャツカ、樺太、千島、北海道、本州、九州、朝鮮南部に分布
 す。

585 Potamogeton Miduhikimo Makino in Illust. Fl. Jap. I.-9. (1891) t. 54

- 和名 ミヅヒキモ
 生育地 水中に生じ普通なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州各部、四國、九州に分布す。

586 *Potamogeton oxyphyllus* Miquel in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 161

- 和名 ヤナギモ、ササモ
 生育地 流水中に生じ普通なり。(事務所)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四国、九州、朝鮮に分布す。

Alismataceae オモダカ科

587 *Alisma Plantago* Linn. var. *angustifolium* Kunth., Enum. Pl. III. p. 148

- 和名 ヘラオモダカ
 生育地 水中に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、九州、朝鮮、琉球に分布す。

588 *Caldesia parnassifolia* Parl. var. *reniformis* Makino in Journ. Jap. Bot. VI.-4. (1929) p. 8

- 和名 マルバオモダカ
 生育地 水中に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 本州中南部、九州に分布す。

Hydrocharitaceae トチカガミ科

589 *Ottelia alismoides* Pers., Syn. I. (1817) p. 400

- 和名 ミヅオホバコ
 生育地 水中に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州各部、九州、朝鮮、満洲、支那、臺灣、印度、濠洲に分布す。

Poaceae (*Gramineae*) イチゴツナギ科590 *Agropyron japonicum* Honda in Bot. Mag. Tokyo XLI. (1927) p. 384

和名 タチカモヂグサ

生育地 伐採跡地、路傍に生じ稀なり。(大倉、穴口、高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州中南部、九州、朝鮮南部に分布す。

591 *Agropyron Mayebaranum* Honda in Bot. Mag. Tokyo XLI. (1927) p. 384

和名 オホタチカモチ

生育地 水邊に生じ稀なり。(穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 カモジグサに比し葉は狭小、水邊性にして穂は直立す。中國、九州に分布す。

592 *Agropyron semicostatum* Nees ex Steudel Syn. Glum. I. (1855) p. 346

和名 カモジグサ

方言 ヒーナグサ

生育地 路傍に生じ普通なり。(大倉、生ヶ谷、高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、シベリヤ、支那、ヒマラヤ、ネパールに分布す。

593 *Agrostis Matsumurae* Hackel ex Matsumura in Bot. Mag. Tokyo XI. (1897) p. 445 nom. nud.

和名 ヌカボ

生育地 路傍に生じ稀なり。(穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

594 *Agrostis palustris* Huds., Fl. Angl. (1762) p. 27

和名 コヌカグサ

生育地 路傍に生じ普通なり。(高辻、穴口)

生活形 H (浅地下植物)

備考 アメリカ、歐洲、濠洲、アジアに廣く分布し本邦にては樺太、北海道、本州、九州、朝鮮に分布す。

595 *Alopecurus geniculatus* Linn., Sp. Pl. ed.-1. (1753) p. 60

和名 スズメノテツバウ

生育地 路傍、水邊に生じ普通なり。(穴口、高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 樺太、千島、北海道、本州、九州、朝鮮、支那北部、琉球、臺灣、歐洲、濠洲、アジア東部、シベリヤ、アメリカ北部に分布す。

596 *Andropogon brevifolius* Sw., Prodr. Veg. Ind. Occ. (1788) p. 26

和名 ウシクサ

生育地 水邊に生じ稀なり。(御手洗水)

生活形 T (一年生植物)

備考 兩半球の暖帶より熱帶に亘り廣く分布し本邦にては本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

597 *Andropogon micranthus* Kunth, Rev. Gram. I. (1829) p. 165

和名 ヒメアブラスキ 方言 アブラスキ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布し海外にありてはアジア、アフリカ、濠洲の熱帶、亞熱帶に廣く分布す。

598 *Arthraxon hispidus* Makino var. *ciliaris* Honda ex Nakai Veg. Apoi
(1930) p. 73

和名 コブナグサ

生育地 路傍に生じ普通なり。(生ケ谷、大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮に分布す。

599 *Arundinella hirta* Tanaka in Bult. Sci. Fakul. Terkult. Kjusu Imp. Univ.
I. 4 (1925) p. 196

var. *ciliata* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1925) p. 303

和名 トダシバ

生育地 原野路傍に生じ普通なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、上ノ山、飯盛)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

var. *typica* Honda in Monogr. Poac. Jap. (1930) p. 305

和名 ケトダシバ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ケ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 葉鞘は粗毛密布す。北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

600 *Avena fatua* Linn., Sp. Pl. ed. I. (1753) p. 80

和名 カラスムギ

生育地 荒廢地に生じ稀なり。(高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、歐洲、コーカサス、ロシア、シベリヤ、支那、濠洲、印度、アフリカ、アメリカ北部に分布す。

601 *Brachypodium miserum* Koidzumi in Bot. Mag. Tokyo XXXIX. (1925) p. 303

和名 ヤマカモヂグサ

生育地 林内路傍に生じ普通なり。(御手洗水、新建、荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

602 *Bromus japonicus* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 52

和名 スズメノチャヒキ

生育地 路傍に生じ稀なり。(高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那、歐洲、アフリカ南部に分布す。

603 *Calamagrostis arundinacea* Roth. var. *sciuroides* Hack. in Bull. Herb. Boiss. (1899) p. 652

和名 サイトウガヤ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

604 *Calamagrostis Epigeios* Roth, Tent. Fl. Germ. I. (1788) p. 34

和名 ヤマアハ

生育地 水湿地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、アフリカ南部、歐洲、アジア北部に分布す。

605 *Chamaeraphis spinescens* Poilet var. *depauperata* J. D. Hooker, Fl. Brit. Ind. VII. (1897) p. 62

和名 ウキシバ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 一見ギョウギシバに似たる所あり。本州中部以南、九州、臺灣、支那、馬來、セイロン島、濠洲に分布す。

606 Coelachne japonica Hack. in Bull. Herb. Boiss. (1899) p. 701

和名 ヒナザサ

生育地 池畔に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 高さ十糎内外の一年生草本にして本州中南部、北九州に分布す。

607 Cymbopogon Goeringii Honda var. **genuinus** Honda, Monogr. Poac.

Jap. (1930) p. 338

和名 フガルカヤ 方言 ドツボ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、御手洗水)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、臺灣、小笠原、支那、比島に分布す。

608 Diplachne Hackeli Honda, Monogr. Poac. Jap. (1930) p. 112

和名 ホソバテウセンガリヤス

生育地 稍々乾燥せる林縁に生じ稀なり。(御手洗水、生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

609 Eccoilopus cotulifer A. Camus in Ann. Soc. Linn. Lyon. (1923) p. 1. t. LXX

和名 アブラススキ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ極めて稀なり。(生ヶ谷、上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、印度北部に分布す。

610 Echinochloa Crus-galli Beauv. subsp. **genuina** Honda var. **echinata**

Honda in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1923) p. 120

和名 ミヅビエ

生育地 水邊に生じ普通なり。(高辻)

生活形 T (一年生植物)

備考 世界の暖地に廣く分布し北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

611 Eragrostis atrovirens Trin. in Steud. Nomencl. (1840) p. 562

和名 イトス^キメガヤ

生育地 池畔に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、御手洗水)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、比島に分布す。

612 Eragrostis ferruginea Beauv., Agrost. (1812) p. 71

和名 カゼクサ

生育地 路傍に生じ稍々稀なり。(生ヶ谷、大倉、鬼ヶ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、ヒマラヤに分布す。

613 Eragrostis Niwahokori Honda in Bot. Mag. Tokyo XLI. (1927) p. 387

和名 ニハホコリ

生育地 路傍に生じ普通なり。(穴口、高辻、生ヶ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 本邦にては北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、臺灣に分布し
海外に於ける分布は不明なり。

614 Eriochloa villosa Kunth, Rev. Gram. I. (1829) p. 203, t. 13

和名 ナルコビエ

生育地 林縁に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、滿洲に分布す。

615 Festuca parvigluma Steud., Syn. Gram. (1855) p. 305

和名 トボシガラ

生育地 路傍に生じ普通なり。(生ケ谷、大倉、新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那に分布す。

616 Glyceria tonglensis Clarke in Journ. Linn. Soc. XV. (1877) p. 119

和名 ドゼウツナギ

生育地 水邊に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、ヒマラヤに分布す。

617 Holcus fulvus R. Br. var. **genuinus** Honda in Bot. Mag. Tokyo XL.
(1926) p. 102

和名 モロコシガヤ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、馬來、印度東部、濠洲に分布す。

618 Imperata cylindrica Beauv. var. **Koenigii** Durand et Schinz ex Camus
in Rev. Bot. appli. Agric. colon. V. 42. (Feb. 1925) p. 110

和名 チガヤ、ツバナ、フシゲチガヤ 方言 マガヤ

生育地 少々乾燥せる林内、原野に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、穴口)

生活形 G (深地下植物)

備考 殆んど全世界に分布し本邦にては本州、四國、九州、朝鮮、小笠原、臺灣に分布す。

619 *Isachne globosa* O. Kuntze, Rev. Gen. (1891) p. 778

- 和名 チゴザサ
 生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、馬來、印度
 東部、濠洲に分布す。

620 *Isachne Myosotis* Nees in Hooker, Kew Journ. II. (1850) p. 98

- 和名 ハヒチゴザサ
 生育地 谷間の水濕地に生じ稀なり。(上ノ山、御手洗水)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、比島、馬來、支那東部に分布す。

621 *Ischaemum crassipes* Thellung var. *typicum* Nakai in Bot. Mag. Tokyo
 XXXIII. (1919) p. 1

- 和名 カモノハシ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、極樂)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

622 *Koeleria gracilis* Pers., Syn. I. (1805) p. 97

- 和名 ミノボロ
 生育地 稍々乾燥せる林野に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、高辻)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州各部、九州、朝鮮、シベリア、歐洲、アフリカ、アメリカ北部
 に分布す。

623 *Leersia japonica* Makino in Bot. Mag. Tokyo VI. (1892) p. 48

生育地 水邊に生じ稀なり。(上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣に分布す。

624 *Leersia oryzoides* Sw. var. *japonica* Hack. in Bull. Herb. Boiss. (1899)

p. 645

和名 サヤヌカグサ

生育地 水邊に生じ稀なり。(極樂)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、臺灣に分布す。

625 *Lophatherum gracile* Brongniart in Duperrey Voy. Coq. Bot. (1828)

p. 50, t. 8

和名 コササクサ 方言 ケーナ

生育地 谷間の草生地に生じ稍々普通なり。(大倉、穴口、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、九州、朝鮮、臺灣、比島、支那、馬來、ヒマラヤ、印度に分布す。

626 *Lophatherum sinense* Rendle in Journ. Linn. Soc. XXXVI. (1904) p. 421

和名 タウササクサ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 前者に比し葉は大形且花序又大なり。本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

627 *Microstegium nudum* A. Camus in Ann. Soc. Linn. Lyon. t. LXVIII.

(1921) p. 201

syn. *Pollinia nuda* Trinius in Mem. Ac. Petersb. ser. 6. II. (1833) p. 307

和名 ササガヤ

生育地 林内の路傍に生じ少々普通なり。(生ケ谷、大倉、新建、鬼ヶ浦)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

628 *Microstegium vimineum* A. Camus var. *imberbe* Honda, Monogr. Poac.
 Jap. (1930) p. 408

syn. *Pollinia Willdenowiana* Benth. in Journ. Linn. Soc. XIX. (1882)
 p. 67

和名 アシボソ
 生育地 林内の路傍に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ケ谷、大倉、新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、滿洲、印度支那、
 瓜哇に分布す。

629 *Miscanthus oligostachyus* Stapf in Bull. Misc. Inform. Kew. (1898)
 p. 227

和名 カリヤスモドキ
 生育地 乾燥せる林内に生じ極めて稀なり。(鬼ヶ浦、上ノ山)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

630 *Miscanthus sinensis* Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Stockh. (1855)
 p. 166

和名 ススキ、カヤ、ヲバナ
 生育地 原野に生じ普通なり。(生ケ谷、新建(多)、飯盛、鬼ヶ浦)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、臺灣、支那、比島、馬來、ボルネオ、
 アツサムに分布す。

631 Muehlenbergia japonica Steud., Syn. Gram. (1855) p. 422

和名 ネズミガヤ

生育地 林内の路傍に生じ普通なり。(大倉、新建、荒平)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮、支那、満洲、シベリヤ東部に分布す。

632 Oplismenus japonicus Honda in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1924) p. 190

和名 コチヂミザサ

生育地 林内の路傍に生じ少々普通なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、新建、大倉)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

633 Oplismenus undulatifolius Roem. et Schult., Syst. II. (1817) p. 482

和名 チヂミザサ

方言 ケーナ

生育地 林内の路傍に生じ普通なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本邦にては北海道、本州、四國、九州、琉球に分布し海外にありては歐洲中部より印度及熱帯アフリカ迄分布す。

634 Panicum bisulcatum Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. VII. (1815)

p. 141

和名 ヌカキビ

生育地 路傍に生じ普通なり。(鬼ケ浦、大倉、荒平、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮、臺灣、印度支那、支那に分布す。

635 Paspalum scrobiculatum Linn., Mant. (1767) p. 29syn. *Paspalum scrobiculatum* Linn. var. *orbiculare* Makino in Bot. Mag. Tokyo X. (1896) p. 60

和名 スズメノコビエ
 生育地 池畔に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、九州、琉球、臺灣、支那、印度東部、濠洲に分布す。

636 Paspalum Thunbergii Kunth. ex Steudel, Syn. Glum. I. (1855) p. 28

和名 スズメノヒエ
 生育地 水邊に生じ稍々稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

637 Pennisetum japonicum Trin. in Sprengel Neude Entd. II. (1821) p. 76

syn. *Pennisetum purpurascens* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVI. (1912)
 p. 294

和名 チカラシバ 方言 ハジカ
 生育地 路傍に生じ稀なり。(穴口)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、支那、滿洲、アムール、ビルマに分布す。

638 Phalaris arundinacea Linn. var. *genuina* Hack. in Bull. Herb. Boiss. (1899) p. 646

和名 クサヨシ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(荒平、極樂)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那北部、シベリヤ、歐洲、アメリカ北部に分布す。

639 Phragmites japonica Steudel, Syn. Glum. I. (1855) p. 196

和名 ツルヨシ、チシバリ
 生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、極樂)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

640 Pleioblastus communis Nakai in Journ. Arn. Arb. VI-3. (1925) p. 146

和名 ゴキダケ 方言 インコロシ、コザサ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口、大倉)
 生活形 N (灌木)
 備考 四國、九州に分布す。

641 Pleioblastus Simoni Nakai in Arn. Arb VI-3. (1925) p. 147

和名 メダケ 方言 シノダケ
 生育地 稍々乾燥したる林内に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)
 生活形 N (灌木)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部に分布す。

642 Poa acroleuca Steud., Syn. Gram. (1855) p. 256

和名 ミゾイチゴツナギ
 生育地 水邊に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、大倉、生ヶ谷)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

643 Poa annua Linn., Sp. Pl. ed.-I. (1753) p. 68

和名 スズメノカタビラ
 生育地 路傍に生じ普通なり。(高辻)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 千島、樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣、小笠原、カムチャツカ、シベリヤ、コーカサス、歐洲、アフリカ、アメリカ北部並中部に分布す。

644 *Poa sphondylodes* Trin. var. *strictula* Koidz. in sched. herb. Univ. Imp.
Tokyo

和名 ヒメイチゴツナギ、ザラツキイチゴツナギ

生育地 少々乾燥せる林縁に生じ稀なり。(生ケ谷、鬼ケ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

645 *Pogonatherum crinitum* Kunth, Enum. Pl. I. (1833) p. 478

和名 イタチガヤ

生育地 水邊の岩石上に生じ稀なり。(御手洗水)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州南部、四國、九州、琉球、臺灣、支那中部、馬來、印度に分布す。

646 *Pseudosasa japonica* Makino in Journ. Jap. Bot. II.-4. (1920) p. 15

syn. *Yadakeya japonica* Makino, l. c. VI.-7. (1920) p. 16

和名 ヤダケ 方言 ヤヂノ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ稀なり。(穴口)

生活形 N (灌木)

備考 本州、四國、九州、朝鮮南部に分布す。

647 *Rottboellia compressa* Linn. f., Suppl. Pl. (1781) p. 114

和名 コバノウシノシツペイ

生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ケ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 九州、臺灣、支那、印度に分布す。

648 *Sacciolepis oryzetora* Honda in Bot. Mag. Tokyo XXXVII. (1923) p. 118

和名 スメリグサ

生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 ハヒヌメリに似るも水邊に生じ莖は直立性にして膝折れをなさず、圓錐花序は綠紫色を呈す。本州、九州、琉球、朝鮮、臺灣に分布す。

649 Sasa Veitchii Rehder in Journ. Arn. Arb. I.-I. (1919) p. 58 ?

syn. *Sasa albo-marginata* Makino et Shibata in Bot. Mag. Tokyo XV.

(1901) p. 25

和名 クマザサ?

生育地 谷間の森林内に生じ稀なり。(荒平、上ノ山)

生活形 N (灌木)

備考 葉は無毛なるも葉鞘は粗毛密生す。本州、四國、九州に分布す。

650 Setaria lutescens Hubbard var. **genuina** Honda, Monogr. Poac. Jap.

(1929) p. 237

syn. *Chaetochloa lutescens* Stuntz. var. *genuina* Honda in Bot. Mag.

Tokyo XXXVIII. (1924) p. 194

和名 キンエノコロ

生育地 路傍に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、大倉)

生活形 T (一年生植物)

備考 世界の温帯より熱帯に亘り廣く分布し本邦にては北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣に分布す。

651 Setaria viridis Beauv. var. **purpurascens** Maxim., Prim. Fl. Amur.

(1859) p. 330

syn. *Chaetochloa viridis* Scribn. var. *purpurascens* Honda in Bot. Mag.

Tokyo XXXVIII. (1924) p. 197

和名 ムラサキエノコログサ
 生育地 路傍に生じ極めて稀なり。(御手洗水)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、シベリヤ、アジア東部、歐洲、アフリカ
 北部に分布す。

652 *Sporobolus elongatus* R. Br., Prodr. (1810) p. 170

和名 ネヅミノヲ
 生育地 路傍に生じ稀なり。(大倉)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、印度東部に分布す。

653 *Syntherisma Ischaemum* Nash, N. Amer. Fl. XVII. (1912) p. 151

和名 アキメヒジハ、ムラサキメヒジハ
 生育地 路傍、池畔に生じ少々普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本邦にては北海道、本州、九州、朝鮮、琉球、小笠原、臺灣に分布
 するも其他世界の暖地に廣く分布す。

654 *Syntherisma sanguinalis* Dulac, Fl. Haut. Pyr. (1867) p. 77

和名 コメヒジハ
 生育地 池畔、路傍に生じ普通なり。(穴口、大倉、鬼ヶ浦、生ヶ谷)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 アジア、アフリカ、歐洲、濠洲の暖地に廣く分布し、本邦にて
 は北海道、本州、四國、九州、朝鮮、小笠原、臺灣に分布す。

var. *ciliaris* Honda in Bot. Mag. Tokyo XXXVIII. (1924) p. 120

和名 メヒジハ 方言 オクトウシ
 生育地 路傍に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 殆んど全世界の暖地に分布し本邦にては北海道以南臺灣迄分布す。

655 *Themeda japonica* Tanaka var. **viridiflora** Honda, Monog. Poac. Jap. (1930) p. 350

和名 アヲメカルカヤ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、九州に分布す。

656 *Trisetum bifidum* Ohwi in Bot. Mag. Tokyo XLV. (1931) p. 191

和名 カニツリグサ

生育地 原野に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

657 *Zoysia japonica* Steud., Syn. Gram. (1855) p. 414

和名 シバ 方言 シバクサ

生育地 路傍に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、小笠原、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

Cyperaceae カヤツリグサ科

658 *Carex breviculmis* R. Br. subsp. **Royleana** Kuek. in Engl. Pfl.-reich, Heft.-38. (1909) p. 469

和名 アヲスゲ

生育地 林内各地に生じ普通なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、穴口、大倉、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムール、琉球、臺灣、支那、印度に分布す。

659 *Carex Brownii* Tuck. var. *transversa* Kuek. in Engl. Pfl.-reich, Heft.-38 (1909) p. 614

和名 ヤハラスゲ

生育地 水邊に生じ稍々稀なり。(生ヶ谷、大倉、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 アハボスゲに酷似するも葉は狭く、一體に稍々纖弱なり。北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那東部に分布す。

660 *Carex brunnea* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 38

和名 ナキリスゲ

生育地 谷間に生じ普通なり。(生ヶ谷、極樂、穴口、大倉、御手洗水、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、小笠原、琉球、臺灣、朝鮮、滿洲、支那、印度、セレベス及濠洲北部に分布す。

661 *Carex dispalata* Boott in Perry, Jap. Exped. II. (1856-57) p. 325

和名 カサスゲ

生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、上ノ山、穴口)

生活形 H (淺地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那中部に分布す。

662 *Carex filipes* Franch. et Savat., Enum. II. (1876-79) p. 148 et 576

和名 タマツリスゲ

生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷、上ノ山、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

663 Carex forficula Fr. et Sav., Enum. II. (1876-79) p. 131 et 557

和名 タニガハスゲ

生育地 水邊に生じ稀なり。(穴口、生ケ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲南部、支那北部に分布す。

664 Carex gibba Wahl in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) p. 148

和名 マスクサ

生育地 草生地に生じ普通なり。(生ケ谷、大倉、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

665 Carex hebecarpa C. A. Mey. var. **ligulata** Kuek. in Engl. Pfl.-reich, Heft-38. (1909) p. 745

和名 サツマスゲ

生育地 林内に生じ稀なり。(上ノ山、新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 四國、九州、朝鮮南部、臺灣に分布す。

666 Carex ischnostachya Steud., Syn. Cyp. (1855) p. 222

和名 ジユズスゲ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、琉球に分布す。

667 Carex japonica Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 38

和名 ヒゴクサ

生育地 林内の蔭地に生じ稍々稀なり。(新建、大倉)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

668 Carex lanceolata Boott in Perry, Jap. Exped. II. (1857) p. 326

和名 ヒカゲスゲ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、御手洗水、穴口、大倉)

生活形 H (淺地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、アムールに分布す。

669 Carex Maximowiczii Miquel in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. (1865)
p. 180

和名 ガウソ 方言 チョウチングサ

生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

670 Carex mitrata Franch. var. **aristata** Ohwi in Journ. Jap. Bot. VII.-5.
(1931) p. 166

和名 ノゲヌカスゲ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(生ヶ谷、大倉)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、九州に分布す。

671 Carex mollicula Boott, Illust. Carex IV. (1867) p. 192

和名 ヒメシラスゲ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(大倉、新建、上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那に分布す。

672 Carex periculosa Honda in Bot. Mag. Tokyo XLI. (1930) p. 408

和名 ヒメテキリスゲ

生育地 湿地に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中部、北九州に分布す。

673 Carex phaeoleuca Ohwi, Acta Phytotax. et Geobot. I, 1. (1932) p. 68

和名 ツクシミノボロスゲ

生育地 路傍の湿地に生じ稀なり。(穴口)

生活形 H (浅地下植物)

備考 一見ミノボロスゲに似るも全株粉白なるを以て一見區別し得。本州東部、九州、朝鮮南部に分布す。

674 Carex rara Boott var. **biwensis** Kuek. in Engl. Pfl.-reich, Heft-38. (1909) p. 102

和名 マツバスゲ

生育地 湿地に生じ稀なり。(生ヶ谷、上ノ山、新建、鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、九州、朝鮮、支那中部に分布す。

675 Carex rhizopoda Maxim. in Mel. Biol. XII. (1887) p. 561

和名 シラコスゲ

生育地 水湿地に生じ稀なり。(生ヶ谷、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州南部、九州に分布す。

676 Carex tristachya Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 38

和名 モエギスゲ

生育地 少々乾燥せる林内に生じ普通なり。(新建、生ヶ谷、御手洗水)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮に分布す。

677 Carex Zollingeri Kuntze ex Steud. Syn. Pl. Cyp. (1855) p. 221

和名 シラスゲ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(荒平、大倉、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、九州、琉球、朝鮮、臺灣に分布す。

678 Cyperus amuricus Maxim., Prim. Fl. Amurl. (1868) p. 296

和名 チャガヤツリ

生育地 水邊に生じ稍々稀なり。(新建、穴口)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、九州、朝鮮、臺灣、アムール、滿洲、支那に分布す。

679 Cyperus difformis Linn., Cent. Pl. II. (1756) p. 6

和名 タマガヤツリ

生育地 水濕地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 アジアの暖地、アフリカ、歐洲に分布し本邦にては北は北海道より南は臺灣迄分布す。

680 Cyperus flavidus Retz., Obs. V. (1789) p. 13

和名 ミヅハナビ、ヒメガヤツリ

生育地 池畔に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州中南部、四國、九州、臺灣、支那、馬來、印度、濠洲北部に分布す。

681 *Cyperus Haspan* Linn., Sp. Pl. ed.-I. (1753) p. 45

和名 コアゼガヤツリ

生育地 池畔に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、極樂)

生活形 G (深地下植物)

備考 概形前者に酷似するも稍々小形にして根莖は横走す。本邦にては本州、四國、九州、濟州島、琉球、臺灣に分布する汎熱帶性植物なり。

682 *Cyperus Iria* Linn., Sp. Pl. ed.-I. (1753) p. 45

和名 コゴメガヤツリ

生育地 路傍に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 T (一年生植物)

備考 世界の温帯より熱帯に亘り廣く分布し、本邦にては本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣に分布す。

683 *Cyperus pilosus* Vahl, Enum. II. (1806) p. 354

和名 オニガヤツリ

生育地 水邊に生じ稀なり。(穴口)

生活形 G (深地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、其他アジアの熱帯、アメリカ、濠洲に分布す。

684 *Cyperus serotinus* Rottb., Desc. Nov. Pl. p. 31

和名 ミヅガヤツリ

生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷、鬼ヶ浦、穴口)

生活形 G (深地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、アムール、支那、印度北部、歐洲南部に分布す。

685 *Cyperus truncatus* Turcz. var. **robustus** Nakai in Bot. Mag. Tokyo XL
(1926) p. 146

和名 ウシクグ

生育地 水邊に生じ稀なり。(穴口、新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、四國、九州に分布す。

686 *Eleocharis afflata* Steud., Syn. Cyper. (1855) p. 76

和名 オホハリキ

生育地 水中に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦、極樂)

生活形 G (深地下植物)

備考 本州、四國、九州、支那、瓜哇に分布す。

687 *Eleocharis japonica* Miq. in Ann. Lugd. Bat. II. (1865) p. 142

和名 ハリキ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、極樂)

生活形 G (深地下植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、アムール、臺灣に分布す。

688 *Eleocharis plantaginea* R. Br., Prodr. (1810) p. 224

和名 クログワキ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 G (深地下植物)

備考 本州、九州、臺灣、印度、マダガスカルに分布す。

689 *Eleocharis tetraquetra* Nees in Wight, Contrib. (1834) p. 113

和名 シカクキ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、極樂)

生活形 H (淺地下植物)

備考 千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、臺灣、ヒマ
ラヤ、印度に分布す。

690 *Fimbristylis annua* Roem. et Schult., Syst. Veg. II. (1817) p. 95

和名 テンツキ

生育地 水邊に生じ稀なり。(御手洗水、事務所)

生活形 T (一年生植物)

備考 世界の熱帯より温帯に亘り廣く分布し、本邦にては本州中
南部、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

691 *Fimbristylis globulosa* Kunth, Enum. Pl. II. (1837) p. 231

和名 クロテンツキ

生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、極樂)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、滿洲、支那、馬來、
印度に分布す。

692 *Fimbristylis sub-bispicata* Nees et Mey. in Nov. Act. Nat. Cur. XIX.
Suppl. I. (1843) p. 75

和名 ヤマキ

生育地 濕地に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、穴口、御手洗水)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、支那、比島、印度
に分布す。

693 *Killinga brevifolia* Rottb., Desc. et Ic. (1773) p. 13

和名 ヒメクグ

生育地 路傍に生じ普通なり。(新建、生ヶ谷、鬼ヶ浦)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、滿洲、カムチャツカ、支那、印度、セイロン、モロッカ諸島に分布す。

694 *Pycrus eragrostis* Merr., Fl. Manila (1912) p. 108

和名 カハラスガナ

生育地 水邊に生じ稍々普通なり。(穴口、大倉、鬼ヶ浦、生ヶ谷)

生活形 H (淺地下植物)

備考 支那、印度、濠洲、アビシニア其他アジアの温帯より熱帯に廣く分布し本邦にては北海道、本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

695 *Pycrus globosus* Reichb. var. *strictus* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. XXXIV. (1898) p. 15

和名 アゼガヤツリ

生育地 水邊に生じ稍々普通なり。(生ヶ谷、穴口、御手洗水、新建)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州、四國、九州、朝鮮、臺灣に分布す。

696 *Pycrus odoratus* Urban, Symb. Antil. II. (1900) p. 164

和名 イガガヤツリ

生育地 濕地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 T (一年生植物)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮南部に分布する汎熱帯性植物なり。

697 *Rynchospora glauca* Vahl, Enum. Pl. II. (1806) p. 233

和名 トラノハナヒゲ

生育地 水濕地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、極樂)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本邦にては本州、四國、九州、琉球に分布する汎熱帯性植物なり。

698 *Rynchospora japonica* Makino in Bot. Mag. Tokyo. XVII. (1903) p. 184

和名 イヌノハナヒゲ

生育地 濕地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦、極樂)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、九州に分布す。

699 *Rynchospora rubra* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVII. (1903) p. 180

和名 イガクサ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、小笠原、琉球、臺灣、馬來、印度東部、濠洲、熱帯アフリカに分布す。

700 *Schoenus apogon* Roem. et Schult., Syst. II. (1817) p. 77

和名 ノグサ、ヒゲクサ

生育地 乾燥せる林内に生じ稍々普通なり。(御手洗水、上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州各部、九州、琉球、比島、濠洲、ニュージーランドに分布す。

701 *Scirpus erectus* Poir., Encycl. VI. (1804) p. 761

和名 ホタルキ

生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦)

生活形 G (深地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、琉球、臺灣其他の熱帯アジア、濠洲に分布す。

702 *Scirpus lineolatus* Franch. et Savat., Enum. II. (1876-79) p. 112, 545

- 和名 ヒメホタルキ
 生育地 水中に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、極樂)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 本州、九州に分布す。

703 *Scirpus mucronatus* Linn., Sp. Pl. ed. 1. (1753) p. 50

- 和名 カンガレキ
 生育地 水中に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦、上ノ山)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、支那、印度、濠洲、マダガスカル、歐洲、北米に分布す。

704 *Scirpus nipponicus* Makino in Bot. Mag. Tokyo XVIII. (1904) p. 112

- 和名 シヅキ、テガヌマキ
 生育地 水中に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 本州、九州、朝鮮、滿洲に分布す。

705 *Scirpus Wichurai* Boeck. var. *concolor* Ohwi in Mayebar, Fl. Austro-higoensis (1931) addenda p. 84

- 和名 アブラガヤ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(生ヶ谷、穴口、極樂)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

706 *Scleria tessellata* Willd., Sp. IV. (1805) p. 315

- 和名 コシンジユガヤ
 生育地 水濕地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、支那、比島、印度、濠洲に分布す。

707 Stenophyllus capillaris Britt. in Bull. Torr. Bot. Club XXI. (1894) p. 30

和名 イトハナビテンツキ

生育地 稍々乾燥せる林内に生じ普通なり。(御手洗水)

生活形 T (一年生植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、ヒマラヤ、印度に分布す。

Areaceae (Palmae) シユロ科

708 Trachycarpus excelsus Wendl. var. **typicus** Makino in Bot. Mag. Tokyo XVIII. (1904) p. 20

和名 シユロ、ワジユロ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(荒平)

生活形 M (亞喬木)

備考 九州特産なり。

Araceae テンナンシヤウ科

709 Acorus gramineus Soland. in Ait. Hort. Kew. I. (1789) p. 474.

和名 セキシヤウ 方言 カハゼキシヤウ、メツツバリ

生育地 水邊に生じ稀なり。(穴口)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、九州、朝鮮、臺灣、比島、支那南部、ヒマラヤに分布す。

710 *Arisaema robustum* Nakai in Bot. Mag. Tokyo XLIII. (1929) p. 531

- 和名 ヒロハノテンナンシャウ
 生育地 谷間の蔭地に生じ少々普通なり。(荒平、新建)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

form. *purpureum* Hatusima, form. nov.

Spatha purpureo-violacea longitudine albo-venosa.

- 和名 ムラサキヒロハノテンナンシャウ (新稱)
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(荒平)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 苞は紫色を呈し縦に白線あり。北九州の海岸附近の山地に生ず。

form. *variegatum* Hatusima, form. nov.

Folia supra creberrimo albo-maculata.

- 和名 フイリヒロハノテンナンシャウ (新稱)
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(荒平)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 葉に白斑を有するを特徴とす。北九州の海岸附近の山地に生ず。

711 *Arisaema serratum* Schott, Melet. I. (1832) p. 17

form. *Blumei* Makino in Bot. Mag. Tokyo XV. (1901) p. 129

- 和名 マムシグサ 方言 ヤマゴンニヤク
 生育地 谷間の蔭地に生じ少々普通なり。(荒平、新建、大倉)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 千島、北海道、本州、九州に分布す。

form. **Thunbergii** Makino, l. c. p. 128

- 和名 ムラサキテンナンセウ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(荒平)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 本州、九州に分布す。苞は紫色を呈す。

Eriocaulaceae ホシクサ科

712 Eriocaulon nipponicum Maxim., Diagn. Pl. Nov. As. VIII. (1893) p. 9

- 和名 イトイヌノヒゲ
 生育地 水中に生じ少々稀なり。(極樂)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 北海道、本州、九州、朝鮮、支那に分布す。

713 Eriocaulon parvum Koern. in Miq. Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 163

- 和名 クロホシクサ
 生育地 水中に生じ少々稀なり。(鬼ヶ浦、極樂)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、濟州島に分布す。

714 Eriocaulon robustium Makino in Journ. Jap. Bot. III.-7. (1926) p. 26

- 和名 ヒロハイヌノヒゲ
 生育地 水中に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、支那、印度東部に分布す。

715 Eriocaulon Sieboldianum Sieb. et Zucc. ex Steud. Syn. Cyper. II. (1855)

p. 272

- 和名 ホシクサ

- 生育地 水中に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦、極樂)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、支那、印度、濠洲に分布す。

Commelinaceae ツユクサ科

716 *Aneilema Keisak* Hassk., Commel. Ind. (1870) p. 32

- 和名 イボクサ
 生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、臺灣、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

717 *Commelina communis* Linn., Sp. Pl. ed. 1. (1753) p. 60

- 和名 ツユクサ
 生育地 路傍に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、滿洲、支那、ウスリ、
 アムール、カムチャツカ、歐洲、北米に分布す。

718 *Pollia japonica* Thunb., Fl. Jap. (1784) p. 138

- 和名 ヤブメウガ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稍々稀なり。(荒平、新建)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州、九州、琉球、朝鮮南部に分布す。

Juncaceae 牛 科

719 *Juncus alatus* Franch. et Savat., Enum. II. (1876) p. 98

- 和名 ハナビゼキシヤウ

生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

720 *Juncus decipiens* Nakai, Veg. Kamikochi (1928) p. 35

syn. *Juncus effusus* Linn. var. *decipiens* Buch., Monogr. Juncac. (1890)
 p. 229

和名 キ 方言 ジミグサ
 生育地 水邊に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 樺太、千島、北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

721 *Juncus Kramerii* Franch. et Savat., Enum. II. (1876) p. 99

和名 タチカウガイゼキシヤウ
 生育地 水邊に生じ稍々稀なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、極樂)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 千島、北海道、本州、九州、朝鮮、琉球に分布す。

722 *Juncus papillosus* Franch. et Savat., Enum. II. (1876) p. 98

和名 ホソバノカウガイゼキシヤウ
 生育地 水邊に生じ稍々普通なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 T (一年生植物)
 備考 北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲、アムールに分布す。前者に似るも葉は狭小にして根莖は匍枝を曳く。

723 *Juncus prismatocarpus* R. Br. var. ***Leschenaultii*** Buch. subv.

pluritubulosus Buch. in Engl. Bot. Jahrb. VI. (1890) p. 311

和名 カウガイゼキシヤウ
 生育地 水邊に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、朝鮮、臺灣、印度、セイロンに分布す。

724 *Luzula campestris* DC. var. *capitata* Miq., Prolusio (1866-67) p. 329

和名 スズメノヒエ

生育地 路傍に生じ普通なり。(生ケ谷、鬼ケ浦、飯盛)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲、小笠原島に分布す。

725 *Luzula multiflora* Lejeune, Fl. Envir. Spa, I. p. 169

和名 ヤマスズメノヒエ

生育地 峯通りの原野に生じ稀なり。(桂木、新建、飯盛)

生活形 H (浅地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

726 *Luzula plumosa* E. Mey. in Linnaea XXII. (1849) p. 387

和名 スカボシサウ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(飯盛、生ケ谷、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 千島、北海道、本州、四國、九州、支那、ヒマラヤに分布す。

Liliaceae ユ リ 科

727 *Aletris spicata* Franch. in Journ. de Bot. X. (1897) p. 199

和名 ソクシンラン

生育地 少々乾燥せる原野、林内に生じ稀なり。(鬼ケ浦、御手洗水)

生活形 G (深地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、琉球、臺灣に分布す。

728 *Asparagus schoberioides* Kunth, Enum. Pl. V. (1850) p. 70

和名 キジカクシ

生育地 林縁に生じ稀なり。(穴口、上ノ山、新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 アジア北部に廣く分布し本邦にては樺太、北海道、本州、四國、九州、朝鮮に分布す。

729 *Disporum hallaisanense* Ohwi, Acta Phytotax. et Geobot. I, 2. (1932)

p. 142

和名 ハウチャクサウ

生育地 林内の蔭地に生じ稍々稀なり。(穴口、新建、荒平)

生活形 G (深地下植物)

備考 樺太、北海道、本州、四國、九州、濟州島、琉球に分布す。

730 *Disporum smilacinum* A. Gray in Perry, Jap. Exped. II. (1856-57) p. 321

和名 チゴユリ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(穴口)

生活形 G (深地下植物)

備考 千島、北海道、本州、九州、朝鮮、琉球に分布す。

731 *Cardiocrinum cordatum* Makino in Bot. Mag. Tokyo XXVII: (1913) p. 124

和名 ウバユリ

方言 オホユリ

生育地 谷間の蔭地又は林縁に生じ稀なり。(新建、荒平)

生活形 G (深地下植物)

備考 本州中南部、九州に分布す。

form. **sordidium** Makino in Journ. Jap. Bot. VIII.-1. (1932) p. 6

和名 ヨゴレウバユリ

生育地 林縁に生じ稀なり。

生活形 G (深地下植物)

備考 中肋並に側脈に沿ふて褐色の斑紋を有す。北九州に分布す。

732 *Heloniopsis japonica* Maxim. var. *grandiflora* Nakai in Tokyo Bot. Mag. XLVII. (1933) p. 243

syn. *Sugerokia orientalis* Koidzumi, Fl. Symb. Orient.-Asia. (1930) p. 95

和名 シロバナシヤウジャウバカマ

生育地 水邊に生じ稀なり。(新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、四國、九州に分布す。

733 *Hosta lancifolia* Engl. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. II. 5. (1887) p. 40

和名 ミツギバウシ

生育地 水濕地に生じ稀なり。(極樂)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、九州、朝鮮、滿洲、アムールに分布す。

734 *Hosta undulata* Tanaka in Bult. Sci. Fakul. Terkult. Kjusu Imp. Univ. I.-4. (1925) p. 201

syn. *Hosta coerulea* Tratt, Arch. Gewaechs. I. (1812) p. 55

和名 ギバウシ

生育地 原野に生じ稀なり。(荒平、桂木)

生活形 H (浅地下植物)

備考 本州、九州、朝鮮、支那北部、シベリヤ東部に分布す。

735 *Mondo graminifolia* Koidz. in Bot. Mag. Tokyo XL. (1931) p. 333

syn. *Liriope graminifolia* Bak. in Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) p. 538

和名 ヤブラン , 方言 ヤネブクシヨウ

- 生育地 林内の蔭地に生じ普通なり。(大倉、新建、荒平、生ケ谷)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 本州、四國、九州、朝鮮、琉球、臺灣、支那、印度に分布す。

736 *Ophiopogon japonicus* Ker. in Bot. Mag. t. 1063 (1808)

- 和名 ジャノヒゲ、リュウノヒゲ 方言 ゴジヨノメンタマ
 生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(生ケ谷、新建、荒平、御手洗水)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 北海道、本州、九州、琉球、臺灣、朝鮮、支那に分布す。

737 *Polygonatum japonicum* Morr. et Decne. in Ann. Sc. Nat. Ser.-2. II.
 (1834) p. 311

- 和名 アマドコロ
 生育地 林内の路傍に生じ稀なり。(生ケ谷)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、朝鮮、滿洲に分布す。

738 *Reineckia carnea* Kunth in Abh. Akad. Berl. (1842) p. 29

- 和名 キチジャウサウ
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(荒平、御手洗水、大倉)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

739 *Rhodea japonica* Roth, Nov. Pl. Sp. (1821) p. 197

- 和名 オモト
 生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(新建、荒平、大倉)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州に分布す。

- 740 *Scilla Thunbergii*** Miyabe et Kudo, Mater. Fl. Hokk. (1921) p. 3
syn. *Scilla japonica* Baker in Journ. Linn. Soc. XIII. (1873) p. 233, non
Thunb.

和名 ツルボ

生育地 路傍に生じ稀なり。(穴口)

生活形 G (深地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、滿洲に分布す。

- 741 *Smilax China*** Linn., Sp. Pl. ed.-1. (1753) p. 1029

和名 サルトリイバラ 方言 ガメシバ

生育地 林縁に生じ普通なり。(鬼ヶ浦、生ヶ谷、上ノ山)

生活形 N (灌木)

備考 北海道、本州、四國、九州、琉球、臺灣、朝鮮、支那、比島、東部
ヒマラヤに分布す。

- 742 *Smilax Maximowiczii*** Koidzumi, Fl. Symb. Orient.-Asia. (1930) p. 10
syn. *Smilax nipponica* Miq. var. *typica* Makino in Journ. Jap. Bot.
VI.-8. (1930) p. 17

和名 シホデ

生育地 林縁に生じ稀なり。(新建、荒平、大倉)

生活形 L (蔓性植物)

備考 北海道、本州、九州、朝鮮、滿洲、支那に分布す。

- 743 *Tricyrtis japonica*** Miquel in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 155

和名 ヤマヂノホトトギス

生育地 林縁に生じ少々普通なり。(生ヶ谷、御手洗水、大倉、荒平、
新建)

生活形 H (浅地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

748 *Dioscorea Tokoro* Makino in Bot. Mag. Tokyo III. (1889) p. 112

和名 オニドコロ、ナガドコロ 方言 キドコロ

生育地 林縁に生じ普通なり。(新建、生ケ谷)

生活形 L (蔓性植物)

備考 一見マルバドコロに似るも葉質稍々薄く葉縁は多少波状をなし、葉脚の侵入淺し。北海道、本州、四國、九州、濟州島に分布す。

Iridaceae アヤメ科

749 *Iris japonica* Thunb. in Trans. Linn. Soc. II. (1793) p. 327

和名 シヤガ

生育地 谷間の蔭地に生じ稍々普通なり。(大倉、新建)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州各部、九州に分布す。

Zingiberaceae シヤウガ科

750 *Languas japonica* Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. XIV. (1924)
p. 84

syn. *Alpinia japonica* Miq. in Ann. Lugd. Bat. III. (1867) p. 140

和名 ハナメウガ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(御手洗水)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、臺灣に分布す。

751 *Zingiber Mioga* Rosc. in Trans. Linn. Soc. VIII. (1805) p. 348

和名 メウガ

生育地 谷間の蔭地に生じ稀なり。(生ケ谷、大倉、新建、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州、九州、琉球に分布す。

Orchidaceae ラン科

752 *Calanthe discolor* Lindl., Sert. Orch. sub. t. 9. (1838)

var. **rosea** Hatusima, nov. var.

Sepala et Petala atropurpurea. Labellum. roseum.

和名 アカエビネ (新稱)

生育地 杉林内に生じ稀なり。(上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 萼片及瓣片は濃紫色にして唇瓣は紅色を呈するを特徴とす。
北九州に分布す。

var. **typica** Hatusima, nom. nov.

和名 エビネ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(上ノ山、大倉、荒平)

生活形 H (淺地下植物)

備考 北海道、本州、四國、九州、濟州島に分布す。

var. **viridi-alba** Maxim. in Mel. Biol. VIII. (1872) p. 642

和名 ヤブエビネ

生育地 杉林内に生じ稀なり。(上ノ山)

生活形 H (淺地下植物)

備考 本州中南部、九州に分布す。萼片及瓣片は淡綠色にして唇瓣は帶綠白色を呈す。

753 *Calanthe reflexa* Maxim. in Mel. Biol. VIII. (1873) p. 644

和名 ナツエビネ

- 生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(極樂、新建)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 花は秋期に開き美麗なり。本州中南部、四國、九州に分布す。

754 *Calanthe striata* R. Br. var. **Sieboldi** Maxim. in Mel. Biol. VIII. (1872)

p. 641

- 和名 キエビネ
 生育地 林内の蔭地に生じ普通なり。(新建、大倉、荒平、上ノ山)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 葉は大形にして黄色の美花を開く。九州、濟州島に分布す。

755 *Cephalanthera falcata* Blume, Orch. Archip. Ind. (1858) p. 188

- 和名 キンラン
 生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(極樂、上ノ山、新建)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮南部、支那東部に分布す。

756 *Cremastra mistrata* A. Gray in Mem. Acad. Art. et Sci. Bost (1859)

p. 411

- 和名 サイハイラン、ハツクリ 方言 ヒトツバハクリ
 生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(新建、荒平)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 樺太、北海道、本州、四國、九州に分布す。

757 *Cymbidium virescens* Lindl., Bot. Reg. Misc. (1838) p. 37

- 和名 ホクロ、シユンラン 方言 ハツクリ
 生育地 稍々乾燥せる林内に生じ稀なり。(御手洗水、大倉、生ケ谷)
 生活形 H (淺地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、濟州島に分布す。

758 *Galeola septentrionalis* Reichb. f., *Xenia Orch.* II. (1865) p. 78

- 和名 ツチアケビ
 生育地 造林地内に生じ稀なり。(新建)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州に分布す。

759 *Goodyera Schlechtendaliana* Reichb. f. in *Linnaea* XXII. (1849) p. 861

- 和名 ミヤマウヅラ
 生育地 林内の蔭地に生じ極めて稀なり。(御手洗水、荒平、新建)
 生活形 H (浅地下植物)
 備考 北海道、本州、四國、九州、濟州島、支那、印度北部に分布す。

760 *Habenaria Oldhami* Kraenzl. in *Engl. Bot. Jahrb.* XVI. (1893) p. 205

- 和名 ミヅトンボ
 生育地 濕地に生じ極めて稀なり。(極樂)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 本州、四國、九州に分布す。

761 *Habenaria radiata* Spreng., *Syst.* III. (1826) p. 693

- 和名 サギサウ
 生育地 濕地に生じ稀なり。(鬼ヶ浦)
 生活形 G (深地下植物)
 備考 本州各部、九州に分布す。

762 *Liparis nervosa* Lindl., *Gen. et Sp. Orch.* (1840) p. 26

- 和名 コクラン
 生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(荒平、御手洗水)
 生活形 H (浅地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、臺灣に分布す。

763 *Platanthera interrupta* Maxim. in Mel. Biol. XII. (1887) p. 550

和名 オホバノトンボサウ

生育地 林内の蔭地に生じ稀なり。(生ヶ谷)

生活形 G (深地下植物)

備考 本州中南部、四國、九州、朝鮮、滿洲に分布す。

764 *Taeniophyllum aphyllum* Makino, Phanerog. Pterid. Jap. Ic. III. I. I.-3,
t. II. (1899)

和名 クモラン

生育地 樹幹に着生し極めて稀なり。(穴口)

生活形 E (着生植物)

備考 本州中南部、四國、九州、臺灣に分布す。