

Vascular endothelial growth factor-C ameliorates renal interstitial fibrosis through lymphangiogenesis in mouse unilateral ureteral obstruction

長谷川, 祥子

<https://hdl.handle.net/2324/1931793>

出版情報：九州大学, 2017, 博士（医学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：やむを得ない事由により本文ファイル非公開（2）



氏 名：長谷川 祥子

論 文 名：Vascular endothelial growth factor-C ameliorates renal interstitial fibrosis through lymphangiogenesis in mouse unilateral ureteral obstruction

(血管内皮増殖因子-C は、リンパ管新生を介して一側尿管結紮モデルマウスの腎間質線維化を改善する)

区 分：甲

論 文 内 容 の 要 旨

腎間質線維化は、慢性腎疾患の最終的な共通経路である。リンパ管の増殖は、ヒト腎疾患や他の線維化疾患において認められており、このことは、リンパ管新生が腎疾患の進行または抑制に関連することを示唆している。しかし、リンパ管が増殖する意義については完全に解明されていない。我々は、一側尿管結紮（UUO）モデルを用いて、マウス腎臓における血管内皮増殖因子（VEGF）-C のリンパ管新生、炎症、線維化に対する効果を検証した。UUO マウスでは、尿細管間質性腎炎と線維化に伴って、リンパ管の有意な増殖を認めた。次に、浸透圧ポンプを用いて UUO モデルマウスに組換えヒト VEGF-C を連続的に投与した（UUO + VEGF-C 群）。毛細血管数は両群で同様だったが、リンパ管新生は、溶媒のみを投与した対照群と比較して UUO + VEGF-C 群で有意に増加した。浸潤マクロファージの数、炎症性マクロファージ、トランスフォーミング増殖因子- β 1 は、対照群と比較して UUO + VEGF-C 群で減少した。その結果、腎間質線維化は UUO + VEGF-C 群で減弱した。培養リンパ管内皮細胞において、VEGF-C の添加は、リンパ管内皮細胞（LEC）の細胞活性、細胞増殖および血管細胞接着分子-1 のような接着因子の発現を増加させた。これらの所見は、リンパ管新生の誘導が腎間質における炎症および線維化を改善することを示唆している。LEC における VEGF-C シグナル伝達経路の亢進は、腎間質線維化の治療戦略となり得る。