

日本産ゾウムシ科目録(I)

森本, 桂
九州大学農学部

<https://doi.org/10.15017/21574>

出版情報 : 九州大学農学部学藝雑誌. 19 (2), pp.183-217, 1962-01. 九州大学農学部
バージョン :
権利関係 :

日本産ゾウムシ科目録 (I)^{1,2}

森 本 桂

Provisional check list of the family
Curculionidae of Japan. I

Katsura Morimoto

日本産のゾウムシ上科のうち、ヒゲナガゾウムシ科、オトシブミ科およびミツギリゾウムシ科の目録は既に発表した。ゾウムシ科は2回に分けて発表する予定である。

排列は便宜上、別報する属までの検索表と同じ順にしておいた。

この研究を発表するに当り、終始懇篤な御指導を与えられた故江崎悌三教授、安松京三教授および平嶋義宏助教授に厚くお礼申上げる。

Family CURCULIONIDAE ゾウムシ科

Subfamily CIONINAE タマゾウムシ亜科

Reitter, Best. Tab. eur. Col. LIV: 1-17, 1907 (Key to Palaearctic species).

Kôno, Ins. Mats. IV (4): 148-161, 1930 (Revision of Japanese species).

Wingelmüller, Kol. Rdsch. 23 (6): 143-221, 1938 (Monograph of Palaearctic species).

Stereonychidius Morimoto, MS.**galloisi** Hustache シロオビタマゾウ

Stereonychus galloisi Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 498, 1920 (Mt. Takao près Hachioji).

分布：本州。

Stereonychus Suffrian, 1854**japonicus** Hustache ハイイロタマゾウ

Stereonychus japonicus Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 631, 1920 (Environ de Tokio, Alpes de Nikko, Mt. Ibuki près Gifu).

分布：本州。

ochraceus Hustache アカタマゾウ

Stereonychus ochraceus Hustache, l. c.: 631 (Environ de Tokio, Alpes de Nikko).

分布：本州。

ogasawarai Kôno オガサワラタマゾウ

1. Comparative morphology, phylogeny and systematics of the superfamily Curculionoidea of Japan. V.

2. Contribution Ser. 2, No. 112. Entomological Laboratory, Kyushu University, Fukuoka.

Cionus (Stereonychus) ogasawarai Kôno, Ins. Mats. IV: 150, 1930 (Iwate).

分布：本州.

thoracicus Faust

Stereonychus thoracicus Faust, Deut. Ent. Zschr. 31: 176, 1887 (Wladivostock).

分布：東シベリヤ, 中国, 本州 (京都—Wingelmüller, 1938 による).

Cionus Clairville, 1798

helleri Reitter クロタマゾウ

Cionus (Cionus) helleri Reitter, Wien. Ent. Ztg. XXIII: 56, 1904 (Best. Tab. eur. Col. 54: 10, 1904) (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

tamazo Kôno マルモンタマゾウ

Cionus (Cionus) tamazo Kôno, Ins. Mats. IV: 149, 1930 (Is. Shakotan, Is. Rishiri, Chuzenji).

分布：北海道, 本州, 四国, 九州, 千島.

latefasciatus Voss クロオビシロタマゾウ

Cionus (Cionus) latefasciatus Voss, Akitu V: 13, 1956 (Mt. Tsurugi).

分布：四国.

Cleopus Stephens, 1831

japonicus Wingelmüller

Cleopus japonicus Wingelmüller, Kol. Rdsch. 23: 207, 1938 (Südchina: Yun-nan, Kioto).

分布：本州, 中国.

Subfamily GYMNETRINAE コバンゾウムシ亜科

Bovic, Genera Insectorum, 92 Gymnetrinae, 20 pp, 2 pls, 1909.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn 45: 7-50, 1907 (Best. Tab. eur. Col. 59, 44 pp., 1907) (Key to Palaearctic species).

Kôno, Ins. Mats. IV: 146-148, 1930 (Revision of Japanese species).

Gymnetron Schönherr, 1926

miyoshii Miyoshi ミヨシコバンゾウ, ムシクサゾウムシ

Gymnetron miyoshi Miyoshi (nec Matsumura), Konchu Sekai, Gifu XXVI: 253, 1922 (Okayama).

分布：本州, 四国, 九州.

villosipenne Roelofs シラケコバンゾウ (新称)

Gymnetron villosipennis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 149, 1875 (Japan).

分布：日本.

Miarus Stephens, 1831

Morimoto, Kontyû 27: 190-195, 1959 (Revision of Japanese species).

flavoscutellatus Morimoto キボシコバンゾウ (新称)

Miarus flavoscutellatus Morimoto, Kontyû 27: 195, 1959 (Shirahone, Daisen).

分布：本州.

kamiyai Morimoto カミヤコバンゾウ (新称)

Miarus kamiyai Morimoto, l. c.: 192 (Masutomi, Kanayama, Komagatake, Shirahone).

分布：本州.

kobanzo Kôno オウコバンゾウ

Miarus kobanzo Kôno, Ins. Mats. IV: 148, 1930 (Japan).

分布：本州.

minimus Morimoto チビコバンゾウ (新称)

Miarus minimus Morimoto, Kontyû 27: 194, 1959 (Masutomi, Kiso-Ontake, Iriyama in Nagano).

分布：本州.

vestitus Roelofs クロコバンゾウ

Miarus vestitus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 150, 1875 (Japan).

分布：本州.

Subfamily ANOPLINAE ツメナシゾウムシ亜科

Anoplus Schönherr, 1826

Hoffmann, Faune de France, Curculionidae: 707-709, 1954 (European species).

sugiharai Kôno ツメナシゾウムシ (新称), スギハラカラスゾウ

Anoplus sugiharai Kôno, Ins. Mats. X: 61, 1935 (Is. Shikotan).

分布：北海道, 千島.

Subfamily RHYNCHAENINAE ノミゾウムシ亜科

Tribe Rhynchaenini

Kôno, Ins. Mats. V: 21-31, 1930 (Revision of Japanese species).

Rhynchaenus Clairville, 1798

=*Orchestes* Illiger, 1804

Ter-Minasyan, Ent. Oboz. XXXIII: 311-324, 1953 (Key to Russian species).

aterrimus Roelofs

Orchestes aterrimus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 166, 1874 (Japan).

分布：日本.

awomoriensis Roelofs キタノミゾウ

Orchestes (Tachyerges) awomoriensis Roelofs, l. c.: 167 (Awomori).

分布：本州.

dorsoplanatus Roelofs ヒラセノミゾウ

Orchestes dorso-planatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 167, 1874 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州, 中国.

excellens Roelofs フトノミゾウ (新称)*Orchestes excellens* Roelofs, *l. c.*: 164 (Japon).

分布: 九州.

galloisi Kôno ガロアノミゾウ*Orchestes galloisi* Kôno, *Ins. Mats.* V: 28, 1930 (Tokio).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国.

horii Kôno ホリノミゾウ*Rhynchaenus horii* Kôno, *Ins. Mats.* XI: 129, 1937 (Meshima in Danjo Isls).

分布: 四国 (沖ノ島), 九州 (男女群島女島).

hustachei Klima ヤドリノミゾウ*Rhynchaenus hustachei* Klima, *Col. Cat.* 145 Rhynchaeninae: 15, 1935 (new name for *puberulus* Hustache).=*Orchestes puberulus* Hustache (nec Boheman), *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris* 1920: 632, 1920 (Kioto, Takao).=*Rhynchaenus croceus* Marshall, *Mushi* 24: 87, 1951 (Murozumi in Prov. Suwô) — *syn. nov.*

分布: 本州, 四国, 九州.

japonicus Hustache ハンノキノミゾウ*Orchestes japonicus* Hustache, *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris* 1920: 632, 1920 (Nakano près Tokio).=*Orchestes excellens* Kôno, (nec Hustache), *Ins. Mats.* V: 23, 1930 (Hokkaido, Honshu, Kyushu).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州.

jota Fabricius シロモンノミゾウ*Curculio jota* Fabricius, *Mant.* I: 110, 1787 (Europe).

分布: 北海道, 本州, 九州, シベリヤ, ヨーロッパ.

jozani Kôno ケンケノミゾウ*Orchestes jozani* Kôno, *Ins. Mats.* V: 27, 1930 (Sapporo, Jozankei).

分布: 北海道, 本州.

mumon Kôno ムモンノミゾウ*Orchestes mumon* Kôno, *Ins. Mats.* V: 24, 1930 (Sachalin).

分布: 北海道, 本州, 千島, 樺太.

mutabilis Boheman =レノミゾウ*Orchestes mutabilis* Boheman, *Gen. Sp. Curc.* VII (2): 372, 1843 (Siberia).=*Orchestes variegatus* Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVII: 166, 1874 (Japon).

分布: 北海道, 樺太, シベリヤ.

nomizo Kôno マダラノミゾウ*Orchestes nomizo* Kôno, *Ins. Mats.* V: 26, 1930 (Sachalin, Sapporo, Chuzenji).

分布: 北海道, 本州, 樺太, 中国.

salicis Linné ヤナギノミゾウ*Curculio salicis* Linné, Syst. Nat., ed. X: 381, 1758 (Europe).

分布：北海道，本州，千島，樺太，シベリヤ，ヨーロッパ。

sanguinipes Roelofs アカアシノミゾウ*Orchestes sanguinipes* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 165, 1874 (Japon).*Orchestes sanguinipes* var. *nigripes* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 635, 1920.*Orchestes sanguinipes* var. *mixtus* Hustache, l. c.: 635.

分布：本州，四国，九州。

spinus Hustache ウスモンノミゾウ*Orchestes spinus* Hustache, l. c.: 634 (Mt. Takao près Hachioji, Gifu).

分布：本州，四国，九州。

stigma Germar クロノミゾウ*Salix stigma* Germar, Mag. IV: 334, 1805 (Europe).

分布：北海道，本州，樺太，シベリヤ，ヨーロッパ。

takabayashii Kôno ムネスジノミゾウ*Orchestes takabayashii* Kôno, Ins. Mats. V: 25, 1930 (Takao).

分布：本州，四国，九州。

rusci Herbst シロオビノミゾウ*Curculio rusci* Herbst, Käfer VI: 424, pl. 93, f. 6, 1795 (Europe).

分布：北海道，樺太，シベリヤ，ヨーロッパ。

Rhamphus Clairville, 1798**pullus** Hustache リンゴノミゾウ*Rhamphus pullus* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 635, 1920 (Chuzenji, Tokio).

分布：北海道，本州，四国，九州，千島，中国。

hisamatsui Chûjô et Morimoto ハチジョウノミゾウ*Rhamphus hisamatsui* Chûjô et Morimoto, Ent. Rev. Japan XI: 4, 1960 (Hachijô).

分布：八丈島。

Orchestoides Roelofs, 1875**deciptens** Roelofs クチアトノミゾウ*Orchestoides deciptens* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 192, 1875 (Japon).

分布：九州，中国。

Tribe Dinorrhopalini**Dinorrhopala** Pascoe, 1860=*Togezo* Kôno, 1930**takahashii** Kôno クカハシトゲゾウ

Tozeo takahashii Kôno, Ins. Mats. V: 3, 1930 (Tokio).

分布：本州，四国，九州。

Ixalma Pascoe, 1871

=*Celia* Roelofs, 1874

Voss, Ent. Blätt. 41-44 : 163-164, 1948 (Key to species).

Morimoto, Ins. Mats. 23: 46-51, 1960 (Revision of Japanese species).

dentipes Roelofs コブノコギリゾウ

Celia dentipes Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 127, 1874 (Yango, sur la côte nord-ouest de Nippon).

=*Ixalma klapperichi* Voss, Ent. Blätt. 41-44: 162, 1948 (Fukien).

分布：本州，四国，九州，中国。

guttulum Kôno シミノコギリゾウ

Ixalma guttulum Kôno, Ins. Mats. II: 169, 1928 (Formosa).

分布：九州，台湾。

hilleri Roelofs サビノコギリゾウ

Ixalma hilleri Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend.: 54, 1879 (Japan).

分布：本州，四国，九州，奄美大島。

nigriventris Kôno ヘラグロノコギリゾウ

Ixalma nigriventris Kôno, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. XV: 31, 1937 (Tosa).

分布：本州，四国。

okadal Kôno オカダノコギリゾウ

Ixalma okadal Kôno, l. c.: 30 (Mt. Taisen, Mt. Takao).

分布：本州，九州。

quadrigibbosa Morimoto ヨツコブノコギリゾウ

Ixalma quadrigibbosus Morimoto, Ins. Mats. 23: 48, 1960 (Hirakura in Mie, Gokurakuji in Hiroshima, Hikosan, Mt. Fukuchi).

分布：本州，九州。

Subfamily CEUTHORRHYNCHINAE サルゾウムシ亜科

Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXV: 107-144, 1916 (Key & descriptions of Japanese species).

Tribe Oorbitini

Oorbitis Germar, 1824

apicalis Kôno タマサルゾウ

Oorbitis apicalis Kôno, Ins. Mats. X: 60, 1935 (Is. Etorofu).

分布：北海道，本州，千島。

Tribe Hypurini

Hypurus Rye, 1882

bertrandi Perris スベリビユサルゾウ

Ceuthorhynchus Bertrandi Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1852: 183, 1852 (France).

分布：九州，ヨーロッパ，ハワイ。

Tribe Scleropterini

Rhytidosoma Stephens, 1831

weisei Faust マルバネサルゾウ

Rhytidosomus Weisei Faust, Oefv. Finsk. Vet. Osc. XXX: 98, 1890 (Abakanski Sawad, Kasan, Samara).

分布：本州，シベリヤ。

Tribe Rhinoncini

Wagner, Ent. Blätt. 35: 31-58, 59-90, 185-208, 241-252, 273-291, 1939; 36: 65-81, 97-111, 1940 (Monograph of Palaearctic species).

Phytobius Schönherr, 1836

canaliculatus Fähræus クロホシサルゾウ (新称)

Phytobius canaliculatus Fähræus, Gen. Sp. Curc. 7 (2): 347, 1843 (Europe).

分布：本州，シベリヤ，ヨーロッパ。

friebi Wagner フリープサルゾウ

Phytobius (Phytobius) friebi Wagner, Ent. Blätt. 35: 71, 1939 (Wladivostock, Transbaikal).

分布：本州，東シベリヤ。

japonicus Roelofs ヤマトサルゾウ (新称)

Phytobius japonicus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 180, 1875 (Japan).

分布：日本。

quadricornis roelofsi Hustache マルメサルゾウ

Phytobius quadricornis var. *Roelofsi* Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXV: 113, 1916 (Kobe).

分布：本州，ウスリー。

quadrituberculatus Fabricius メダカサルゾウ

Phytobius quadrituberculatus Fabricius, Mant. Ins. I: 100, 1787 (Europe).

分布：北海道，本州，ヨーロッパ，シベリヤ。

waltoni Boheman ワルトンサルゾウ (新称)

Phytobius Waltoni Boheman, Gen. Sp. Curc. 7 (2): 435, 1843 (Europe).

分布：本州，シベリヤ，ヨーロッパ。

Rhinoncomimus Wagner, 1940

niger Chûjô et Morimoto クロクチプトサルゾウ (新称)

Rhinoncominus niger Chûjô et Morimoto, Kontyû 27: 154, 1959 (Shimokita, Sendai, Echigo).

分布: 本州.

Rhinoncus Stephens, 1831

bruchoides Herbst エゾクテプトサルゾウ (新称)

Curculio bruchoides Herbst, in Flüßly, Arch. Insectengesch. VI: 85, 1784 (Europe).

分布: 北海道, シベリヤ, ヨーロッパ.

cribricollis Hustache キアシクテプトサルゾウ

Rhinoncus cribricollis Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXV: 111, 1916 (Yumoto, Tokio, Kioto).

= *Rhinoncus uchidai* Kôno, Ins. Mats. X: 60, 1935 (Is. Kunashiri).

分布: 本州, 千島.

jakovlevi Faust ギシギシクテプトサルゾウ

Rhinoncus jakovlevi Faust, Deut. Ent. Zschr. 1893: 205, 1893 (Irkutsk, Amur).

= *Rhinoncus pericarpus* Roelofs (nec Linné), Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 180, 1875 (Japon).

分布: 本州, 四国, 九州, 東シベリヤ.

pericarpus Linné オオクテプトサルゾウ (新称)

Curculio pericarpus Linné, Syst. Nat., ed. X: 380, 1758 (Europe).

分布: ヨーロッパ, シベリヤ, 日本 (Wagner による).

perpendicularis Reich コブナシクテプトサルゾウ (新称)

Curculio perpendicularis Reich, Mant. Ins.: 10, 1797 (Europe).

分布: 本州, 四国, 九州, ヨーロッパ, シベリヤ.

sibiricus Faust タデノクテプトサルゾウ

Rhinoncus sibiricus Faust, Deut. Ent. Zschr. 1893: 205, 1893 (Irkutsk).

= *Rhinoncus pyrrhopus* Hustache (nec Boheman), Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 110, 1916 (Tokio).

= *Rhinoncus sulcipennis* Schultze, Deut. Ent. Zschr. 1898: 233, 1898 (Nipon).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 奄美大島, 台湾.

Tribe Mecysmoderini

Mecysmoderes Schönherr, 1837

ater Hustache チャイロトゲムネサルゾウ (新称)

Mecysmoderes ater Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 124, 1916 (Nikko, Kioto).

分布: 本州, 四国, 九州.

brevicarinatus Hustache キオビトゲムネサルゾウ (新称)

Mecysmoderes brevicarinatus Hustache, l. c.: 124 (Kumanotaira).

分布: 北海道, 本州.

fulvus Roelofs ツツジトゲムネサルゾウ

Mecysmoderes fulvus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 179, 1875 (Japon).

分布：本州，四国，九州，中国。

japonicus Pic キボントゲムネサルゾウ（新称）

Mecysmoderes japonicus Pic, Mélang. exot. -ent. XIX: 13, 1916 (Japon)

分布：本州，九州。

lesnei Hustache クロオビトゲムネサルゾウ（新称）

Mecysmoderes Lesnei Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 124, 1916 (Mt. Kin-kazan près Gifu).

分布：本州，九州。

Tribe Ceuthorrhynchini

Craponius Leconte, 1876

bigibbosus Hustache ジュウジコブサルゾウ

Craponius bigibbosus Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXV: 119, 1916 (Mt. Takao près Hachioji, Kumanotaira près Karuizawa, Alpes de Sasago près Kofu, Yuyama, Subashiri).

= *Phytobiotomorphus alternanus* Voss, Decheniana, Beihefte 5: 65, 1958 (Fukien).

分布：本州，四国，九州，中国。

Cyphosenus Schultze, 1899

bouvieri Hustache トゲカタピロサルゾウ

Cyphosenus Bouvieri Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 120, 1916 (Environ de Tokio, Alpes de Nikko, Chuzenji, Kumanotaira).

分布：本州，九州。

grouvellei Hustache グルーベルカタピロサルゾウ（新称）

Cyphosenus Grouvellei Hustache, l. c.: 121 (Kioto).

分布：本州。

sasakii Chûjô ササキカタピロサルゾウ（新称）

Cyphosenus sasakii Chûjô, Trans. Shikoku Ent. Soc. 6: 52, 1959 (Mt. Kirishima).

分布：九州。

similis Chûjô ツルギカタピロサルゾウ（新称）

Cyphosenus similis Chûjô, l. c.: 49 (Mt. Tsurugi in Awa, Monobe-mura in Tosa).

分布：四国。

Zacladus Reitter, 1912

= *Allodactylus* Weise, 1883

Schultze, Münch. Kol. Zschr. I: 174—176, 1902 (Revision).

transversicollis Faust トゲトゲクロサルゾウ（新称）

Allodactylus transversicollis Faust, Horae Soc. Ent. Ros. XXVIII: 174, 1894 (Kurtymaldy in Issyk-kul).

分布：本州，シベリヤ。

Homorosoma Frivaldsky, 1893

Wagner, Ent. Blätt. XL: 97-124, 1944 (Monograph).

asper Roelofs タデサルゾウ*Ceuthorrhynchus asper* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 177, 1875 (Japon).

分布：北海道，本州，四国，九州，アムール，中国。

aterrimus Hustache コトゲトゲサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus aterrimus* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 138, 1916 (Kioto).

分布：本州。

Micrelus Thomson, 1865**excavatus** Hustache アカアシサルゾウ (新称)*Micrelus excavatus* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 128, 1916 (Mt. Kinokazan près Gifu, Nagasaki).

分布：本州，九州。

Ceuthorrhynchus Germar, 1824**ancora** Roelofs オオシロモンサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus ancora* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 177, 1875 (Japon)

分布：北海道，本州，四国。

carinulatus Faust スジサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus (Nedyus) carinulatus* Faust, Deut. Ent. Zschr. XXXI: 177, 1887 (Chabarofsk).

分布：日本，アムール。

costatus Hustache クロツヤサルゾウ*Ceuthorrhynchus costatus* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 139, 1916 (Mt. Ibuki).

分布：本州。

diffusus Hustache ミドリサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus diffusus* Hustache, Col. Cat. 113 *Ceuthorrhynchinae*: 58, 1930 (new name for *difficilis* Hustache).=*Ceuthorrhynchus difficilis* Hustache (nec Schultze), Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 142, 1916 (Japon).

分布：四国，九州。

harmandi Hustache アルマンサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus Harmandi* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 141, 1916 (Kumanotaira près Karuizawa, Mt. Takao près Hachioji, Subashiri, Suyama, Kobe, Miyanoshta).

分布：本州。

ibukianus Hustache アオバネサルゾウ (新称)

- Ceuthorrhynchus ibukianus* Hustache, *l. c.*: 143 (Environ de Tokio, Alpes de Nikko, Mt. Ibuki).
 分布：本州，四国，九州。
- lewisii** Hustache リュイスサルゾウ (新称)
Ceuthorrhynchus Lewisii Hustache, *l. c.*: 136, (Nikko).
 分布：本州。
- nipponensis** Hustache シロオビサルゾウ (新称)
Ceuthorrhynchus nipponensis Hustache, *l. c.*: 141 (Chuzenji).
 分布：本州。
- rubripes** Hustache アササルゾウ
Ceuthorrhynchus rubripes Hustache, *l. c.*: 134 (Kioto).
 分布：本州。
- sulcithorax** Hustache ムネミゾサルゾウ (新称)
Ceuthorrhynchus sulcithorax Hustache, *l. c.*: 135 (Japon moyen).
 分布：本州。
- virgatus** Gyllenhal ジュウジサルゾウ (新称)
Ceutorhynchus virgatus Gyllenhal, *Gen. Sp. Curc. IV(1)*: 568, 1837 (Southern Russia).
 分布：日本，シベリヤ，コーカサス，トルケスタン。
Coeliodes Schönherr, 1837
- babai** Voss et Chûjô ババアカサルゾウ (新称)
Coeliodes babai Voss et Chûjô, *Nipponius 1 (3)*: 1, 1960 (Kurokawa in Niigata Pref.).
 分布：本州。
- brunneus** Hustache チャイロアカサルゾウ (新称)
Coeliodes brunneus Hustache, *Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV*: 117, 1916 (Mt. Ibuki près Gifu).
 分布：本州。
- galloisi** Hustache ガロアカサルゾウ (新称)
Coeliodes Galloisi Hustache, *l. c.*: 116 (Alpes de Nikko, Chuzenji, Mt. Ibuki, Environ de Tokio).
 分布：本州。
- nakanoensis** Hustache オビアカサルゾウ (新称)
Coeliodes nakanoensis Hustache, *l. c.*: 115 (Environ de Tokio, Mt. Takao près Hachioji).
 分布：本州。
- parcesquamosus** Hustache ツヤアカサルゾウ (新称)
Coeliodes parcesquamosus Hustache, *l. c.*: 115 (Environ de Tokio).
 分布：本州。

setifer Schultze ケアカサルゾウ (新称)

Coeliodes setifer Schultze, Deut. Ent. Zschr. 1898: 225, 1898 (Japan).

分布: 本州.

Cidnorhinus Thomson, 1865

quadrinaculatus Linné ヨツホシムネミゾサルゾウ (新称)

Curculio quadrinaculatus Linné, Syst. Nat., ed. X: 380, 1758 (Europe).

分布: 北海道, シベリヤ, ヨーロッパ.

Ceuthorrhynchidius J. du Val, 1854

Schultze, Münch. Kol. Zschr. III: 1-10, 1906 (Revision).

hypocritus Hustache キイチゴトゲサルゾウ

Ceuthorrhynchidius hypocrita Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 126, 1916 (Kumanotaira, Mt. Takao, Asakarawa petit près Hachioji, Nikko, Miyashita, Kyoto).

分布: 本州, 四国, 九州.

Calosirus Thomson, 1865

= *Sirocalus*, Heyden, 1906

albosuturalis Roelofs ダイコンサルゾウ, ナタネサルゾウ

Ceutorhynchidius albosuturalis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 178, 1875 (Japan).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国.

umbrinus Hustache ケマンサルゾウ (新称)

Ceuthorrhynchus (Sirocalus) umbrinus Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 131, 1916 (Fukushima).

分布: 本州, 九州.

Subfamily BARINAE ヒメゾウムシ亜科

Reitter, Best. Tab. eur. Kol. 33 Curculionidae III, Coryssomerini, Barini, 31 pp. 1895.

Centrinopsis Roelofs, 1875

nitens Roelofs ツヤチビヒメゾウ

Centrinopsis nitens Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 185, 1872 (Japan).

分布: 本州, 四国, 九州, 中国.

Barinomorphus Morimoto, MS.

antennatus Morimoto, MS. ヒシガタヒメゾウ (新称)

分布: 九州.

Barinomorphoides Morimoto, MS.

similaris Morimoto, MS. セヒシガタヒメゾウ (新称)

分布: 四国, 九州.

Baris Germar, 1824

Voss, *Senckenbergiana*, 19: 267-270, 1937 (Key to Chinese species).

Zaslavskij, *Trud. Vc. Ent. Ob.* 45: 343-374, 1956 (Monograph of Russian species).

armipes Roelofs トゲアシヒメゾウ (新称)

Baris armipes Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVIII: 183, 1875 (Japon).

分布：九州.

deplanata Roelofs クワヒメゾウ

Baris deplanata Roelofs, *l. c.*: 183 (Japon).

分布：本州, 四国, 九州.

dispilota Solsky シラホシヒメゾウ

Baridius dispilota Solsky, *Horae Soc. Ent. Ross.* VI: 312, 1870 (Siberie orientale).

分布：九州 (久住山), 朝鮮, 中国, 満洲.

dispilota Solsky f. *davidi* Fairmaire.

Baridius davidi Fairmaire, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (5) VIII: 127 (Chine centrale).

= *Baridius Reini* Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XXII, *Compt. Rend.*: liv. 1879 (Aburasaka zwischen den Prov. Mino und Echizen).

分布：北海道, 本州, 四国, 九州, 中国, シベリヤ.

ezoana Kôno エゾヒメゾウ

Baris ezoana Kôno, *Ins. Mats.* XIV: 78, 1940 (Hokkaido).

分布：北海道.

flavosignata Roelofs ヨツボシヒメゾウ (新称)

Baris flavosignata Roelofs, *Deut. Ent. Zschr.* XXIII: 301, 1879 (Japon).

分布：本州, 九州.

maculata Roelofs チャイロヒメゾウ (新称)

Baris maculata Roelofs, *l. c.*: 299 (Japon).

分布：本州, 九州.

maritima Roelofs ウミベヒメゾウ (新称)

Baris maritima Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVIII: 181, 1875 (Japon, au bord de la mer).

分布：四国, 九州.

menthae Kôno ハッカヒメゾウ

Baris menthae Kôno, *Kontyû* XI: 316, 1937 (Okayama).

分布：本州.

nipponica Kôno サメハダヒメゾウ

Baris nipponicus Kôno, *Ins. Mats.* II: 174, 1928 (Shimauchi in Nagano)

分布：本州, 九州.

orientalis Roelofs マダラヒメゾウ

Baris orientalis Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVIII: 184, 1875 (Japon, Hong-Kong).

分布：本州，四国，九州，中国。

pilosa Roelofs オオハッカヒメゾウ

Baris pilosa Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 182, 1875 (Japan).

分布：本州，九州。

rubricata Hustache クテスジアカヒメゾウ

Baris rubricata Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXVI: 84, 1921 (Kioto).

分布：本州，九州。

Didthis Zaslavskij, 1956

melancholica Roelofs ツヤケシヒメゾウ

Baris melancholica Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 181, 1875 (Japan).

分布：北海道，本州，四国，九州。

Pseudorhyssematus Morimoto, MS.

rufitarsis Roelofs ツヤハダヒメゾウ (新称)

Rhyssematus (?) *rufitarsis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 159, 1875 (Japan).

分布：本州，九州。

Limnobaris Bedel, 1885

jucunda Reitter スゲノハラジロヒメゾウ (新称)

Limnobaris jucunda Reitter, Wien. Ent. Zttg. XXIX: 202, 1910 (Ussuri).

分布：北海道，本州，ウスリー。

Keibaris Chôjô, 1960

babai Chôjô ババオオヒメゾウ (新称)

Keibaris babai Chôjô, Niponius I (5): 1, 1960 (Tsushima).

分布：対馬。

Aparallelodemas Morimoto, 1961

foveipennis Morimoto キンケツツヒメゾウ (新称)

Aparallelodemas foveipennis Morimoto, Kontyû 29: 23, 1961 (Amami-Oshima, Tsushima, Kuroson, Is. Miyake, Formosa).

分布：本州，四国，九州，奄美大島，三宅島，台湾。

Subfamily ZYGOPINAE クモゾウムシ亜科

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII: 198-222, 258-266, 2pls., 1871 (East-asian species)

Heller, Abh. Ber. König Zool. Anthr.-Ethonograph. Mus. Dresden, No. 2: 1-48, 1 pl., 1893; No. 11: 1-70, 1 pl., 1895 (Genera).

Hustache, Soc. Ent. France, Livre Cent.: 369-380, 1932 (Key to tribes and genera of Africa).

Tribe Lobotrachelini

Morimoto, Ins. Mats. 22: 15-21, 1958 (Japanese species).

Metetra Pascoe, 1873**esakii** Morimoto エサキヒシガタクモゾウ (新称)*Metetra esakii* Morimoto, *Ins. Mats.* 22: 16, 1958 (Satanomisaki, Amakusa).

分布：九州。

Lobotrachelus Schönherr, 1838**montanus** Morimoto ミヤマヒシガタクモゾウ (新称)*Lobotrachelus montanus* Morimoto, *Ins. Mats.* 22: 19, 1958 (Mt. Hakusan, Mt. Tateyama, Shimashimadani, Shirahone, Mt. Ishizuchi, Mt. Hiko).

分布：本州，四国，九州。

tosanus Morimoto トサヒシガタクモゾウ (新称)*Lobotrachelus tosanus* Morimoto, *l. c.*: 20 (Kôchi).

分布：四国。

Tribe Sphadasmini**Nipponosphadasmus Morimoto, 1959****coxalis** Morimoto ダルマクモゾウ (新称)*Nipponosphadasmus coxalis* Morimoto, *Akitu VIII*: 40, 1959 (Mt. Tebako, Omogo).

分布：四国。

yanoi Morimoto ヤノダルマクモゾウ (新称)*Nipponosphadasmus yanoi* Morimoto, *l. c.*: 42 (Misakatoge near Matsuyama).

分布：四国。

Tribe IsorhynchiniMorimoto, *Kontyû* 28: 110-115, 177-183, 1960 (Japanese species).**Macrotelephae Morimoto, 1960****ichihashii** Morimoto オオヒメクモゾウ (新称)*Macrotelephae ichihashii* Morimoto, *Kontyû* 28: 114, 1960 (Mie).

分布：本州。

Kumozo Morimoto, 1960**ishikawai** Morimoto イシカワクモゾウ (新称)*Kumozo ishikawai* Morimoto, *l. c.*: 111 (Kamikochi).

分布：本州。

Podeschrus Roelofs, 1875**signatus** Roelofs キュウシュウヒメクモゾウ (新称)*Podeschrus signatus* Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVIII: 176, 1875 (Japan).

分布：九州。

Ellatocerus Schönherr, 1874**japonicus** Morimoto ヤマトヒメクモゾウ (新称)

Ellatocerus japonicus Morimoto, Kontyû 28 : 112, 1960 (Shimokita, Nikko, Masutomi).

分布：本州.

Telephae Pascoe, 1870

insularis Morimoto ヤクシマヒメクモゾウ (新称)

Telephae insularis Morimoto, Kontyû 28 : 182, 1960 (Yakushima, Nakanoshima).

分布：屋久屋, 中ノ島.

kimotoi Morimoto キモトヒメクモゾウ (新称)

Telephae kimotoi Morimoto, l. c. : 181 (Mt. Tebako, Shirahone).

分布：本州, 四国.

matsudai Morimoto マツダヒメクモゾウ (新称)

Telephae matsudai Morimoto, l. c. : 178 (Amami-Oshima).

分布：奄美大島.

murakamii Morimoto ムラカミヒメクモゾウ (新称)

Telephae murakamii Morimoto, l. c. : 179 (Ashoro, Shimokita, Hakusan).

分布：北海道, 本州.

tebakosanus Morimoto テバコヒメクモゾウ (新称)

Telephae tebakosanus Morimoto, l. c. : 180 (Mt. Tebako).

分布：四国.

trifasciatus Morimoto ミツオビヒメクモゾウ (新称)

Telephae trifasciatus Morimoto, l. c. : 179 (Shimokita, Kajigamori, Omogo, Mt. Hiko).

分布：本州, 四国, 九州.

Tribe Othippiini

Egiona Pascoe, 1874

= *Apiophorus* Roelofs, 1875. - syn. nov.

fasciata Voss オビタマクモゾウ (新称)

Apiophorus fasciatus Voss, Ent. Blätt. LI : 32, 1955 (Fukien).

分布：九州, 中国.

minor Hustache チビタマクモゾウ (新称)

Apiophorus minor Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1921 : 93, 1921 (Kumano-taira près Karuizawa).

分布：本州.

picta Roelofs クロホシタマクモゾウ (新称)

Apiophorus pictus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII : 173, 1875 (Japon).

分布：本州, 九州.

Tribe Mecopini

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) VII: 194, 1941 (Key to *Phylaitis* allied genera).

Mecopomorphus Hustache, 1920

griseus Hustache ノコギリクモゾウ (新称)

Mecopomorphus griseus Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXVI: 636, 1920
(Chuzenji, Environ de Tokio, Alpes de Nikko).

分布：北海道，本州，四国，九州。

Neomecopus Hustache, 1921

subarmatus Hustache シラフクモゾウ

Neomecopus subarmatus Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXVII: 92, 1921
(Ibuki près Gifu).

分布：本州，九州。

Phylaitis Pascoe, 1871

maculiventris Voss ツノクモゾウ (新称)

Phylaitis maculiventris Voss, Decheniana, Beihefte 5: 59, 1958 (Fukien).

分布：本州，九州，中国。

Tribe Coryssomerini

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) IV: 1—32, 1939 (Generic revision).

Euryommatus Roger, 1857

Zumpt, Ent. Blätt. 33: 28, 1937 (Key to species).

konoi Zumpt コウノクモゾウ (新称)

Euryommatus konoi Zumpt, Ent. Blätt. 33: 25, 1937 (Sapporo).

分布：北海道，本州。

mariae Roger マリアクモゾウ

Euryommatus Mariae Roger, Stett. Ent. Ztg. XVIII: 61, 1857 (Sibirien).

分布：北海道，シベリヤ，ヨーロッパ。

Metialma Pascoe, 1871

cordata Marshall トゲハラヒラセクモゾウ (新称)

Metialma cordata Marshall, Novit. Zool. 42: 451, 1948 (Burma).

分布：本州，九州，中国，ビルマ。

japonica Hustache ヤマトヒラセクモゾウ (新称)

Metialma japonica Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXVII: 92, 1921 (Chuzenji, Kumanotaira près Karuizawa).

分布：本州，九州，蕨州。

pusilla Roelofs コヒラセクモゾウ (新称)

Metialma pusilla Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 175, 1875 (Japon).

分布：本州，九州。

signifera Pascoe ヒラセクモゾウ

Metalmia signifera Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII: 218, note, 1871 (Hong-Kong).

分布：九州，中国。

Subfamily CURCULIONINAE シギゾウムシ亜科

Heller, Stett. Ent. Ztg. 86: 86-134, 1925; 88: 175-287, 2pls., 1927 (Genera; Key to species of *Timola*, *Pseudobalaninus*, *Ergania*; descriptions of many new species).

Curculio Linné, 1758

= *Balaninus* Germar, 1817

Morimoto, Mushi 33: 89-104, 1960; 36: in press (Revision of Japanese species).

aino Kôno アイノシギゾウ

Balaninus aino Kôno, Ins. Mats. V: 15, 1930 (Kurile Isls., Jozankei).

分布：北海道，本州，四国，千島。

alboscuteatus Roelofs シロモンシギゾウ (新称)

Balaninus alboscuteatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 159, 1874 (Kagoshima, Yokohama).

分布：本州，九州，台湾，中国。

albovittatus Kôno シラホンチビシギゾウ

Balaninus albovittatus Kôno, Ins. Mats. V: 18, 1930 (Sachalin).

分布：北海道，樺太。

amabilis Morimoto, in press ネジロチビシギゾウ (新称)

分布：九州。

antennatus Kôno ムモンチビシギゾウ

Balaninus antennatus Kôno, Ins. Mats. V: 18, 1930 (Garugawa in Hokkaido).

分布：北海道。

arakawai Matsumura et Kôno コナラシギゾウ，ウスイロシギゾウ，アラカワシギゾウ

Balaninus arakawai Matsumura et Kôno, Ins. Mats. II: 171, 1928 (Iyo),
= *Balaninus quercivorus* Kôno, l. c.: 172 (Sapporo).
= *Balaninus shigizo* Kôno, i. c.: 171 (Iyo, Tosa).

分布：北海道，本州，満州。

camelliae Roelofs ツバキシギゾウ

Balaninus camelliae Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 157, 1874 (Japon).

分布：本州，四国，九州，朝鮮 (?)

cerasorum Paykull キマダラシギゾウ

Curculio cerasorum Paykull, Monogr. Curc. Suec. 22, 1792 (Sweden).

分布：北海道，本州，九州，ヨーロッパ，アルゼリヤ。

chibi Kôno チビシギゾウ

- Balaninus chibi* Kôno, Ins. Mats. V: 17, 1930 (Sapporo, Moiwa).
分布：北海道。
- conjugaris** Faust ニセコナラシギゾウ (新称)
Balaninus conjugaris Faust, Deut. Ent. Zschr. XXVI: 278, 1882 (Amur).
分布：本州, 九州, アムール。
- convexus** Roelofs セダカシギゾウ
Balaninus convexus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 161, 1874 (Japon).
分布：本州, 四国, 九州。
- dentipes** Roelofs クリシギゾウ
Balaninus dentipes Roelofs, l. c.: 156 (Japon).
分布：北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, シベリヤ。
- dieckmanni** Faust デークマンシギゾウ (新称)
Balaninus Dieckmanni Faust, Deut. Ent. Zschr. XXXI: 178, 1887 (Amur).
分布：日本 (Heller, 1927 による), アムール。
- distinguendus** Roelofs クロシギゾウ
Balaninus distinguendus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 156, 1874 (Japon).
= *Balaninus takabayashii* Kôno, Ins. Mats. II: 172, 1928 (Takao, Towada).
分布：本州, アムール。
- elaeagni** Morimoto, in press ナツグミシギゾウ
分布：本州, 四国, 九州。
- esakii** Morimoto, in press エサキチビシギゾウ (新称)
分布：本州, 九州。
- flavescens** Roelofs キオビシギゾウ
Balaninus flavescens Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 160, 1874 (Japon).
分布：北海道, 本州, 朝鮮。
- flavoscutellatus** Roelofs モンキシギゾウ
Balaninus flavoscutellatus Roelofs, l. c.: 160 (Nagasaki).
= *Curculio modestus* Voss, Mitt. Münch. Ent. Ges. 1941: 898, 1941 (Beppu).
分布：本州, 四国, 九州。
- fluvipennis** Morimoto チャバネセダカシギゾウ (新称)
Curculio fluvipennis Morimoto, Mushi 35: 101, 1960 (Nikko, Daisen, Tsurugisan, Sobosan, Hikosan).
分布：本州, 四国, 九州。
- funebri** Roelofs イスビワシギゾウ
Balaninus funebri Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 159, 1874 (Japon).
= *Balaninus (Balanobius) clavatus* Faust, Deut. Ent. Zschr. XXVI: 278, 1882 (Japan).
分布：本州, 四国, 九州。
- hachijoensis** Morimoto, in press ハチジョウシギゾウ (新称)

分布：八丈島。

hime Kôno ヒメシギゾウ

Balaninus hime Kôno, Ins. Mats. V: 15, 1930 (Shimauchi in Nagano).

分布：本州，四国，九州。

ichihashi Morimoto, in press イチハシシギゾウ (新称)

分布：本州。

iwasakii Matsumura et Kôno イワサキシギゾウ

Balaninus iwasakii Matsumura et Kôno, Ins. Mats. II: 170, 1928 (Is. Ishigaki).

分布：九州，石垣島。

kamiyai Morimoto, in press カミヤチビシギゾウ (新称)

分布：九州。

kimotoi Morimoto キモトシギゾウ (新称)

Curculio kimotoi Morimoto, Mushi 33: 94, 1960 (Cape Sata, Mt. Kirishima).

分布：九州。

kojimai Morimoto コジマシギゾウ (新称)

Curculio kojimai Morimoto, l. c.: 99 (Kuroson).

分布：四国，九州。

koreanus Heller ミヤマシギゾウ

Balaninus koreanus Heller, Stett. Ent. Ztg. 88: 181, 1927 (Wladivostock).

分布：本州，四国，ウスリー。

kunugi Morimoto, in press クヌギチビシギゾウ (新称)

分布：本州，四国，九州。

kurosawai Morimoto, in press. クロサワシギゾウ (新称)

分布：本州。

maculanigra Roelofs クロホシシギゾウ

Balaninus macula-nigra Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 154, 1874 (Japan).

分布：四国，九州。

minutissimus Dalla Torre et Schenkling ウスモンチビシギゾウ

Curculio minutissimus Dalla Torre et Schenkling, Col. Cat. 123. Curculioninae: 15, 1932 (new name for *minimus* Kôno).

= *Balaninus minimus* Kôno (nec Rey), Ins. Mats. V: 16, 1930 (Mt. Fuji).

分布：本州，四国，九州。

miyatakei Morimoto ミヤタケシギゾウ (新称)

Curculio miyatakei Morimoto, Mushi 33: 100, 1960 (Mt. Tsurugi).

分布：四国。

murakamii Morimoto, in press ムラカミチビシギゾウ (新称)

分布：北海道，本州。

parasiticus Morimoto, in press ヤドリシギゾウ (新称)

分布：北海道。

pictus Roelofs ジュウジチビシギゾウ

Balaninus pictus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 161, 1874 (Japan).

分布：本州，四国，九州，朝鮮。

robustus Roelofs ナラシギゾウ

Balaninus robustus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 155, 1874 (Nagasaki).

= *Balaninus transversalis* Faust, Deut. Ent. Zschr. 1860: 261, 1890 (Pekin).

分布：本州，九州，中国。

roelofsi Heller レロフチビシギゾウ

Balaninus roelofsi Heller, Stett. Ent. Ztg. 88: 275, 1927 (new name for *crucifer* Roelofs).

= *Balaninus crucifer* Roelofs (nec Fuchs), Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 162, 1874 (Yokohama).

分布：北海道，本州，四国，九州。

styracis Roelofs エゴシギゾウ

Balaninus styracis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 157, 1874 (Nagasaki).

分布：本州，九州。

tigrinus Morimoto ビゲプトシギゾウ (新称)

Curculio tigrinus Morimoto, Mushi 33: 103, 1960 (Mt. Hiko, Cape Sata, Is. Tanegashima).

分布：本州，四国，九州，種ヶ島。

ussuriensis Heller ウスリーシギゾウ (新称)

Balaninus ussuriensis Heller, Stett. Ent. Ztg. 88: 181, 1927 (Ussuri).

分布：九州，ウスリー。

yanoi Morimoto, in press ヤノシギゾウ

分布：四国，九州。

Subfamily TYCHINAE コガタゾウムシ亜科

Tribe Tychiini

Tychius Schönherr, 1826

Kôno, Ins. Mats. IV: 145-146, 1930 (Revision of Japanese species).

Franz, Arb. morph. tax. Ent. Dahlem 6: 341-349, 1939; 7: 17-32, 1940; 9: 104-133, 182-205, 242-266, 1942 (Revision of Palearctic species).

ginsuji Kôno ギンスジゾウ

Tychius ginsuji Kôno, Ins. Mats. V: 145, 1930 (Berg Ibuki in Omi).

分布：本州。

iwatensis Kôno オオギンスジゾウ

Tychius iwatensis Kôno, l. c.: 146 (Iwate).

分布：本州。

ovalis Roelofs コギンスジゾウ

Tychius ovalis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 171, 1874 (Japon).

分布: 本州, 九州.

Tribe Demimacini

Demimaea Pascoe, 1870

= *Lychnuchus* Roelofs, 1874

Voss, Ent. Blätt. 33: 448-463, 1938 (Revision).

Kôno, Ins. Mats. XIII: 71-75, 1939 (Revision of Japanese species).

circula Roelofs マルモンササラゾウ

Lychnuchus circula Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 170, 1874 (Japon).

分布: 本州, 四国, 九州.

fascicularis Roelofs タバゲササラゾウ

Lychnuchus fascicularis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend.: liv, 1879 (Japon).

分布: 本州, 四国, 九州, 中国.

mori Kôno クワササラゾウ

Demimaea mori Kôno, Ins. Mats. XIII: 73, 1939 (Sapporo, Tokio).

分布: 北海道, 本州.

okuboi Kôno オオクボササラゾウ

Demimaea okuboi Kôno, l. c.: 74 (Kochi)

= *Demimaea okubana* Voss, Mitt. Münch. Ent. Ges. XXXIII: 222, 1943 (Insel Okuba (Tosa)). - syn. nov.

分布: 本州, 四国, 九州.

tricolor Roelofs ミイロササラゾウ

Lychnuchus tricolor Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 170, 1874 (Nagasaki).

分布: 九州.

Tribe Endaeini

Endaeus Schönherr, 1826

nipponicus Voss et Chûjô アシプトゾウ (新称)

Endaeus nipponicus Voss et Chûjô, Nipponius I (3): 3, 1960 (Niigata).

分布: 本州.

Gryphorhynchus Roelofs, 1875

obscurus Roelofs ウスグロアシプトゾウ (新称)

Gryphorhynchus obscurus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 189, 1875 (Japon).

分布: 本州, 四国, 九州.

Endaenidius Morimoto, MS.

ikezakii Morimoto, MS. イケザキアシプトゾウ (新称)

分布：九州.

Eusynnada Heller, 1925

japonica Roelofs, comb. nov. モンアシプトゾウ (新称)

Minyrus japonicus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 163, 1874 (Japan).

分布：九州.

Heterendaeus Morimoto, MS.

miyamotoi Morimoto, MS. クロオビアシプトゾウ (新称)

分布：奄美大島.

Sphixioides Voss et Chûjô, 1960

= *Epidemimaea* Chûjô et Voss, 1960.

koikei Voss et Chûjô クロツブゾウ (新称)

Sphixioides koikei Voss et Chûjô, Niponius I (3): 7 (Niigata).

分布：本州, 四国, 九州.

ihai Chûjô et Voss ネジロツブゾウ (新称)

Demimaea (Epidemimaea) ihai Chûjô et Voss, Mem. Fac. Liberal Arts & Educ. Kagawa Univ. II (94): 7, 1960 (Is. Okinawa).

分布：九州, 沖縄.

Sphinxus Roelofs, 1875

pubescens Roelofs スフィンクスツブゾウ (新称)

Sphinxus pubescens Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 190, 1875 (Japan).

分布：日本.

Tribe Elleschini

Elleschus Stephens, 1831

bicoloripes Voss et Chûjô ハモグリゾウムシ (新称)

Elleschus bicoloripes Voss et Chûjô, Niponius I (3): 9, 1960 (Niigata, Kochi).

分布：本州, 四国.

pauper Chûjô et Voss クロハモグリゾウムシ (新称)

Ellatocerus pauper Chûjô et Voss, Mem. Fac. Liberal Arts & Educ. Kagawa Univ. II (94): 9, 1960 (Omogo, Berg. Kirishima).

分布：四国, 九州.

Subfamily PACHYRRHYNCHINAE カタゾウムシ亜科

Schultze, Philipp. J. Sci. 23: 609-673, 6 pls. 1922; 24: 309-366, 3 pls. 1923; 25: 359-390, 1924; 26: 131-309, 12 pls. 1925 (Monograph).

Pachyrrhynchus Germar, 1824

infernalis Fairmaire クロカタゾウ

Pachyrrhynchus infernalis Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. 70, 1879 (Ishigaki).

分布：石垣島，八重山群島。

Subfamily SITONINAE コフキノゾウムシ亜科

Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 163-166, 1930 (Japanese species).
Emden, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) XI: 580-581, 1944 (Key to genera).

Parasitones Sharp, 1896

gravidus Sharp ハネナシコフキノゾウ (新称)

Parasitones gravidus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 113, 1896 (Hakone).

分布：本州。

Sitona Germar, 1817

=*Sitones* Schönherr, 1840

Reitter, Wien. Ent. Ztg. XXII: 3-41, 1903 (Best. Tab. eur. Col. LII) (Key to Palaearctic species).

hispidula Fabricius ケチビコフキノゾウ (新称)

Curculio hispidulus Fabricius, Gen. Ins. Mant.: 226, 1776 (Europe).

分布：北海道，本州，九州，ヨーロッパ，コーカサス，アメリカ。

japonica Roelofs チビコフキノゾウ

Sitones japonicus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 160, 1873 (Japan).

分布：本州，四国，九州。

lineata Linné アカアシチビコフキノゾウ

Curculio lineatus Linné, Syst. Nat., ed. X: 385, 1758 (Europe).

分布：北海道，シベリヤ，ヨーロッパ。

Eugnathus Schönherr, 1834

Voss, Deut. Ent. Zschr. 1920: 210-222, 1925 (Key to species).

distinctus Roelofs コフキノゾウ

Eugnathus distinctus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 179, 1873 (Japan).

=*Catachaenus bracteatus* Pascoe, J. Linn. Soc. London, Zool. XII: 23, 1874 (Is. Tsushima).

=*Catachaenus chloroticus* Pascoe, l. c.: 23 (Japan).

分布：本州，四国，九州，琉球，台湾，中国。

Subfamily OTIORRHYNCHINAE クチブトゾウムシ亜科

Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV (5): 153-237, 2 pls., 1930 (Revision of Japanese species).

Tribe Episomini

Episomus Schönherr, 1826

Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI: 90-201, 1897 (Revision).

Voss, Senckenbergiana 19: 250-251, 1927 (Key to *turritus* allied species).

mori Kôno オキナワクワゾウ

Episomus mori Kôno, Ins. Mats. II: 166, 1928 (Okinawa, Ishigaki).

分布：沖縄本島，石垣島。

mundus Sharp クワゾウ

Episomus mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 93, 1896 (Yuyama).

分布：本州，九州。

turritus Gyllenhal シロコブゾウ

Lagostomus turritus Gyllenhal, Gen. Sp. Curc. I (2): 613, 1833 (Japonia).

= *Episomus turritus* var. ? *declivis* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI: 158, 1871 (Tschifu).

分布：本州，四国，九州，朝鮮，中国。

Tribe Celeuthetini

Marshall, Otiorrhynchine Curc. of tribe Celeuthetini, London, 134 pp., 1956 (Revision).

Arrhaphogaster Roelofs, 1873

pilosus Roelofs ケブカヒメカタゾウ

Arrhaphogaster pilosus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 164, 1873 (Hakodadi).

分布：北海道，本州。

Tribe Otiorrhynchini

Asphalmus Sharp, 1896

japonicus Sharp ホソヒメカタゾウ

Asphalmus japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 95, 1896 (Shiba in Tokio).

分布：本州。

Omoiotos Sharp, 1896

ovatus Sharp ツヤヒメカタゾウ

Omoiotos ovatus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 96, 1896 (Japan).

分布：四国。

Tribe Phyllobiini

Phyllobius Germar, 1824

= *Diallobius* Sharp, 1896

Schilsky, Käf. Eur. 47: A-MM, 1911 (Key to Palearctic species).

annectens Sharp ミヤマヒゲボソゾウ

Phyllobius annectens Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 99, 1896 (Nikko, Kashiwagi).

= *Phyllobius daisetsuzanus* Kôno, Ins. Mats. II: 164, 1928 (Daisetsu).

分布：北海道，本州，四国，九州，千島。

armatus Roelofs リンゴコブキノゾウ

- Phyllobius armatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, Compt. Rend.: cxviii, 1879 (Japan).
 分布：本州，四国，九州。
- brevitarsis** Kôno コヒゲボソゾウ
Phyllobius brevitarsis Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 205, 1930 (Kamikochi).
 分布：本州，四国，九州。
- galloisi** Hustache コブヒゲボソゾウ
Phyllobius Galloisi Hustache, Bull. Soc. Ent. Fr. 1920: 115, 1920 (Tokio, Takao).
 分布：北海道，本州，四国，九州。
- incomptus** Sharp ツチイロヒゲボソゾウ
Phyllobius incomptus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 103, 1896 (Miyano-shita).
 = *Diallobius inornatus* Sharp, l. c. : 104 (Japan).
 分布：本州。
- intrusus** Kôno ヒラズネヒゲボソゾウ
Phyllobius intrusus Kôno, Proc. Biol. Soc. Washington 61: 169, 1948 (Rhode Island, Tokyo, Utsunomiya, Kyoto).
 分布：本州，九州，アメリカ。
- japonicus** Faust ハダカヒゲボソゾウ
Phyllobius japonicus Faust, Sett. Ent. Ztg. 1889: 221, 1889 (Japan).
 = *Phyllobius subnudus* Kôno, Ins. Mats. II: 165, 1928 (Chiba, Kagoshima) - syn. nov.
 分布：本州，四国，九州。
- leechi** Sharp リーチヒゲボソゾウ
Phyllobius leechi Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 103, 1896 (Kashiwagi).
 分布：本州，四国。
- lewis** Sharp リュイスヒゲボソゾウ
Diallobius lewis Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 105, 1896 (Kashiwagi).
 分布：本州。
- longicornis** Roelofs リンゴヒゲナガゾウ
Phyllobius longicornis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 166, 1873 (Hakodadi, Awomori).
 分布：北海道，本州。
- mundus** Sharp ウスイロヒゲボソゾウ
Diallobius mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 104, 1896 (Nikko, Kashiwagi).
 = *Phyllobius (Subphyllobius) japonicus* Schilsky (nec Faust), Käf. Eur. XLVIII: 11, 1911 (Kioto).
 = *Phyllobius schilskyi* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 207, 1930 (new name for *japonicus* Schilsky).

分布：本州.

polydrusoides Sharp チクブトヒゲボソゾウ (新称)

Phyllobius polydrusoides Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 102, 1896 (Kashiwagi).

分布：本州, 四国.

prolongatus Motschulsky アオヒゲボソゾウ

Phyllobius prolongatus Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou 1866: 180, 1866 (Japan).

分布：北海道, 本州.

rotundicollis Roelofs キュウシュウヒゲボソゾウ (新称), キンヒゲボソゾウ

Phyllobius rotundicollis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 167, 1873 (Nagasaki).
=*Phyllobius nigritus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 100, 1896 (Hitoyoshi).

分布：本州, 四国, 九州.

(**argentatus** Linné)

Curculio argentatus Linné, Syst. Nat., ed. X: 384, 1758 (Europe).

この種は Motschulsky, 1866 により日本から記録されたが, 同定の誤りによるものと思われる.

(**picipes** Motschulsky)

Phyllobius picipes Motschulsky, Etud. Ent. IX: 20, 1860 (Japan).

この原記載は極めて簡単で, この属の多くの種に合致する. Sharp, 1896 はこの理由により種名を抹殺すべきだといっている. 模式標本がみつかるまで不明種として残しておきたい.

Tribe Ptochini

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XIV: 208-256, 1906 (Key to Palaearctic species).

Subtribe Ptochina

Calomycterus Roelofs, 1873

setarius Roelofs チビメナガゾウムシ

Calomycterus setarius Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 175, 1873 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

Myosides Roelofs, 1873

pyrus Sharp ニセチビヒョウタンゾウ

Myosides pyrus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 93, 1896 (Nikko).

分布：本州.

seriehispidus Roelofs チビヒョウタンゾウ

Myosides seriehispidus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 164, 1873 (Nagasaki).

分布：本州, 九州.

Ptochus Schönherr, 1826**obscuripes** Motschulsky ツチイロヒヨウタンゾウ*Ptochus obscuripes* Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX (1): 180, 1866 (Japan).

分布：日本。

Sharp, 1896 によればこの種は *Ptochus* 属のものでないかもしれないという。**Subtribe Myllocerina****Hyperstylus Roelofs, 1873****pallipes** Roelofs チビアネゾウ*Hyperstylus pallipes* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 172, 1873 (Japan).

分布：本州，四国，九州。

Eumyllocerus Sharp, 1896

Voss, Mitt. Münch. Ent. Ges. 30: 884, 1940 (Key to species).

gratiosus Sharp アオヒゲナガゾウ*Eumyllocerus gratiosus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 109, 1896 (Kioto, Kashiwagi).

分布：本州，九州。

Macrocorynus Schönherr, 1826**=Myllocerops** Reitter, 1906

Formáneck, Wien. Ent. Ztg. 35: 44-56, 1916 (Revision).

elegantulus Roelofs ウスアオクテプトゾウ*Myllocerus elegantulus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 170, 1873 (Japan).

分布：本州，九州。

discoldeus Olivier ツノクテプトゾウ*Curculio discoldeus* Olivier, Ent. V: 418, 1807 (India).

分布：九州，中国，インド。

griseoides Zumpt コカシワクテプトゾウ*Myllocerops griseoides* Zumpt, Mitt. Deut. Ent. Ges. VIII: 10, 1937 (Tokio).

分布：本州，九州。

naso Sharp エグリクテプトゾウ*Myllocerus naso* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 107, 1896 (Higo).

分布：九州。

variabilis Roelofs オオクテプトゾウ*Myllocerus variabilis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 168, 1873 (Nagasaki).

分布：本州，四国，九州。

viridulus Roelofs ミドリクテプトゾウ*Myllocerus viridulus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 171, 1873 (Nagasaki).

分布：九州.

Myllocerus Schönherr, 1826

abnormalis Sharp ヒゲブトクテブトゾウ

Myllocerus (?) *abnormalis* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 108, 1896 (Hi-toyoshi).

分布：四国, 九州.

dissimilis Voss ウンゼンクテブトゾウ (新称)

Myllocerus dissimilis Voss, Ent. NachrBl. XIII: 53, 1939 (Unzen Shimabara).

分布：九州.

fumosus Faust ケブカクテブトゾウ

Myllocerus fumosus Faust, Deut. Ent. Zschr. XXVI: 261, 1882 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

griseus Roelofs カシワクテブトゾウ

Myllocerus griseus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 170, 1873 (Nagasaki).

分布：北海道, 本州, 四国, 九州.

nigromaculatus Roelofs クロホシクテブトゾウ

Myllocerus nigro-maculatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 169, 1873 (Nagasaki).

分布：本州, 四国, 九州.

nipponensis Zumpt ツムブトクテブトゾウ

Myllocerus nipponensis Zumpt, Ent. Blätt. 34: 85, 1938 (Iwate).

分布：本州.

otsukai Kôno オオツカクテブトゾウ

Myllocerus otsukai Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 218, 1930 (Ibukisan).

分布：本州.

Subtribe Cyphicerina

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) 11: 73-98, 433-462, 1944 (Generic revision).

Anosimus Roelofs, 1873

decoratus トゲアシゾウ

Anosimus decoratus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 174, 1873 (Japan).
= *Anosimus pallidus* Roelofs, l. c.: 174 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

Cyphicerus Schönherr, 1826

Formáneck, Wien. Ent. Ztg. XXXV: 35-39, 1916 (Key to Palearctic species of *Cyphicerus* sens. Reitter).

aceri Kôno イタヤクテブトゾウ, セアカクテブトゾウ

Myllocerus aceri Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 217, 1930

(Hokkaido).

= *Myllocerus tosanus* Kôno, l. c.: 218 (Tosa). -syn. nov.

= *Myllocerus viridulus* Kôno (nec Roelofs), l. c.: 217, 1930 (Kagoshima).

分布：北海道，本州，四国，九州。

kuchibutonus Kôno ハイイロクテブトゾウ

Myllocerus kuchibutonus Kôno, l. c.: 219 (Okinawa).

分布：沖縄。

Cyphicerinus Marshall, 1928

Marshall, Proc. R. Ent. Soc. London (B) 11: 124-126, 1942 (Key to species).

tesselatus Motschulsky ツチイロクテブトゾウ

Prochidius tesselatus Motschulsky, Schrenck's Reisen Amurl. II: 160, 1860 (Amur).

分布：日本 (Reitter, 1906 による), アムール, 中国。

Canolixus Roelofs, 1873

japonicus Roelofs サビクテブトゾウ

Canolixus japonicus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 172 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

Oedophyrus Marshall, 1941

hilleri Faust, comb. nov. ヒレルクテブトゾウ

Myllocerus Hilleri Faust, Stett. Ent. Ztg. 1889: 222, 1889 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

sakaguchii Kôno, comb. nov. サカグチクテブトゾウ

Myllocerus sakaguchii Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 212, 1930 (Okinawa).

分布：九州，沖縄。

Cyrteplstomus Marshall, 1924

castaneus Roelofs クライロクテブトゾウ

Myllocerus castaneus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 168, 1873 (Japon).

分布：本州，四国，九州，アメリカ。

Subtribe Phytoscaphina

Phytoscaphus Schönherr, 1826

ciliatus Roelofs クチナガクテブトゾウ

Phytoscaphus ciliatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XV: 176, 1873 (Japon).

分布：日本。

Tribe Callirhopalini

Callirhopalus Hochhuth, 1851

= *Pseudocneorrhinus* Roelofs, 1873

Marshall, Ark. Zool. 27A (29): 8-10, 1934 (Key to species).

bifasciatus Roelofs スグリゾウ

Pseudocneorrhinus bifasciatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend. : liii, 1879 (Japon).

分布：北海道，本州，四国，九州，アメリカ。

minimus Roelofs チビスグリゾウ

Pseudocneorrhinus minimus Roelofs, l. c. : liii (Japon).

分布：北海道，本州。

obesus Roelofs カキゾウ

Pseudocneorrhinus obesus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI : 177, 1873 (Nagasaki).

分布：本州，九州。

setosus Roelofs ケナガスグリゾウ

Pseudocneorrhinus setosus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend. : liii, 1879 (Japon).

分布：本州，九州。

Tribe Tanymecini

Reitter, Best. Tab. eur. Col. Tanymecini I, 21 pp., 1903 (Key to Palaearctic species).

Emden, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) 11 : 568-580, 1944 (Key to genera).

Sympiezomias Faust, 1887

cribricollis Kôno ホソヒョウタンゾウ

Sympiezomias cribricollis Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV : 189, 1930 (Formosa).

分布：琉球，台湾。

lewisii Roelofs リュイスヒョウタンゾウ，ワモンヒョウタンゾウ

Piazomias Lewisii Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII ; Compt. Rend. : liii, 1879 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

velatus Chevrolat シナヒョウタンゾウ

Piazomias velatus Chevrolat, Rev. Zool. : 98, 1845 (Peking).

分布：日本 (Roelofs, 1873 による)，中国。

Amystax Roelofs, 1873

fasciatus Roelofs オビモンヒョウタンゾウ

Amystax fasciatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI : 160, 1873 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

Enaptorrhinus Waterhouse, 1853

Heller, Wien, Ent. Ztg. XLVII : 107-109, 1930 (Key).

Voss, Ent. NachrBl. XIII : 57-58, 1939 (Key).

dispar Voss ケナガヒョウタンゾウ (新称)

Enaptorrhinus dispar Voss, Ent. NachrBl. XIII: 56, 1939 (Unzen Shimabara, Northwest China : Tienmuschan).

分布：九州，中国。

Chlorophanus Germar, 1824

Reitter, Wien. Ent. Ztg. 34: 171-184, 1915 (Best. Tab. eur. Col. 75, 14 pp., 1915) (Revision),

grandis Roelofs オオアオゾウ

Chlorophanus grandis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 162, 1873 (Yokohama).
Chlorophanus grandis var. *lugbris* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 111, 1896 (Oyama).

Chlorophanus grandis var. *metallescens* Sharp, l. c.: 111 (Oyama).

分布：北海道，本州，九州。

kônoi Günther et Zumpt ムネジワオオアオゾウ

Chlorophanus Kônoi Günther et Zumpt, Col. Cat. 131 Tanymericinae: 70, 1933 (new name for *rugicollis* Kôno).

=*Chlorophanus rugicollis* Kôno (nec Gyllenhal), J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 182, 1930 (Kogota in Honshu).

分布：本州。

planus Sharp ヒメオオアオゾウ

Chlorophanus planus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 111, 1896 (Nikko).

分布：本州，四国。

Scepticus Roelofs, 1873

=*Copanopachys* Roelofs, 1880

griseus Roelofs サビヒヨウタンゾウ

Piazomias griseus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 162, 1873 (Japan).

分布：本州，四国，九州。

hachijoensis Kôno ヘチジョウヒヨウタンゾウ

Scepticus hachijoensis Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 187, 1930 (Is. Hachijo).

分布：八丈島。

insularis Roelofs クワヒヨウタンゾウ

Scepticus insularis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 158, 1873 (Nagasaki, Hiogo).

分布：北海道，本州，四国，九州，樺太。

minowai Kôno ミノウヒヨウタンゾウ

Scepticus minowai Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 185, 1930 (Is. Yaku).

分布：九州，屋久島。

tigrinus Roelofs スナムグリヒヨウタンゾウ

Piazomias tigrinus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 161, 1873 (Japon).

分布：北海道，本州。

uniformis Kôno ハイイロヒヨウタンゾウ

Scepticus uniformis Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 186, 1930 (Okinawa).

分布：琉球。

Meotiorrhynchus Sharp, 1896

querendus Sharp シラフヒヨウタンゾウ

Meotiorrhynchus querendus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 86, 1896 (Hakodate).

分布：北海道，樺太，千島。

Tribe Cneorrhini

Emden, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) 11: 561-567, 1944 (Key to genera).

Dermatoxenus Marshall, 1916

caesicollis Gyllenhal ヒメシロコブゾウ

Lagostomus caesicollis Gyllenhal, Gen. Sp. Curc. I (2): 619, 1833 (Japonia, nec Java (Gyllenhal, 1840)).

=*Cneorhinus nodosus* Motschulsky, Etud. Ent. IX: 21, 1860 (Japon).

分布：本州，四国，九州，琉球，中国，台湾，アッサム。

carinulatus Motschulsky

Dermatodes carinulatus Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX: 177, 1866 (Japon).

分布：日本。

clathratus Roelofs ウスヒヨウタンゾウ

Catapionus clathratus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 157, 1873 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

interstitialis Motschulsky

Dermatodes interstitialis Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX: 179, 1866 (Japon).

分布：日本。

Catapionus Schönherr, 1842

Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XIX: 125-163, 1876 (Revision).

angusticollis Motschulsky

Cneorhinus angusticollis Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX: 179, 1866 (Japon).

分布：日本。

cuprescens Motschulsky アカヒヨウタンゾウ

Cneorhinus cuprescens Motschulsky, l. c.: 178 (Japon).

分布：本州.

gracilicornis Roelofs ハイイロヒヨウタンゾウ

Catapionus gracilicornis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 157, 1873 (Hakodate).

分布：北海道, 本州, 千島.

modestus Roelofs フキヒヨウタンゾウ (新称)

Catapionus modestus Roelofs, l. c.: 156 (Kawatchi).

分布：本州.

oblongus Kôno ホソヒヨウタンゾウ

Catapionus oblongus Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIX: 173, 1930 (Echigo).

分布：本州.

obscurus Sharp マルヒヨウタンゾウ

Catapionus obscurus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 90, 1896 (Centre of the main island).

分布：本州.

subcostatus Formâneck エゾヒヨウタンゾウ (新称)

Catapionus subcostatus Formâneck, Wien. Ent. Ztg. XXXIX: 80, 1922 (Otaru).

分布：北海道.

Tribe Polydrosini

Scythropus Schönherr, 1826

Desbrochers des Loges, Frelon 10: 113-158, 1901-2 (Revision).

Schilsky, Käf. Eur. XLVII: OO-SS, 1911 (Key to Palaearctic species).

isshikii Kôno イッシキホソゾウ

Scythropus isshikii Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 169, 1930 (Odaigahara).

分布：本州, 四国.

japonicus Hustache キアシチビアオゾウ

Scythropus japonicus Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920: 116, 1920 (Nakano près Tokio).

分布：本州.

ornatus Matsumura ウスアオオビゾウ

Polydrosus ornatus Matsumura, J. Agr. Coll. Sapporo IV: 132, 1911 (Sachalin).

分布：北海道, 本州, 樺太.

scutellaris Roelofs マットビゾウ

Scythropus scutellaris Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 179, 1873 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

Tribe **Blosyrini**

Blosyrus Schönherr, 1826

japonicus Sharp マルカククチゾウ

Blosyrus japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 88, 1896 (Awomori, Sapporo).

分布：北海道，本州。