

## 日本産ゾウムシ科目録(I)

森本, 桂  
九州大学農学部

<https://doi.org/10.15017/21574>

---

出版情報 : 九州大学農学部学藝雑誌. 19 (2), pp.183-217, 1962-01. 九州大学農学部  
バージョン :  
権利関係 :

日本産ゾウムシ科目録 (I)<sup>1,2</sup>

森 本 桂

Provisional check list of the family  
Curculionidae of Japan. I

Katsura Morimoto

日本産のゾウムシ上科のうち、ヒゲナガゾウムシ科、オトシブミ科およびミツギリゾウムシ科の目録は既に発表した。ゾウムシ科は2回に分けて発表する予定である。

排列は便宜上、別報する属までの検索表と同じ順にしておいた。

この研究を発表するに当り、終始懇篤な御指導を与えられた故江崎悌三教授、安松京三教授および平嶋義宏助教授に厚くお礼申上げる。

## Family CURCULIONIDAE ゾウムシ科

## Subfamily CIONINAE タマゾウムシ亜科

Reitter, Best. Tab. eur. Col. LIV: 1-17, 1907 (Key to Palaearctic species).  
Kôno, Ins. Mats. IV (4): 148-161, 1930 (Revision of Japanese species).  
Wingelmüller, Kol. Rdsch. 23 (6): 143-221, 1938 (Monograph of Palaearctic species).

*Stereonychidius* Morimoto, MS.**galloisi** Hustache シロオビタマゾウ

*Stereonychus galloisi* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 498, 1920 (Mt. Takao près Hachioji).

分布：本州.

*Stereonychus* Suffrian, 1854**japonicus** Hustache ハイイロタマゾウ

*Stereonychus japonicus* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 631, 1920 (Environ de Tokio, Alpes de Nikko, Mt. Ibuki près Gifu).

分布：本州.

**ochraceus** Hustache アカタマゾウ

*Stereonychus ochraceus* Hustache, l. c.: 631 (Environ de Tokio, Alpes de Nikko).

分布：本州.

**ogasawarai** Kôno オガサワラタマゾウ

1. Comparative morphology, phylogeny and systematics of the superfamily Curculionoidea of Japan. V.  
2. Contribution Ser. 2, No. 112. Entomological Laboratory, Kyushu University, Fukuoka.

*Cionus (Stereonychus) ogasawarai* Kôno, Ins. Mats. IV: 150, 1930 (Iwate).

分布：本州.

**thoracicus** Faust

*Stereonychus thoracicus* Faust, Deut. Ent. Zschr. 31: 176, 1887 (Wladivostock).

分布：東シベリヤ, 中国, 本州 (京都—Wingelmüller, 1938 による).

*Cionus* Clairville, 1798

**helleri** Reitter クロタマゾウ

*Cionus (Cionus) helleri* Reitter, Wien. Ent. Ztg. XXIII: 56, 1904 (Best. Tab. eur. Col. 54: 10, 1904) (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

**tamazo** Kôno マルモンタマゾウ

*Cionus (Cionus) tamazo* Kôno, Ins. Mats. IV: 149, 1930 (Is. Shakotan, Is. Rishiri, Chuzenji).

分布：北海道, 本州, 四国, 九州, 千島.

**latefasciatus** Voss クロオビシロタマゾウ

*Cionus (Cionus) latefasciatus* Voss, Akitu V: 13, 1956 (Mt. Tsurugi).

分布：四国.

*Cleopus* Stephens, 1831

**japonicus** Wingelmüller

*Cleopus japonicus* Wingelmüller, Kol. Rdsch. 23: 207, 1938 (Südchina: Yun-nan, Kioto).

分布：本州, 中国.

Subfamily GYMNETRINAE コバンゾウムシ亜科

Bovic, Genera Insectorum, 92 Gymnetrinae, 20 pp, 2 pls, 1909.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn 45: 7-50, 1907 (Best. Tab. eur. Col. 59, 44 pp., 1907) (Key to Palaearctic species).

Kôno, Ins. Mats. IV: 146-148, 1930 (Revision of Japanese species).

*Gymnetron* Schönherr, 1926

**miyoshii** Miyoshi ミヨシコバンゾウ, ムシクサゾウムシ

*Gymnetron miyoshi* Miyoshi (nec Matsumura), Konchu Sekai, Gifu XXVI: 253, 1922 (Okayama).

分布：本州, 四国, 九州.

**villosipenne** Roelofs シラケコバンゾウ (新称)

*Gymnetron villosipennis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 149, 1875 (Japan).

分布：日本.

*Miarus* Stephens, 1831

Morimoto, Kontyû 27: 190-195, 1959 (Revision of Japanese species).

**flavoscutellatus** Morimoto キボシコバンゾウ (新称)

*Miarus flavoscutellatus* Morimoto, Kontyû 27: 195, 1959 (Shirahone, Daisen).

分布：本州.

**kamiyai Morimoto** カミヤコバンゾウ (新称)

*Miarus kamiyai* Morimoto, l. c.: 192 (Masutomi, Kanayama, Komagatake, Shirahone).

分布：本州.

**kobanzo Kôno** オウコバンゾウ

*Miarus kobanzo* Kôno, Ins. Mats. IV: 148, 1930 (Japan).

分布：本州.

**minimus Morimoto** チビコバンゾウ (新称)

*Miarus minimus* Morimoto, Kontyû 27: 194, 1959 (Masutomi, Kiso-Ontake, Iriyama in Nagano).

分布：本州.

**vestitus Roelofs** クロコバンゾウ

*Miarus vestitus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 150, 1875 (Japan).

分布：本州.

Subfamily ANOPLINAE ツメナシゾウムシ亜科

**Anoplus** Schönherr, 1826

Hoffmann, Faune de France, Curculionidae: 707-709, 1954 (European species).

**sugiharai Kôno** ツメナシゾウムシ (新称), スギハラカラスゾウ

*Anoplus sugiharai* Kôno, Ins. Mats. X: 61, 1935 (Is. Shikotan).

分布：北海道, 千島.

Subfamily RHYNCHAENINAE ノミゾウムシ亜科

Tribe Rhynchaenini

Kôno, Ins. Mats. V: 21-31, 1930 (Revision of Japanese species).

**Rhynchaenus** Clairville, 1798

=*Orchestes* Illiger, 1804

Ter-Minasyan, Ent. Oboz. XXXIII: 311-324, 1953 (Key to Russian species).

**aterrimus Roelofs**

*Orchestes aterrimus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 166, 1874 (Japan).

分布：日本.

**awomoriensis Roelofs** キタノミゾウ

*Orchestes (Tachyerges) awomoriensis* Roelofs, l. c.: 167 (Awomori).

分布：本州.

**dorsoplanatus Roelofs** ヒラセノミゾウ

*Orchestes dorso-planatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 167, 1874 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州, 中国.

**excellens** Roelofs フトノミゾウ (新称)*Orchestes excellens* Roelofs, l. c.: 164 (Japon).

分布: 九州.

**galloisi** Kôno ガロアノミゾウ*Orchestes galloisi* Kôno, Ins. Mats. V: 28, 1930 (Tokio).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国.

**horii** Kôno ホリノミゾウ*Rhynchaenus horii* Kôno, Ins. Mats. XI: 129, 1937 (Meshima in Danjo Isls).

分布: 四国 (沖ノ島), 九州 (男女群島女島).

**hustachei** Klima ヤドリノミゾウ*Rhynchaenus hustachei* Klima, Col. Cat. 145 Rhynchaeninae: 15, 1935 (new name for *puberulus* Hustache).=*Orchestes puberulus* Hustache (nec Boheman), Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 632, 1920 (Kioto, Takao).=*Rhynchaenus croceus* Marshall, Mushi 24: 87, 1951 (Murozumi in Prov. Suwô) — syn. nov.

分布: 本州, 四国, 九州.

**japonicus** Hustache ハンノキノミゾウ*Orchestes japonicus* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 632, 1920 (Nakano près Tokio).=*Orchestes excellens* Kôno, (nec Hustache), Ins. Mats. V: 23, 1930 (Hokkaido, Honshu, Kyushu).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州.

**jota** Fabricius シロモンノミゾウ*Curculio jota* Fabricius, Mant. I: 110, 1787 (Europe).

分布: 北海道, 本州, 九州, シベリヤ, ヨーロッパ.

**jozamus** Kôno キンケノミゾウ*Orchestes jozamus* Kôno, Ins. Mats. V: 27, 1930 (Sapporo, Jozankei).

分布: 北海道, 本州.

**mumon** Kôno ムモンノミゾウ*Orchestes mumon* Kôno, Ins. Mats. V: 24, 1930 (Sachalin).

分布: 北海道, 本州, 千島, 樺太.

**mutabilis** Boheman =レノミゾウ*Orchestes mutabilis* Boheman, Gen. Sp. Curc. VII (2): 372, 1843 (Siberia).=*Orchestes variegatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 166, 1874 (Japon).

分布: 北海道, 樺太, シベリヤ.

**nomizo** Kôno マダラノミゾウ*Orchestes nomizo* Kôno, Ins. Mats. V: 26, 1930 (Sachalin, Sapporo, Chuzenji).

分布: 北海道, 本州, 樺太, 中国.

**salicis** Linné ヤナギノミゾウ*Curculio salicis* Linné, Syst. Nat., ed. X: 381, 1758 (Europe).

分布：北海道，本州，千島，樺太，シベリヤ，ヨーロッパ。

**sanguinipes** Roelofs アカアシノミゾウ*Orchestes sanguinipes* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 165, 1874 (Japon).*Orchestes sanguinipes* var. *nigripes* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 635, 1920.*Orchestes sanguinipes* var. *mixtus* Hustache, l. c.: 635.

分布：本州，四国，九州。

**spinus** Hustache ウスモンノミゾウ*Orchestes spinus* Hustache, l. c.: 634 (Mt. Takao près Hachioji, Gifu).

分布：本州，四国，九州。

**stigma** Germar クロノミゾウ*Salix stigma* Germar, Mag. IV: 334, 1805 (Europe).

分布：北海道，本州，樺太，シベリヤ，ヨーロッパ。

**takabayashii** Kôno ムネスジノミゾウ*Orchestes takabayashii* Kôno, Ins. Mats. V: 25, 1930 (Takao).

分布：本州，四国，九州。

**rusci** Herbst シロオビノミゾウ*Curculio rusci* Herbst, Käfer VI: 424, pl. 93, f. 6, 1795 (Europe).

分布：北海道，樺太，シベリヤ，ヨーロッパ。

**Rhamphus** Clairville, 1798**pullus** Hustache リンゴノミゾウ*Rhamphus pullus* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 635, 1920 (Chuzenji, Tokio).

分布：北海道，本州，四国，九州，千島，中国。

**hisamatsui** Chûjô et Morimoto ハチジョウノミゾウ*Rhamphus hisamatsui* Chûjô et Morimoto, Ent. Rev. Japan XI: 4, 1960 (Hachijô).

分布：八丈島。

**Orchestoides** Roelofs, 1875**deciptens** Roelofs クチアトノミゾウ*Orchestoides deciptens* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 192, 1875 (Japon).

分布：九州，中国。

**Tribe Dinorrhopalini****Dinorrhopala** Pascoe, 1860=*Togezo* Kôno, 1930**takahashii** Kôno クカハシトゲゾウ

*Tozeo takahashii* Kôno, Ins. Mats. V: 3, 1930 (Tokio).

分布：本州，四国，九州。

*Ixalma* Pascoe, 1871  
= *Celia* Roelofs, 1874

Voss, Ent. Blätt. 41-44 : 163-164, 1948 (Key to species).

Morimoto, Ins. Mats. 23: 46-51, 1960 (Revision of Japanese species).

*dentipes* Roelofs コブノコギリゾウ

*Celia dentipes* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 127, 1874 (Yango, sur la côte nord-ouest de Nippon).

= *Ixalma klapperichi* Voss, Ent. Blätt. 41-44: 162, 1948 (Fukien).

分布：本州，四国，九州，中国。

*guttulum* Kôno シミノコギリゾウ

*Ixalma guttulum* Kôno, Ins. Mats. II: 169, 1928 (Formosa).

分布：九州，台湾。

*hilleri* Roelofs サビノコギリゾウ

*Ixalma hilleri* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend.: 54, 1879 (Japan).

分布：本州，四国，九州，奄美大島。

*nigriventris* Kôno ヘラダロノコギリゾウ

*Ixalma nigriventris* Kôno, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. XV: 31, 1937 (Tosa).

分布：本州，四国。

*okadal* Kôno オカダノコギリゾウ

*Ixalma okadal* Kôno, l. c.: 30 (Mt. Taisen, Mt. Takao).

分布：本州，九州。

*quadrigibbosa* Morimoto ヨツコブノコギリゾウ

*Ixalma quadrigibbosus* Morimoto, Ins. Mats. 23: 48, 1960 (Hirakura in Mie, Gokurakuji in Hiroshima, Hikosan, Mt. Fukuchi).

分布：本州，九州。

Subfamily CEUTHORRHYNCHINAE サルゾウムシ亜科

Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXV: 107-144, 1916 (Key & descriptions of Japanese species).

#### Tribe Oorbitini

*Oorbitis* Germar, 1824

*apicalis* Kôno タマサルゾウ

*Oorbitis apicalis* Kôno, Ins. Mats. X: 60, 1935 (Is. Etorofu).

分布：北海道，本州，千島。

Tribe Hypurini

*Hypurus* Rye, 1882

**bertrandi** Perris スベリビユサルゾウ

*Ceuthorhynchus Bertrandi* Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1852: 183, 1852 (France).

分布：九州，ヨーロッパ，ハワイ。

Tribe Scleropterini

*Rhytidosoma* Stephens, 1831

**weisei** Faust マルバネサルゾウ

*Rhytidosomus Weisei* Faust, Oefv. Finsk. Vet. Osc. XXX: 98, 1890 (Abakanski Sawad, Kasan, Samara).

分布：本州，シベリヤ。

Tribe Rhinoncini

Wagner, Ent. Blätt. 35: 31-58, 59-90, 185-208, 241-252, 273-291, 1939; 36: 65-81, 97-111, 1940 (Monograph of Palaearctic species).

*Phytobius* Schönherr, 1836

**canaliculatus** Fähræus クロホシサルゾウ (新称)

*Phytobius canaliculatus* Fähræus, Gen. Sp. Curc. 7 (2): 347, 1843 (Europe).

分布：本州，シベリヤ，ヨーロッパ。

**friebi** Wagner フリープサルゾウ

*Phytobius (Phytobius) friebi* Wagner, Ent. Blätt. 35: 71, 1939 (Wladivostock, Transbaikal).

分布：本州，東シベリヤ。

**japonicus** Roelofs ヤマトサルゾウ (新称)

*Phytobius japonicus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 180, 1875 (Japan).

分布：日本。

**quadricornis roelofsi** Hustache マルメサルゾウ

*Phytobius quadricornis* var. *Roelofsi* Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXV: 113, 1916 (Kobe).

分布：本州，ウスリー。

**quadrituberculatus** Fabricius メダカサルゾウ

*Phytobius quadrituberculatus* Fabricius, Mant. Ins. I: 100, 1787 (Europe).

分布：北海道，本州，ヨーロッパ，シベリヤ。

**waltoni** Boheman ワルトンサルゾウ (新称)

*Phytobius Waltoni* Boheman, Gen. Sp. Curc. 7 (2): 435, 1843 (Europe).

分布：本州，シベリヤ，ヨーロッパ。

*Rhinoncomimus* Wagner, 1940

**niger** Chûjô et Morimoto クロクテプトサルゾウ (新称)



*Rhinoncominus niger* Chûjô et Morimoto, Kontyû 27: 154, 1959 (Shimokita, Sendai, Echigo).

分布：本州.

**Rhinoncus Stephens, 1831**

**bruchoides** Herbst エゾクテプトサルゾウ (新称)

*Curculiobruchoides* Herbst, in Flüßly, Arch. Insectengesch. VI: 85, 1784 (Europe).

分布：北海道, シベリヤ, ヨーロッパ.

**cribricollis** Hustache キアシクテプトサルゾウ

*Rhinoncus cribricollis* Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXV: 111, 1916 (Yumoto, Tokio, Kioto).

= *Rhinoncus uchidai* Kôno, Ins. Mats. X: 60, 1935 (Is. Kunashiri).

分布：本州, 千島.

**jakovlevi** Faust ギシギシクテプトサルゾウ

*Rhinoncus jakovlevi* Faust, Deut. Ent. Zschr. 1893: 205, 1893 (Irkutsk, Amur).

= *Rhinoncus pericarpus* Roelofs (nec Linné), Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 180, 1875 (Japon).

分布：本州, 四国, 九州, 東シベリヤ.

**pericarpus** Linné オオクテプトサルゾウ (新称)

*Curculio pericarpus* Linné, Syst. Nat., ed. X: 380, 1758 (Europe).

分布：ヨーロッパ, シベリヤ, 日本 (Wagner による).

**perpendicularis** Reich コブナシクテプトサルゾウ (新称)

*Curculio perpendicularis* Reich, Mant. Ins.: 10, 1797 (Europe).

分布：本州, 四国, 九州, ヨーロッパ, シベリヤ.

**sibiricus** Faust タデノクテプトサルゾウ

*Rhinoncus sibiricus* Faust, Deut. Ent. Zschr. 1893: 205, 1893 (Irkutsk).

= *Rhinoncus pyrrhopus* Hustache (nec Boheman), Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 110, 1916 (Tokio).

= *Rhinoncus sulcipennis* Schultze, Deut. Ent. Zschr. 1898: 233, 1898 (Nipon).

分布：北海道, 本州, 四国, 九州, 奄美大島, 台湾.

**Tribe Mecysmoderini**

**Mecysmoderes Schönherr, 1837**

**ater** Hustache チャイロトゲムネサルゾウ (新称)

*Mecysmoderes ater* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 124, 1916 (Nikko, Kioto).

分布：本州, 四国, 九州.

**brevicarinatus** Hustache キオビトゲムネサルゾウ (新称)

*Mecysmoderes brevicarinatus* Hustache, l. c.: 124 (Kumanotaira).

分布：北海道, 本州.

**fulvus** Roelofs ツツジトゲムネサルゾウ

*Mecysmoderes fulvus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 179, 1875 (Japon).

分布：本州，四国，九州，中国。

**japonicus** Pic キボントゲムネサルゾウ（新称）

*Mecysmoderes japonicus* Pic, Mélang. exot. -ent. XIX: 13, 1916 (Japon)

分布：本州，九州。

**lesnei** Hustache クロオビトゲムネサルゾウ（新称）

*Mecysmoderes Lesnei* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 124, 1916 (Mt. Kin-kazan près Gifu).

分布：本州，九州。

### Tribe Ceuthorrhynchini

#### Craponius Leconte, 1876

**bigibbosus** Hustache ジュウジコブサルゾウ

*Craponius bigibbosus* Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXV: 119, 1916 (Mt. Takao près Hachioji, Kumanotaira près Karuizawa, Alpes de Sasago près Kofu, Yuyama, Subashiri).

= *Phytobiotomorphus alternanus* Voss, Decheniana, Beihefte 5: 65, 1958 (Fukien).

分布：本州，四国，九州，中国。

#### Cyphosenus Schultze, 1899

**bouvieri** Hustache トゲカタピロサルゾウ

*Cyphosenus Bouvieri* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 120, 1916 (Environ de Tokio, Alpes de Nikko, Chuzenji, Kumanotaira).

分布：本州，九州。

**grouvellei** Hustache グルーベルカタピロサルゾウ（新称）

*Cyphosenus Grouvellei* Hustache, l. c.: 121 (Kioto).

分布：本州。

**sasakii** Chûjô ササキカタピロサルゾウ（新称）

*Cyphosenus sasakii* Chûjô, Trans. Shikoku Ent. Soc. 6: 52, 1959 (Mt. Kirishima).

分布：九州。

**similis** Chûjô ツルギカタピロサルゾウ（新称）

*Cyphosenus similis* Chûjô, l. c.: 49 (Mt. Tsurugi in Awa, Monobe-mura in Tosa).

分布：四国。

#### Zacladus Reitter, 1912

= *Allodactylus* Weise, 1883

Schultze, Münch. Kol. Zschr. I: 174—176, 1902 (Revision).

**transversicollis** Faust トゲトゲクロサルゾウ（新称）

*Allodactylus transversicollis* Faust, Horae Soc. Ent. Ros. XXVIII: 174, 1894 (Kurtymaldy in Issyk-kul).

分布：本州，シベリヤ。

**Homorosoma Frivaldsky, 1893**

Wagner, Ent. Blätt. XL: 97-124, 1944 (Monograph).

**asper** Roelofs タデサルゾウ*Ceuthorrhynchus asper* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 177, 1875 (Japon).

分布：北海道，本州，四国，九州，アムール，中国。

**aterrimus** Hustache コトゲトゲサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus aterrimus* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 138, 1916 (Kioto).

分布：本州。

**Micrelus Thomson, 1865****excavatus** Hustache アカアシサルゾウ (新称)*Micrelus excavatus* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 128, 1916 (Mt. Kinokazan près Gifu, Nagasaki).

分布：本州，九州。

**Ceuthorrhynchus Germar, 1824****ancora** Roelofs オオシロモンサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus ancora* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 177, 1875 (Japon)

分布：北海道，本州，四国。

**carinulatus** Faust スジサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus (Nedyus) carinulatus* Faust, Deut. Ent. Zschr. XXXI: 177, 1887 (Chabarofsk).

分布：日本，アムール。

**costatus** Hustache クロツヤサルゾウ*Ceuthorrhynchus costatus* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 139, 1916 (Mt. Ibuki).

分布：本州。

**diffusus** Hustache ミドリサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus diffusus* Hustache, Col. Cat. 113 *Ceuthorrhynchinae*: 58, 1930 (new name for *difficilis* Hustache).=*Ceuthorrhynchus difficilis* Hustache (nec Schultze), Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 142, 1916 (Japon).

分布：四国，九州。

**harmandi** Hustache アルマンサルゾウ (新称)*Ceuthorrhynchus Harmandi* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 141, 1916 (Kumanotaira près Karuizawa, Mt. Takao près Hachioji, Subashiri, Suyama, Kobe, Miyanoshta).

分布：本州。

**ibukianus** Hustache アオバネサルゾウ (新称)

- Ceuthorrhynchus ibukianus* Hustache, *l. c.*: 143 (Environ de Tokio, Alpes de Nikko, Mt. Ibuki).  
 分布：本州，四国，九州。
- lewisii** Hustache リュイスサルゾウ (新称)  
*Ceuthorrhynchus Lewisii* Hustache, *l. c.*: 136, (Nikko).  
 分布：本州。
- nipponensis** Hustache シロオビサルゾウ (新称)  
*Ceuthorrhynchus nipponensis* Hustache, *l. c.*: 141 (Chuzenji).  
 分布：本州。
- rubripes** Hustache アササルゾウ  
*Ceuthorrhynchus rubripes* Hustache, *l. c.*: 134 (Kioto).  
 分布：本州。
- sulcithorax** Hustache ムネミゾサルゾウ (新称)  
*Ceuthorrhynchus sulcithorax* Hustache, *l. c.*: 135 (Japon moyen).  
 分布：本州。
- virgatus** Gyllenhal ジュウジサルゾウ (新称)  
*Ceutorhynchus virgatus* Gyllenhal, *Gen. Sp. Curc. IV(1)*: 568, 1837 (Southern Russia).  
 分布：日本，シベリヤ，コーカサス，トルケスタン。  
**Coeliodes** Schönherr, 1837
- babai** Voss et Chûjô ババアカサルゾウ (新称)  
*Coeliodes babai* Voss et Chûjô, *Nipponius 1 (3)*: 1, 1960 (Kurokawa in Niigata Pref.).  
 分布：本州。
- brunneus** Hustache チャイロアカサルゾウ (新称)  
*Coeliodes brunneus* Hustache, *Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV*: 117, 1916 (Mt. Ibuki près Gifu).  
 分布：本州。
- galloisi** Hustache ガロアカサルゾウ (新称)  
*Coeliodes Galloisi* Hustache, *l. c.*: 116 (Alpes de Nikko, Chuzenji, Mt. Ibuki, Environ de Tokio).  
 分布：本州。
- nakanoensis** Hustache オビアカサルゾウ (新称)  
*Coeliodes nakanoensis* Hustache, *l. c.*: 115 (Environ de Tokio, Mt. Takao près Hachioji).  
 分布：本州。
- parcesquamosus** Hustache ツヤアカサルゾウ (新称)  
*Coeliodes parcesquamosus* Hustache, *l. c.*: 115 (Environ de Tokio).  
 分布：本州。

**setifer** Schultze ケアカサルゾウ (新称)

*Coeliodes setifer* Schultze, Deut. Ent. Zschr. 1898: 225, 1898 (Japan).

分布: 本州.

**Cidnorhinus** Thomson, 1865

**quadrinaculatus** Linné ヨツホシムネミゾサルゾウ (新称)

*Curculio quadrinaculatus* Linné, Syst. Nat., ed. X: 380, 1758 (Europe).

分布: 北海道, シベリヤ, ヨーロッパ.

**Ceuthorrhynchidius** J. du Val, 1854

Schultze, Münch. Kol. Zschr. III: 1-10, 1906 (Revision).

**hypocritus** Hustache キイチゴトゲサルゾウ

*Ceuthorrhynchidius hypocrita* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 126, 1916  
(Kumanotaira, Mt. Takao, Asakarawa petit près Hachioji, Nikko, Miyanoshita, Kyoto).

分布: 本州, 四国, 九州.

**Calosirus** Thomson, 1865

= *Sirocalus*, Heyden, 1906

**albosuturalis** Roelofs ダイコンサルゾウ, ナタネサルゾウ

*Ceutorhynchidius albosuturalis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 178, 1875  
(Japan).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, 中国.

**umbrinus** Hustache ケマンサルゾウ (新称)

*Ceuthorrhynchus (Sirocalus) umbrinus* Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV: 131,  
1916 (Fukushima).

分布: 本州, 九州.

Subfamily BARINAE ヒメゾウムシ亜科

Reitter, Best. Tab. eur. Kol. 33 Curculionidae III, Coryssomerini, Barini, 31 pp. 1895.

**Centrinopsis** Roelofs, 1875

**nitens** Roelofs ツヤチビヒメゾウ

*Centrinopsis nitens* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 185, 1872 (Japan).

分布: 本州, 四国, 九州, 中国.

**Barinomorphus** Morimoto, MS.

**antennatus** Morimoto, MS. ヒシガタヒメゾウ (新称)

分布: 九州.

**Barinomorphoides** Morimoto, MS.

**similaris** Morimoto, MS. セヒシガタヒメゾウ (新称)

分布: 四国, 九州.

## Baris Germar, 1824

Voss, *Senckenbergiana*, 19: 267-270, 1937 (Key to Chinese species).

Zaslavskij, *Trud. Vc. Ent. Ob.* 45: 343-374, 1956 (Monograph of Russian species).

**armipes** Roelofs トゲアシヒメゾウ (新称)

*Baris armipes* Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVIII: 183, 1875 (Japon).

分布：九州。

**deplanata** Roelofs クワヒメゾウ

*Baris deplanata* Roelofs, *l. c.*: 183 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**dispilota** Solsky シラホシヒメゾウ

*Baridius dispilota* Solsky, *Horae Soc. Ent. Ross.* VI: 312, 1870 (Siberie orientale).

分布：九州 (久住山)，朝鮮，中国，満洲。

**dispilota** Solsky f. *davidi* Fairmaire.

*Baridius davidi* Fairmaire, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (5) VIII: 127 (Chine centrale).

= *Baridius Reini* Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XXII, *Compt. Rend.*: liv. 1879 (Aburasaka zwischen den Prov. Mino und Echizen).

分布：北海道，本州，四国，九州，中国，シベリヤ。

**ezoana** Kôno エゾヒメゾウ

*Baris ezoana* Kôno, *Ins. Mats.* XIV: 78, 1940 (Hokkaido).

分布：北海道。

**flavosignata** Roelofs ヨツボシヒメゾウ (新称)

*Baris flavosignata* Roelofs, *Deut. Ent. Zschr.* XXIII: 301, 1879 (Japon).

分布：本州，九州。

**maculata** Roelofs チャイロヒメゾウ (新称)

*Baris maculata* Roelofs, *l. c.*: 299 (Japon).

分布：本州，九州。

**maritima** Roelofs ウミベヒメゾウ (新称)

*Baris maritima* Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVIII: 181, 1875 (Japon, au bord de la mer).

分布：四国，九州。

**menthae** Kôno ハッカヒメゾウ

*Baris menthae* Kôno, *Kontyû* XI: 316, 1937 (Okayama).

分布：本州。

**nipponica** Kôno サメハダヒメゾウ

*Baris nipponicus* Kôno, *Ins. Mats.* II: 174, 1928 (Shimauchi in Nagano)

分布：本州，九州。

**orientalis** Roelofs マダラヒメゾウ

*Baris orientalis* Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVIII: 184, 1875 (Japon, Hong-Kong).

分布：本州，四国，九州，中国。

**pilosa** Roelofs オオハッカヒメゾウ

*Baris pilosa* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 182, 1875 (Japan).

分布：本州，九州。

**rubricata** Hustache クテスジアカヒメゾウ

*Baris rubricata* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXVI: 84, 1921 (Kioto).

分布：本州，九州。

#### **Didthis** Zaslavskij, 1956

**melancholica** Roelofs ツヤケシヒメゾウ

*Baris melancholica* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 181, 1875 (Japan).

分布：北海道，本州，四国，九州。

#### **Pseudorhyssematus** Morimoto, MS.

**rufitarsis** Roelofs ツヤハダヒメゾウ (新称)

*Rhyssematus* (?) *rufitarsis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 159, 1875 (Japan).

分布：本州，九州。

#### **Limnobaris** Bedel, 1885

**jucunda** Reitter スゲノハラジロヒメゾウ (新称)

*Limnobaris jucunda* Reitter, Wien. Ent. Zttg. XXIX: 202, 1910 (Ussuri).

分布：北海道，本州，ウスリー。

#### **Keibaris** Chôjô, 1960

**babai** Chôjô ババオオヒメゾウ (新称)

*Keibaris babai* Chôjô, Niponius I (5): 1, 1960 (Tsushima).

分布：対馬。

#### **Aparallelodemas** Morimoto, 1961

**foveipennis** Morimoto キンケツツヒメゾウ (新称)

*Aparallelodemas foveipennis* Morimoto, Kontyû 29: 23, 1961 (Amami-Oshima, Tsushima, Kuroson, Is. Miyake, Formosa).

分布：本州，四国，九州，奄美大島，三宅島，台湾。

#### Subfamily ZYGOPINAE クモゾウムシ亜科

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII: 198-222, 258-266, 2pls., 1871 (East-asian species)

Heller, Abh. Ber. König Zool. Anthr.-Ethonograph. Mus. Dresden, No. 2: 1-48, 1 pl., 1893; No. 11: 1-70, 1 pl., 1895 (Genera).

Hustache, Soc. Ent. France, Livre Cent.: 369-380, 1932 (Key to tribes and genera of Africa).

#### Tribe Lobotrachelini

Morimoto, Ins. Mats. 22: 15-21, 1958 (Japanese species).

**Metetra Pascoe, 1873****esakii** Morimoto エサキヒシガタクモゾウ (新称)*Metetra esakii* Morimoto, *Ins. Mats.* 22: 16, 1958 (Satanomisaki, Amakusa).

分布：九州。

**Lobotrachelus Schönherr, 1838****montanus** Morimoto ミヤマヒシガタクモゾウ (新称)*Lobotrachelus montanus* Morimoto, *Ins. Mats.* 22: 19, 1958 (Mt. Hakusan, Mt. Tateyama, Shimashimadani, Shirahone, Mt. Ishizuchi, Mt. Hiko).

分布：本州，四国，九州。

**tosanus** Morimoto トサヒシガタクモゾウ (新称)*Lobotrachelus tosanus* Morimoto, *l. c.*: 20 (Kôchi).

分布：四国。

**Tribe Sphadasmini****Nipponosphadasmus Morimoto, 1959****coxalis** Morimoto ダルマクモゾウ (新称)*Nipponosphadasmus coxalis* Morimoto, *Akitu VIII*: 40, 1959 (Mt. Tebako, Omogo).

分布：四国。

**yanoi** Morimoto ヤノダルマクモゾウ (新称)*Nipponosphadasmus yanoi* Morimoto, *l. c.*: 42 (Misakatoge near Matsuyama).

分布：四国。

**Tribe Isorhynchini**Morimoto, *Kontyû* 28: 110-115, 177-183, 1960 (Japanese species).**Macrotelephae Morimoto, 1960****ichihashii** Morimoto オオヒメクモゾウ (新称)*Macrotelephae ichihashii* Morimoto, *Kontyû* 28: 114, 1960 (Mie).

分布：本州。

**Kumozo Morimoto, 1960****ishikawai** Morimoto イシカワクモゾウ (新称)*Kumozo ishikawai* Morimoto, *l. c.*: 111 (Kamikochi).

分布：本州。

**Podeschrus Roelofs, 1875****signatus** Roelofs キュウシュウヒメクモゾウ (新称)*Podeschrus signatus* Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVIII: 176, 1875 (Japan).

分布：九州。

**Ellatocerus Schönherr, 1874****japonicus** Morimoto ヤマトヒメクモゾウ (新称)



*Ellatocerus japonicus* Morimoto, Kontyû 28 : 112, 1960 (Shimokita, Nikko, Masutomi).

分布：本州.

**Telephae Pascoe, 1870**

**insularis** Morimoto ヤクシマヒメクモゾウ (新称)

*Telephae insularis* Morimoto, Kontyû 28 : 182, 1960 (Yakushima, Nakanoshima).

分布：屋久屋, 中ノ島.

**kimotoi** Morimoto キモトヒメクモゾウ (新称)

*Telephae kimotoi* Morimoto, l. c. : 181 (Mt. Tebako, Shirahone).

分布：本州, 四国.

**matsudai** Morimoto マツダヒメクモゾウ (新称)

*Telephae matsudai* Morimoto, l. c. : 178 (Amami-Oshima).

分布：奄美大島.

**murakamii** Morimoto ムラカミヒメクモゾウ (新称)

*Telephae murakamii* Morimoto, l. c. : 179 (Ashoro, Shimokita, Hakusan).

分布：北海道, 本州.

**tebakosanus** Morimoto テバコヒメクモゾウ (新称)

*Telephae tebakosanus* Morimoto, l. c. : 180 (Mt. Tebako).

分布：四国.

**trifasciatus** Morimoto ミツオビヒメクモゾウ (新称)

*Telephae trifasciatus* Morimoto, l. c. : 179 (Shimokita, Kajigamori, Omogo, Mt. Hiko).

分布：本州, 四国, 九州.

**Tribe Othippiini**

**Egiona Pascoe, 1874**

= *Apiophorus* Roelofs, 1875. - syn. nov.

**fasciata** Voss オビタマクモゾウ (新称)

*Apiophorus fasciatus* Voss, Ent. Blätt. LI : 32, 1955 (Fukien).

分布：九州, 中国.

**minor** Hustache チビタマクモゾウ (新称)

*Apiophorus minor* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1921 : 93, 1921 (Kumano-taira près Karuizawa).

分布：本州.

**picta** Roelofs クロホシタマクモゾウ (新称)

*Apiophorus pictus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII : 173, 1875 (Japon).

分布：本州, 九州.

## Tribe Mecopini

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) VII: 194, 1941 (Key to *Phylaitis* allied genera).

**Mecopomorphus** Hustache, 1920

**griseus** Hustache ノコギリクモゾウ (新称)

*Mecopomorphus griseus* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXVI: 636, 1920  
(Chuzenji, Environ de Tokio, Alpes de Nikko).

分布：北海道，本州，四国，九州。

**Neomecopus** Hustache, 1921

**subarmatus** Hustache シラフクモゾウ

*Neomecopus subarmatus* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXVII: 92, 1921  
(Ibuki près Gifu).

分布：本州，九州。

**Phylaitis** Pascoe, 1871

**maculiventris** Voss ツノクモゾウ (新称)

*Phylaitis maculiventris* Voss, Decheniana, Beihefte 5: 59, 1958 (Fukien).

分布：本州，九州，中国。

## Tribe Coryssomerini

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) IV: 1—32, 1939 (Generic revision).

**Euryommatus** Roger, 1857

Zumpt, Ent. Blätt. 33: 28, 1937 (Key to species).

**kanoi** Zumpt コウノクモゾウ (新称)

*Euryommatus kanoi* Zumpt, Ent. Blätt. 33: 25, 1937 (Sapporo).

分布：北海道，本州。

**mariae** Roger マリアクモゾウ

*Euryommatus Mariae* Roger, Stett. Ent. Ztg. XVIII: 61, 1857 (Sibirien).

分布：北海道，シベリヤ，ヨーロッパ。

**Metialma** Pascoe, 1871

**cordata** Marshall トゲハラヒラセクモゾウ (新称)

*Metialma cordata* Marshall, Novit. Zool. 42: 451, 1948 (Burma).

分布：本州，九州，中国，ビルマ。

**japonica** Hustache ヤマトヒラセクモゾウ (新称)

*Metialma japonica* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XXVII: 92, 1921 (Chuzenji, Kumanotaira près Karuizawa).

分布：本州，九州，満州。

**pusilla** Roelofs コヒラセクモゾウ (新称)

*Metialma pusilla* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 175, 1875 (Japon).

分布：本州，九州。

**signifera** Pascoe ヒラセクモゾウ

*Metialma signifera* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VII: 218, note, 1871 (Hong-Kong).

分布：九州，中国。

Subfamily CURCULIONINAE シギゾウムシ亜科

Heller, Stett. Ent. Ztg. 86: 86-134, 1925; 88: 175-287, 2pls., 1927 (Genera; Key to species of *Timola*, *Pseudobalaninus*, *Ergania*; descriptions of many new species).

**Curculio** Linné, 1758

= *Balaninus* Germar, 1817

Morimoto, Mushi 33: 89-104, 1960; 36: in press (Revision of Japanese species).

**aino** Kôno アイノシギゾウ

*Balaninus aino* Kôno, Ins. Mats. V: 15, 1930 (Kurile Isls., Jozankei).

分布：北海道，本州，四国，千島。

**alboscuteatus** Roelofs シロモンシギゾウ (新称)

*Balaninus alboscuteatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 159, 1874 (Kagoshima, Yokohama).

分布：本州，九州，台湾，中国。

**albovittatus** Kôno シラホンチビシギゾウ

*Balaninus albovittatus* Kôno, Ins. Mats. V: 18, 1930 (Sachalin).

分布：北海道，樺太。

**amabilis** Morimoto, in press ネジロチビシギゾウ (新称)

分布：九州。

**antennatus** Kôno ムモンチビシギゾウ

*Balaninus antennatus* Kôno, Ins. Mats. V: 18, 1930 (Garugawa in Hokkaido).

分布：北海道。

**arakawai** Matsumura et Kôno コナラシギゾウ，ウスイロシギゾウ，アラカワシギゾウ

*Balaninus arakawai* Matsumura et Kôno, Ins. Mats. II: 171, 1928 (Iyo),  
= *Balaninus quercivorus* Kôno, l. c.: 172 (Sapporo).  
= *Balaninus shigizo* Kôno, i. c.: 171 (Iyo, Tosa).

分布：北海道，本州，満州。

**camelliae** Roelofs ツバキシギゾウ

*Balaninus camelliae* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 157, 1874 (Japon).

分布：本州，四国，九州，朝鮮 (?)

**cerasorum** Paykull キマダラシギゾウ

*Curculio cerasorum* Paykull, Monogr. Curc. Suec. 22, 1792 (Sweden).

分布：北海道，本州，九州，ヨーロッパ，アルゼリヤ。

**chibi** Kôno チビシギゾウ

- Balaninus chibi* Kôno, Ins. Mats. V: 17, 1930 (Sapporo, Moiwa).  
分布：北海道。
- conjugaris** Faust ニセコナラシギゾウ (新称)  
*Balaninus conjugaris* Faust, Deut. Ent. Zschr. XXVI: 278, 1882 (Amur).  
分布：本州, 九州, アムール。
- convexus** Roelofs セダカシギゾウ  
*Balaninus convexus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 161, 1874 (Japon).  
分布：本州, 四国, 九州。
- dentipes** Roelofs クリシギゾウ  
*Balaninus dentipes* Roelofs, l. c.: 156 (Japon).  
分布：北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, シベリヤ。
- dieckmanni** Faust デークマンシギゾウ (新称)  
*Balaninus Dieckmanni* Faust, Deut. Ent. Zschr. XXXI: 178, 1887 (Amur).  
分布：日本 (Heller, 1927 による), アムール。
- distinguendus** Roelofs クロシギゾウ  
*Balaninus distinguendus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 156, 1874 (Japon).  
= *Balaninus takabayashii* Kôno, Ins. Mats. II: 172, 1928 (Takao, Towada).  
分布：本州, アムール。
- elaeagni** Morimoto, in press ナツグミシギゾウ  
分布：本州, 四国, 九州。
- esakii** Morimoto, in press エサキチビシギゾウ (新称)  
分布：本州, 九州。
- flavescens** Roelofs キオピシギゾウ  
*Balaninus flavescens* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 160, 1874 (Japon).  
分布：北海道, 本州, 朝鮮。
- flavoscutellatus** Roelofs モンキシギゾウ  
*Balaninus flavoscutellatus* Roelofs, l. c.: 160 (Nagasaki).  
= *Curculio modestus* Voss, Mitt. Münch. Ent. Ges. 1941: 898, 1941 (Beppu).  
分布：本州, 四国, 九州。
- fluvipennis** Morimoto チャバネセダカシギゾウ (新称)  
*Curculio fluvipennis* Morimoto, Mushi 35: 101, 1960 (Nikko, Daisen, Tsurugisan, Sobosan, Hikosan).  
分布：本州, 四国, 九州。
- funebri** Roelofs イスビワシギゾウ  
*Balaninus funebri* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 159, 1874 (Japon).  
= *Balaninus (Balanobius) clavatus* Faust, Deut. Ent. Zschr. XXVI: 278, 1882 (Japan).  
分布：本州, 四国, 九州。
- hachijoensis** Morimoto, in press ハチジョウシギゾウ (新称)

分布：八丈島。

**hime Kôno** ヒメシギゾウ

*Balaninus hime* Kôno, Ins. Mats. V: 15, 1930 (Shimauchi in Nagano).

分布：本州，四国，九州。

**ichihashi Morimoto, in press** イチハシシギゾウ (新称)

分布：本州。

**iwasakii Matsumura et Kôno** イワサキシギゾウ

*Balaninus iwasakii* Matsumura et Kôno, Ins. Mats. II: 170, 1928 (Is. Ishigaki).

分布：九州，石垣島。

**kamiyai Morimoto, in press** カミヤチビシギゾウ (新称)

分布：九州。

**kimotoi Morimoto** キモトシギゾウ (新称)

*Curculio kimotoi* Morimoto, Mushi 33: 94, 1960 (Cape Sata, Mt. Kirishima).

分布：九州。

**kojimai Morimoto** コジマシギゾウ (新称)

*Curculio kojimai* Morimoto, l. c.: 99 (Kuroson).

分布：四国，九州。

**koreanus Heller** ミヤマシギゾウ

*Balaninus koreanus* Heller, Stett. Ent. Ztg. 88: 181, 1927 (Wladivostock).

分布：本州，四国，ウスリー。

**kunugi Morimoto, in press** クヌギチビシギゾウ (新称)

分布：本州，四国，九州。

**kurosawai Morimoto, in press.** クロサワシギゾウ (新称)

分布：本州。

**maculanigra Roelofs** クロホシシギゾウ

*Balaninus macula-nigra* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 154, 1874 (Japan).

分布：四国，九州。

**minutissimus Dalla Torre et Schenkling** ウスモンチビシギゾウ

*Curculio minutissimus* Dalla Torre et Schenkling, Col. Cat. 123. Curculioninae: 15, 1932 (new name for *minimus* Kôno).

= *Balaninus minimus* Kôno (nec Rey), Ins. Mats. V: 16, 1930 (Mt. Fuji).

分布：本州，四国，九州。

**miyatakei Morimoto** ミヤタケシギゾウ (新称)

*Curculio miyatakei* Morimoto, Mushi 33: 100, 1960 (Mt. Tsurugi).

分布：四国。

**murakamii Morimoto, in press** ムラカミチビシギゾウ (新称)

分布：北海道，本州。

**parasiticus Morimoto, in press** ヤドリシギゾウ (新称)

分布：北海道.

**pictus** Roelofs ジュウジチビシギゾウ

*Balaninus pictus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 161, 1874 (Japan).

分布：本州，四国，九州，朝鮮.

**robustus** Roelofs ナラシギゾウ

*Balaninus robustus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 155, 1874 (Nagasaki).

= *Balaninus transversalis* Faust, Deut. Ent. Zschr. 1860: 261, 1890 (Pekin).

分布：本州，九州，中国.

**roelofsi** Heller レロフチビシギゾウ

*Balaninus roelofsi* Heller, Stett. Ent. Ztg. 88: 275, 1927 (new name for *crucifer* Roelofs).

= *Balaninus crucifer* Roelofs (nec Fuchs), Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 162, 1874 (Yokohama).

分布：北海道，本州，四国，九州.

**styracis** Roelofs エゴシギゾウ

*Balaninus styracis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 157, 1874 (Nagasaki).

分布：本州，九州.

**tigrinus** Morimoto ビゲプトシギゾウ (新称)

*Curculio tigrinus* Morimoto, Mushi 33: 103, 1960 (Mt. Hiko, Cape Sata, Is. Tanegashima).

分布：本州，四国，九州，種ヶ島.

**ussuriensis** Heller ウスリーシギゾウ (新称)

*Balaninus ussuriensis* Heller, Stett. Ent. Ztg. 88: 181, 1927 (Ussuri).

分布：九州，ウスリー.

**yanoi** Morimoto, in press ヤノシギゾウ

分布：四国，九州.

#### Subfamily TYCHINAE コガタゾウムシ亜科

#### Tribe Tychini

#### *Tychius* Schönherr, 1826

Kôno, Ins. Mats. IV: 145-146, 1930 (Revision of Japanese species).

Franz, Arb. morph. tax. Ent. Dahlem 6: 341-349, 1939; 7: 17-32, 1940; 9: 104-133, 182-205, 242-266, 1942 (Revision of Palearctic species).

**ginsuji** Kôno ギンスジゾウ

*Tychius ginsuji* Kôno, Ins. Mats. V: 145, 1930 (Berg Ibuki in Omi).

分布：本州.

**iwatensis** Kôno オオギンスジゾウ

*Tychius iwatensis* Kôno, l. c.: 146 (Iwate).

分布：本州.

**ovalis** Roelofs コギンスジゾウ

*Tychius ovalis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 171, 1874 (Japon).

分布: 本州, 九州.

#### Tribe Demimacini

**Demimaea** Pascoe, 1870

= *Lychnuchus* Roelofs, 1874

Voss, Ent. Blätt. 33: 448-463, 1938 (Revision).

Kôno, Ins. Mats. XIII: 71-75, 1939 (Revision of Japanese species).

**circula** Roelofs マルモンササラゾウ

*Lychnuchus circula* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 170, 1874 (Japon).

分布: 本州, 四国, 九州.

**fascicularis** Roelofs タバゲササラゾウ

*Lychnuchus fascicularis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend.: liv, 1879 (Japon).

分布: 本州, 四国, 九州, 中国.

**mori** Kôno クワササラゾウ

*Demimaea mori* Kôno, Ins. Mats. XIII: 73, 1939 (Sapporo, Tokio).

分布: 北海道, 本州.

**okuboi** Kôno オオクボササラゾウ

*Demimaea okuboi* Kôno, l. c.: 74 (Kochi)

= *Demimaea okubana* Voss, Mitt. Münch. Ent. Ges. XXXIII: 222, 1943 (Insel Okuba (Tosa)). - syn. nov.

分布: 本州, 四国, 九州.

**tricolor** Roelofs ミイロササラゾウ

*Lychnuchus tricolor* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 170, 1874 (Nagasaki).

分布: 九州.

#### Tribe Endaeini

**Endaeus** Schönherr, 1826

**nipponicus** Voss et Chûjô アシプトゾウ (新称)

*Endaeus nipponicus* Voss et Chûjô, Nipponius I (3): 3, 1960 (Niigata).

分布: 本州.

**Gryphorhynchus** Roelofs, 1875

**obscurus** Roelofs ウスグロアシプトゾウ (新称)

*Gryphorhynchus obscurus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 189, 1875 (Japon).

分布: 本州, 四国, 九州.

**Endaenidius** Morimoto, MS.

**ikezakii** Morimoto, MS. イケザキアシプトゾウ (新称)

分布：九州。

**Eusynnada Heller, 1925**

**japonica** Roelofs, comb. nov. モンアシプトゾウ (新称)

*Minyrus japonicus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 163, 1874 (Japan).

分布：九州。

**Heterendaeus Morimoto, MS.**

**miyamotoi** Morimoto, MS. クロオビアシプトゾウ (新称)

分布：奄美大島。

**Sphixioides Voss et Chûjô, 1960**

= *Epidemimaea* Chûjô et Voss, 1960.

**koikei** Voss et Chûjô クロツブゾウ (新称)

*Sphixioides koikei* Voss et Chûjô, Niponius I (3): 7 (Niigata).

分布：本州, 四国, 九州。

**ihai** Chûjô et Voss ネジロツブゾウ (新称)

*Demimaea (Epidemimaea) ihai* Chûjô et Voss, Mem. Fac. Liberal Arts & Educ. Kagawa Univ. II (94): 7, 1960 (Is. Okinawa).

分布：九州, 沖縄。

**Sphinxus Roelofs, 1875**

**pubescens** Roelofs スフィンクスツブゾウ (新称)

*Sphinxus pubescens* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 190, 1875 (Japan).

分布：日本。

**Tribe Elleschini**

**Elleschus Stephens, 1831**

**bicoloripes** Voss et Chûjô ハモグリゾウムシ (新称)

*Elleschus bicoloripes* Voss et Chûjô, Niponius I (3): 9, 1960 (Niigata, Kochi).

分布：本州, 四国。

**pauper** Chûjô et Voss クロハモグリゾウムシ (新称)

*Ellatocerus pauper* Chûjô et Voss, Mem. Fac. Liberal Arts & Educ. Kagawa Univ. II (94): 9, 1960 (Omogo, Berg. Kirishima).

分布：四国, 九州。

**Subfamily PACHYRRHYNCHINAE カタゾウムシ亜科**

Schultze, Philipp. J. Sci. 23: 609-673, 6 pls. 1922; 24: 309-366, 3 pls. 1923; 25: 359-390, 1924; 26: 131-309, 12 pls. 1925 (Monograph).

**Pachyrrhynchus Germar, 1824**

**infernalis** Fairmaire クロカタゾウ

*Pachyrrhynchus infernalis* Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. 70, 1879 (Ishigaki).



分布：石垣島，八重山群島。

**Subfamily SITONINAE** コフキノゾウムシ亜科

Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 163-166, 1930 (Japanese species).  
Emden, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) XI: 580-581, 1944 (Key to genera).

**Parasitones Sharp, 1896**

**gravidus Sharp** ハネナシコフキノゾウ (新称)

*Parasitones gravidus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 113, 1896 (Hakone).

分布：本州。

**Sitona Germar, 1817**

=*Sitones* Schönherr, 1840

Reitter, Wien. Ent. Ztg. XXII: 3-41, 1903 (Best. Tab. eur. Col. LII) (Key to Palaearctic species).

**hispidula Fabricius** ケチビコフキノゾウ (新称)

*Curculio hispidulus* Fabricius, Gen. Ins. Mant.: 226, 1776 (Europe).

分布：北海道，本州，九州，ヨーロッパ，コーカサス，アメリカ。

**japonica Roelofs** チビコフキノゾウ

*Sitones japonicus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 160, 1873 (Japan).

分布：本州，四国，九州。

**lineata Linné** アカアシチビコフキノゾウ

*Curculio lineatus* Linné, Syst. Nat., ed. X: 385, 1758 (Europe).

分布：北海道，シベリヤ，ヨーロッパ。

**Eugnathus Schönherr, 1834**

Voss, Deut. Ent. Zschr. 1920: 210-222, 1925 (Key to species).

**distinctus Roelofs** コフキノゾウ

*Eugnathus distinctus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 179, 1873 (Japan).

=*Catachaenus bracteatus* Pascoe, J. Linn. Soc. London, Zool. XII: 23, 1874 (Is. Tsushima).

=*Catachaenus chloroticus* Pascoe, l. c.: 23 (Japan).

分布：本州，四国，九州，琉球，台湾，中国。

**Subfamily OTIORRHYNCHINAE** クチブトゾウムシ亜科

Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV (5): 153-237, 2 pls., 1930 (Revision of Japanese species).

**Tribe Episomini**

**Episomus Schönherr, 1826**

Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI: 90-201, 1897 (Revision).

Voss, Senckenbergiana 19: 250-251, 1927 (Key to *turritus* allied species).

**mori Kôno** オキナワクワゾウ

*Episomus mori* Kôno, Ins. Mats. II: 166, 1928 (Okinawa, Ishigaki).

分布：沖縄本島，石垣島。

**mundus** Sharp クワゾウ

*Episomus mundus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 93, 1896 (Yuyama).

分布：本州，九州。

**turritus** Gyllenhal シロコブゾウ

*Lagostomus turritus* Gyllenhal, Gen. Sp. Curc. I (2): 613, 1833 (Japonia).

= *Episomus turritus* var. ? *declivis* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI: 158, 1871 (Tschifu).

分布：本州，四国，九州，朝鮮，中国。

#### Tribe Celeuthetini

Marshall, Otiorrhynchine Curc. of tribe Celeuthetini, London, 134 pp., 1956 (Revision).

#### **Arrhaphogaster** Roelofs, 1873

**pilosus** Roelofs ケブカヒメカタゾウ

*Arrhaphogaster pilosus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 164, 1873 (Hakodadi).

分布：北海道，本州。

#### Tribe Otiorrhynchini

#### **Asphalmus** Sharp, 1896

**japonicus** Sharp ホソヒメカタゾウ

*Asphalmus japonicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 95, 1896 (Shiba in Tokio).

分布：本州。

#### **Omoiotos** Sharp, 1896

**ovatus** Sharp ツヤヒメカタゾウ

*Omoiotos ovatus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 96, 1896 (Japan).

分布：四国。

#### Tribe Phyllobiini

#### **Phyllobius** Germar, 1824

= *Diallobius* Sharp, 1896

Schilsky, Käf. Eur. 47: A-MM, 1911 (Key to Palearctic species).

**annectens** Sharp ミヤマヒゲボソゾウ

*Phyllobius annectens* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 99, 1896 (Nikko, Kashiwagi).

= *Phyllobius daisetsuzanus* Kôno, Ins. Mats. II: 164, 1928 (Daisetsu).

分布：北海道，本州，四国，九州，千島。

**armatus** Roelofs リンゴコブキノゾウ

- Phyllobius armatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, Compt. Rend.: cxviii, 1879 (Japan).  
 分布：本州，四国，九州。
- brevitarsis** Kôno コヒゲボソゾウ  
*Phyllobius brevitarsis* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 205, 1930 (Kamikochi).  
 分布：本州，四国，九州。
- galloisi** Hustache コブヒゲボソゾウ  
*Phyllobius Galloisi* Hustache, Bull. Soc. Ent. Fr. 1920: 115, 1920 (Tokio, Takao).  
 分布：北海道，本州，四国，九州。
- incomptus** Sharp ツチイロヒゲボソゾウ  
*Phyllobius incomptus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 103, 1896 (Miyano-shita).  
 = *Diallobius inornatus* Sharp, l. c. : 104 (Japan).  
 分布：本州。
- intrusus** Kôno ヒラズネヒゲボソゾウ  
*Phyllobius intrusus* Kôno, Proc. Biol. Soc. Washington 61: 169, 1948 (Rhode Island, Tokyo, Utsunomiya, Kyoto).  
 分布：本州，九州，アメリカ。
- japonicus** Faust ハダカヒゲボソゾウ  
*Phyllobius japonicus* Faust, Sett. Ent. Ztg. 1889: 221, 1889 (Japan).  
 = *Phyllobius subnudus* Kôno, Ins. Mats. II: 165, 1928 (Chiba, Kagoshima) - syn. nov.  
 分布：本州，四国，九州。
- leechi** Sharp リーチヒゲボソゾウ  
*Phyllobius leechi* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 103, 1896 (Kashiwagi).  
 分布：本州，四国。
- lewis** Sharp リュイスヒゲボソゾウ  
*Diallobius lewis* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 105, 1896 (Kashiwagi).  
 分布：本州。
- longicornis** Roelofs リンゴヒゲナガゾウ  
*Phyllobius longicornis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 166, 1873 (Hakodadi, Awomori).  
 分布：北海道，本州。
- mundus** Sharp ウスイロヒゲボソゾウ  
*Diallobius mundus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 104, 1896 (Nikko, Kashiwagi).  
 = *Phyllobius (Subphyllobius) japonicus* Schilsky (nec Faust), Käf. Eur. XLVIII: 11, 1911 (Kioto).  
 = *Phyllobius schilskyi* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 207, 1930 (new name for *japonicus* Schilsky).

分布：本州.

**polydrusoides** Sharp チクブトヒゲボソゾウ (新称)

*Phyllobius polydrusoides* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 102, 1896 (Kashiwagi).

分布：本州, 四国.

**prolongatus** Motschulsky アオヒゲボソゾウ

*Phyllobius prolongatus* Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou 1866: 180, 1866 (Japan).

分布：北海道, 本州.

**rotundicollis** Roelofs キュウシュウヒゲボソゾウ (新称), キンヒゲボソゾウ

*Phyllobius rotundicollis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 167, 1873 (Nagasaki).  
=*Phyllobius nigritus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 100, 1896 (Hitoyoshi).

分布：本州, 四国, 九州.

(**argentatus** Linné)

*Curculio argentatus* Linné, Syst. Nat., ed. X: 384, 1758 (Europe).

この種は Motschulsky, 1866 により日本から記録されたが, 同定の誤りによるものと思われる.

(**picipes** Motschulsky)

*Phyllobius picipes* Motschulsky, Etud. Ent. IX: 20, 1860 (Japan).

この原記載は極めて簡単で, この属の多くの種に合致する. Sharp, 1896 はこの理由により種名を抹殺すべきだといっている. 模式標本がみつかるまで不明種として残しておきたい.

### Tribe Ptochini

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XIV: 208-256, 1906 (Key to Palaearctic species).

### Subtribe Ptochina

#### Calomycterus Roelofs, 1873

**setarius** Roelofs チビメナガゾウムシ

*Calomycterus setarius* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 175, 1873 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

#### Myosides Roelofs, 1873

**pyrus** Sharp ニセチビヒョウタンゾウ

*Myosides pyrus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 93, 1896 (Nikko).

分布：本州.

**seriehispidus** Roelofs チビヒョウタンゾウ

*Myosides seriehispidus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 164, 1873 (Nagasaki).

分布：本州, 九州.

**Ptochus Schönherr, 1826****obscuripes** Motschulsky ツチイロヒヨウタンゾウ*Ptochus obscuripes* Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX (1): 180, 1866 (Japan).

分布：日本。

Sharp, 1896 によればこの種は *Ptochus* 属のものでないかもしれないという。**Subtribe Myllocerina****Hyperstylus Roelofs, 1873****pallipes** Roelofs チビアネゾウ*Hyperstylus pallipes* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 172, 1873 (Japan).

分布：本州，四国，九州。

**Eumyllocerus Sharp, 1896**

Voss, Mitt. Münch. Ent. Ges. 30: 884, 1940 (Key to species).

**gratiosus** Sharp アオヒゲナガゾウ*Eumyllocerus gratiosus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 109, 1896 (Kioto, Kashiwagi).

分布：本州，九州。

**Macrocorynus Schönherr, 1826****=Myllocerops** Reitter, 1906

Formáneck, Wien. Ent. Ztg. 35: 44-56, 1916 (Revision).

**elegantulus** Roelofs ウスアオクテプトゾウ*Myllocerus elegantulus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 170, 1873 (Japan).

分布：本州，九州。

**discoldeus** Olivier ツノクテプトゾウ*Curculio discoideus* Olivier, Ent. V: 418, 1807 (India).

分布：九州，中国，インド。

**griseoides** Zumpt コカシワクテプトゾウ*Myllocerops griseoides* Zumpt, Mitt. Deut. Ent. Ges. VIII: 10, 1937 (Tokio).

分布：本州，九州。

**naso** Sharp エグリクテプトゾウ*Myllocerus naso* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 107, 1896 (Higo).

分布：九州。

**variabilis** Roelofs オオクテプトゾウ*Myllocerus variabilis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 168, 1873 (Nagasaki).

分布：本州，四国，九州。

**viridulus** Roelofs ミドリクテプトゾウ*Myllocerus viridulus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 171, 1873 (Nagasaki).

分布：九州.

**Myllocerus Schönherr, 1826**

**abnormalis** Sharp ヒゲブトクテブトゾウ

*Myllocerus* (?) *abnormalis* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 108, 1896 (Hi-toyoshi).

分布：四国, 九州.

**dissimilis** Voss ウンゼンクテブトゾウ (新称)

*Myllocerus dissimilis* Voss, Ent. NachrBl. XIII: 53, 1939 (Unzen Shimabara).

分布：九州.

**fumosus** Faust ケブカクテブトゾウ

*Myllocerus fumosus* Faust, Deut. Ent. Zschr. XXVI: 261, 1882 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

**griseus** Roelofs カシワクテブトゾウ

*Myllocerus griseus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 170, 1873 (Nagasaki).

分布：北海道, 本州, 四国, 九州.

**nigromaculatus** Roelofs クロホシクテブトゾウ

*Myllocerus nigro-maculatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 169, 1873 (Nagasaki).

分布：本州, 四国, 九州.

**nipponensis** Zumpt ツムブトクテブトゾウ

*Myllocerus nipponensis* Zumpt, Ent. Blätt. 34: 85, 1938 (Iwate).

分布：本州.

**otsukai** Kôno オオツカクテブトゾウ

*Myllocerus otsukai* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 218, 1930 (Ibukisan).

分布：本州.

**Subtribe Cyphicerina**

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) 11: 73-98, 433-462, 1944 (Generic revision).

**Anosimus** Roelofs, 1873

**decoratus** トゲアシゾウ

*Anosimus decoratus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 174, 1873 (Japan).  
= *Anosimus pallidus* Roelofs, l. c.: 174 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

**Cyphicerus** Schönherr, 1826

Formáneck, Wien. Ent. Ztg. XXXV: 35-39, 1916 (Key to Palearctic species of *Cyphicerus* sens. Reitter).

**aceri** Kôno イタヤクテブトゾウ, セアカクテブトゾウ

*Myllocerus aceri* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 217, 1930

(Hokkaido).

= *Myllocerus tosanus* Kôno, l. c.: 218 (Tosa). -syn. nov.

= *Myllocerus viridulus* Kôno (nec Roelofs), l. c.: 217, 1930 (Kagoshima).

分布：北海道，本州，四国，九州。

**kuchibutonus** Kôno ハイイロクテプトゾウ

*Myllocerus kuchibutonus* Kôno, l. c.: 219 (Okinawa).

分布：沖縄。

**Cyphicerinus** Marshall, 1928

Marshall, Proc. R. Ent. Soc. London (B) 11: 124-126, 1942 (Key to species).

**tesselatus** Motschulsky ツチイロクテプトゾウ

*Prochidius tesselatus* Motschulsky, Schrenck's Reisen Amurl. II: 160, 1860 (Amur).

分布：日本 (Reitter, 1906 による), アムール, 中国。

**Canolixus** Roelofs, 1873

**japonicus** Roelofs サビクテプトゾウ

*Canolixus japonicus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 172 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**Oedophyrus** Marshall, 1941

**hilleri** Faust, comb. nov. ヒレルクテプトゾウ

*Myllocerus Hilleri* Faust, Stett. Ent. Ztg. 1889: 222, 1889 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**sakaguchii** Kôno, comb. nov. サカグチクテプトゾウ

*Myllocerus sakaguchii* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 212, 1930 (Okinawa).

分布：九州，沖縄。

**Cyrteplstomus** Marshall, 1924

**castaneus** Roelofs クライロクテプトゾウ

*Myllocerus castaneus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 168, 1873 (Japon).

分布：本州，四国，九州，アメリカ。

**Subtribe Phytoscaphina**

**Phytoscaphus** Schönherr, 1826

**ciliatus** Roelofs クチナガクテプトゾウ

*Phytoscaphus ciliatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XV: 176, 1873 (Japon).

分布：日本。

**Tribe Callirhopalini**

**Callirhopalus** Hochhuth, 1851

= *Pseudocneorrhinus* Roelofs, 1873

Marshall, Ark. Zool. 27A (29): 8-10, 1934 (Key to species).

**bifasciatus** Roelofs スグリゾウ

*Pseudocneorrhinus bifasciatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend. : liii, 1879 (Japon).

分布：北海道，本州，四国，九州，アメリカ。

**minimus** Roelofs チビスグリゾウ

*Pseudocneorrhinus minimus* Roelofs, l. c. : liii (Japon).

分布：北海道，本州。

**obesus** Roelofs カキゾウ

*Pseudocneorrhinus obesus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI : 177, 1873 (Nagasaki).

分布：本州，九州。

**setosus** Roelofs ケナガスグリゾウ

*Pseudocneorrhinus setosus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend. : liii, 1879 (Japon).

分布：本州，九州。

**Tribe Tanymecini**

Reitter, Best. Tab. eur. Col. Tanymecini I, 21 pp., 1903 (Key to Palaearctic species).

Emden, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) 11 : 568-580, 1944 (Key to genera).

**Sympiezomias** Faust, 1887

**cribricollis** Kôno ホソヒョウタンゾウ

*Sympiezomias cribricollis* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV : 189, 1930 (Formosa).

分布：琉球，台湾。

**lewisii** Roelofs リュイスヒョウタンゾウ，ワモンヒョウタンゾウ

*Piazomias Lewisii* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII ; Compt. Rend. : liii, 1879 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**velatus** Chevrolat シナヒョウタンゾウ

*Piazomias velatus* Chevrolat, Rev. Zool. : 98, 1845 (Peking).

分布：日本 (Roelofs, 1873 による)，中国。

**Amystax** Roelofs, 1873

**fasciatus** Roelofs オビモンヒョウタンゾウ

*Amystax fasciatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI : 160, 1873 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**Enaptorrhinus** Waterhouse, 1853

Heller, Wien, Ent. Ztg. XLVII : 107-109, 1930 (Key).

Voss, Ent. NachrBl. XIII : 57-58, 1939 (Key).

**dispar** Voss ケナガヒョウタンゾウ (新称)



*Enaptorrhinus dispar* Voss, Ent. NachrBl. XIII: 56, 1939 (Unzen Shimabara, Northwest China : Tienmuschan).

分布：九州，中国。

**Chlorophanus Germar, 1824**

Reitter, Wien. Ent. Ztg. 34: 171-184, 1915 (Best. Tab. eur. Col. 75, 14 pp., 1915) (Revision),

**grandis** Roelofs オオアオゾウ

*Chlorophanus grandis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 162, 1873 (Yokohama).  
*Chlorophanus grandis* var. *lugbris* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 111, 1896 (Oyama).

*Chlorophanus grandis* var. *metallescens* Sharp, l. c.: 111 (Oyama).

分布：北海道，本州，九州。

**kônoi** Günther et Zumpt ムネジワオオアオゾウ

*Chlorophanus Kônoi* Günther et Zumpt, Col. Cat. 131 Tanymericinae: 70, 1933 (new name for *rugicollis* Kôno).

=*Chlorophanus rugicollis* Kôno (nec Gyllenhal), J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 182, 1930 (Kogota in Honshu).

分布：本州。

**planus** Sharp ヒメオオアオゾウ

*Chlorophanus planus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 111, 1896 (Nikko).

分布：本州，四国。

**Scepticus Roelofs, 1873**

=*Copanopachys* Roelofs, 1880

**griseus** Roelofs サビヒョウタンゾウ

*Piazomias griseus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 162, 1873 (Japan).

分布：本州，四国，九州。

**hachijoensis** Kôno ヘチジョウヒョウタンゾウ

*Scepticus hachijoensis* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 187, 1930 (Is. Hachijo).

分布：八丈島。

**insularis** Roelofs クワヒョウタンゾウ

*Scepticus insularis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 158, 1873 (Nagasaki, Hiogo).

分布：北海道，本州，四国，九州，樺太。

**minowai** Kôno ミノワヒョウタンゾウ

*Scepticus minowai* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 185, 1930 (Is. Yaku).

分布：九州，屋久島。

**tigrinus** Roelofs スナムグリヒョウタンゾウ

*Piazomias tigrinus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 161, 1873 (Japon).

分布：北海道，本州。

**uniformis** Kôno ハイイロヒヨウタンゾウ

*Scepticus uniformis* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 186, 1930 (Okinawa).

分布：琉球。

**Meotiorrhynchus** Sharp, 1896

**querendus** Sharp シラフヒヨウタンゾウ

*Meotiorrhynchus querendus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 86, 1896 (Hakodate).

分布：北海道，樺太，千島。

**Tribe Cneorrhini**

Emden, Ann. Mag. Nat. Hist. (11) 11: 561-567, 1944 (Key to genera).

**Dermatoxenus** Marshall, 1916

**caesicollis** Gyllenhal ヒメシロコブゾウ

*Lagostomus caesicollis* Gyllenhal, Gen. Sp. Curc. I (2): 619, 1833 (Japonia, nec Java (Gyllenhal, 1840)).

=*Cneorhinus nodosus* Motschulsky, Etud. Ent. IX: 21, 1860 (Japon).

分布：本州，四国，九州，琉球，中国，台湾，アッサム。

**carinulatus** Motschulsky

*Dermatodes carinulatus* Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX: 177, 1866 (Japon).

分布：日本。

**clathratus** Roelofs ウスヒヨウタンゾウ

*Catapionus clathratus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 157, 1873 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**interstitialis** Motschulsky

*Dermatodes interstitialis* Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX: 179, 1866 (Japon).

分布：日本。

**Catapionus** Schönherr, 1842

Tournier, Ann. Soc. Ent. Belg. XIX: 125-163, 1876 (Revision).

**angusticollis** Motschulsky

*Cneorhinus angusticollis* Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX: 179, 1866 (Japon).

分布：日本。

**cuprescens** Motschulsky アカヒヨウタンゾウ

*Cneorhinus cuprescens* Motschulsky, l. c.: 178 (Japon).

分布：本州.

**gracilicornis** Roelofs ハイイロヒヨウタンゾウ

*Catapionus gracilicornis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 157, 1873 (Hakodate).

分布：北海道, 本州, 千島.

**modestus** Roelofs フキヒヨウタンゾウ (新称)

*Catapionus modestus* Roelofs, l. c.: 156 (Kawatchi).

分布：本州.

**oblongus** Kôno ホソヒヨウタンゾウ

*Catapionus oblongus* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIX: 173, 1930 (Echigo).

分布：本州.

**obscurus** Sharp マルヒヨウタンゾウ

*Catapionus obscurus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 90, 1896 (Centre of the main island).

分布：本州.

**subcostatus** Formâneck エゾヒヨウタンゾウ (新称)

*Catapionus subcostatus* Formâneck, Wien. Ent. Ztg. XXXIX: 80, 1922 (Otaru).

分布：北海道.

### Tribe Polydrosini

#### Scythropus Schönherr, 1826

Desbrochers des Loges, Frelon 10: 113-158, 1901-2 (Revision).

Schilsky, Käf. Eur. XLVII: OO-SS, 1911 (Key to Palaearctic species).

**isshikii** Kôno イッシキホソゾウ

*Scythropus isshikii* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXIV: 169, 1930 (Odaigahara).

分布：本州, 四国.

**japonicus** Hustache キアシチビアオゾウ

*Scythropus japonicus* Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920: 116, 1920 (Nakano près Tokio).

分布：本州.

**ornatus** Matsumura ウスアオオビゾウ

*Polydrosus ornatus* Matsumura, J. Agr. Coll. Sapporo IV: 132, 1911 (Sachalin).

分布：北海道, 本州, 樺太.

**scutellaris** Roelofs マツトビゾウ

*Scythropus scutellaris* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 179, 1873 (Japan).

分布：本州, 四国, 九州.

---

Tribe **Blosyrini**

**Blosyrus** Schönherr, 1826

**japonicus** Sharp マルカククチゾウ

*Blosyrus japonicus* Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896: 88, 1896 (Awomori, Sapporo).

分布：北海道，本州.