

## 日本産ゾウムシ科(II)とオサゾウムシ科目録

森本, 桂  
九州大学農学部

<https://doi.org/10.15017/21583>

---

出版情報 : 九州大学農学部学藝雑誌. 19 (3), pp.341-368, 1962-03. 九州大学農学部  
バージョン :  
権利関係 :

日本産ゾウムシ科 (II) と  
オサゾウムシ科目録<sup>1,2)</sup>

森 本 桂

Preliminary check list of the families Curculionidae (II)  
and Rhynchophoridae of Japan

Katsura Morimoto

前回はゾウムシ科の前半を発表したが、今回はその残りとして、オサゾウムシ科の目録を発表する。排列は前回と同様に別報する検索表と同じ順にした。

Cossoninae, Stromboscerini 及び Dryophthorinae は小西正泰博士により纏められ、近々発表されることになっているので、混乱をさけるため新しい和名を与えることをしなかつた。

本文に入るに先立ち、故江崎悌三教授、安松京三教授及び平嶋義宏助教授の御指導、御鞭撻を厚く感謝する。

Subfamily PETALOCHILINAE シュロゾウムシ亜科

Tribe Derelomini

*Derelomus* Schönherr, 1826

*uenoi* Morimoto シュロゾウ (新称)

*Derelomus uenoi* Morimoto, Ent. Rev. Japan X: 46, 1959 (Kyoto, Hikari, Fukuoka).

分布：本州，九州。

Subfamily ACALYPTINAE デオゾウムシ亜科

*Acalyptus* Schönherr, 1836

*carpini* Fabricius チビデオゾウ (新称)

*Rhynchaenus carpini* Fabricius, Ent. Syst. I(2): 409, 1792 (Europe).

分布：北海道，シベリヤ，ヨーロッパ。

Subfamily ONYCHOLIPINAE ハマベゾウムシ亜科

*Isonycholips* Chûjô et Voss, 1960

1. Comparative Morphology, Phylogeny and Systematics of the Superfamily Curculionoidea of Japan. VI.
2. Contribution Ser. 2, No. 113, Entomological Laboratory of Kyushu University.

**gotoi** Chûjô et Voss ハマベゾウ (新称)

*Isonycholips gotoi* Chûjô et Voss, Mem. Fac. Liberal Arts & Educ. Kagawa Univ. II(94) 14, 1960 (Mie, Aichi).

分布：本州，九州。

## Subfamily ALOPHINAE

**Trichalophus** Leconte, 1876

Reitter, Deut. Ent. Zschr. 1913: 446-457, 1913 (Key to Asian species).

**albonotatus** Motschulsky ヨホシゾウムシ

*Alophus albonotatus* Motschulsky, Schrenck's Reisen Amurl. II(2): 166, 1860 (Amour).

分布：北海道，アムール，千島。

**nutakkanus** Kôno スタツカゾウムシ

*Trichalophus nutakkanus* Kôno, Trans. Biogeogr. Soc. Jap. 1 (2): 99, 1938 (Daisetsu).

分布：北海道。

## Subfamily SMICRONYCHINAE ケシツブゾウムシ亜科

**Smicronyx** Schönherr, 1843

Kôno, Ins. Mats. IV: 161, 1930 (Japanese species).

**madaranus** Kôno マダラケシツブゾウ

*Smicronyx madaranus* Kôno, Ins. Mats. IV: 161, 1930 (Iwate).

分布：本州，対馬。

**rubricatus** Kôno アカスジケシツブゾウ

*Smicronyx rubricatus* Kôno, Ins. Mats. IV: 161, 1930 (Kiushiu).

分布：四国，九州。

## Subfamily ANTHONOMINAE ハナゾウムシ亜科

Voss, Stett. Ent. Ztg. 105: 34-51, 1944 (Key to genera).

## Tribe Bradybatini

**Bradybatus** Germar, 1824

Peneck, Wien. Ent. Ztg. 43: 1-6, 1926 (Revision of European species).

**limbatus** Roelofs ヘリアカナガハナゾウ (新称)

*Bradybatus limbatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 191, 1875 (Hakodadi).

分布：北海道，本州，四国，九州。

**sharpi** Tournier クロナガハナゾウ (新称)

*Bradybatus Sharpi* Tournier, Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IV: 180, 1873 (Ostsibirien)

分布：本州，四国，九州，シベリヤ。

Tribe **Tachypterellini****Tachypterellus** Fall & Cocker, 1907**dorsalis** Voss et Chûjô コブハナゾウ (新称)*Tachypterellus dorsalis* Voss of Chûjô, Niponius I(3): 4, 1960 (Niigata).

分布：本州.

Tribe **Brachyonychini****Euphyllobiomorphus** Morimoto, MS.**kurosawai** Morimoto, MS. アオクチナガハナゾウ (新称)

分布：屋久島.

Tribe **Anthonomini****Anthonomus** Germar, 1817Desbroachers des Loges, Ann. Soc. Ent. France (4) VIII: 411-470, 1868  
(Monograph of Palaearctic species).

Kôno, Ins. Mats. XIII: 76-80, 1938 (Japanese species).

**aino** Kôno アイノハナゾウ*Anthonomus aino* Kôno, Ins. Mats. XIII: 77, 1938 (Sapporo).

分布：北海道.

**bisignifer** Schenkling イチゴハナゾウ*Anthonomus bisignifer* Schenkling, Col. Cat. 139 Anthonominae: 16, 1934 (new name for *bisignatus* Roelofs).= *Anthonomus bisignatus* Roelofs (nec Gyllenhal), Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 162, 1874 (Japan).= *Anthonomus albopilosus* Matsumura, J. Coll. Agr. Tohoku Imp. Univ. IV: 132, 1911 (Sachalin).= *Minyrus japonicus* Matsumura (nec Roelofs), Nippon Gaichuhen III: 318, 1900 (Japan).

分布：北海道, 本州, 四国, 九州, 樺太, 千島.

**pomorum** Linné ナシハナゾウ*Curculio pomorum* Linné, Syst. Nat. ed. X: 381, 1758 (Europe).

分布：本州, 朝鮮, シベリヤ, ヨーロッパ.

**rectirostris** Linné オビモンハナゾウ*Curculio rectirostris* Linné, Syst. Nat. ed. X: 383, 1758 (Europe).

分布：北海道, 本州, 四国, 九州, 朝鮮, シベリヤ, ヨーロッパ.

**terreus** Gyllenhal カセンソウハナゾウ*Anthonomus terreus* Gyllenhal, Gen. Sp. Curc. III (i): 346, 1836 (Siberië occidentale).

分布：北海道, シベリヤ.

**yuasai Kôno** エアサハナゾウ

*Anthonomus yuasai* Kôno, Ins Mats. XIII: 79, 1939 (Shimauchi in Nagano, Tokio, Berg Takao).

分布：本州，四国，九州。

**Anthomorphus** Weise, 1883

**varians** Paykull ハイマツハナゾウ

*Curculio varians* Paykull, Monogr. Curc. Succ.: 16, 1792 (Sweden).

分布：北海道，ヨーロッパ。

Subfamily HYPERINAE タコゾウムシ亜科

Tribe **Cylindrorrhini**

**Listroderes** Schönherr, 1826

**obliquus** Klug ヤサイゾウムシ

*Listroderes obliquus* Klug, Verz. vor. Insectendoubletten: 6, 1829 (Süd-Brazilien).

分布：本州，四国，九州，南北アメリカ，オーストラリア，アフリカ。

Tribe **Hyperini**

**Hypera** Germar, 1821

=*Phytonomus* Schönherr, 1826

Petri, Verh. Siebenb. Ver. Nat., 2, Sep.-Band IV, 208 pp., 1902 (Monograph).

**adpersa** Fabricius シロスジタコゾウ

*Curculio adpersus* Fabricius, Ent. Syst. I(2): 413, 1792 (Europe).

*Phytonomus adpersus* var. *japonicus* Petri, Verh. Siebenb. Ver. Nat., 2, Sep.-Band IV: 128, 1901 (Japan).

分布：本州，シベリヤ，ヨーロッパ。

**mongolica** Motschulsky ハコベタコゾウ

*Phytonomus mongolicus* Motschulsky, Schrenk's Reisen Amurl. II: 164, 1860 (Mongolie, Daourie, Amour).

=*Phytonomus basalis* Voss, Senckenbergiana 19: 265, 1937 (Szetschwan).

分布：本州，四国，九州，対馬，アムール，中国。

**nigrirostris** Fabricius ツメクサタコゾウ

*Curculio nigrirostris* Fabricius, Syst. Ent.: 132, 1775 (Europe).

分布：北海道，中国，ヨーロッパ，北アメリカ。

**rumicis** Linné ギンギンタコゾウ

*Curculio rumicis* Linné, Syst. Nat., ed. X: 379, 1758 (Europe).

分布：北海道，ヨーロッパ，コーカサス。

**subcostata** Capioment カピオマンタコゾウ

*Phytonomus subcostatus* Capioment, Ann. Soc. Ent. France (4) VIII: 202, 1868 (China).

分布：九州，中国.

**Phaeopholus** Roelofs, 1873

**major** Roelofs オオミスジマルゾウ

*Phaeopholus major* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend. : liii, 1879 (Japan).

分布：本州，四国，九州.

**ornatus** Roelofs ミスジマルゾウ

*Phaeopholus ornatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. VI : 181, 1873 (Japan).

分布：本州，四国，九州.

**Tribe Notarini**

Kôno, Ins. Mats. IV : 154–161, 1920 (Revision of Japanese species).

**Caenosilapillus** Chûjô et Morimoto, 1959

**babai** Chûjô et Morimoto シラホシニセイネゾウ (新称)

*Caenosilapillus babai* Chûjô et Morimoto, Kontyû 27 : 148, 1955 (Niigata).

分布：本州.

**Dorytomus** Germar, 1817

Faust, Bull. Soc. Nat. Moscou LXII (IV) : 368–468, 1882 (Monograph).

Zumt, Kol. Rdsch. XIX : 81–105, 1933 (Key to species of subgenera *Dorytomus* s. str. and *Paradorytomus* Zpt.).

**maculipennis** Roelofs モンイネゾウモドキ

*Dorytomus maculipennis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII : 124 1874 (Nagasaki).

分布：本州，四国，九州.

**notaroides** Kôno ムネピロイネゾウモドキ(新称)，カバイロイネゾウモドキ

*Dorytomus notaroides* Kôno, Ins. Mats. IV : 156, 1930 (Sapporo).

分布：北海道.

**roelofsi** Faust アカイネゾウ

*Dorytomus Roelofsi* Faust, Bull. Soc. Nat. Moscou LVII (IV) : 380, 402, 1882 (Japan).

≡ *Dorytomus rufus* Kôno (nec Say), Ins. Mats. IV : 155, 1930 (Sapporo).

≡ *Dorytomus japonicus* Zumt, Col. CentrBl. VI : 59, 1932 (new name for *rufus* Kôno).

分布：北海道，本州，四国，九州.

**shikotanus** Kôno シコタンイネゾウモドキ

*Dorytomus (Dorytomus) shikotanus* Kôno, Ins. Mats. X : 56, 1935 (Shikotan).

分布：北海道，千島.

**Echinocnemus** Schönherr, 1843

**squameus** Billberg イネゾウ

*Rhynchaenus squameus* Billberg, Enum. Ins. : 42, 1820 (Kanton).  
 = *Echinocnemus bipunctatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII : 123, 1874 (Japon).  
 分布：本州，四国，九州，台湾，カントン，ジャワ。

**Procas** Stephens, 1831

**biguttatus** Faust オオクニイネゾウモドキ

*Procas biguttatus* Faust, Deut. Ent. Zschr. XXVI : 275, 1882 (Ussuri).  
 = *Notaris okunii* Kôno, Ins. Mats. IV : 159, 1930 (Sapporo).  
 分布：北海道，本州，ウスリー。

**Notaris** Stephens, 1831

Faust, Bull. Soc. Nat. Moscou LVII (III) : 136-176, 1882 (Monograph).

**oryzae** Ishida クロイネゾウモドキ

*Eirrhinus (Notaris) Oryzae* Ishida (nec Csiki), Hokkaido Nokaiho II : 90, 1902 (Hokkaido).  
 = *Notaris funebriis* Kôno, Ins. Mats. IV : 158 1930 (Korea).  
 分布：北海道，本州，四国，九州，朝鮮。

**scripti** Fabricius キボシイネゾウモドキ

*Curculio scripti* Fabricius, Ent. Syst. I(II) : 405, 1792 (Europe).  
 分布：北海道，シベリヤ，ヨーロッパ。

Subfamily MECYSLOBINAE アシナガゾウムシ亜科

Kôno, Ins. Mats. IV : 137-143, 1930 (Revision of Japanese species).

**Mesalcidodes** Voss, 1958

**trifidus** Pascoe, 1870 オジロアシナガゾウ

*Alcides trifidus* Pascoe, J. Linn. Soc. London, Zool. X : 460, 1870 (North China, Japan, Manchuria).  
 分布：本州，四国，九州，満州，中国。

**Mecyslobus** Reitter, 1905

= *Alcides* Schönherr, 1826 (nec Hübner)

**erro** Pascoe ホホジロアシナガゾウ

*Alcides erro* Pascoe, J. Linn. Soc. London, Zool. XI : 182, 1873 (China).  
 分布：本州，四国，九州，台湾，中国。

**flavosignatus** Roelofs キスジアシナガゾウ

*Alcides flavosignatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII : 548, 1875 (Kobé).  
 分布：本州，四国，九州。

**nigrofasciatus** Kôno クロオビアシナガゾウ

*Alcides nigrofasciatus* Kôno, Ins. Mats. II : 175, 1928 (Kuccharo).

分布：北海道.

**nipponicus** Kôno シロオビアカアシナガゾウ

*Alcides nipponicus* Kôno, Ins. Mats. IV : 139, 1930 (Chichibu).

分布：本州，四国，九州

**piceus** Roelofs カシアシナガゾウ

*Alcides piceus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII : 152, 1875 (Japon).

分布：本州，四国，九州.

**roelofsi** Lewis ムツスジアシナガゾウ

*Alcides Roelofsi* Lewis, Cat. Col. Jap. Archipel. : 23, 1879 (new name for *albo-lineatus* Roelofs).

= *Alcides albo-lineatus* Roelofs (nec Boheman), Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII : 152, 1875 (Japon).

= *Alcides sexvittatus* Faust, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XIV : 243, 258, 1895 (Burma).

分布：日本，台湾，ビルマ，セイロン.

**takahashii** Kôno タカハシアシナガゾウ

*Alcides takahashii* Kôno, Ins. Mats. IV : 140, 1930 (Formosa).

分布：九州，八丈島，台湾.

Subfamily **CARCILIINAE** ツツゾウムシ亜科

**Carcilia** Roelofs, 1874

= *Leamosaccodes* Voss, 1937. – **syn. nov.**

Zumpt, Kol. Rdsch. 23 : 23–24, 1937 (Key).

Voss, Ent. Blätt. 49 : 72–73, 1953 (Key).

**freyi** Zumpt フライツツゾウ (新称)

*Tenguzo freyi* Zumpt, Kol. Rdsch. 18 : 126, 1932 (Insel Sado).

= *Laemosaccodes similis* Voss, Ent. Blätt. 49 ; 72, 1953 (Fukien). – **syn. nov.**

分布：佐渡，本州，九州，中国.

**strigicollis** Roelofs ツツゾウ，フトカツオゾウ

*Carcilia strigicollis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII : 153, 1874 (Japon).

分布：本州，四国，九州.

Subfamily **STYANACINAE** コブコブゾウムシ亜科

**Styanax** Pascoe, 1871

= *Scaphosternus* Roelofs, 1879.

Chûjô et Voss, Mem. Fac. Liberal Arts & Educ. Kagawa Univ. II(94) : 3–4, 1960 (Key to Japanese species).

**kuwanoi** Chûjô et Voss クワノコブコブゾウ (新称)

*Styanax Kuwanoi* Chûjô et Voss, l. c. : 4 (Is. Sado).

分布：佐渡.



**rugosus** Roelofs コブコブゾウ (新称)

*Scaphosternus rugosus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rent. : liii, 1879 (Nagasaki).

分布：九州.

**scrobiculatus** Roelofs レロフコブコブゾウ (新称)

*Scaphosternus scrobiculatus* Roelofs, l. c. : liii (Tokio, Japon).

分布：本州.

## Subfamily CRYPTORRHYNCHINAE クチカクシゾウムシ亜科

## Tribe Chonotrachelini

**Catagmatus** Roelofs, 1875**japonicus** Roelofs クロクチカクシゾウ (新称)

*Catagmatus japonicus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII 158, 1875 (Japon).

分布：本州, 四国, 九州.

## Tribe Ithyporini

**Ectatorrhinus** Lacordaire 1866

Heller, Wien. Ent. Ztg. XLIII : 149-154, 1926 (Key to species).

**adamsi** Pascoe マダラアシゾウ

*Ectatorrhinus Adamsi* Pascoe, J. Linn. Soc. London, Zool. XI : 478, 1871 (Is. Tsushima).

= *Mecocorynus humerosus* Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France (6) IX : 53, 1889 (Kiang-si).

= *Mecocorynus tuberosus* Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France LXVIII : 634, 1900 (Chine).

分布：本州, 四国, 九州, 対馬.

**Colobodes** Schönherr, 1837**matsumurai** Kôno マツムラトゲトゲゾウ

*Colobodes matsumurai* Kôno, Ins. Mats. VI : 179, 1932 (Sapporo).

分布：北海道, 本州.

**ornatus** Roelofs ワモントゲトゲゾウ

*Colobodes ornatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII : 156, 1875 (Japon).

分布：本州, 九州.

**V-album** Roelofs シロモントゲトゲゾウ (新称)

*Colobodes V-album* Roelofs, l. c. : 155 (Japon).

分布：九州.

**Acallinus** Morimoto, MS.**tuberculatus** Morimoto, MS. コブマルクチカクシゾウ (新称)

分布：九州.

**Protacallinus Morimoto, MS.**

**uenoi Morimoto, MS.** ウエノクチカクシゾウ (新称)

分布：本州.

**Protacalles Voss, 1957**

**monticola Voss** ミヤマクチカクシゾウ (新称)

*Protacalles monticola* Voss, Ent. Rev. Japan VIII: 38, 1957 (Mt. Tsurugi).

分布：本州, 九州.

**Tribe Camptorrhinini**

**Camptorrhinus Schönherr, 1826**

**squamosohirtus Fairmaire** カレキクチカクシゾウ (新称)

*Camptorrhinus squamosohirtus* Fairmaire, Bull. Soc. Ent. France: 70, 1897  
(Ishigaki).

分布：石垣島.

**Tribe Cryptorrhynchini**

**Subtribe Cryptorrhynchina**

**Euscepes Schönherr, 1844**

**postfasciatus Fairmaire** イモゾウ

*Cryptorrhynchus postfasciatus* Fairmaire, Rev. Mag. Zool. 513, 1849 (Tahiti).

= *Cryptorrhynchus batatae* Waterhouse, Proc. Ent. Soc. London 1849: LXIX, 1850.

分布：琉球, グアム, ハワイ, クヒチ, 南北アメリカ, ニュージーランド.

**Heterocryptorrhynchus Morimoto, MS.**

**maculicollis Morimoto, MS.** モンクチカクシゾウ (新称)

分布：本州, 四国, 九州.

**Cechania Pascoe, 1874**

**eremita Pascoe** ツツクチカクシゾウ (新称)

*Cechania eremita* Pascoe, J. Linn. Soc. London, Zool. XII: 38, 1874 (Nagasaki).

分布：九州.

**Syrotelus Pascoe, 1874**

= *Catarrhinus* Roelofs, 1875

Heller, Ent. Blätt. 34: 319-329, 1938 (Key).

**septentrionalis Roelofs** オオクチカクシゾウ

*Catarrhinus septentrionalis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, Compt. Rend.,  
cxxxii, 1875 (Japon).

分布：北海道, 本州, アムール.

**umbrosus** Roelofs ヒメクチカクシゾウ

*Catarrhinus umbrosus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 164, 1875 (Temple de la Lune).

分布：本州，四国，九州.

**Rhyssematoides** Morimoto, MS.

**flavomaculatus** Morimoto, MS. キボシクチカクシゾウ

分布：四国，九州.

**Orochlesis** Pascoe 1871

Zimmerman, Occ. Pap. Bishop Mus. 12(1), 19 pp., 1936 (Review).

**meshimensis** Kôno メシマルクチカクシゾウ (新称)

*Orochlesis meshimensis* Kôno, Ins. Mats. XI: 129, 1937 (Is. Meshima in Danjos).

分布：屋久島，女島 (男女群島).

**takaosanus** Kôno タカオマルクチカクシゾウ

*Orochlesis takaosanus* Kôno, Ins. Mats. VI: 178, 1932 (Berg. Takao).

分布：本州，四国，九州.

**Gasterocercus** Laporte et Brullé, 1828

**enokivorus** Kôno エノキオニゾウ

*Gasterocercus enokivorus* Kôno, Ins. Mats. VI: 174, 1932 (Awa).

分布：四国.

**longipes** Kôno アシナガオニゾウ

*Gasterocercus longipes* Kôno, Ins. Mats. VI: 173, 1932 (Echigo).

分布：本州，四国，九州.

**tamanukii** Kôno タマヌキオニゾウ

*Gasterocercus tamanukii* Kôno, Ins. Mats. VI: 175, 1932 (Sapporo).

分布：北海道.

**Caenocryptorrhynchus** Morimoto, MS.

**frontalis** Morimoto, MS. アタマクチカクシゾウ (新称)

分布：本州，四国，九州.

**Cryptorrhynchus** Illigar, 1807

**erectus** Roelofs マダラクチカクシゾウ

*Coelosternus* (?) *erectus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 170, 1875 (Kobé).

分布：北海道，本州，四国，九州.

**fasciculatus** Roelofs ハスジクチカクシゾウ

*Coelosternus* (?) *fasciculatus* Roelofs, l.c.: 169 (Japon).

分布：本州，四国，九州.

**lapathi** Linné ヤナギシリジロゾウ

*Curculio lapathi* Linné, Syst. Nat., ed. X: 379, 1758 (Europe).

分布：北海道，本州，シベリヤ，ヨーロッパ，北アメリカ。

? **nigrovariegatus** Roelofs クロマダラクチカクシゾウ

*Coelosternus* (?) *nigrovariegatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 171, 1875 (Japon).

分布：日本。

**tamanukii** Kôno タマスキクチカクシゾウ

*Coelosternus tamanukii* Kôno, Ins. Mats. XII: 144, 1938 (Sachalin, Hokkaido).

分布：北海道，本州。

**Shirahoshizo** Morimoto, in press.

**insidiosus** Roelofs マツシラホシゾウ，マツノシラホシゾウ

*Cryptorhynchus insidiosus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 167, 1875 (Japon).

= *Cryptorhynchus obscurus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend.: liv, 1879 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

? **japonicus** Zumpt ヤマトシラホシゾウ

*Cryptorhynchus japonicus* Zumpt, Kol. Rdsch. 18: 134, 1932 (Tokio).

分布：本州。

**pini** Morimoto, in press. コマツノシラホシゾウ

分布：本州，四国，九州。

**rufescens** Roelofs ニセマツノシラホシゾウ

*Cryptorhynchus rufescens* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 166, 1875 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**Paracryptorhynchus** Morimoto, MS.

**navicularis** Roelofs フナガタクチカクシゾウ

*Cryptorhynchus navicularis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 165, 1875 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**Sculptosternellum** Morimoto, MS.

**sulcastriatum** Roelofs アラハダクチカクシゾウ

*Coelosternus* (?) *sulcastriatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 168, 1875 (Nagasaki).

分布：本州，四国，九州。

**Coelosteridius** Morimoto, MS.

**nigricollis** Roelofs クロクビクチカクシゾウ

*Cryptorhynchus nigricollis* Roelofs, Deut. Ent. Zschr. XXIII: 298, 1879 (Japan).

分布：本州，四国，九州。

**Subtribe Tylodina**

**Pseudoporoapterus** Lea, 1898

**simulator** Roelofs, **comb. nov.** ヒサゴクチカクシゾウ

*Acalles simulator* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 160, 1875 (Japan).

分布：本州，四国，九州。

**Hytanzo** Morimoto, MS.

**uenoi** Morimoto, MS. ウエノヒヨウタンクチカクシゾウ (新称)

分布：四国，九州。

**Tribe Sophrorrhinini**

**Deiradocranoides** Morimoto, MS.

**setosus** Morimoto, MS. チビクチカクシゾウ (新称)

分布：本州，四国，九州。

**Catabonops** Roelofs, 1875

**monachus** Roelofs ボウサンゾウ

*Catabonops monachus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 162, 1875 (Japan).

分布：本州，九州。

**Rhadinomerus** Faust, 1892

**annulipes** Roelofs, **comb. nov.** アカナガクチカクシゾウ

*Cryptorhynchus annulipes* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend.: liv, 1879 (Japan).

分布：四国，九州。

**maebarai** Voss et Chûjô マエバラナガクチカクシゾウ (新称)

*Rhadinomerus maebarai* Voss et Chûjô, Mem. Fac. Liberal Arts & Educ. Kagawa Univ. II(94): 6, 1960 (Berg Takachiho, Berg Seppiko in Hirayu in Gifu).

分布：本州，四国，九州。

**Monaulax** Roelofs, 1875

**rugicollis** Roelofs アラムネクチカクシゾウ (新称)

*Monaulax rugicollis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 163, 1875 (Japan).

分布：本州，四国。

**Mechistocerus** Fauvel, 1862

**nipponicus** Kôno マダラメカクシゾウ

*Mechistocerus nipponicus* Kôno, Ins. Mats. VI: 180, 1932 (Hokkaido, Honshu),

分布：北海道，本州，四国，九州。

Subfamily ACICNEMINAE カレキゾウムシ亜科

**Metrachodes** Marshall, 1948

**subfasciatus** Voss ダルマカレキゾウ (新称)

*Trachodes subfasciatus* Voss, Ent. Rev. Japan VIII: 36, 1957 (Hoki-Daisen).

分布：本州，四国，九州。

**Acicnemis** Lacordaire, 1866

Hubenthal, Arch. Naturg. 83 A(8): 92-160; l. c. A(9): 53-155, 1917 (Monograph).

**dorsonigrita** Voss ヒメクロカレキゾウ

*Acicnemis dorsonigrita* Voss, Mitt. Münch. Ent. Ges. 31: 889, 1941 (Unzen Shimabara, Tienmuschan).

分布：本州，四国，九州，中国。

**maculaalba** Roelofs マダラカレキゾウ (新称)

*Acicnemis macula-alba* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 153, 1875 (Japan).

分布：本州，九州。

**palliata** Pascoe ウスモンカレキゾウ

*Acicnemis palliata* Pascoe, J. Linn. Soc. London, Zool.: XI: 462, 1872 (Japan)

分布：本州，四国，九州。

**suturalis** Roelofs フジカレキゾウ (新称)

*Acicnemis suturalis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 154, 1875 (Kobé).

分布：本州，四国，九州。

**Atrachodes** Morimoto, MS.

**murakamii** Morimoto, MS. ムラカミカレキゾウ

分布：本州。

**Karekizo** Morimoto, MS.

**impressicollis** Morimoto, MS. シロカレキゾウ (新称)

分布：本州。

Subfamily PISSODINAE キボシゾウムシ亜科

Tribe Cotasteromimini

**Cotasteromimus** Chûjô et Voss, 1960

**morimotoi** Chûjô et Voss ツチイロゾウ (新称)

*Cotasteromimus morimotoi* Chûjô et Voss, Mem. Fac. Agr. Liberal Arts & Educ. Kagawa Univ. II(94): 11, 1960 (Berg Hiko).

分布：本州，四国，九州。

**Pseudohylobius Morimoto, MS.**

**setosus Morimoto, MS.** モジヤモジヤツチイロゾウ (新称)

分布：九州。

**Tribe Pissodini**

**Pissodes Germar, 1824**

Kôno, Ins. Mats. V: 4-5, 1930 (Revision of Japanese species).

**cembrae** Motschulsky トドキボシゾウ

*Pissodes cembrae* Motschulsky, Schrenck's Reisen Amurl. II: 158, 1960 (Amour).  
= *Pissodes japonicus* Niiijima, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. IV: 10, 1913 (Hokkaido).

分布：北海道，樺太，シベリヤ。

**galloisi** Kôno オオキボシゾウ

*Pissodes galloisi* Kôno, Ins. Mats. II: 169, 1928 (Awa).

分布：本州，四国。

**nitidus** Roelofs マツキボシゾウ

*Pissodes nitidus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 121, 1874 (Japon).

分布：北海道，本州，四国，九州。

**obscurus** Roelofs クロキボシゾウ

*Pissodes obscurus* Roelofs, l. c.: 122 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**Subfamily CLEONINAE** カツオゾウムシ亜科

Kôno, Ins. Mats. IV: 49-63, 1929 (Revision of Japanese species).

**Tribe Cleonini**

Faust, Deut. Ent. Zschr. 1907: 177-284, 1907 (Revision).

**Nemoxenus Faust, 1907**

**inducens** Walker フタホシハスジゾウ

*Cleonus inducens* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III: 263, 1859 (Ceylon).  
= *Cleonus bimaculatus* Chevrolat, Mém. Soc. Sci. Liège, (2)V: 72, 1872.  
= *Cleonus bisignatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 181, 1873 (Japon).  
= *Cleonus vagesignatus* Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII: 31, 1888 (China).

分布：日本 (Roelofs, 1873 による)，中国，シャム，カンボジャ，ボルネオ，セイロン。

**Cleonus Schönherr, 1826**

**japonicus** Faust ハスジゾウ

*Cleonus japonicus* Faust, Deut. Ent. Zschr. 1907: 237, 1907 (Japan).

分布：本州，九州.

**japonicus hasujizo** Kôno

*Cleonus japonicus hasujizo* Kôno, Ins. Mats. IV: 52, 1929 (Hokkaido).

分布：北海道.

**Adosomus** Faust, 1907

Voss, Senckenbergiana 19: 254-260, 1937 (Key).

**mongolicus** Faldermann マダラハスジゾウ

*Cleonus mongolicus* Faldermann, Mém. Acad. Sc. St. Pétersburg II: 423, 1835 (Mongolia).

分布：日本(Faust, 1902 による), 朝鮮, 中国, モンゴリア.

**melogrammus** Motschulsky コマダラハスジゾウ

*Cleonus melogrammus* Motschulsky, Etud. Ent. III: 64, 1854 (China).

分布：日本(Motschulsky, 1866 による), 中国.

**Tribe Lixini**

**Lixus** Fabricius, 1801

Petri, Wien. Ent. Ztg. 23: 183-198, 1904; 24: 33-48, 101-116, 155-167, 1905 (Best. Tab. eur. Col. 55, 62 pp.) (Key to Palaearctic species).

**auriculatus** Sahlberg カムチャホソゾウ

*Lixus auriculatus* Sahlberg, Peric. Ent. Spec. Ins. III: 40, 1823 (Java).

= *Lixus velatus* Matsumura (nec Fabricius), Schädl. u. Nützl. Ins. Zuckerrohr Formosas: 35, 1910 (Formosa).

分布：沖縄，台湾，トンキン，ボルネオ，ジャワ，ビルマ.

**acutipennis** Roelofs ハスジカツオゾウ

*Cleonus acutipennis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 172, 1873 (Japon).

分布：本州，四国，九州.

**depressipennis** Roelofs ナガカツオゾウ

*Lixus depressipennis* Roelofs, I. c.: 184 (Japon).

分布：本州，四国.

**divaricatus** Motschulsky オオカツオゾウ

*Lixus divaricatus* Motschulsky, Etud. Ent.: 20, 1860 (Sibirien).

分布：北海道，本州，シベリヤ.

**impressiventris** Roelofs カツオゾウ

*Lixus impressiventris* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 185, 1873 (Japon).

分布：北海道，本州，四国，九州，朝鮮.

**maculatus** Roelofs アイノカツオゾウ

*Lixus maculatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 185, 1873 (Hakodadi).



分布：北海道，本州，千島。

**moiwanus** Kôno オナガカツオゾウ

*Lixus moiwanus* Kôno, Ins. Mats. II : 167, 1928 (Moiwa).

分布：北海道，本州，九州。

**subtilis** Boheman ヒメカツオゾウ (新称)

*Lixus subtilis* Boheman, Gen. Sp. Curc. III : 73, 1836.

分布：九州，中国，トルケスタン，ヨーロッパ。

**Larinus** Germar, 1824

Petri, Verh. Nat. Ver. Brünn 45 : 51-146, 1907 (Best. Tab. eur. Col. 66, 69 pp.)

(Key to Palaearctic species).

**formosus** Petri シラクモゴボゾウ

*Larinus formosus* Petri, Verh. Nat. Ver. Brünn 45 : 86, 1907 (Yokohama).

分布：本州。

**griseopilosus** Roelofs キュウシュウゴボゾウ (新称)

*Larinus griseopilosus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI : 182, 1873 (Nagasaki).

分布：九州。

**latissimus** Roelofs ゴボゾウ

*Larinus latissimus* Roelofs, I. c. : 183 (Hiogo).

分布：本州

**meleagris** Petri オオゴボゾウ

*Larinus meleagris* Petri (nec Faust), Verh. Nat. Ver. Brünn 45 : 85, 1907 (Hakodate, Yokohama).

= *Larinus griseopilosus* Kôno (nec Roelofs), Ins. Mats. II : 60, 1928 (Sachalin, Hokkaido, Honshu).

分布：北海道，本州，樺太。

**ovalis** Roelofs ヒメゴボゾウ

*Larinus ovalis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI : 183, 1873 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**subvariolosus** Petri コゴボゾウ (新称)

*Larinus subvariolosus* Petri, Verh. Nat. Ver. Brünn 45 : 112, 1907 (Halbinsel Sidemi bei Wladiwostock ; Ussuri).

分布：日本(Reitter による)，シベリヤ。

Subfamily GALLOISINAE マルクチゾウムシ亜科

**Galloisia** Hustache, 1920

**inflata** Hustache サビマルクチゾウ

*Galloisia inflata* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920 : 495, 1920 (Mt. Ibuki).

分布：本州，四国，九州。

Subfamily TRIGONOCOLINAE カタビロゾウムシ亜科

**Trigonocolus** Lacordaire, 1863

= *Lystrus* Pascoe, 1874

**sulcatus** Roelofs コカタビロゾウ

*Trigonocolus sulcatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 168, 1874 (Japon).

= *Lystrus elegans* Kôno, Ins. Mats. II: 174, 1928 (Tokio).

分布：本州，対馬，満州。

Subfamily MAGDALINAE ツツキクイゾウムシ亜科

**Magdalis** Germar, 1817

Kôno, Ins. Mats. IV: 5-8, 1930 (Revision of Japanese species).

**chibi** Kôno チビツツキクイゾウ

*Magdalis chibi* Kôno, Ins. Mats. IV: 6, 1930 (Sachalin, Sapporo, Iwate).

分布：北海道，本州，樺太。

**jezoensis** Kôno コクロツツキクイゾウ

*Magdalis jezoensis* Kôno, l. c.: 6 (Sapporo).

分布：北海道。

**galloisi** Kôno クロツツキクイゾウ

*Magdalis galloisi* Kôno, l. c.: 7 (Chuzenji).

分布：本州。

**takizawai** Kôno タキザワキクイゾウ

*Magdalis takizawai* Kôno, l. c.: 8, 1930 (Nagano).

分布：本州，九州。

Subfamily TANYSPHYRINAE ミズゾウムシ亜科

**Tanysphyrus** Schönherr, 1826

Voss, NachrBl. Bayer. Ent. II (8): 1-2, 1953 (Key).

Kôno, Ins. Mats. V: 1, 1930 (Key to Japanese species).

**lemnae** Fabricius ウキクサミズゾウ

*Tanysphyrus lemnae* Fabricius, Syst. El. II: 455, 1801 (Europe).

分布：北海道，本州，四国，九州，ヨーロッパ，北アメリカ。

**major** Roelofs オオミズゾウ

*Tanysphyrus major* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVII: 125, 1874 (Orakami).

*Tanysphyrus major* f. *picipes* Voss, Tijdschr. Ent. 80: 153, 1937 (Java).

分布：本州，四国，九州，中国，ジャワ。

Subfamily **Hylobiinae** アナアキゾウムシ亜科

Marshall, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) IX: 341-355, 1932 (Key to tribes).

Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXXIII (3): 223-248, 2 pls, 1934  
(Revision of Japanese species).

Tribe **Paipalesomini**

**Peribleptus** Schönherr, 1843

= *Tenguzo* Kôno, 1929 (Lixini)

**similaris** Voss テングゾウ (新称)

*Peribleptus similaris* Voss, Ent. NachrBl. XIII: 62, 1939 (Tienmuschan, Unzen Shimabara).

分布: 九州, 中国.

Tribe **Lithinini**

**Niphades** Pascoe, 1871

= *Scaphostethus* Roelofs, 1875

= *Pseudoconotrachelus* Voss, 1932

Voss, Senckenbergiana 19: 264-265, 1937 (Key to species).

**variegatus** Roelofs クロコブゾウ

*Scaphostethus variegatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 192, 1873 (Japan).

分布: 北海道, 本州, 四国, 九州, アムール.

**verrucosus** Voss ナガクロコブゾウ

*Pseudoconotrachelus verrucosus* Voss, Wien. Ent. Ztg. 49: 65, 1932 (Szetschwan).

分布: 九州, 中国.

**Nipponiphades** Kôno, 1934

**foveolatus** Hustache コクロアナアキゾウ

*Scaphostethus foveolatus* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 495, 1920  
(Asakawa, Mt. Takao, Kobotoke, Maruko, Nagano).

分布: 本州, 四国, 九州.

**Seleucha** Pascoe, 1871

Voss, Ent. Rev. Japan VIII: 35-36, 1957 (Key).

**chujoi** Voss チュウジョウアナアキゾウ (新称)

*Seleucha chujoi* Voss, Ent. Rev. Japan VIII: 34, 1957 (Kuroson).

分布: 本州, 四国, 九州.

Tribe **Hylobiini**

**Kobuzo** Kôno, 1934

**rectirostris** Roelofs アカコブコブゾウ*Hylobius rectirostris* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 188, 1873 (Japon).

分布：本州，九州。

**Aclees** Schönherr, 1836**hirayamai** Kôno ヒラヤマナガメゾウ*Aclees hirayamai* Kôno, Ins. Mats. VII: 183, 1933 (Iriomote, Formosa).

分布：西表島，台湾。

**Hylobius** Germar, 1817= *Curculio* Gemminger et Harold, 1871= *Hypomolyx* Leconte, 1876= *Pagiophloeus* Faust, 1892= *Dyscerus* Faust, 1892**abietis haroldi** Faust マツアナアキゾウ*Hylobius abietis* var., Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 187, 1873 (Japon).*Hylobius Haroldi* Faust, Deut. Ent. Zschr. XXVI: 273, 1882 (Japan).

分布：本州，四国，九州，朝鮮。

**adachii** Kâno アダチアナアキゾウ*Hylobius adachii* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXXIII: 229, 1934 (Chichibu).

分布：本州。

**albosparsus** Boheman カラフトアナアキゾウ*Hylobius albosparsus* Boheman, Gen. Sp. Curc. VIII (2): 429, 1845 (Siberia).

分布：北海道，樺太，シベリヤ。

**cribratus** Roelofs コクロアナアキゾウ*Hylobius cribratus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 190, 1873 (Japon).

分布：本州，四国，九州。

**cribripennis** Matsumura et Kôno オジロアナアキゾウ*Dyscerus cribripennis* Matsumura et Kôno, Ins. Mats. II: 168, 1928 (Is. Hachijo).

分布：八丈島。

**desbrochersi** Zumpt オリーブアナアキゾウ，トゲアナアキゾウ*Hylobius desbrochersi* Zumpt, Kol. Rdsch. 18: 130, 1932 (new name for *roelofsi* Desbrochers).= *Aclees Roelofsi* Desbrochers, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, Compt. Rend.: cccli, 1891 (Japon).= *Hylobius macilentus* Matsumura (nec Boheman), Dainippon Gaichu Zensho II: 222, 1915,

分布：本州，四国，九州。

**freyi** Zumpt フライアナアキゾウ

*Hylobius freyi* Zumpt, Kol. Rdsch. 18: 128, 1932 (Is. Sado, Tokio, Nikko, Norobetsu Onsen, Yokohama).

= *Hylobius yakui* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXXIII: 234, 1934 (Sapporo, Minomo).

分布：北海道，本州，四国，九州。

**gigas** Kôno フトアナアキゾウ

*Hylobius gigas* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXXIII: 236, 1934 (Jozankei, Berg Eniwa).

分布：北海道，九州。

**elongatus** Roelofs ホソアナアキゾウ

*Hylobius elongatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 190, 1870 (Japan).

分布：本州，四国，九州。

**exsculptus** Roelofs

*Hylobius exsculptus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, Compt Rend.: cxxx, 1875 (Kioto, Hiogo).

分布：本州。

**insularis** Kôno トドマツアナアキゾウ

*Dyscerus insularis* Kôno, Ins. Mats. II: 168, 1928 (Nopporo).

分布：北海道，本州，九州。

**koreanus** Kôno チョウセンアナアキゾウ

*Hylobius koreanus* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXXIII: 233, 1934 (Suigen).

分布：本州，朝鮮。

**laeiventris** Hustache ナガアナアキゾウ

*Hylobius laeiventris* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 497, 1920 (Mt. Takao, Chuzenji, Tokyo, Alpes de Nikko).

分布：本州。

**matsumurai** Zumpt マツムラアナアキゾウ

*Hylobius matsumurai* Zumpt, Ent. Blätt. 34: 82, 1938 (new name for *freyi* Kôno).

= *Hylobius freyi* Kôno (nec Zumpt), J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXXIII: 231, 1934 (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu).

分布：北海道，本州，四国，九州。

**montanus** Kôno ミヤマアナアキゾウ

*Hylobius montanus* Kôno, l. c.: 231 (Teshio, Sounkei, Daisetsu, Shikaribetsu).

分布：北海道。

**orientalis** Motschulsky クスアナアキゾウ

*Heilipus orientalis* Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX: 180, 1866 (Japan).

= *Hylobius okinawanus* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido, Imp. Univ. XXXIII: 237,

1934 (Okinawa). – **syn. nov.**

分布：本州，四国，九州，琉球，台湾，中国.

**perforatus** Roelofs ガロアアナアキゾウ

*Hylobius perforatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI:188, 1873 (Japon).

= *Hylobius galloisi* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXXIII: 235, 1934  
(Sapporo, Chuzenji, Yonezawa).

分布：北海道，本州，九州.

**pinastri karafutonis** Kôno チビマツアナアキゾウ

*Hylobius pinastri karafutonis* Kôno, l. c.: 231 (Sachalin, Hokkaido).

分布：北海道，樺太.

**shikokuensis** Kôno

*Hylobius shikokuensis* Kôno, l. c.: 234 (Awa)

**Hybolius** Chûjô, 1960

**vossi** Chûjô シロアナアキゾウ

*Hylobius vossi* Chûjô, Niponius I (1): 1, 1959 (Kagoshima).

分布：九州.

**Okikuruminus** Kôno, 1934

**oblongus** Hustache ミヤマタマゴゾウ

*Hylobius oblongus* Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1920: 496, 1920 (Kioto,  
Yumoto, Kumanotaira, Chuzenj, Environ de Tokio, Yeso).

分布：北海道，本州.

**roelofsi** Harold キクタマゴゾウ

*Curculio Roelofsi* Harold, Deut. Ent. Zschr. XXII: 84, 1878 (Hakodate).

分布：北海道，本州.

**Poiyaunbeus** Kôno, 1934

**gebleri** Boheman クロアナアキゾウ

*Hylobius gebleri* Boheman, Gen. Sp. Curc. II: 338, 1834 (Siberia).

= *Hylobius signatipennis* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 187, 1873 (Hakodadi).

= *Curculio japonicus* Harold, Deut. Ent. Zschr. XXII: 83, 1878 (Tokio).

分布：北海道，本州，シベリヤ.

**Lepyrus** Schönherr, 1826

Zumpt, Pub. Mus. Ent. Pietro Rossi I: 259–290, 1936 (Revision).

**flavipunctatus** Zumpt オオスジムネゾウ

*Lepyrus flavipunctatus* Zumpt, Ins. Mats. X: 146, 1936 (Daisetsu).

? = *Lepyrus arcticus* Kôno (nec Paykull), Trans. Biogeogr. Soc. Japan I: 98, 1936  
(Daisetsu).

分布：北海道

**japonicus** Roelofs フタキボシゾウ

*Lepyrus japonicus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 186, 1873 (Hiogo).

分布：北海道，本州，九州，アムール，中国。

Tribe Anthonini

Otibazo Morimoto, 1961

**nagasakiensis** Morimoto ナガサキオチバゾウ (新称)

*Otibazo nagasakiensis* Morimoto, Kontyû 29: 26, 1961 (Nagasaki).

分布：九州(長崎市)。

Tribe Liparini

**Euthycus** Pascoe, 1885

**japonicus** Heller オオイカリゾウ

*Euthicus japonicus* Heller, Deut. Ent. Zschr. 1922: 11, 1922 (Japan).

分布：日本。

**Liparus** Olivier, 1807

= *Molytus* Schönherr, 1826

**lewisi** Roelofs リュイスフトゾウ

*Molytus lewisi* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI: 178, 1873 (Hiogo).

分布：本州。

Subfamily BAGOINAE カギアシゾウムシ亜科

**Bagous** Germar, 1817

= *Himeniphades* Kôno, 1934

Schilsky, Käf. Eur. 44: A-X, 1907 (Key to Palearctic species).

**bipunctatus** Kôno カギアシゾウ

*Himeniphades bipunctatus* Kôno, J. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. XXXIII: 246, 1934 (Wakamatsu, Komaba).

分布：北海道，本州，四国，朝鮮。

**kagiashi** Chûjô et Morimoto フタホシカギアシゾウ (新称)

*Bagous (Bagous) kagiashi* Chûjô et Morimoto, Kontyû 27: 150, 1959 (Honshu, Shikoku, Amami-Oshima, Korea).

分布：本州，四国，奄美大島，朝鮮。

Subfamily COSSONINAE キクイゾウムシ亜科

Wollaston, Trans. Ent. Soc. London 1873: 1-43, 1873 (Japanese species).

Wollaston, Trans. Ent. Soc. London 1873: 427-657, 1873 (Generic revision).

Marshall, Proc. R. Ent. Soc. London 6: 54–58, 1937 (Key and notes on some genera).

Voss, Mitt. Münch. Ent. Ges. XLIV/XLV: 182–239, 1955 (Revision of Palaearctic species).

**Choerorrhinus** Fairmaire, 1858

= *Pentacoptus* Wollaston, 1873

Konishi, Ins. Mats. 23: 115–117, 1960 (Revision of Japanese species).

**explanatus** Konishi

*Choerorrhinus explanatus* Konishi, l. c.: 117 (Chigasaki in Kanagawa).

分布：本州.

**gronopiformis** Wollaston

*Pentacoptus gronopiformis* Wollaston, Trans. Ent. Soc. London 1873: 13, 1873 (Nagasaki).

分布：四国(沖ノ島), 九州.

**Tychiodes** Wollaston, 1873

**adamsii** Wollaston

*Tychiodes Adamsii* Wollaston, l. c.: 17 (Awashima).

分布：粟島.

**Phloeophagosoma** Wollaston, 1873

**curvirostre** Wollaston ワシパナヒメキクイゾウ

*Phloeophagosoma curvirostre* Wollaston, Trans. Ent. Soc. London 1873: 26, 1873 (Hiogo).

分布：本州, 三宅島, 四国, 九州, 奄美大島.

**minutum** Wollaston

*Phloeophagosoma minutum* Wollaston, l. c.: 35 (Simabara).

分布：九州.

**Pentarthrum** Wollaston, 1854

**angustissimus** Wollaston

*Pentarthrum angustissimus* Wollaston, l. c.: 14, (Nagasaki).

分布：九州.

**Pholidoforus** Wollaston, 1873

**squamosus** Wollaston

*Pholidoforus squamosus* Wollaston, l. c.: 19 (Nagasaki).

分布：九州.

**Coprodema** Wollaston, 1873



**calandraeforme** Wollaston*Coprodema calandraeforme* Wollaston, *l. c.* : 21 (Nagasaki, Hiogo).

分布：本州，九州。

**Exodema** Wollaston, 1873**sublutosa** Wollaston*Exodema sublutosa* Wollaston, *l. c.* : 23 (Hiogo).

分布：本州。

**Pseudocossonus** Wollaston, 1873Marshall, *Ent. Month. Mag.* XL : 232-233, 1954 (Key).**brachypus** Wollaston*Pseudocossonus brachypus* Wollaston, *l. c.* : 29, (Tomatzu prop Nagasaki).

分布：九州。

**brevitarsis** Wollaston*Pseudocossonus brevitarsis* Wollaston, *l. c.* : 28 (Yokohama).

分布：本州，九州。

**Cossonus** Clairville, 1798**gibbistrois** Roelofs*Cossonus gibbistrois* Roelofs, *Ann. Soc. Ent. Belg.* XVIII, *Compt. Rend.* : cxxxiv, 1875 (Yesso).

分布：北海道，本州。

**Macrorhyncholus** Wollaston, 1873**crassiusculus** Wollaston マツオオキクイゾウ*Macrorhyncholus crassiusculus* Wollaston, *Trans. Ent. Soc. London* 1873 : 34, 1873 (Hiogo).

分布：本州，伊豆大島，三宅島，八丈島，九州，中ノ島，奄美大島。

**?sulcistrois** Voss*Macrorhyncholus* (?) *sulcistrois* Voss, *Ent. Rev. Japan* VIII : 38, 1957 (Aomori).

分布：本州。

**Heterarthrus** Wollaston, 1873**lewisi** Wollaston*Heterarthrus Lewisi* Wollaston, *Trans. Ent. Soc. London* 1873 : 31, 1873 (Nagasaki).

分布：九州。

**pallidipennis** Wollaston*Heterarthrus pallidipennis* Wollaston, *l. c.* : 32 (Nagasaki).

分布：九州.

**pictus** Wollaston

*Heterarthrus pictus* Wollaston, *l. c.*: 636 (Nagasaki).

分布：九州.

**Sphaerocorynes** Wollaston, 1873

**lewisianus** Wollaston

*Sphaerocorynes Lewisianus* Wollaston, *l. c.*: 39 (Nagasaki).

分布：九州.

**Xenomimetes** Wollaston, 1873

Konishi, *Ins. Mats.* 19: 59–63, 1955 (Revision of Japanese species).

**alni** Konishi ハンノキコブキクイゾウ

*Xenomimetes alni* Konishi, *l. c.*: 61, 1955 (Hokkaido, Izu-Oshima, Kyushu).

分布：北海道, 本州, 伊豆大島, 九州.

**destructor** Wollaston マツコブキクイゾウ

*Xenomimetes destructor* Wollaston, *Trans. Ent. Soc. London* 1873: 36, 1873 (Nagasaki).

= *Xenomimetes todomatsuanus* Kôno, *Ins. Mats.* X: 55, 1935 (Hokkaido).

分布：北海道, 本州, 四国, 九州, 樺太, 千島.

**Eremotes** Wollaston, 1861

**elongatus** Gyllenhal クロトドキクイゾウ

*Cossonus elongatus* Gyllenhal, *Ins. Suec.* I (4): 601. 1827 (Sweden).

分布：北海道, 千島, コーカサス, ヨーロッパ, アルゼリヤ.

**Stenoscelis** Wollaston, 1861

Konishi, *Ins. Mats.* 19: 109–112, 1956 (Revision of Japanese species).

**gracilitarsus** Wollaston マツクチブトキクイゾウ

*Stenoscelis gracilitarsus* Wollaston, *Trans. Ent. Soc. London* 1873: 42, 1873 (Hiogo).

分布：本州, 三宅島, 四国, 九州.

**longisetosus** Konishi ケナガクチブトキクイゾウ

*Stenoscelis longisetosus* Konishi, *Ins. Mats.* 19: 110, 1956 (Hokkaido, Honshu).

分布：北海道, 本州.

**Pentacotaster** Chûjô et Voss, 1960

**nagayamai** Chûjô et Voss

*Pentacotaster nagayamai* Chûjô et Voss, *Mem. Fac. Liberal Arts & Educ. Kagawa Univ* II (94): 15, 1960 (Is. Ishigaki, Is. N. Borodino).

分布：琉球.

## Family RHYNCHOPHORIDAE

## Subfamily Cryptoderminae

Bovie, Genera Insectorum, 70, Cryptoderminae 3 pp., 1 col. pl., 1908.

**Cryptoderma** Ritsema, 1885

=*Oxyrhynchus* Schönherr, 1826

**fortunei** Waterhouse オオシロオビゾウ

*Oxyrhynchus Fortunei* Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London (2) 2: 1, 1853 (China Boreali).

分布：本州，四国，九州，中国.

## Subfamily ORTHOGNATHINAE

Voss, Tijdschr. Ent. 1940: 35-61, 1940 (Key to genera).

## Tribe Orthognathini

**Hyposipalus** Voss, 1940

=*Sipalus* Schönherr, 1826

=*Sipalinus* Marshall, 1943

**gigas** Fabricius オオゾウ

*Curculio gigas* Fabricius, Syst. El.: 127, 1775.

=*Sipalus hypocritus* Boheman, Gen. Sp. Curc. VIII (2): 209, 1845.

=*Sipalus formosanus* Kôno, Ins. Mats. IX: 7, 1934 (Formosa).

分布：日本全土，朝鮮，中国，台湾，フィリピン，ボルネオ，ジャワ，ニューギニア，マラヤ，ビルマ，インド，セイロン.

## Tribe Stromboscerini

**Dryophthoroides** Roelofs, 1879

**sulcatus** Roelofs

*Dryophthoroides sulcatus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, Compt. Rend.: liv, 1879 (Japon).

分布：本州，四国，九州.

## Subfamily DRYOPHTHORINAE

**Dryophthorus** Schönherr, 1838

=*Tetratemnus* Wollaston, 1873

**sculpturatus** Wollaston

*Tetratemnus sculpturatus* Wollaston, Trans. Ent. Soc. London 1873: 11, 1873 (Hiogo, Nagasaki).

分布：本州，四国，九州.

## Subfamily RHYNCHOPHORINAE

## Tribe Rhynchophorini

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XIV (XXXIV): 341-342, 1894 (Key to some genera).

**Otidognathus** Lacordaire, 1866

Günther, Temminckia III: 45-108, 1938 (Revision).

**dauidis** Fairmaire ダビドオサゾウ (新称)

*Cyrtotrachelus dauidis* Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France (5) VIII: 127, 1878 (China).

分布：日本 (Günther, 1938 による), 中国.

**jansoni** Roelofs ホホアオサゾウ

*Otidognathus jansoni* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 186, 1875 (Japon).  
= *Otidognathus nigropictus* Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France (5) VIII: 128, 1878 (China).

= *Otidognathus maculipennis* Voss, Ent. Blätt. XXVII: 38, 1931 (China).

分布：本州, 九州, 中国.

**Cosmopolitus** Chevrolat, 1885

**sordidus** Germar, 1824 バシヨウオサゾウ

*Calandra sordidus* Germar, Ins. Spec. Nov.: 299, 1824.

分布：奄美大島, 琉球, 台湾.

**Sphenocorynus** Schönherr, 1838

Günther, Stett. Ent. Ztg. 97: 99-108, 1936 (Key to species).

**ocellatus** Pascoe ヨツメオサゾウ

*Sphenocorynus ocellatus* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX: 376, 1887 (Formosa).

= *Sphenocorynus perelegans* Fairmaire, Bull. Soc. Ent. France 1895: 15, 1895 (Ishigaki).

分布：石垣島, 台湾.

**Aplotes** Chevrolat, 1885

**roelofsi** Chevrolat トホシオサゾウ

*Sphenophorus Roelofsi* Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France (6) II, Bull.: clix. 1882 (new name for *carinicollis* Roelofs).

= *Sphenophorus carinicollis* Roelofs (nec Gyllenhal), Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 187, 1875 (Japon).

分布：本州, 四国, 九州.

**Odoiporus** Chevrolat, 1885

**longicollis** Olivier

*Calandra longicollis* Olivier, Ent. V (83): 86, 1807.  
 = *Sphenophorus glabricollis* Gyllenhal, Gen. Sp. Curc. IV (2): 913, 1838.  
 分布: 日本 (Roelofs, 1875 による), 中国, ビルマ, インド, セイロン.

**Tribe Sitophilini**

Heller, Ent. Blätt. 22; 180-187, 1926; 23: 1-14, 1927 (Key to genera).

**Paracalendra Chûjô et Morimoto, 1959**

**saccharivora** Chûjô et Morimoto サトウキビコクゾウ (新称)

*Paracalendra saccharivora* Chûjô et Morimoto, Akitu VIII: 26, 1959 (Okinawa).  
 分布: 沖縄本島.

**Polytus Faust, 1894**

**mellerborghi** Boheman パシヨウコクゾウ

*Sitophilus mellerborghi* Boheman, Gen. Sp. Curc. IV (2): 976, 1838.  
 分布: 奄美大島, 琉球, 台湾, ミクロネシア, ハワイ, ニューギニア, ジャワ, ビルマ, インド, マダガスカル.

**Diocalandra Faust, 1894**

**elongata** Roelofs ササコクゾウ (新称)

*Calandra elongata* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII: 187, 1875 (Japon).  
 分布: 本州, 九州.

**Sitophilus Schönherr, 1838**

= *Calandra* Schellenberg, 1798  
 = *Calandra* Schellenberg, 1798

**granarius** Linné グラナリアココクゾウ

*Curculio granarius* Linné, Syst. Nat., ed. X: 378, 1758.  
 分布: 世界共通.

**oryzae** Linné コクゾウ

*Curculio oryza* Linné, Amoen. Acad. VI: 395, 1796.  
 = *Sitophilus zea-mais* Motschulsky, Etud. Ent. IV: 77, 1855 (Cayenne).  
 分布: 世界共通.

**sasakii** Takahashi コクゾウ

*Calandra sasakii* Takahashi, Sakumotsu Gaichuron: 164, 1928 (Japan).  
 分布: 世界共通.