

桑本文庫

洋書

0570



ŒUVRES

COMPLÈTES

DE LAPLACE,

PUBLIÉES SOUS LES AUSPICES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

PAR

MM. LES SECRÉTAIRES PERPÉTUELS.

TOME PREMIER.



PARIS,

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES,

SUCCESSION DE MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.

M DCCC LXXVIII

MARUZEN CO LTD  
BOOK DEPARTMENT  
TOKYO

物理

08  
1  
3.1

九州帝國大學理學部  
8440  
物理學教室

桑本文庫

洋書

0570

理學部 洋 題及  
022232002008950  
九州大學藏書







図書番号	801877
部門	
カ一ド	

ŒUVRES

COMPLÈTES

DE LAPLACE.







P. S. LAPLACE.

HAIGEON FINT

M<sup>me</sup> ROUSSAY DEL.

TONY GOUTIERE SCULPT.

Paris, GAUTHIER-VILLARS Editeur.

Imp. Ch. Chardon aîné. — Paris.

DE LAPLACE.

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

DES ARTS ET DES MANUFACTURES

DE PARIS

1796

DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES





ŒUVRES  
COMPLÈTES  
DE LAPLACE,

PUBLIÉES SOUS LES AUSPICES  
DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

PAR  
MM. LES SECRÉTAIRES PERPÉTUELS.

TOME PREMIER.



PARIS,  
GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE  
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES,  
SUCCESSEUR DE MALLET-BACHELIER,  
Quai des Augustins, 55.

M DCCCLXXXVIII



---

## AVERTISSEMENT.

---

Cette nouvelle édition des *OEuvres de Laplace*, publiée par les soins de sa famille, sous les auspices de l'Académie des Sciences, réunit, pour la première fois, aux divers Ouvrages compris dans les éditions précédentes, la collection des Mémoires de l'illustre Astronome, rangée par ordre chronologique.

Elle permettra de comparer la forme définitive de la pensée de l'Auteur aux études par lesquelles il s'était préparé pendant de longues années à élever le monument qui a rendu son nom inséparable de celui de Newton.

Le nouvel hommage rendu à la mémoire de Laplace est dû à l'initiative du Général marquis de Laplace, son fils, dont le testament renfermait les dispositions suivantes :

- » Je veux que, sur les plus clairs deniers de ma succession,
- » une somme de soixante-dix mille francs soit prélevée, pour
- » être affectée à la réimpression des Ouvrages de mon père,
- » dont l'édition imprimée aux frais de l'État, par la loi du
- » 15 juin 1842, est à peu près épuisée.
- » Je prie MM. Dumas et Élie de Beaumont, membres de
- » l'Institut, dont l'attachement à la mémoire de mon père est





» si connu, de vouloir bien se charger de surveiller cette nouvelle édition. »

M<sup>me</sup> la Marquise de Colbert, nièce du Général et petite-fille du grand Astronome, voulant que le témoignage de vénération rendu à la mémoire de son aïeul fût complet, a mis à la disposition de l'Académie la somme importante qu'exigeait la publication de son Oeuvre entière.

M. Élie de Beaumont, Secrétaire perpétuel de l'Académie pour les Sciences mathématiques, étant décédé avant l'ouverture du testament du Général Marquis de Laplace, son successeur, M. J. Bertrand, se trouvait naturellement appelé à le remplacer dans une œuvre de surveillance pour laquelle une haute et particulière compétence le désignait d'ailleurs.

Les soins qu'exigeait ce travail considérable, long et délicat, rendaient indispensable l'active coopération de collaborateurs dévoués et offrant à la Science toutes les garanties nécessaires.

M. Puiseux, Membre de l'Académie des Sciences, et M. Houël, professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux, ont saisi avec empressement l'occasion de donner à la mémoire de Laplace un témoignage de leur vénération. C'est à leurs soins respectueux et à leur profonde intelligence des questions sur lesquelles s'est exercé le génie de Laplace que les astronomes et les géomètres devront reporter toute leur gratitude, lorsqu'ils reconnaîtront avec quelle scrupuleuse fidélité les textes ont été arrêtés, après des études et des comparaisons qui ont toujours permis de remonter à la vraie pensée de l'Auteur.

La partie matérielle de cette importante publication a été confiée à M. Gauthier-Villars. L'habile et consciencieux éditeur

n'a rien négligé pour que l'œuvre fût digne de la grandeur du sujet, de la gloire de l'Auteur et du sentiment pieux de la famille.

L'Académie, sur le Rapport de la Section d'Astronomie et de la Commission administrative, après avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles devait s'accomplir ce travail et des soins dont il était entouré, a décidé, dans la Séance du 16 juillet 1877, que la nouvelle édition serait publiée sous ses auspices et sous sa responsabilité. Les deux Secrétaires perpétuels demeurent, en conséquence, chargés de poursuivre officiellement désormais une mission confiée d'abord à titre privé, par le Général Marquis de Laplace, à l'affection de MM. Dumas et Élie de Beaumont.



---

NOTICE

SUR

LE GÉNÉRAL MARQUIS DE LAPLACE.

---

Le Général Marquis de Laplace (Charles-Émile-Pierre-Joseph), né à Paris, le 15 avril 1789, fils de l'illustre astronome, avait choisi la carrière militaire. Élève de l'École Polytechnique et de l'École de Metz, il entra en 1809, à l'âge de vingt ans, au 2<sup>e</sup> régiment d'artillerie.

La haute situation de son père, entouré du respect universel, chancelier du Sénat et considéré par Napoléon I<sup>er</sup> comme l'une des gloires de son époque et de son Empire, lui aurait rendu facile l'accès des voies paisibles et sans péril de la diplomatie ou de l'administration; il préféra le métier des armes avec les privations, les fatigues et les dangers que ne devaient pas lui épargner les campagnes d'Allemagne, de Russie et de France, pendant lesquelles il s'élevait, par ses services, du grade de sous-lieutenant à celui de chef d'escadron.

Son âme ferme, son amour du devoir et son respect pour la discipline l'avaient préparé à rechercher les périls et à comprendre les obligations de la vie des camps, dans laquelle il avait débuté muni des témoignages de l'affection éclairée et prévoyante de son père :

« C'est avec bien du regret, mon ami », lui écrivait celui-ci, le 17 juin 1809, « que je te vois partir de Metz sans que je puisse t'em-





vi NOTICE SUR LE GÉNÉRAL MARQUIS DE LAPLACE.

» brasser et te donner ma bénédiction. J'espère que tu te feras honneur dans la noble carrière que tu vas parcourir.

» Tu seras ma consolation et celle de ta mère. Je prie Dieu qu'il veuille sur tes jours. Aie-le toujours présent à ta pensée, ainsi que ton père et ta mère. Songe que de toi dépend principalement notre bonheur.

» Malheureusement, retenu à Paris par mes fonctions, je ne puis te témoigner que par écrit combien je t'aime et combien je désire que tu te distingues en servant utilement ton pays. »

Sous tous les rapports, les vœux du grand Astronome furent exaucés, et lorsque, à sa mort, son fils lui succédait à la Chambre des Pairs, en 1827, il était déjà parvenu au grade de colonel dans l'arme de l'artillerie.

Après avoir exercé divers commandements, et notamment à l'École de la Fère et à Vincennes, il fut nommé Général de division en 1843. A partir de cette époque, soit par les inspections générales dont il était chargé chaque année, soit par sa coopération active aux travaux du Comité d'Artillerie, dont il était Membre, il contribua avec une ardeur patriotique et convaincue à toutes les améliorations qui ont successivement transformé le matériel de l'artillerie, l'armement de nos places fortes et la défense de nos côtes.

Jusqu'à la fin de sa carrière, le Général de Laplace a consacré sa vie au culte de la mémoire de son glorieux père, aux soins qu'il rendait à sa mère, parvenue aux dernières limites de l'âge avec toute la vivacité de son rare esprit et toutes les bienveillances de son cœur généreux, à l'armée enfin, à laquelle, au milieu des troubles politiques, il se rattachait toujours en serviteur fidèle et dévoué.

A la Chambre des Pairs et au Sénat, si son rang dans l'armée l'appelait souvent à prendre part à la discussion des projets ayant trait à la constitution militaire de la France ou à l'organisation de nos troupes, son nom le signalait naturellement, dès qu'il s'agissait de questions de nature à intéresser les Sciences.

NOTICE SUR LE GÉNÉRAL MARQUIS DE LAPLACE. vii

Si le Système métrique français, à la création duquel son illustre père avait pris une part prépondérante, s'est établi définitivement dans notre pays et s'il s'est étendu chez la plupart des nations civilisées, il serait injuste d'oublier qu'on le doit en grande partie à ses soins persévérants. Mettant tour à tour en jeu l'influence que sa situation élevée dans l'État lui assurait auprès des représentants des pouvoirs publics, et la confiance qu'il inspirait aux représentants de la Science, excitant les uns et soutenant les autres, il parvint à garantir au Système métrique sa place définitive dans nos lois et à faire passer son usage habituel dans nos mœurs.

Les rapports qui existent entre le Système métrique et le Système monétaire avaient amené le Général de Laplace à porter une attention particulière sur toutes les questions que soulèvent la fabrication et la circulation des monnaies. Sa parole sur ces sujets, considérés pendant longtemps comme entourés de mystère, était toujours écoutée avec faveur et souvent décisive dans le débat. Il s'attachait avec une persévérance infatigable à maintenir le système monétaire en concordance absolue avec le système décimal.

Le Général de Laplace était l'homme du devoir. Ses habitudes simples, son caractère bienveillant, la douceur et la sûreté de son commerce l'avaient entouré dans l'armée, à la Chambre des Pairs et au Sénat, d'un respect qui, provoqué par son nom d'abord, s'adressait bientôt plus particulièrement à sa personne. Dans ce milieu du monde de la guerre ou de la politique, où sa destinée l'avait conduit, le nombre des admirateurs compétents des immortelles Oeuvres de son père n'était pas grand; mais le culte intérieur qu'il portait à sa mémoire n'avait pas besoin d'être entretenu par des manifestations étrangères. Il aimait à se retirer dans cette maison d'Arcueil et à se recueillir près de ce modeste cabinet de travail, témoins respectés de tant de labeurs et de veilles, point de départ de tant de sublimes conceptions.

Après les événements de 1870, le Général de Laplace s'était éloigné du monde et s'était concentré dans ses souvenirs; il fut enlevé à sa famille et à ses amis le 27 octobre 1874, à la suite d'une longue maladie.



VIII NOTICE SUR LE GÉNÉRAL MARQUIS DE LAPLACE.

M<sup>me</sup> de Laplace avait voulu, en 1842, consacrer une part de son patrimoine à publier une édition des OEuvres de son illustre époux; le Gouvernement ne permit pas ce sacrifice; il jugea qu'il appartenait à la France, assez riche alors pour payer sa gloire, d'acquitter la dette de la Science et celle de la Nation. L'édition fut publiée aux frais de l'État.

Le Général Marquis de Laplace n'a pas accepté que, trente ans après, une semblable libéralité fût imposée au pays épuisé par ses malheurs; il n'a pas voulu cependant que les nouvelles générations fussent privées des grands enseignements que les OEuvres de son père offrent aux intelligences élevées, et, par une disposition qui atteste quelles furent les préoccupations constantes de sa vie, il a confié à sa famille et à deux de ses amis le soin d'élever encore une fois un monument à la mémoire de son glorieux père, par la publication complète de ses OEuvres, mais à ses frais et sur ses propres ressources. L'Académie s'est empressée de réclamer sa part dans l'accomplissement de ce devoir.

La Science, dans sa reconnaissance, n'oubliera jamais que c'est au Général de Laplace et à M<sup>me</sup> la Marquise de Colbert qu'elle doit de pouvoir contempler dans leur ensemble les travaux de l'émule de Newton.

TRAITÉ  
DE  
MÉCANIQUE CÉLESTE.

---

QUATRIÈME ÉDITION.

REIMPRIMÉE

D'APRÈS L'ÉDITION PRINCEPS DE 1798-1825.

---





TRAITÉ  
DE  
MÉCANIQUE CÉLESTE,

PAR P. S. LAPLACE,

Membre de l'Institut national de France, et du Bureau  
des Longitudes.

TOME PREMIER.

---

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.

A PARIS,

Chez J. B. M. DUPRAT, Libraire pour les Mathématiques,  
quai des Augustins.

---

AN VII.



## TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.

	Pages
AVERTISSEMENT.....	I
NOTICE SUR LE GÉNÉRAL MARQUIS DE LAPLACE.....	V
PLAN DE L'OUVRAGE.....	I

### PREMIÈRE PARTIE.

#### LIVRE I.

DES LOIS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE ET DU MOUVEMENT.

CHAPITRE I. — <i>De l'équilibre et de la composition des forces qui agissent sur un point matériel</i> .....	5
Du mouvement, de la force, de la composition et décomposition des forces. N <sup>os</sup> 1 et 2. 5 et 9	
Equation de l'équilibre d'un point sollicité par un nombre quelconque de forces agissantes dans des directions quelconques. Méthode pour déterminer, lorsque le point n'est pas libre, la pression qu'il exerce sur la surface ou sur la courbe à laquelle il est assujéti. Théorie des moments. N <sup>o</sup> 3.....	11
CHAPITRE II. — <i>Du mouvement d'un point matériel</i> .....	16
De la loi d'inertie, du mouvement uniforme et de la vitesse. N <sup>o</sup> 4.....	16
Recherche de la relation qui existe entre la force et la vitesse : dans la nature, cette relation est la proportionnalité. Résultats de cette loi. N <sup>os</sup> 5 et 6.....	17 et 20
Équations du mouvement d'un point sollicité par des forces quelconques. N <sup>o</sup> 7.....	21
Expression générale du carré de sa vitesse. Il décrit la courbe dans laquelle l'intégrale du produit de sa vitesse par l'élément de cette courbe est un minimum. N <sup>o</sup> 8.....	23
Méthode pour déterminer la pression qu'un point mù sur une surface ou sur une courbe exerce sur elle. De la force centrifuge. N <sup>o</sup> 9.....	26
Application des principes précédents au mouvement d'un point libre animé par la pesanteur, dans un milieu résistant. Recherche de la loi de la résistance nécessaire pour que le mobile décrive une courbe donnée. Examen particulier du cas où la résistance est nulle. N <sup>o</sup> 10.....	28
Application des mêmes principes au mouvement d'un corps pesant dans une surface sphérique. Détermination de la durée des oscillations du mobile. Les oscillations très-petites sont isochrones. N <sup>o</sup> 11.....	31





	Pages
Recherche de la courbe sur laquelle l'isochronisme a lieu rigoureusement dans un milieu résistant, et particulièrement lorsque la résistance est proportionnelle aux deux premières puissances de la vitesse. N° 12. ....	36
<b>CHAPITRE III. — De l'équilibre d'un système de corps</b> .....	
Conditions de l'équilibre de deux systèmes de points qui se choquent avec des vitesses directement contraires. Ce que l'on entend par la quantité de mouvement d'un corps et par points matériels semblables. N° 13. ....	41
De l'action réciproque des points matériels. La réaction est toujours égale et contraire à l'action. Équation de l'équilibre d'un système de corps, d'où résulte le principe des vitesses virtuelles. Méthode pour déterminer les pressions exercées par les corps sur les surfaces ou sur les courbes auxquelles ils sont assujettis. N° 14. ....	42
Application de ces principes au cas où tous les points du système sont invariablement unis ensemble; conditions de l'équilibre pour un pareil système. Du centre de gravité. Méthode pour déterminer sa position : 1° par rapport à trois plans fixes et rectangulaires; 2° par rapport à trois points donnés dans l'espace. N° 15. ....	48
Conditions de l'équilibre d'un corps solide de figure quelconque. N° 16. ....	52
<b>CHAPITRE IV. — De l'équilibre des fluides</b> .....	
Équations générales de cet équilibre. Application à l'équilibre d'une masse fluide homogène dont la surface extérieure est libre, et qui recouvre un noyau solide fixe, de figure quelconque. N° 17. ....	53
<b>CHAPITRE V. — Principes généraux du mouvement d'un système de corps</b> .....	
Équation générale de ce mouvement. N° 18. ....	57
Développement des principes qu'elle renferme. Du principe des forces vives. Il ne subsiste que dans le cas où les mouvements des corps changent par des nuances insensibles. Moyen d'évaluer l'altération que la force vive éprouve dans les variations brusques des mouvements du système. N° 19. ....	58
Du principe de la conservation du mouvement du centre de gravité. Il subsiste dans le cas même où les corps du système exercent les uns sur les autres une action finie dans un instant. N° 20. ....	62
Du principe de la conservation des aires. Il subsiste, comme le précédent, dans le cas d'un changement brusque dans le mouvement du système. Détermination du système de coordonnées dans lequel la somme des aires décrites par les projections des rayons vecteurs est nulle sur deux des plans rectangulaires formés par les axes de ces coordonnées. Cette somme est un maximum sur le troisième plan rectangulaire; elle est nulle sur tout autre plan perpendiculaire à celui-ci. N° 21. ....	63
Les principes de la conservation des forces vives et des aires ont encore lieu, en supposant à l'origine des coordonnées un mouvement rectiligne et uniforme. Dans ce cas, le plan passant constamment par ce point, et sur lequel la somme des aires décrites par les projections des rayons est un maximum, reste toujours parallèle à lui-même. Les principes des forces vives et des aires peuvent se réduire à des relations entre les coordonnées des distances mutuelles des corps du système. Les plans passant par chacun des corps du système, parallèlement au plan invariable mené par le centre de gravité, jouissent de propriétés analogues. N° 22. ....	69

	Pages
Principe de la moindre action. Combiné avec celui des forces vives, il donne l'équation générale du mouvement. N° 23. ....	72
<b>CHAPITRE VI. — Des lois du mouvement d'un système de corps, dans toutes les relations mathématiquement possibles entre la force et la vitesse</b> .....	
Principes nouveaux qui, dans ce cas général, correspondent à ceux de la conservation des forces vives, des aires, du mouvement du centre de gravité et de la moindre action. Dans un système qui n'éprouve point d'actions étrangères : 1° la somme des forces finies du système, décomposées parallèlement à un axe quelconque, est constante; 2° la somme des forces finies pour faire tourner le système autour d'un axe est constante; 3° la somme des intégrales des forces finies du système, multipliées respectivement par les éléments de leurs directions, est un minimum. Ces trois sommes sont nulles dans l'état d'équilibre. N° 24. ....	74
<b>CHAPITRE VII. — Des mouvements d'un corps solide de figure quelconque</b> .....	
Équations qui déterminent les mouvements de translation et de rotation du corps. N° 25 et 26. ....	80 et 83
Des axes principaux. En général, un corps n'a qu'un système d'axes principaux. Des moments d'inertie. Le plus grand et le plus petit de ces moments appartiennent aux axes principaux, et le plus petit de tous les moments d'inertie a lieu par rapport à l'un des trois axes principaux qui passent par le centre de gravité. Cas où le solide a une infinité d'axes principaux. N° 27. ....	85
Recherche de l'axe instantané de rotation du corps : les quantités qui déterminent sa position par rapport aux axes principaux donnent en même temps la vitesse de rotation. N° 28. ....	90
Équations qui déterminent, en fonction du temps, cette position et celle des axes principaux. Application au cas où le mouvement de rotation est dû à une impulsion qui ne passe point par le centre de gravité. Formule pour déterminer la distance de ce centre à la direction de l'impulsion primitive. Exemple tiré des planètes, et en particulier de la Terre. N° 29. ....	92
Des oscillations d'un corps qui tourne à fort peu près autour d'un des axes principaux. Le mouvement est stable autour des axes principaux dont les moments d'inertie sont le plus grand et le plus petit; il ne l'est pas autour du troisième axe principal. N° 30. Du mouvement d'un corps solide autour d'un axe fixe. Détermination du pendule simple qui oscille dans le même temps que ce corps. N° 31. ....	97 100
<b>CHAPITRE VIII. — Du mouvement des fluides</b> .....	
Équations du mouvement des fluides; condition relative à leur continuité. N° 32. ....	102
Transformation de ces équations; elles sont intégrables lorsque, la densité étant une fonction quelconque de la pression, la somme des vitesses parallèles à trois axes rectangulaires, et multipliées chacune par l'élément de sa direction, est une variation exacte. On prouve que cette condition sera remplie à tous les instants, si elle l'est dans un seul. N° 33. ....	105
Application des principes précédents au mouvement d'une masse fluide homogène, donnée d'un mouvement uniforme de rotation autour d'un des axes des coordonnées. N° 34. Détermination des oscillations très-petites d'une masse fluide homogène, recouvrant un sphéroïde donné d'un mouvement de rotation. N° 35. ....	108 110





	Pages
Application au mouvement de la mer, en la supposant dérangé de l'état d'équilibre par l'action de forces très-petites. N° 36. ....	113
De l'atmosphère terrestre considérée d'abord dans l'état d'équilibre. Des oscillations qu'elle éprouve dans l'état de mouvement, en n'ayant égard qu'aux causes régulières qui l'agitent. Des variations que ces mouvements produisent dans les hauteurs du baromètre. N° 37. ....	117

LIVRE II.

DE LA LOI DE LA PESANTEUR UNIVERSELLE ET DU MOUVEMENT DES CENTRES DE GRAVITÉ DES CORPS CÉLESTES.

CHAPITRE I. — <i>De la loi de la pesanteur universelle, tirée des phénomènes.</i> .....	125
Les aires décrites par les rayons vecteurs des planètes, dans leur mouvement autour du Soleil, étant proportionnelles au temps, la force qui sollicite les planètes est dirigée vers le centre du Soleil, et réciproquement. N° 1. ....	125
Les orbites des planètes et des comètes étant des sections coniques, la force qui les anime est en raison inverse du carré de la distance du centre de ces astres à celui du Soleil. Réciproquement, si la force suit cette raison, la courbe décrite est une section conique. N° 2. ....	126
Les carrés des temps des révolutions des planètes étant proportionnels aux cubes des grands axes de leurs orbites, ou, ce qui revient au même, les aires décrites en temps égal, dans différentes orbites, étant proportionnelles aux racines carrées de leurs paramètres, la force qui sollicite les planètes et les comètes serait la même pour tous ces corps placés à égale distance du Soleil. N° 3. ....	129
Le mouvement des satellites autour de leurs planètes présentant à peu près les mêmes phénomènes que celui des planètes autour du Soleil, les satellites sont sollicités vers leurs planètes et vers le Soleil par des forces réciproques au carré des distances. N° 4. ....	131
Détermination de la parallaxe lunaire, d'après les expériences sur la pesanteur, et dans l'hypothèse de la gravitation en raison inverse du carré des distances. Le résultat obtenu par cette voie se trouvant parfaitement conforme aux observations, la force attractive de la Terre est de la même nature que celle de tous les corps célestes. N° 5. ....	132
Réflexions générales sur ce qui précède : elles conduisent à ce principe, savoir, que toutes les molécules de la matière s'attirent en raison directe des masses, et en raison inverse du carré des distances. N° 6. ....	135
CHAPITRE II. — <i>Des équations différentielles du mouvement d'un système de corps soumis à leur attraction mutuelle.</i> .....	139
Équations différentielles de ce mouvement. N° 7. ....	139
Développement des intégrales que l'on a pu jusqu'à présent en obtenir, et qui résultent des principes de la conservation du mouvement du centre de gravité, des aires et des forces vives. N° 8. ....	141
Équations différentielles du mouvement d'un système de corps soumis à leur attraction mutuelle, autour de l'un d'eux, considéré comme le centre de leurs mouvements; développement des intégrales rigoureuses que l'on sait en déduire. N° 9. ....	143

	Pages
Le mouvement du centre de gravité du système d'une planète et de ses satellites autour du Soleil est à très-peu près le même que si tous les corps de ce système étaient réunis à ce point, et le système agit sur les autres corps à très-peu près comme dans cette hypothèse. N° 10. ....	148
Recherches sur l'attraction des sphéroïdes : cette attraction est donnée par les différences partielles de la fonction qui exprime la somme des molécules, divisées par leurs distances au point attiré. Equation fondamentale aux différences partielles à laquelle cette fonction satisfait. Diverses transformations de cette équation. N° 11. ....	152
Application au cas où le corps attirant est une couche sphérique : il en résulte qu'un point placé dans l'intérieur de la couche est également attiré de toutes parts, et qu'un point placé hors de la couche est attiré par elle comme si sa masse était réunie à son centre. Ce résultat a encore lieu pour les globes formés de couches concentriques d'une densité variable du centre à la circonférence. Recherche des lois d'attraction dans lesquelles ces propriétés subsistent. Dans le nombre infini des lois qui rendent l'attraction très-petite à de grandes distances, celle de la nature est la seule dans laquelle les sphères agissent sur un point extérieur, comme si leurs masses étaient réunies à leurs centres. Cette loi est aussi la seule dans laquelle l'action d'une couche sphérique sur un point placé dans son intérieur est nulle. N° 12. ....	155
Application des formules du n° 11 au cas où le corps attirant est un cylindre dont la base est une courbe rentrante, et dont la longueur est infinie. Lorsque cette courbe est un cercle, l'action du cylindre sur un point extérieur est réciproque à la distance de ce point à l'axe du cylindre. Un point placé dans l'intérieur d'une couche cylindrique circulaire d'une épaisseur constante est également attiré de toutes parts. N° 13. ....	161
Équation de condition relative au mouvement d'un corps. N° 14. ....	163
Diverses transformations des équations différentielles du mouvement d'un système de corps soumis à leur attraction mutuelle. N° 15. ....	167
CHAPITRE III. — <i>Première approximation des mouvements célestes, ou théorie du mouvement elliptique.</i> .....	171
Intégration des équations différentielles qui déterminent le mouvement relatif de deux corps qui s'attirent en raison des masses et réciproquement au carré des distances. La courbe qu'ils décrivent dans ce mouvement est une section conique. Expression du temps en série convergente de sinus et de cosinus du mouvement vrai. Si l'on néglige les masses des planètes relativement à celle du Soleil, les carrés des temps des révolutions sont comme les cubes des grands axes des orbites. Cette loi s'étend au mouvement des satellites autour de leur planète. N° 16. ....	171
Seconde méthode pour l'intégration des équations différentielles du numéro précédent. N° 17. ....	175
Troisième méthode pour l'intégration des mêmes équations. Cette méthode a l'avantage de donner les arbitraires en fonction des coordonnées et de leurs premières différences. N° 18 et 19. ....	178 et 183
Équations finies du mouvement elliptique : expressions de l'anomalie moyenne, du rayon vecteur et de l'anomalie vraie en fonctions de l'anomalie excentrique. N° 20. ....	186
Méthode générale pour la réduction des fonctions en séries : théorèmes qui en résultent. N° 21. ....	188
Application de ces théorèmes au mouvement elliptique. Expressions de l'anomalie excentrique, de l'anomalie vraie et du rayon vecteur des planètes en séries convergentes	c.





	Pages
de sinus et de cosinus de l'anomalie moyenne. Expressions en séries convergentes de la longitude, de la latitude et de la projection du rayon vecteur sur un plan fixe, peu incliné à celui de l'orbite. N° 22.....	196
Expressions convergentes du rayon vecteur et du temps, en fonctions de l'anomalie vraie, dans une orbite fort excentrique. Si l'orbite est parabolique, l'équation entre le temps et l'anomalie vraie est une équation de troisième degré, que l'on résout au moyen de la Table du mouvement des comètes. Correction à faire à l'anomalie vraie calculée dans la parabole, pour avoir l'anomalie vraie, correspondante au même temps, dans une ellipse fort excentrique. N° 23.....	202
Théorie du mouvement hyperbolique. N° 24.....	206
Détermination du rapport des masses des planètes accompagnées de satellites à celle du Soleil. N° 25.....	207
CHAPITRE IV. — <i>Détermination des éléments du mouvement elliptique.</i> .....	210
Formules qui donnent ces éléments, lorsque les circonstances du mouvement primitif sont connues. Expression de la vitesse, indépendante de l'excentricité de l'orbite. Dans la parabole, la vitesse est réciproque à la racine carrée du rayon vecteur. N° 26.....	210
Recherche de la relation qui existe entre le grand axe de l'orbite, la corde de l'arc décrit, le temps employé à le décrire et la somme des rayons vecteurs extrêmes. N° 27.....	214
Moyen le plus propre pour déterminer, par les observations, les éléments des orbites des comètes. N° 28.....	218
Formules pour avoir, d'après un nombre quelconque d'observations voisines, la longitude et la latitude géocentriques d'une comète à un instant donné, ainsi que leurs premières et secondes différences. N° 29.....	220
Méthode générale pour déduire des équations différentielles du mouvement d'un système de corps les éléments des orbites, en supposant connues, pour un instant donné, les longitudes et les latitudes apparentes de ces corps, ainsi que les premières et secondes différences de ces quantités. N° 30.....	224
Application de cette méthode au mouvement des comètes, en les supposant animées par la seule attraction du Soleil : elle donne, par une équation du septième degré, la distance de la comète à la Terre. La seule inspection de trois observations consécutives très-voisines suffit pour reconnaître si la comète est plus près ou plus loin que la Terre du Soleil. N° 31.....	226
Méthode pour avoir aussi exactement que l'on voudra, en n'employant que trois observations, la longitude et la latitude géocentriques d'une comète, ainsi que leurs premières et secondes différences divisées par les puissances correspondantes de l'élément du temps. N° 32.....	231
Détermination des éléments de l'orbite de la comète, lorsque l'on connaît, pour un instant donné, sa distance à la Terre et la première différentielle de cette distance, divisée par l'élément du temps. Moyen simple d'avoir égard à l'excentricité de l'orbite terrestre. N° 33.....	233
Dans le cas de l'orbite parabolique, le grand axe devenant infini, cette condition donne une nouvelle équation du sixième degré pour déterminer la distance de la comète à la Terre. N° 34.....	237
De là résultent diverses méthodes pour calculer les orbites paraboliques. Recherche de celle dont on doit attendre le plus de précision dans les résultats et le plus de simplicité dans le calcul. N° 35 et 36.....	238 et 240

	Pages
Cette méthode se divise en deux parties : dans la première, on détermine d'une manière approchée la distance périhélie de la comète et l'instant de son passage au périhélie; dans la seconde, on donne le moyen de corriger ces deux éléments par trois observations éloignées entre elles, et l'on en déduit tous les autres. N° 37.....	242
Détermination rigoureuse de l'orbite, dans le cas où la comète a été observée dans ses deux nœuds. N° 38.....	252
Méthode pour déterminer l'ellipticité de l'orbite, dans le cas d'une ellipse très-excentrique. N° 39.....	254
CHAPITRE V. — <i>Méthodes générales pour déterminer, par des approximations successives, les mouvements des corps célestes.</i> .....	257
Recherche des changements que l'on doit faire subir aux intégrales des équations différentielles, pour avoir celles des mêmes équations, augmentées de certains termes. N° 40.....	257
On en déduit un moyen simple d'avoir les intégrales rigoureuses des équations différentielles linéaires, lorsque l'on sait intégrer ces mêmes équations privées de leurs derniers termes. N° 41.....	260
On en déduit encore un moyen facile pour obtenir des intégrales de plus en plus approchées des équations différentielles. N° 42.....	263
Méthode pour faire disparaître les arcs de cercle qui se trouvent dans les intégrales approchées, lorsqu'il ne doit pas s'en trouver dans l'intégrale rigoureuse. N° 43 et 44.....	266 et 271
Méthode d'approximation, fondée sur la variation des constantes arbitraires. N° 45.....	272
CHAPITRE VI. — <i>Seconde approximation des mouvements célestes, ou théorie de leurs perturbations.</i> .....	277
Formules du mouvement en longitude et en latitude, et du rayon vecteur dans l'orbite troublée. Forme très-simple sous laquelle elles se présentent, quand on n'a égard qu'à la première puissance des forces perturbatrices. N° 46.....	277
Méthode pour obtenir les perturbations en séries ordonnées par rapport aux puissances et aux produits des excentricités et des inclinaisons des orbites. N° 47.....	282
Développement en série de la fonction des distances mutuelles des corps du système dont leurs perturbations dépendent. Usage du calcul aux différences finies dans ce développement. Réflexions sur cette série. N° 48.....	286
Formules pour calculer ses différents termes. N° 49.....	292
Expressions générales des perturbations du mouvement en longitude et en latitude et du rayon vecteur, en portant la précision jusqu'aux quantités de l'ordre des excentricités et des inclinaisons. N° 50 et 51.....	299 et 305
Rapprochement de ces divers résultats, et considérations sur les approximations ultérieures. N° 52.....	307
CHAPITRE VII. — <i>Des inégalités séculaires des mouvements célestes.</i> .....	309
Ces inégalités naissent des termes qui, dans l'expression des perturbations, renferment le temps hors des signes périodiques. Équations différentielles des éléments du mouvement elliptique, qui font disparaître ces termes. N° 53.....	309
Si l'on n'a égard qu'à la première puissance de la force perturbatrice, les moyens mou-	





	Pages
vements des planètes sont uniformes, et les grands axes de leurs orbites sont constants. N° 54.....	313
Développement des équations différentielles relatives aux excentricités et à la position des périhélie dans un système quelconque d'orbites peu excentriques et peu inclinées entre elles. N° 53.....	318
Intégration de ces équations, et détermination, par les observations, des arbitraires de leurs intégrales. N° 56.....	323
Le système des orbites des planètes et des satellites est stable relativement aux excentricités, c'est-à-dire que ces excentricités restent toujours fort petites, et le système ne fait qu'osciller autour d'un état moyen d'ellipticité dont il s'écarte peu. N° 57.....	327
Expressions différentielles des variations séculaires de l'excentricité et de la position du périhélie. N° 58.....	331
Intégration des équations différentielles relatives aux nœuds et aux inclinaisons des orbites. Dans le mouvement d'un système d'orbites très-peu inclinées entre elles, leurs inclinaisons mutuelles restent toujours très-petites. N° 59.....	334
Expressions différentielles des variations séculaires des nœuds et des inclinaisons des orbites : $1^{\circ}$ par rapport à un plan fixe; $2^{\circ}$ par rapport à l'orbite mobile d'un des corps du système. N° 60.....	337
Relations générales entre les éléments elliptiques d'un système d'orbites, quelles que soient leurs excentricités, et leurs inclinaisons respectives. N° 61.....	339
Recherche du plan invariable ou sur lequel la somme des masses des corps du système, multipliées respectivement par les projections des aires décrites par leurs rayons vecteurs dans un temps donné, est un maximum. Détermination du mouvement de deux orbites inclinées l'une à l'autre, d'un angle quelconque. N° 62.....	343
CHAPITRE VIII. — <i>Seconde méthode d'approximation des mouvements célestes.</i> .....	346
Cette méthode est fondée sur les variations que les éléments du mouvement supposé elliptique éprouvent en vertu des inégalités périodiques et séculaires. Méthode générale pour déterminer ces variations. Les équations finies du mouvement elliptique et leurs premières différentielles sont les mêmes dans l'ellipse variable que dans l'ellipse invariable. N° 63.....	346
Expressions des éléments du mouvement elliptique, dans l'orbite troublée, quelles que soient son excentricité et son inclinaison au plan des orbites des masses perturbatrices. N° 64.....	349
Développement de ces expressions dans le cas des orbites peu excentriques et peu inclinées les unes aux autres. En considérant d'abord les moyens mouvements et les grands axes, on prouve que, si l'on néglige les carrés et les produits des forces perturbatrices, ces deux éléments ne sont assujettis qu'à des inégalités périodiques, dépendantes de la configuration des corps du système. Si les moyens mouvements de deux planètes approchent beaucoup d'être commensurables entre eux, il peut en résulter dans leurs longitudes moyennes deux inégalités très-sensibles, affectées de signes contraires, et réciproques aux produits des masses des corps, par les racines carrées des grands axes de leurs orbites. C'est à de semblables inégalités que sont dus l'accélération du mouvement de Jupiter et le ralentissement de celui de Saturne. Expressions de ces inégalités et de celles que le même rapport des moyens mouvements peut rendre sensibles dans les termes dépendants de la seconde puissance des masses perturbatrices. N° 65.....	356

	Pages
Examen du cas où les inégalités les plus sensibles du moyen mouvement ne se rencontrent que parmi les termes de l'ordre du carré des masses perturbatrices. Cette circonstance très-remarquable a lieu dans le système des satellites de Jupiter, et l'on en déduit ces deux théorèmes : <i>Le moyen mouvement du premier satellite, moins trois fois celui du second, plus deux fois celui du troisième, est exactement et constamment égal à zéro.</i> <i>La longitude moyenne du premier satellite, moins trois fois celle du second, plus deux fois celle du troisième, est constamment égale à deux angles droits.</i> Ces théorèmes subsistent malgré l'altération que les moyens mouvements des satellites peuvent recevoir, soit par une cause semblable à celle qui altère le moyen mouvement de la Lune, soit par la résistance d'un milieu très-rare. Ces théorèmes donnent naissance à une inégalité arbitraire, qui ne diffère pour chacun des trois satellites que par son coefficient, et qui, par les observations, est insensible. N° 66.....	362
Equations différentielles qui déterminent les variations des excentricités et des périhélie. N° 67.....	370
Développement de ces équations. Les valeurs de ces éléments sont formées de deux parties : l'une dépendante de la configuration mutuelle des corps du système, et qui contient les variations périodiques; l'autre indépendante de cette configuration, et qui renferme les variations séculaires. Cette seconde partie est donnée par les mêmes équations différentielles que l'on a considérées précédemment. N° 68.....	375
Moyen très-simple d'obtenir les variations qui résultent du rapport presque commensurable des moyens mouvements, dans les excentricités et les périhélie des orbites; elles sont liées à celles du moyen mouvement qui y correspondent. Elles peuvent produire, dans les expressions séculaires des excentricités et de la longitude des périhélie, des termes sensibles dépendants des carrés et des produits des forces perturbatrices. Détermination de ces termes. N° 69.....	379
Des variations des nœuds et des inclinaisons des orbites. Equations qui déterminent leurs valeurs périodiques et séculaires. N° 70.....	384
Moyen facile d'obtenir les inégalités qui résultent, dans ces éléments, du rapport presque commensurable des moyens mouvements : elles sont liées aux inégalités analogues du moyen mouvement. N° 71.....	388
Recherche de la variation qu'éprouve la longitude de l'époque. C'est de cette variation que dépend l'équation séculaire de la Lune. N° 72.....	392
Réflexions sur les avantages que la méthode précédente, fondée sur la variation des paramètres des orbites, présente dans plusieurs circonstances; moyen d'en conclure les variations de la longitude, de la latitude et du rayon vecteur. N° 73.....	394





TRAITÉ  
DE  
MÉCANIQUE CÉLESTE.

---

Newton publia, vers la fin du dernier siècle, la découverte de la pesanteur universelle. Depuis cette époque, les Géomètres sont parvenus à ramener à cette grande loi de la nature tous les phénomènes connus du Système du monde, et à donner ainsi aux théories et aux Tables astronomiques une précision inespérée. Je me propose de présenter sous un même point de vue ces théories éparses dans un grand nombre d'ouvrages, et dont l'ensemble, embrassant tous les résultats de la gravitation universelle sur l'équilibre et sur les mouvements des corps solides et fluides qui composent le système solaire et les systèmes semblables répandus dans l'immensité des cieux, forme la *Mécanique céleste*. L'Astronomie, considérée de la manière la plus générale, est un grand problème de Mécanique, dont les éléments des mouvements célestes sont les arbitraires; sa solution dépend à la fois de l'exactitude des observations et de la perfection de l'Analyse, et il importe extrêmement d'en bannir tout empirisme et de la réduire à n'emprunter de l'observation que les données indispensables. C'est à remplir, autant qu'il m'a été possible, un objet aussi intéressant, que cet Ouvrage est destiné. Je désire qu'en considération de l'importance et des difficultés de la matière, les Géomètres et les Astronomes le reçoivent avec in-



dulgence, et qu'ils en trouvent les résultats assez simples pour les employer dans leurs recherches. Il sera divisé en deux Parties. Dans la première, je donnerai les méthodes et les formules pour déterminer les mouvements des centres de gravité des corps célestes, la figure de ces corps, les oscillations des fluides qui les recouvrent, et leurs mouvements autour de leurs propres centres de gravité. Dans la seconde Partie, j'appliquerai les formules trouvées dans la première aux planètes, aux satellites et aux comètes; je la terminerai par l'examen de diverses questions relatives au Système du monde et par une Notice historique des travaux des Géomètres sur cette matière. J'adopterai la division décimale de l'angle droit et du jour, et je rapporterai les mesures linéaires à la longueur du mètre, déterminée par l'arc du méridien terrestre compris entre Dunkerque et Barcelone.

## PREMIÈRE PARTIE.

THÉORIE GÉNÉRALE DES MOUVEMENTS ET DE LA FIGURE  
DES CORPS CÉLESTES.





---

## LIVRE PREMIER.

DES LOIS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE ET DU MOUVEMENT.

---

Je vais établir dans ce Livre les principes généraux de l'équilibre et du mouvement des corps, et résoudre les problèmes de Mécanique, dont la solution est indispensable dans la théorie du Système du monde.

---

### CHAPITRE PREMIER.

DE L'ÉQUILIBRE ET DE LA COMPOSITION DES FORCES QUI AGISSENT  
SUR UN POINT MATÉRIEL.

---

1. Un corps nous paraît se mouvoir, lorsqu'il change de situation par rapport à un système de corps que nous jugeons en repos; mais, comme tous les corps, ceux même qui nous semblent jouir du repos le plus absolu, peuvent être en mouvement, on imagine un espace sans bornes, immobile et pénétrable à la matière: c'est aux parties de cet espace réel ou idéal que nous rapportons par la pensée la position des corps, et nous les concevons en mouvement lorsqu'ils répondent successivement à divers lieux de l'espace.

La nature de cette modification singulière, en vertu de laquelle un corps est transporté d'un lieu dans un autre, est et sera toujours inconnue: on l'a désignée sous le nom de *force*, on ne peut déterminer que ses effets et les lois de son action. L'effet d'une force agissant sur un point matériel est de le mettre en mouvement, si rien ne s'y op-

pose; la direction de la force est la droite qu'elle tend à lui faire décrire. Il est visible que, si deux forces agissent dans le même sens, elles s'ajoutent l'une à l'autre, et que, si elles agissent en sens contraire, le point ne se meut qu'en vertu de leur différence. Si leurs directions forment un angle entre elles, il en résulte une force dont la direction est moyenne entre celles des forces composantes. Voyons quelle est cette résultante et sa direction.

Pour cela, considérons deux forces  $x$  et  $y$ , agissant à la fois sur un point matériel  $M$  et formant entre elles un angle droit. Soient  $z$  leur résultante, et  $\theta$  l'angle qu'elle fait avec la direction de la force  $x$ ; les deux forces  $x$  et  $y$  étant données, l'angle  $\theta$  sera déterminé, ainsi que la résultante  $z$ , en sorte qu'il existe entre les trois quantités  $x$ ,  $z$  et  $\theta$  une relation qu'il s'agit de connaître.

Supposons d'abord les forces  $x$  et  $y$  infiniment petites et égales aux différentielles  $dx$  et  $dy$ ; supposons ensuite que,  $x$  devenant successivement  $2x$ ,  $3x$ ,  $\dots$ ,  $y$  devienne  $dy$ ,  $2dy$ ,  $3dy$ ,  $\dots$ ; il est clair que l'angle  $\theta$  sera toujours le même, et que la résultante  $z$  deviendra successivement  $2z$ ,  $3z$ ,  $\dots$ ; ainsi, dans les accroissements successifs des trois forces  $x$ ,  $y$  et  $z$ , le rapport de  $x$  à  $z$  sera constant et pourra être exprimé par une fonction de  $\theta$ , que nous désignerons par  $\varphi(\theta)$ ; on aura donc  $x = z\varphi(\theta)$ , équation dans laquelle on peut changer  $x$  en  $y$ , pourvu que l'on y change semblablement l'angle  $\theta$  dans  $\frac{\pi}{2} - \theta$ ,  $\pi$  étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité.

Maintenant, on peut considérer la force  $x$  comme la résultante de deux forces  $x'$  et  $x''$ , dont la première  $x'$  est dirigée suivant la résultante  $z$ , et dont la seconde  $x''$  est perpendiculaire à cette résultante. La force  $x$ , qui résulte de ces deux nouvelles forces, formant l'angle  $\theta$  avec la force  $x'$  et l'angle  $\frac{\pi}{2} - \theta$  avec la force  $x''$ , on aura

$$x' = x\varphi(\theta) = \frac{x^2}{z}, \quad x'' = x\varphi\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{xy}{z};$$

on peut donc substituer ces deux forces à la force  $x$ . On peut substi-

tuer pareillement à la force  $y$  deux nouvelles forces  $y'$  et  $y''$ , dont la première est égale à  $\frac{y^2}{z}$  et dirigée suivant  $z$ , et dont la seconde est égale à  $\frac{xy}{z}$  et perpendiculaire à  $z$ ; on aura ainsi, au lieu des deux forces  $x$  et  $y$ , les quatre suivantes

$$\frac{x^2}{z}, \quad \frac{y^2}{z}, \quad \frac{xy}{z}, \quad \frac{xy}{z};$$

les deux dernières, agissant en sens contraire, se détruisent; les deux premières, agissant dans le même sens, s'ajoutent et forment la résultante  $z$ ; on aura donc

$$x^2 + y^2 = z^2;$$

d'où il suit que la résultante des deux forces  $x$  et  $y$  est représentée, pour la quantité, par la diagonale du rectangle dont les côtés représentent ces forces.

Déterminons présentement l'angle  $\theta$ . Si l'on fait croître la force  $x$ , de la différentielle  $dx$ , sans faire varier la force  $y$ , cet angle diminuera d'une quantité infiniment petite  $d\theta$ ; or on peut concevoir la force  $dx$  décomposée en deux, l'une  $dx'$  dirigée suivant  $z$ , et l'autre  $dx''$  perpendiculaire à  $z$ ; le point  $M$  sera donc alors sollicité par les deux forces  $z + dx'$  et  $dx''$  perpendiculaires entre elles, et la résultante de ces deux forces, que nous nommerons  $z'$ , fera avec  $dx''$  l'angle  $\frac{\pi}{2} - d\theta$ ; on aura ainsi, par ce qui précède,

$$dx'' = z'\varphi\left(\frac{\pi}{2} - d\theta\right);$$

la fonction  $\varphi\left(\frac{\pi}{2} - d\theta\right)$  est par conséquent infiniment petite et de la forme  $-k d\theta$ ,  $k$  étant une constante indépendante de l'angle  $\theta$ ; on a donc

$$\frac{dx''}{z'} = -k d\theta.$$

$z'$  est, à un infiniment petit près, égal à  $z$ ; de plus,  $dx''$  formant avec



de l'angle  $\frac{\pi}{2} - \theta$ , on a

$$dx^{\rho} = \varphi \left( \frac{\pi}{2} - \theta \right) dx = \frac{y dx}{z},$$

partant

$$d\theta = - \frac{y dx}{k z^2}.$$

Si l'on fait varier la force  $y$  de  $dy$ , en supposant  $x$  constant, on aura la variation correspondante de l'angle  $\theta$ , en changeant dans l'équation précédente  $x$  en  $y$ ,  $y$  en  $x$ , et  $\theta$  dans  $\frac{\pi}{2} - \theta$ ; ce qui donne

$$d\theta = \frac{x dy}{k z^2},$$

en faisant donc varier à la fois  $x$  et  $y$ , la variation totale de l'angle  $\theta$  sera  $\frac{x dy - y dx}{k z^2}$ , et l'on aura

$$\frac{x dy - y dx}{z^2} = k d\theta.$$

Substituant pour  $z^2$  sa valeur  $x^2 + y^2$  et intégrant, on aura

$$\frac{y}{x} = \text{tang}(k\theta + \rho),$$

$\rho$  étant une constante arbitraire. Cette équation, combinée avec celle-ci  $x^2 + y^2 = z^2$ , donne

$$x = z \cos(k\theta + \rho).$$

Il ne s'agit plus que de connaître les deux constantes  $k$  et  $\rho$ ; or, si l'on suppose  $y$  nul, on a évidemment  $z = x$  et  $\theta = 0$ ; donc  $\cos \rho = 1$  et  $x = z \cos k\theta$ . Si l'on suppose  $x$  nul, on a  $z = y$  et  $\theta = \frac{1}{2}\pi$ ;  $\cos k\theta$  étant alors égal à zéro,  $k$  doit être égal à  $2n + 1$ ,  $n$  étant un nombre entier, et dans ce cas  $x$  sera nul toutes les fois que  $\theta$  sera égal à  $\frac{1}{2}\pi$ ; mais,  $x$  étant nul, on a évidemment  $\theta = \frac{1}{2}\pi$ ; donc  $2n + 1 = 1$ , ou  $n = 0$ , et, par conséquent,

$$x = z \cos \theta.$$

De là il suit que la diagonale du rectangle construit sur les droites qui représentent les deux forces  $x$  et  $y$  représente non-seulement la quantité, mais encore la direction de leur résultante. Ainsi l'on peut, à une force quelconque, substituer deux autres forces qui forment les côtés d'un rectangle dont elle est la diagonale; et il est facile d'en conclure que l'on peut décomposer une force en trois autres qui forment les côtés d'un parallélépipède rectangle dont elle est la diagonale.

Soient donc  $a, b, c$  les trois coordonnées rectangulaires de l'extrémité de la droite qui représente une force quelconque, et dont l'origine est celle des coordonnées; cette force sera exprimée par la fonction  $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ , et, en la décomposant parallèlement aux axes des  $a$ , des  $b$  et des  $c$ , les forces partielles seront exprimées respectivement par ces coordonnées.

Soient  $a', b', c'$  les coordonnées d'une seconde force;  $a + a', b + b', c + c'$  seront les coordonnées de la résultante des deux forces, et représenteront les forces partielles dans lesquelles on peut la décomposer parallèlement aux trois axes; d'où il est aisé de conclure que cette résultante est la diagonale du parallélogramme construit sur les deux forces.

En général,  $a, b, c; a', b', c'; a'', b'', c''; \dots$  étant les coordonnées d'un nombre quelconque de forces,  $a + a' + a'' + \dots, b + b' + b'' + \dots, c + c' + c'' + \dots$  seront les coordonnées de la résultante, dont le carré sera la somme des carrés de ces dernières coordonnées; on aura donc ainsi la grandeur et la position de cette résultante.

2. D'un point quelconque de la direction d'une force  $S$ , point que nous prendrons pour l'origine de cette force, menons au point matériel  $M$  une droite, que nous nommerons  $s$ ; soient  $x, y, z$  les trois coordonnées rectangulaires qui déterminent la position du point  $M$ , et  $a, b, c$  les coordonnées de l'origine de la force; on aura

$$s = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}.$$

Si l'on décompose la force  $S$  parallèlement aux axes des  $x$ , des  $y$  et

des  $z$ , les forces partielles correspondantes seront, par le numéro précédent,

$$S \frac{x-a}{s}, S \frac{y-b}{s}, S \frac{z-c}{s}, \text{ ou } S \frac{\partial s}{\partial x}, S \frac{\partial s}{\partial y}, S \frac{\partial s}{\partial z},$$

$\frac{\partial s}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial s}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial s}{\partial z}$  exprimant, suivant la notation reçue, les coefficients des variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ , dans la variation de l'expression précédente de  $s$ .

Si l'on nomme pareillement  $s'$  la distance de M à un point quelconque de la direction d'une autre force  $S'$ , pris pour l'origine de cette force,  $S' \frac{\partial s'}{\partial x}$  sera cette force décomposée parallèlement à l'axe des  $x$ , et ainsi de suite; la somme des forces  $S$ ,  $S'$ ,  $S''$ , ... décomposées parallèlement à cet axe, sera donc  $\Sigma S \frac{\partial s}{\partial x}$ , la caractéristique  $\Sigma$  des intégrales finies exprimant ici la somme des termes  $S \frac{\partial s}{\partial x}$ ,  $S' \frac{\partial s'}{\partial x}$ , ...

Soient  $V$  la résultante de toutes les forces  $S$ ,  $S'$ , ... et  $u$  la distance du point M à un point de la direction de cette résultante, pris pour son origine;  $V \frac{\partial u}{\partial x}$  sera l'expression de cette résultante décomposée parallèlement à l'axe des  $x$ ; on aura donc, par le numéro précédent,

$$V \frac{\partial u}{\partial x} = \Sigma S \frac{\partial s}{\partial x}.$$

On aura pareillement

$$V \frac{\partial u}{\partial y} = \Sigma S \frac{\partial s}{\partial y}, \quad V \frac{\partial u}{\partial z} = \Sigma S \frac{\partial s}{\partial z};$$

d'où l'on tire, en multipliant respectivement ces trois équations par  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ , et en les ajoutant ensemble,

$$(a) \quad V \delta u = \Sigma S \delta s;$$

cette dernière équation ayant lieu, quelles que soient les variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ , elle équivaut aux trois précédentes. Si son second membre est la variation exacte d'une fonction  $\varphi$ , on aura  $V \delta u = \delta \varphi$ , et par conséquent

$$V \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial x};$$

c'est-à-dire que la somme de toutes les forces  $S$ ,  $S'$ , ... décomposées parallèlement à l'axe des  $x$ , est égale à la différence partielle  $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ . Ce cas a généralement lieu lorsque ces forces sont respectivement fonctions de la distance de leur origine au point M. Alors, pour avoir la résultante de toutes ces forces, décomposée parallèlement à une droite quelconque, on prendra l'intégrale  $\Sigma / S \delta s$ , et, en nommant  $\varphi$  cette intégrale, on la considérera comme une fonction de  $x$  et de deux autres droites perpendiculaires entre elles et à  $x$ ; la différence partielle  $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$  sera la résultante des forces  $S$ ,  $S'$ , ... décomposée parallèlement à la droite  $x$ .

3. Lorsque le point M est en équilibre en vertu de toutes les forces qui le sollicitent, leur résultante est nulle, et l'équation (a) devient

$$(b) \quad 0 = \Sigma S \delta s,$$

c'est-à-dire que, dans le cas de l'équilibre d'un point sollicité par un nombre quelconque de forces, la somme des produits de chaque force par l'élément de sa direction est nulle.

Si le point M est forcé d'être sur une surface courbe, il éprouvera de sa part une réaction, que nous désignerons par  $R$ . Cette réaction est égale et directement contraire à la pression que le point exerce sur la surface: car, en le concevant animé des deux forces  $R$  et  $-R$ , on peut supposer que la force  $-R$  est détruite par la réaction de la surface, et qu'ainsi le point M presse la surface avec la force  $-R$ . Or la force de pression d'un point sur une surface lui est perpendiculaire; autrement elle pourrait se décomposer en deux, l'une perpendiculaire à la surface, et qui serait détruite par elle, l'autre parallèle à la surface, et en vertu de laquelle le point n'aurait point d'action sur cette surface, ce qui est contre la supposition; en nommant donc  $r$  la perpendiculaire menée par le point M à la surface, et terminée à un point quelconque de sa direction, la force  $R$  sera dirigée suivant cette perpendiculaire: il faudra donc ajouter  $R \delta r$  au second membre de l'équation (b), qui devient ainsi

$$(c) \quad 0 = \Sigma S \delta s + R \delta r;$$



— R étant alors la résultante de toutes les forces S, S',...., elle est perpendiculaire à la surface.

Si l'on suppose que les variations arbitraires  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  appartiennent à la surface courbe sur laquelle le point est assujéti, on a, par la nature de la perpendiculaire à cette surface,  $\delta r = 0$ , ce qui fait disparaître  $R\delta r$  de l'équation précédente : l'équation (b) a donc encore lieu dans ce cas, pourvu que l'on élimine l'une des trois variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  au moyen de l'équation à la surface; mais alors l'équation (b), qui dans le cas général équivaut à trois équations, n'équivaut plus qu'à deux équations distinctes, que l'on obtient en égalant séparément à zéro les coefficients des deux différentielles restantes. Soit  $u = 0$  l'équation de la surface; les deux équations  $\delta r = 0$  et  $\delta u = 0$  auront lieu en même temps, ce qui exige que  $\delta r$  soit égal à  $N\delta u$ , N étant fonction de  $x$ ,  $y$ ,  $z$ . Pour la déterminer, nommons  $a$ ,  $b$ ,  $c$  les coordonnées de l'origine de  $r$ ; on aura

$$r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2},$$

d'où l'on tire  $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial r}{\partial z}\right)^2 = 1$ , et par conséquent

$$N^2 \left[ \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 \right] = 1;$$

en faisant donc

$$\lambda = \frac{R}{\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2}},$$

le terme  $R\delta r$  de l'équation (c) se changera dans  $\lambda\delta u$ , et cette équation deviendra

$$0 = \sum S\delta s + \lambda\delta u,$$

équation dans laquelle on doit éгалer séparément à zéro les coefficients des variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ , ce qui donne trois équations; mais elles n'équivalent qu'à deux équations entre  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , à cause de l'indéterminée  $\lambda$  qu'elles renferment. On peut donc, au lieu d'éliminer de l'équation (b) une des variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  au moyen de l'équation différentielle à la surface, lui ajouter cette équation multipliée par une indéterminée  $\lambda$ .

et considérer alors les variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  comme indépendantes. Cette méthode, qui résulte encore de la théorie de l'élimination, réunit à l'avantage de simplifier le calcul celui de faire connaître la pression — R que le point M exerce contre la surface.

Concevons ce point renfermé dans un canal à simple ou à double courbure; il éprouvera de la part de ce canal une réaction que nous désignerons par  $k$ , et qui sera égale et directement contraire à la pression que le point exerce contre le canal, et dont la direction sera perpendiculaire au côté du canal. Or la courbe formée par ce canal est l'intersection de deux surfaces dont les équations expriment sa nature; on peut donc considérer la force  $k$  comme la résultante des deux réactions R et R' que le point M éprouve de la part de chacune des surfaces, puisque, les directions des trois forces R, R' et  $k$  étant perpendiculaires au côté de la courbe, elles sont dans un même plan. En nommant ainsi  $\delta r$  et  $\delta r'$  les éléments des directions des forces R et R', directions respectivement perpendiculaires à chaque surface, il faudra ajouter à l'équation (b) les deux termes  $R\delta r$  et  $R'\delta r'$ , ce qui la change dans celle-ci

$$(d) \quad 0 = \sum S\delta s + R\delta r + R'\delta r'.$$

Si l'on détermine les variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  de manière qu'elles appartiennent à la fois aux deux surfaces, et par conséquent à la courbe formée par le canal,  $\delta r$  et  $\delta r'$  seront nuls, et l'équation précédente se réduira à l'équation (b), qui par conséquent a encore lieu dans le cas où le point M est assujéti à se mouvoir dans un canal; pourvu qu'au moyen des deux équations qui expriment la nature de ce canal, on fasse disparaître deux des variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ .

Supposons que  $u = 0$  et  $u' = 0$  soient les équations de deux surfaces dont l'intersection forme le canal; si l'on fait

$$\lambda = \frac{R}{\sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2}},$$

$$\lambda' = \frac{R'}{\sqrt{\left(\frac{\partial u'}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u'}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u'}{\partial z}\right)^2}},$$

l'équation (d) deviendra

$$0 = \Sigma S \delta s + \lambda \delta u + \lambda' \delta u',$$

équation dans laquelle on égalera séparément à zéro les coefficients de chacune des variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ ; on aura ainsi trois équations au moyen desquelles on déterminera les valeurs de  $\lambda$  et de  $\lambda'$ , qui donneront les réactions R et R' des deux surfaces; et, en les composant, on aura la réaction  $k$  du canal sur le point M, et par conséquent la pression que ce point exerce contre le canal. Cette réaction, décomposée parallèlement à l'axe des  $x$ , est égale à

$$R \frac{\partial r}{\partial x} + R' \frac{\partial r'}{\partial x}, \text{ ou à } \lambda \frac{\partial u}{\partial x} + \lambda' \frac{\partial u'}{\partial x};$$

les équations de condition  $u = 0$ ,  $u' = 0$ , auxquelles le mouvement du point M est assujéti, expriment donc, au moyen des différences partielles des fonctions qui sont nulles en vertu de ces équations, les résistances que le mobile éprouve en vertu des conditions de son mouvement.

On voit, par ce qui précède, que l'équation (b) de l'équilibre a généralement lieu, pourvu que l'on assujétisse les variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  aux conditions de l'équilibre. Cette équation peut se traduire dans le principe suivant :

*Si l'on fait varier infiniment peu la position du point M, en sorte qu'il reste toujours sur la surface ou sur la courbe qu'il doit suivre s'il n'est pas entièrement libre, la somme des forces qui le sollicitent, multipliées chacune par l'espace que le point parcourt suivant sa direction, est égale à zéro, dans le cas de l'équilibre.*

Les variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  étant supposées arbitraires et indépendantes, on peut dans l'équation (a) substituer aux coordonnées  $x$ ,  $y$ ,  $z$  trois autres quantités qui en soient fonctions, et égaliser les coefficients des variations de ces quantités à zéro. Nommons ainsi  $\rho$  le rayon mené de l'origine des coordonnées à la projection du point M sur le plan des  $x$  et des  $y$ , et  $\sigma$  l'angle formé par  $\rho$  et par l'axe des  $x$ ; nous aurons

$$x = \rho \cos \sigma, \quad y = \rho \sin \sigma.$$

En considérant donc, dans l'équation (a),  $u$ ,  $s$ ,  $s'$ ,... comme fonctions de  $\rho$ ,  $\sigma$  et  $z$ , et comparant les coefficients de  $\delta \sigma$ , on aura

$$(e) \quad V \frac{\partial u}{\partial \sigma} = \Sigma S \frac{\partial s}{\partial \sigma};$$

$\frac{V \partial u}{\rho \partial \sigma}$  est l'expression de la force V décomposée suivant l'élément  $\rho \delta \sigma$ . Soit V' cette force décomposée parallèlement au plan des  $x$  et des  $y$ , et  $p$  la perpendiculaire abaissée de l'axe des  $z$  sur la direction de V, parallèlement au même plan;  $\frac{pV'}{\rho}$  sera une seconde expression de la force V décomposée suivant l'élément  $\rho \delta \sigma$ ; on aura donc

$$pV' = V \frac{\partial u}{\partial \sigma}.$$

Si l'on conçoit la force V appliquée à l'extrémité de la perpendiculaire  $p$ , elle tendra à la faire tourner autour de l'axe des  $z$ ; le produit de cette force par la perpendiculaire est ce que l'on nomme *moment* de la force V par rapport à l'axe des  $z$ ; ce moment est donc égal à  $V \frac{\partial u}{\partial \sigma}$ ; et il résulte de l'équation (e) que le moment de la résultante d'un nombre quelconque des forces est égal à la somme des moments de ces forces.



## CHAPITRE II.

## DU MOUVEMENT D'UN POINT MATÉRIEL.

4. Un point en repos ne peut se donner aucun mouvement, puisqu'il ne renferme pas en lui-même de raison pour se mouvoir dans un sens plutôt que dans un autre. Lorsqu'il est sollicité par une force quelconque, et ensuite abandonné à lui-même, il se meut constamment d'une manière uniforme dans la direction de cette force, s'il n'éprouve aucune résistance. Cette tendance de la matière à persévérer dans son état de mouvement ou de repos est ce que l'on nomme *inertie*. C'est la première loi du mouvement des corps.

La direction du mouvement en ligne droite suit évidemment de ce qu'il n'y a aucune raison pour que le point s'écarte plutôt à droite qu'à gauche de sa direction primitive; mais l'uniformité de son mouvement n'est pas de la même évidence. La nature de la force motrice étant inconnue, il est impossible de savoir *a priori* si cette force doit se conserver sans cesse. A la vérité, un corps étant incapable de se donner aucun mouvement à lui-même, il paraît également incapable d'altérer celui qu'il a reçu; en sorte que la loi d'inertie est au moins la plus naturelle et la plus simple que l'on puisse imaginer; elle est d'ailleurs confirmée par l'expérience: en effet, nous observons sur la Terre que les mouvements se perpétuent plus longtemps, à mesure que les obstacles qui s'y opposent viennent à diminuer; ce qui nous porte à croire que, sans ces obstacles, ils dureraient toujours. Mais l'inertie de la matière est principalement remarquable dans les mouvements célestes, qui, depuis un

grand nombre de siècles, n'ont point éprouvé d'altération sensible. Ainsi nous regarderons l'inertie comme une loi de la nature, et, lorsque nous observerons de l'altération dans le mouvement d'un corps, nous supposerons qu'elle est due à l'action d'une cause étrangère.

Dans le mouvement uniforme, les espaces parcourus sont proportionnels aux temps; mais les temps employés à décrire un espace déterminé sont plus ou moins longs, suivant la grandeur de la force motrice. Ces différences ont fait naître l'idée de *vitesse*, qui, dans le mouvement uniforme, est le rapport de l'espace au temps employé à le parcourir; ainsi,  $s$  représentant l'espace,  $t$  le temps et  $v$  la vitesse, on a  $v = \frac{s}{t}$ . Le temps et l'espace étant des quantités hétérogènes, et par conséquent incomparables, on choisit un intervalle de temps déterminé, tel que la seconde, pour unité de temps; on choisit pareillement une unité d'espace, telle que le mètre; et alors l'espace et le temps sont des nombres abstraits, qui expriment combien ils renferment d'unités de leur espèce, et qui peuvent être comparés l'un à l'autre. La vitesse devient ainsi le rapport de deux nombres abstraits, et son unité est la vitesse du corps qui parcourt un mètre dans une seconde.

5. La force n'étant connue que par l'espace qu'elle fait décrire dans un temps déterminé, il est naturel de prendre cet espace pour sa mesure; mais cela suppose que plusieurs forces, agissant dans le même sens, feront parcourir un espace égal à la somme des espaces que chacune d'elles eût fait parcourir séparément, ou, ce qui revient au même, que la force est proportionnelle à la vitesse. C'est ce que nous ne pouvons pas savoir *a priori*, vu notre ignorance sur la nature de la force motrice; il faut donc encore, sur cet objet, recourir à l'expérience; car tout ce qui n'est pas une suite nécessaire du peu de données que nous avons sur la nature des choses n'est pour nous qu'un résultat de l'observation.

Nommons  $v$  la vitesse de la Terre, commune à tous les corps qui sont à sa surface. Soit  $f$  la force dont un de ces corps  $M$  est animé en vertu de cette vitesse, et supposons que  $v = f \varphi(f)$  soit la relation qui existe



entre la vitesse et la force,  $\varphi(f)$  étant une fonction de  $f$ , qu'il faut déterminer par l'expérience. Soient  $a, b, c$  les trois forces partielles dans lesquelles la force  $f$  se décompose parallèlement à trois axes perpendiculaires entre eux. Concevons ensuite le mobile M sollicité par une nouvelle force  $f$ , qui se décompose en trois autres  $a', b', c'$ , parallèles aux mêmes axes. Les forces dont ce mobile sera animé suivant ces axes seront  $a+a', b+b', c+c'$ ; et, en nommant F la force unique qui en résulte, on aura, par ce qui précède,

$$F = \sqrt{(a+a')^2 + (b+b')^2 + (c+c')^2}.$$

Si l'on nomme U la vitesse correspondante à F,  $\frac{(a+a')U}{F}$  sera cette vitesse décomposée parallèlement à l'axe des  $a$ ; ainsi la vitesse relative du mobile sur la Terre sera, parallèlement à cet axe,

$$\frac{(a+a')U}{F} - \frac{av}{f}, \text{ ou } (a+a')\varphi(F) - a\varphi(f).$$

Les forces les plus considérables que nous puissions imprimer aux corps à la surface de la Terre étant beaucoup plus petites que celles dont ils sont animés en vertu du mouvement de la Terre, nous pouvons considérer  $a', b', c'$  comme des quantités infiniment petites relativement à  $f$ ; nous aurons ainsi

$$F = f + \frac{aa' + bb' + cc'}{f}, \text{ et } \varphi(F) = \varphi(f) + \frac{(aa' + bb' + cc')}{f} \varphi'(f),$$

$\varphi'(f)$  étant la différentielle de  $\varphi(f)$  divisée par  $df$ . La vitesse relative de M, suivant l'axe des  $a$ , deviendra ainsi

$$a'\varphi(f) + \frac{a}{f}(aa' + bb' + cc')\varphi'(f).$$

Ses vitesses relatives, suivant les axes des  $b$  et des  $c$ , seront

$$b'\varphi(f) + \frac{b}{f}(aa' + bb' + cc')\varphi'(f),$$

$$c'\varphi(f) + \frac{c}{f}(aa' + bb' + cc')\varphi'(f).$$

La position des axes des  $a$ , des  $b$  et des  $c$  étant arbitraire, nous pouvons prendre la direction de la force imprimée pour l'axe des  $a$ , et alors  $b'$  et  $c'$  seront nuls; les vitesses relatives précédentes se changent dans celles-ci

$$a'[\varphi(f) + \frac{a^2}{f}\varphi'(f)], \frac{ab}{f}a'\varphi'(f), \frac{ac}{f}a'\varphi'(f).$$

Si  $\varphi'(f)$  n'est pas nul, le mobile, en vertu de la force imprimée  $a'$ , aura une vitesse relative perpendiculaire à la direction de cette force, pourvu que  $b$  et  $c$  ne soient pas nuls, c'est-à-dire, pourvu que la direction de cette force ne coïncide pas avec celle du mouvement de la Terre. Ainsi, en concevant qu'un globe en repos sur un plan horizontal très-uni vienne à être frappé par la base d'un cylindre droit, mû suivant la direction de son axe supposé horizontal, le mouvement relatif apparent du globe ne serait point parallèle à cet axe dans toutes les positions de l'axe par rapport à l'horizon. Voilà donc un moyen simple de reconnaître par l'expérience si  $\varphi'(f)$  a une valeur sensible sur la Terre; mais les expériences les plus précises ne font apercevoir, dans le mouvement apparent du globe, aucune déviation de la direction de la force imprimée; d'où il suit que sur la Terre  $\varphi'(f)$  est nul à très-peu près. Sa valeur, pour peu qu'elle fût sensible, se manifesterait principalement dans la durée des oscillations du pendule, durée qui serait différente suivant la position du plan de son mouvement par rapport à la direction du mouvement de la Terre. Les observations les plus exactes ne laissant apercevoir aucune différence semblable, nous devons en conclure que  $\varphi'(f)$  est insensible et peut être supposé nul sur la Terre.

Si l'équation  $\varphi'(f) = 0$  avait lieu quelle que soit la force  $f$ ,  $\varphi(f)$  serait constant, et la vitesse serait proportionnelle à la force; elle lui serait encore proportionnelle si la fonction  $\varphi(f)$  n'était composée que d'un seul terme, puisque, autrement,  $\varphi'(f)$  ne serait jamais nul,  $f$  ne l'étant pas; il faudrait donc, si la vitesse n'était pas proportionnelle à la force, supposer que, dans la nature, la fonction de la vitesse qui exprime la force est formée de plusieurs termes, ce qui est peu probable; il faudrait supposer, de plus, que la vitesse de la Terre est exactement



celle qui convient à l'équation  $\varphi'(f) = 0$ , ce qui est contre toute vraisemblance. D'ailleurs la vitesse de la Terre varie dans les diverses saisons de l'année : elle est d'un trentième environ plus grande en hiver qu'en été. Cette variation est plus considérable encore si, comme tout paraît l'indiquer, le Système solaire est en mouvement dans l'espace : car, selon que ce mouvement progressif conspire avec celui de la Terre, ou selon qu'il lui est contraire, il doit en résulter, pendant le cours de l'année, de grandes variations dans le mouvement absolu de la Terre, ce qui devrait altérer l'équation dont il s'agit et le rapport de la force imprimée à la vitesse absolue qui en résulte, si cette équation et ce rapport n'étaient pas indépendants du mouvement de la Terre : cependant l'observation n'y fait apercevoir aucune altération sensible.

Voilà donc deux lois du mouvement : savoir, la loi d'inertie et celle de la force proportionnelle à la vitesse, qui sont données par l'observation. Elles sont les plus naturelles et les plus simples que l'on puisse imaginer, et sans doute elles dérivent de la nature même de la matière ; mais, cette nature étant inconnue, elles ne sont pour nous que des faits observés, les seuls, au reste, que la Mécanique emprunte de l'expérience.

6. La vitesse étant proportionnelle à la force, ces deux quantités peuvent être représentées l'une par l'autre, et tout ce que nous avons établi précédemment sur la composition des forces s'applique à la composition des vitesses. Il en résulte que les mouvements relatifs d'un système de corps animés de forces quelconques sont les mêmes, quel que soit leur mouvement commun ; car ce dernier mouvement, décomposé en trois autres parallèles à trois axes fixes, ne fait qu'accroître d'une même quantité les vitesses partielles de chaque corps parallèlement à ces axes ; et comme leur vitesse relative ne dépend que de la différence de ces vitesses partielles, elle est la même, quel que soit le mouvement commun à tous les corps : il est donc impossible alors de juger du mouvement absolu d'un système dont on fait partie, par les apparences que l'on y observe, et c'est ce qui caractérise la loi de la proportionnalité de la force à la vitesse.

Il résulte encore du n° 3 que, si l'on projette chaque force et leur résultante sur un plan fixe, la somme des moments des forces composantes ainsi projetées, par rapport à un point fixe pris sur le plan, est égale au moment de la projection de la résultante : or, si de ce point on mène au mobile un rayon que nous nommerons *rayon vecteur*, ce rayon, projeté sur le plan fixe, y tracerait, en vertu de chaque force agissant séparément, une aire égale au produit de la projection de la ligne qu'elle ferait décrire par la moitié de la perpendiculaire abaissée du point fixe sur cette projection : cette aire est donc proportionnelle au temps. Elle est encore, dans un temps donné, proportionnelle au moment de la projection de la force ; ainsi la somme des aires que tracerait la projection du rayon vecteur en vertu de chaque force composante, si elle agissait seule, est égale à l'aire que la résultante fait décrire à cette projection. Il suit de là que, si un mobile, projeté d'abord en ligne droite, est ensuite sollicité par des forces quelconques dirigées vers le point fixe, son rayon vecteur décrira toujours autour de ce point des aires proportionnelles aux temps, puisque les aires, que feraient décrire à ce rayon les nouvelles composantes, seraient nulles. Réciproquement, on voit que, si le mobile décrit autour du point fixe des aires proportionnelles aux temps, la résultante des nouvelles forces qui le sollicitent est constamment dirigée vers ce point.

7. Considérons maintenant le mouvement d'un point sollicité par des forces qui semblent agir d'une manière continue, telles que la pesanteur. Les causes de cette force et des forces semblables qui ont lieu dans la nature étant inconnues, il est impossible de savoir si elles agissent sans interruption, ou si leurs actions successives sont séparées par des intervalles de temps dont la durée est insensible ; mais il est facile de s'assurer que les phénomènes doivent être à très-peu près les mêmes dans ces deux hypothèses ; car, si l'on représente la vitesse d'un corps sollicité par une force sans cesse agissante, par l'ordonnée d'une courbe dont l'abscisse représente le temps, cette courbe, dans la seconde hypothèse, se changera dans un polygone d'un très-grand nombre de



côtés, et qui, par cette raison, pourra se confondre avec la courbe. Nous adopterons la première hypothèse avec les Géomètres, et nous supposons que l'intervalle de temps, qui sépare deux actions consécutives d'une force quelconque, est égal à l'élément  $dt$  du temps que nous désignerons par  $t$ . Il est clair qu'il faut alors supposer l'action de la force d'autant plus considérable, que l'intervalle qui sépare ses actions successives est supposé plus grand, afin qu'après le même temps  $t$  la vitesse soit la même; l'action instantanée d'une force doit donc être supposée en raison de son intensité et de l'élément du temps pendant lequel elle est supposée agir. Ainsi, en représentant par  $P$  cette intensité, on doit supposer, au commencement de chaque instant  $dt$ , le mobile sollicité par une force  $P dt$ , et mû uniformément pendant cet instant. Cela posé :

On peut réduire toutes les forces qui sollicitent un point  $M$  à trois forces  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ , agissant parallèlement à trois coordonnées rectangles  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , qui déterminent la position de ce point; nous supposons ces forces agir en sens contraire de l'origine de ces coordonnées, ou tendre à les accroître. Au commencement d'un nouvel instant  $dt$ , le mobile reçoit, dans le sens de chacune de ces coordonnées, les accroissements de force ou de vitesse  $P dt$ ,  $Q dt$ ,  $R dt$ . Les vitesses du point  $M$ , parallèles à ces coordonnées, sont  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$ ; car, dans un instant infiniment petit, elles peuvent être censées uniformes, et par conséquent égales aux espaces élémentaires divisés par l'élément du temps. Les vitesses dont le mobile est animé au commencement d'un nouvel instant sont par conséquent

$$\frac{dx}{dt} + P dt, \quad \frac{dy}{dt} + Q dt, \quad \frac{dz}{dt} + R dt,$$

ou

$$\frac{dx}{dt} + d \frac{dx}{dt} - d \frac{dx}{dt} + P dt,$$

$$\frac{dy}{dt} + d \frac{dy}{dt} - d \frac{dy}{dt} + Q dt,$$

$$\frac{dz}{dt} + d \frac{dz}{dt} - d \frac{dz}{dt} + R dt.$$

Mais, dans ce nouvel instant, les vitesses dont le mobile est animé parallèlement aux coordonnées  $x$ ,  $y$ ,  $z$  sont évidemment

$$\frac{dx}{dt} + d \frac{dx}{dt}, \quad \frac{dy}{dt} + d \frac{dy}{dt}, \quad \frac{dz}{dt} + d \frac{dz}{dt};$$

les forces

$$-d \frac{dx}{dt} + P dt, \quad -d \frac{dy}{dt} + Q dt, \quad -d \frac{dz}{dt} + R dt$$

doivent donc être détruites, en sorte que le mobile  $M$ , en vertu de ces forces seules, serait en équilibre. Ainsi, en désignant par  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  les variations quelconques des trois coordonnées  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , variations qu'il ne faut pas confondre avec les différences  $dx$ ,  $dy$ ,  $dz$  qui expriment les espaces que le mobile décrit parallèlement aux coordonnées durant l'instant  $dt$ , l'équation (b) du n° 3 deviendra

$$(f) \quad 0 = \delta x \left( d \frac{dx}{dt} - P dt \right) + \delta y \left( d \frac{dy}{dt} - Q dt \right) + \delta z \left( d \frac{dz}{dt} - R dt \right).$$

Si le point  $M$  est libre, on égalera séparément à zéro les coefficients de  $\delta x$ ,  $\delta y$  et  $\delta z$ , et l'on aura, en supposant constant l'élément  $dt$  du temps, les trois équations différentielles

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = P, \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = Q, \quad \frac{d^2 z}{dt^2} = R.$$

Si le point  $M$  n'est pas libre, en sorte qu'il soit assujéti à se mouvoir sur une surface ou sur une ligne courbe, on éliminera de l'équation (f), au moyen des équations à la surface ou à la courbe, autant de variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  qu'il y aura d'équations, et l'on égalera séparément à zéro les coefficients des variations restantes.

8. On peut supposer dans l'équation (f) les variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  égales aux différentielles  $dx$ ,  $dy$ ,  $dz$ , puisque ces différentielles sont nécessairement assujétiées aux conditions du mouvement du mobile  $M$ . En faisant cette supposition, et en intégrant ensuite l'équation (f), on aura

$$\frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} = c + 2f(P dx + Q dy + R dz),$$



$c$  étant une constante arbitraire,  $\frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2}$  est le carré de la vitesse de  $M$ , vitesse que nous désignerons par  $v$ ; en supposant donc que  $Pdx + Qdy + Rdz$  soit la différence exacte d'une fonction  $\varphi$ , on aura

$$(g) \quad v^2 = c + 2\varphi.$$

Ce cas a lieu lorsque les forces qui sollicitent le point  $M$  sont fonctions des distances de leurs origines à ce point, ce qui comprend à peu près toutes les forces de la nature. En effet,  $S, S', \dots$  représentant ces forces, et  $s, s', \dots$  étant les distances du point  $M$  à leurs origines, la résultante de toutes ces forces, multipliée par la variation de sa direction, sera, par le n° 2, égale à  $\Sigma S \delta s$ ; elle est encore égale à  $P \delta x + Q \delta y + R \delta z$ ; on a donc

$$P \delta x + Q \delta y + R \delta z = \Sigma S \delta s;$$

ainsi, le second membre de cette équation étant une différence exacte, le premier membre l'est pareillement.

Il résulte de l'équation (g) : 1° que, si le point  $M$  n'est sollicité par aucune force, sa vitesse est constante, puisque alors  $\varphi = 0$ ; c'est ce dont il est facile de s'assurer d'ailleurs, en observant qu'un corps mù dans une surface ou sur une ligne courbe ne perd, à la rencontre de chaque plan infiniment petit de la surface ou de chaque côté infiniment petit de la courbe, qu'une partie infiniment petite du second ordre de sa vitesse; 2° que le point  $M$ , en partant d'un point donné avec une vitesse donnée pour arriver à un autre point, aura, en parvenant à ce dernier point, la même vitesse, quelle que soit la courbe qu'il aura décrite.

Mais, si le mobile n'est point assujéti à se mouvoir sur une courbe déterminée, la courbe qu'il décrit jouit d'une propriété singulière, à laquelle on a été conduit par des considérations métaphysiques, et qui n'est au fond qu'un résultat remarquable des équations différentielles précédentes. Elle consiste en ce que l'intégrale  $\int v ds$ , comprise entre les deux points extrêmes de la courbe décrite, y est moindre que sur toute autre courbe, si le corps est libre, ou sur toute autre courbe assu-

jetée à la même surface sur laquelle il doit se mouvoir, s'il n'est pas entièrement libre.

Pour le faire voir, nous observerons que,  $Pdx + Qdy + Rdz$  étant supposé une différentielle exacte, l'équation (g) donne

$$v \delta v = P \delta x + Q \delta y + R \delta z;$$

l'équation (f) du numéro précédent devient ainsi

$$0 = \delta x \cdot d \frac{dx}{dt} + \delta y \cdot d \frac{dy}{dt} + \delta z \cdot d \frac{dz}{dt} - v dt \cdot \delta v.$$

Nommons  $ds$  l'élément de la courbe décrite par le mobile; nous aurons

$$v dt = ds, \quad ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2},$$

partant

$$(h) \quad 0 = \delta x \cdot d \frac{dx}{dt} + \delta y \cdot d \frac{dy}{dt} + \delta z \cdot d \frac{dz}{dt} - ds \cdot \delta v;$$

en différentiant par rapport à  $\delta$  l'expression de  $ds$ , on a

$$\frac{ds}{dt} \delta ds = \frac{dx}{dt} \delta dx + \frac{dy}{dt} \delta dy + \frac{dz}{dt} \delta dz.$$

Les caractéristiques  $d$  et  $\delta$  étant indépendantes, on peut les placer à volonté l'une avant l'autre; l'équation précédente peut ainsi prendre cette forme

$$v \delta ds = \frac{d(dx \delta x + dy \delta y + dz \delta z)}{dt} - \delta x \cdot d \frac{dx}{dt} - \delta y \cdot d \frac{dy}{dt} - \delta z \cdot d \frac{dz}{dt};$$

en retranchant du premier membre de cette équation le second membre de l'équation (h), on aura

$$\delta(v ds) = \frac{d(dx \delta x + dy \delta y + dz \delta z)}{dt}.$$

Cette dernière équation, intégrée par rapport à la caractéristique  $d$ , donne

$$\delta \int v ds = \text{const.} + \frac{dx \delta x + dy \delta y + dz \delta z}{dt}.$$



Si l'on étend l'intégrale à la courbe entière décrite par le mobile, et si l'on suppose les points extrêmes de cette courbe invariables, on aura  $\delta \int v ds = 0$ ; c'est-à-dire que, de toutes les courbes suivant lesquelles le mobile assujéti aux forces P, Q, R peut parvenir d'un point donné à un autre point donné, il décrira celle dans laquelle la variation de l'intégrale  $\int v ds$  est nulle, et dans laquelle, par conséquent, cette intégrale est un *minimum*.

Si le point se meut dans une surface courbe, sans être sollicité par aucune force, sa vitesse est alors constante, et l'intégrale  $\int v ds$  devient  $v \int ds$ ; ainsi la courbe décrite par le mobile est, dans ce cas, la plus courte que l'on puisse tracer sur la surface, du point de départ au point d'arrivée.

9. Déterminons la pression qu'un point, mû dans une surface, exerce contre elle. Au lieu d'éliminer de l'équation ( $f$ ) du n° 7 une des variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ , au moyen de l'équation à la surface, on peut, par le n° 3, ajouter à cette équation l'équation différentielle de la surface, multipliée par une indéterminée  $-\lambda dt$ , et considérer ensuite les trois variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  comme indépendantes. Soit donc  $u = 0$  l'équation de la surface; on ajoutera à l'équation ( $f$ ) le terme  $-\lambda \delta u dt$ , et la pression que le point exerce contre la surface sera, par le n° 3, égale à

$$\lambda \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2}.$$

Supposons d'abord que le point ne soit sollicité par aucune force, sa vitesse  $v$  sera constante; si l'on observe ensuite que  $v dt = ds$ , l'élément  $dt$  du temps étant supposé constant, l'élément  $ds$  de la courbe décrite le sera pareillement, et l'équation ( $f$ ), augmentée du terme  $-\lambda \delta u dt$ , donnera les trois suivantes

$$0 = v^2 \frac{d^2 x}{ds^2} - \lambda \frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 = v^2 \frac{d^2 y}{ds^2} - \lambda \frac{\partial u}{\partial y}, \quad 0 = v^2 \frac{d^2 z}{ds^2} - \lambda \frac{\partial u}{\partial z},$$

d'où l'on tire

$$\lambda \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2} = \frac{v^2 \sqrt{(d^2 x)^2 + (d^2 y)^2 + (d^2 z)^2}}{ds^2}.$$

Mais,  $ds$  étant constant, le rayon osculateur de la courbe décrite par le mobile est égal à

$$\frac{ds^2}{\sqrt{(d^2 x)^2 + (d^2 y)^2 + (d^2 z)^2}},$$

en nommant donc  $r$  ce rayon, on aura

$$\lambda \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2} = \frac{v^2}{r};$$

c'est-à-dire que la pression exercée par le point contre la surface est égale au carré de sa vitesse, divisé par le rayon osculateur de la courbe qu'il décrit.

Si le point se meut dans une surface sphérique, il décrira la circonférence du grand cercle de la sphère qui passe par la direction primitive de son mouvement, puisqu'il n'y a pas de raison pour qu'il s'écarte plutôt à droite qu'à gauche du plan de ce cercle : sa pression contre la surface, ou, ce qui revient au même, contre la circonférence qu'il décrit, est donc égale au carré de sa vitesse, divisé par le rayon de cette circonférence.

Concevons le point attaché à l'extrémité d'un fil supposé sans masse, et dont l'autre extrémité soit fixe au centre de la surface; il est visible que la pression exercée par ce point contre la circonférence est égale à la tension qu'éprouverait le fil, si le point n'était retenu que par lui. L'effort, que ce point ferait pour tendre le fil et pour s'éloigner du centre de la circonférence, est ce que l'on nomme *force centrifuge*; ainsi la force centrifuge est égale au carré de la vitesse, divisé par le rayon.

Dans le mouvement d'un point sur une courbe quelconque, la force centrifuge est égale au carré de la vitesse, divisé par le rayon osculateur de la courbe, puisque l'arc infiniment petit de cette courbe se confond avec la circonférence du cercle osculateur; on aura donc la pression que le point exerce contre la courbe qu'il décrit, en ajoutant au carré de sa vitesse, divisé par le rayon osculateur, la pression due aux forces qui sollicitent ce point.

Dans le mouvement d'un point sur une surface, la pression due à la



force centrifuge est égale au carré de la vitesse, divisé par le rayon osculateur de la courbe décrite par ce point, et multiplié par le sinus de l'inclinaison du plan du cercle osculateur sur le plan tangent à la surface; en ajoutant à cette pression celle qui est due à l'action des forces qui sollicitent le point, on aura la pression totale qu'il exerce contre la surface.

Nous venons de voir que, si le point n'est animé d'aucune force, sa pression contre la surface est égale au carré de sa vitesse, divisé par le rayon osculateur de la courbe décrite; le plan du cercle osculateur, c'est-à-dire le plan qui passe par deux côtés consécutifs de la courbe décrite par le point, est donc alors perpendiculaire à la surface. Cette courbe, relativement à la surface de la Terre, est celle que l'on a nommée *perpendiculaire à la méridienne*, et nous avons prouvé (8) qu'elle est la plus courte que l'on puisse mener d'un point à un autre sur la surface.

10. De toutes les forces que nous observons sur la Terre, la plus remarquable est la pesanteur; elle pénètre les parties les plus intimes des corps, et sans la résistance de l'air elle les ferait tomber avec une égale vitesse. La pesanteur est à fort peu près la même sur les plus grandes hauteurs où nous puissions nous élever, et dans les plus grandes profondeurs où nous puissions descendre; sa direction est perpendiculaire à l'horizon, mais dans les mouvements des projectiles on peut supposer, sans erreur sensible, qu'elle est constante et qu'elle agit suivant des droites parallèles, vu le peu d'étendue des courbes qu'ils décrivent, relativement à la circonférence de la Terre. Ces corps étant mus dans un fluide résistant, nous nommerons  $\epsilon$  la résistance qu'ils en éprouvent, et qui est dirigée suivant le côté de la courbe qu'ils décrivent, côté que nous désignerons par  $ds$ ; nous nommerons, de plus,  $g$  la pesanteur. Cela posé :

Reprenons l'équation ( $f$ ) du n° 7, et supposons que le plan des  $x$  et des  $y$  soit horizontal, et que l'origine des  $z$  soit au point le plus élevé; la force  $\epsilon$  produira, suivant les coordonnées  $x, y, z$ , les trois forces

$$-\epsilon \frac{dx}{ds}, \quad -\epsilon \frac{dy}{ds}, \quad -\epsilon \frac{dz}{ds};$$

on aura donc, par le n° 7,

$$P = -\epsilon \frac{dx}{ds}, \quad Q = -\epsilon \frac{dy}{ds}, \quad R = -\epsilon \frac{dz}{ds} + g,$$

et l'équation ( $f$ ) devient

$$0 = \partial x \left( d \frac{dx}{dt} + \epsilon \frac{dx}{ds} dt \right) + \partial y \left( d \frac{dy}{dt} + \epsilon \frac{dy}{ds} dt \right) + \partial z \left( d \frac{dz}{dt} + \epsilon \frac{dz}{ds} dt - g dt \right).$$

Si le corps est entièrement libre, on aura les trois équations

$$0 = d \frac{dx}{dt} + \epsilon \frac{dx}{ds} dt, \quad 0 = d \frac{dy}{dt} + \epsilon \frac{dy}{ds} dt, \quad 0 = d \frac{dz}{dt} + \epsilon \frac{dz}{ds} dt - g dt.$$

Les deux premières donnent

$$\frac{dy}{dt} d \frac{dx}{dt} - \frac{dx}{dt} d \frac{dy}{dt} = 0,$$

d'où l'on tire, en intégrant,

$$dx = f dy,$$

$f$  étant une constante arbitraire. Cette équation est celle d'une droite horizontale; ainsi le corps se meut dans un plan vertical. En prenant ce plan pour celui des  $x$  et des  $z$ , on aura  $y = 0$ ; les deux équations

$$0 = d \frac{dx}{dt} + \epsilon \frac{dx}{ds} dt, \quad 0 = d \frac{dz}{dt} + \epsilon \frac{dz}{ds} dt - g dt$$

donneront, en faisant  $dx$  constant,

$$\epsilon = \frac{ds d^2 t}{dt^2}, \quad 0 = \frac{d^2 z}{dt} - \frac{dz d^2 t}{dt^2} + \epsilon \frac{dz}{ds} dt - g dt,$$

d'où l'on tire  $g dt^2 = d^2 z$ , et, en différentiant,

$$2g dt d^2 t = d^3 z;$$

en substituant pour  $d^2 t$  sa valeur  $\frac{\epsilon dt^2}{ds}$ , et pour  $dt^2$  sa valeur  $\frac{d^2 z}{g}$ , on aura

$$\frac{\epsilon}{g} = \frac{ds d^2 z}{2(d^2 z)^2}.$$



Cette équation donne la loi de la résistance  $\phi$ , nécessaire pour faire décrire au projectile une courbe déterminée.

Si la résistance est proportionnelle au carré de la vitesse,  $\phi$  est égal à  $h \frac{ds^2}{dt^2}$ ,  $h$  étant constant dans le cas où la densité du milieu est uniforme. On a alors

$$\frac{\phi}{g} = \frac{h ds^2}{g dt^2} = \frac{h ds^2}{d^2 z},$$

partant  $h ds = \frac{d^2 z}{2 d^2 z}$ ; ce qui donne, en intégrant,

$$\frac{d^2 z}{dx^2} = 2ac^{2Ax},$$

$a$  étant une constante arbitraire, et  $c$  étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. Si l'on suppose nulle la résistance du milieu, ou  $h = 0$ , on aura, en intégrant, l'équation à la parabole

$$z = ax^2 + bx + e,$$

$b, e$  étant des constantes arbitraires.

L'équation différentielle  $d^2 z = g dt^2$  donnera  $dt^2 = \frac{2a}{g} dx^2$ , d'où l'on tire  $t = x \sqrt{\frac{2a}{g}} + f$ . Supposons que  $x, z$  et  $t$  commencent ensemble; on aura  $e = 0, f = 0$ , et par conséquent

$$t = x \sqrt{\frac{2a}{g}}, \quad z = ax^2 + bx,$$

ce qui donne

$$z = \frac{g t^2}{2} + bt \sqrt{\frac{g}{2a}}.$$

Ces trois équations renferment toute la théorie des projectiles dans le vide; il en résulte que la vitesse est uniforme dans le sens horizontal, et que dans le sens vertical elle est la même que si le corps tombait suivant la verticale.

Si le mobile part de l'état du repos,  $b$  sera nul, et l'on aura

$$\frac{dz}{dt} = gt, \quad z = \frac{1}{2} g t^2;$$

la vitesse acquise croît donc comme le temps, et l'espace croît comme le carré du temps.

Il est facile, au moyen de ces formules, de comparer la force centrifuge à la pesanteur. On a vu précédemment que,  $v$  étant la vitesse d'un corps mù dans une circonférence dont le rayon est  $r$ , la force centrifuge est  $\frac{v^2}{r}$ . Soit  $h$  la hauteur dont il devrait tomber pour acquérir la vitesse  $v$ ; on aura, par ce qui précède,  $v^2 = 2gh$ ; d'où l'on tire

$$\frac{v^2}{r} = g \frac{2h}{r}.$$

Si  $h = \frac{1}{2} r$ , la force centrifuge devient égale à la pesanteur  $g$ ; ainsi un corps pesant attaché à l'extrémité d'un fil fixe par son autre extrémité, sur un plan horizontal, tendra ce fil avec la même force que s'il était suspendu verticalement, pourvu qu'il se meuve sur ce plan avec la vitesse qu'il acquerrait en tombant d'une hauteur égale à la moitié de la longueur du fil.

11. Considérons le mouvement d'un corps pesant dans une surface sphérique. En nommant  $r$  son rayon, et fixant à son centre l'origine des coordonnées  $x, y, z$ , on aura  $r^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0$ ; cette équation, comparée à celle-ci  $u = 0$ , donne  $u = r^2 - x^2 - y^2 - z^2$ ; en ajoutant donc à l'équation ( $f$ ) du n° 7 la fonction  $\delta u$ , multipliée par l'indéterminée  $-\lambda dt$ , on aura

$$0 = \delta x \left( \frac{dx}{dt} + 2\lambda x dt \right) + \delta y \left( \frac{dy}{dt} + 2\lambda y dt \right) + \delta z \left( \frac{dz}{dt} + 2\lambda z dt - g dt \right),$$

équation dans laquelle on pourra évaluer séparément à zéro les coefficients de chacune des variations  $\delta x, \delta y, \delta z$ , ce qui donne les trois équations



tions suivantes

$$(A) \quad \begin{cases} 0 = d \frac{dx}{dt} + \lambda x dt, \\ 0 = d \frac{dy}{dt} + \lambda y dt, \\ 0 = d \frac{dz}{dt} + \lambda z dt - g dt. \end{cases}$$

L'indéterminée  $\lambda$  fait connaître la pression que le mobile exerce contre la surface. Cette pression est, par le n° 9, égale à

$$\lambda \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2};$$

elle est par conséquent égale à  $2\lambda r$ ; or on a, par le n° 8,

$$c + 2gz = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2},$$

$c$  étant une constante arbitraire : en ajoutant cette équation aux équations (A) divisées par  $dt$ , et multipliées respectivement par  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ; en observant ensuite que, l'équation différentielle de la surface étant  $0 = x dx + y dy + z dz$ , on a

$$0 = x d^2x + y d^2y + z d^2z + dx^2 + dy^2 + dz^2,$$

on trouvera

$$\lambda r = \frac{c + 3gz}{r}.$$

Si l'on multiplie la première des équations (A) par  $-y$ , et qu'on l'ajoute à la seconde multipliée par  $x$ , on aura, en intégrant leur somme,

$$\frac{x dy - y dx}{dt} = c',$$

$c'$  étant une nouvelle arbitraire.

Le mouvement du point est ainsi ramené aux trois équations diffé-

rentielles du premier ordre

$$\begin{aligned} x dx + y dy &= -z dz, \\ x dy - y dx &= c' dt, \\ \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} &= c + 2gz. \end{aligned}$$

En élevant chaque membre des deux premières au carré et en les ajoutant, on aura

$$(x^2 + y^2)(dx^2 + dy^2) = c'^2 dt^2 + z^2 dz^2;$$

si l'on substitue au lieu de  $x^2 + y^2$  sa valeur  $r^2 - z^2$ , et au lieu de  $\frac{dx^2 + dy^2}{dt^2}$  sa valeur  $c + 2gz - \frac{dz^2}{dt^2}$ , on aura, en supposant que le corps s'éloigne de la verticale,

$$dt = \frac{-rdz}{\sqrt{(r^2 - z^2)(c + 2gz) - c'^2}}.$$

La fonction sous le radical peut être mise sous la forme

$$(a - z)(z - b)(2gz + f),$$

$a$ ,  $b$ ,  $f$  étant déterminés par les équations

$$\begin{aligned} f &= \frac{2g(r^2 + ab)}{a + b}, \\ c &= \frac{2g(r^2 - a^2 - ab - b^2)}{a + b}, \\ c'^2 &= \frac{2g(r^2 - a^2)(r^2 - b^2)}{a + b}. \end{aligned}$$

On peut ainsi substituer aux arbitraires  $c$  et  $c'$  les nouvelles arbitraires  $a$  et  $b$ , dont la première est la plus grande valeur de  $z$ , et dont la seconde est la plus petite valeur. En faisant ensuite

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{a - z}{a - b}},$$



l'équation différentielle précédente deviendra

$$dt = \frac{r\sqrt{a+b}}{\sqrt{g[(a+b)^2+r^2-b^2]}} \cdot \frac{d\theta}{\sqrt{1-\gamma^2\sin^2\theta}},$$

$\gamma^2$  étant égal à  $\frac{a^2-b^2}{(a+b)^2+r^2-b^2}$ .

L'angle  $\theta$  donne la coordonnée  $z$  au moyen de l'équation

$$z = a \cos^2\theta + b \sin^2\theta,$$

et la coordonnée  $z$ , divisée par  $r$ , exprime le cosinus de l'angle que le rayon  $r$  fait avec la verticale.

Soit  $\sigma$  l'angle que le plan vertical qui passe par le rayon  $r$  fait avec le plan vertical qui passe par l'axe des  $x$ ; on aura

$$x = \sqrt{r^2-z^2} \cos\sigma, \quad y = \sqrt{r^2-z^2} \sin\sigma,$$

ce qui donne

$$x dy - y dx = (r^2 - z^2) d\sigma;$$

l'équation  $x dy - y dx = c dt$  donnera ainsi

$$d\sigma = \frac{c dt}{r^2 - z^2}.$$

En substituant pour  $z$  et  $dt$  leurs valeurs précédentes en  $\theta$ , on aura l'angle  $\sigma$  en fonction de  $\theta$ ; ainsi l'on connaîtra, pour un temps quelconque, les deux angles  $\theta$  et  $\sigma$ , ce qui suffit pour déterminer la position du mobile.

Nommons *demi-oscillation* du mobile le temps qu'il emploie à parvenir de la plus grande à la plus petite valeur de  $z$ ; soit  $\frac{1}{2}T$  ce temps. Pour le déterminer, il faut intégrer la valeur précédente de  $dt$  depuis  $\theta = 0$  jusqu'à  $\theta = \frac{1}{2}\pi$ ,  $\pi$  étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité; on trouvera ainsi

$$T = \pi \sqrt{\frac{r}{g}} \sqrt{\frac{2r(a+b)}{(a+b)^2+r^2-b^2}} \left[ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \gamma^2 + \left(\frac{1.3}{2.4}\right)^2 \gamma^4 + \left(\frac{1.3.5}{2.4.6}\right)^2 \gamma^6 + \dots \right].$$

Concevons le point suspendu à l'extrémité d'un fil sans masse, et fixe

par son autre extrémité; si la longueur du fil est  $r$ , le mobile sera mu exactement comme dans l'intérieur d'une surface sphérique; il formera avec le fil un pendule dont le cosinus du plus grand écart de la verticale sera  $\frac{b}{r}$ . Si l'on suppose que dans cet état la vitesse du mobile soit nulle, il oscillera dans un plan vertical, et l'on aura dans ce cas

$$a = r, \quad \gamma^2 = \frac{r-b}{2r}.$$

La fraction  $\frac{r-b}{2r}$  est le carré du sinus de la moitié du plus grand angle que le fil forme avec la verticale; la durée entière  $T$  de l'oscillation du pendule sera donc

$$T = \pi \sqrt{\frac{r}{g}} \left[ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{r-b}{2r} + \left(\frac{1.3}{2.4}\right)^2 \left(\frac{r-b}{2r}\right)^2 + \left(\frac{1.3.5}{2.4.6}\right)^2 \left(\frac{r-b}{2r}\right)^3 + \dots \right].$$

Si l'oscillation est très-petite,  $\frac{r-b}{2r}$  est une très-petite fraction que l'on peut négliger, et alors on a

$$T = \pi \sqrt{\frac{r}{g}},$$

les oscillations fort petites sont donc isochrones, ou de même durée, quelle que soit leur étendue; et l'on peut facilement, au moyen de cette durée et de la longueur correspondante du pendule, déterminer les variations de l'intensité de la pesanteur dans les divers lieux de la Terre.

Soit  $z$  la hauteur dont la pesanteur fait tomber les corps pendant le temps  $T$ ; on aura, par le n° 10,  $2z = gT^2$ , et par conséquent  $z = \frac{1}{2}gT^2$ ; on aura donc ainsi, avec une grande précision, au moyen de la longueur du pendule à secondes, l'espace que la pesanteur fait parcourir aux corps dans la première seconde de leur chute. Des expériences très-exactes ayant fait voir que la longueur du pendule à secondes est la même, quelles que soient les substances que l'on fait osciller, il en résulte que la pesanteur agit également sur tous les corps, et qu'elle tend, dans le même lieu, à leur imprimer dans le même temps la même vitesse.





12. L'isochronisme des oscillations du pendule n'étant qu'approché, il est intéressant de connaître la courbe sur laquelle un corps pesant doit se mouvoir, pour arriver dans le même temps au point où son mouvement cesse, quel que soit l'arc qu'il aura décrit depuis le point le plus bas. Mais, pour embrasser ce problème dans toute sa généralité, nous supposerons, conformément à ce qui a lieu dans la nature, que le mobile se meut dans un milieu résistant. Soient  $s$  l'arc décrit depuis le point le plus bas de la courbe,  $z$  l'abscisse verticale comptée de ce point,  $dt$  l'élément du temps et  $g$  la pesanteur. La force retardatrice le long de l'arc de la courbe sera : 1<sup>o</sup> la pesanteur décomposée suivant l'arc  $ds$ , et qui devient ainsi égale à  $g \frac{dz}{ds}$ ; 2<sup>o</sup> la résistance du milieu, que nous exprimerons par  $\varphi \left( \frac{ds}{dt} \right)$ ,  $\frac{ds}{dt}$  étant la vitesse du mobile, et  $\varphi \left( \frac{ds}{dt} \right)$  étant une fonction quelconque de cette vitesse. La différentielle de cette vitesse sera, par le n<sup>o</sup> 7, égale à  $-g \frac{dz}{ds} - \varphi \left( \frac{ds}{dt} \right)$ ; on aura donc, en faisant  $dt$  constant,

$$(i) \quad 0 = \frac{d^2 s}{dt^2} + g \frac{dz}{ds} + \varphi \left( \frac{ds}{dt} \right).$$

Supposons  $\varphi \left( \frac{ds}{dt} \right) = m \frac{ds}{dt} + n \frac{ds^2}{dt^2}$ , et  $s = \psi(s')$ ; en désignant par  $\psi'(s')$  la différence de  $\psi(s')$  divisée par  $ds'$ , et par  $\psi''(s')$  celle de  $\psi'(s')$  divisée par  $ds'$ , on aura

$$\begin{aligned} \frac{ds}{dt} &= \frac{ds'}{dt} \psi'(s'), \\ \frac{d^2 s}{dt^2} &= \frac{d^2 s'}{dt^2} \psi'(s') + \frac{ds'^2}{dt^2} \psi''(s'), \end{aligned}$$

et l'équation (i) deviendra

$$(l) \quad 0 = \frac{d^2 s'}{dt^2} + m \frac{ds'}{dt} + \frac{ds'^2}{dt^2} \cdot \frac{\psi''(s') + n[\psi'(s')]^2}{\psi'(s')} + \frac{g dz}{ds [\psi'(s')]^2}.$$

On fera disparaître le terme multiplié par  $\frac{ds'^2}{dt^2}$  au moyen de l'équation

$$0 = \psi''(s') + n[\psi'(s')]^2,$$

d'où l'on tire, en intégrant,

$$\psi(s') = \log [h(s' + q)^{\frac{1}{2}}] = s,$$

$h$  et  $q$  étant des arbitraires. Si l'on fait commencer  $s'$  avec  $s$ , on aura  $hq^{\frac{1}{2}} = 1$ , et si l'on fait, pour plus de simplicité,  $h = 1$ , on aura

$$s' = c^{2s} - 1,$$

$c$  étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité; l'équation différentielle (l) devient alors

$$0 = \frac{d^2 s'}{dt^2} + m \frac{ds'}{dt} + n^2 g \frac{dz}{ds} (1 + s')^2.$$

En supposant  $s'$  très-petit, nous pourrions développer le dernier terme de cette équation dans une suite ascendante par rapport aux puissances de  $s'$ , et qui sera de cette forme  $ks' + ls'^2 + \dots$ ,  $i$  étant plus grand que l'unité; ce qui donne

$$0 = \frac{d^2 s'}{dt^2} + m \frac{ds'}{dt} + ks' + ls'^2 + \dots$$

Cette équation, multipliée par  $c^{\frac{ms'}{2}} (\cos \gamma t + \sqrt{-1} \sin \gamma t)$ , et ensuite intégrée, devient,  $\gamma$  étant supposé égal à  $\sqrt{k - \frac{m^2}{4}}$ ,

$$\begin{aligned} & \frac{mc}{c^{\frac{ms'}{2}}} (\cos \gamma t + \sqrt{-1} \sin \gamma t) \left[ \frac{ds'}{dt} + \left( \frac{m}{2} - \gamma \sqrt{-1} \right) s' \right] \\ &= -t \int s'^i dt \cdot c^{\frac{ms'}{2}} (\cos \gamma t + \sqrt{-1} \sin \gamma t) - \dots \end{aligned}$$

En comparant séparément les parties réelles et les parties imaginaires,

on aura deux équations au moyen desquelles on pourra éliminer  $\frac{ds'}{dt}$ ; mais il nous suffira ici de considérer la suivante

$$\frac{m}{c^2} \frac{ds'}{dt} \sin \gamma t + c^2 s' \left( \frac{m}{2} \sin \gamma t - \gamma \cos \gamma t \right) = -l \int s'^i dt \cdot c^2 \sin \gamma t - \dots,$$

les intégrales du second membre étant supposées commencer avec  $t$ . Nommons T la valeur de  $t$  à la fin du mouvement, où  $\frac{ds'}{dt}$  est nul; on aura, à cet instant,

$$\frac{m}{c^2} s' \left( \frac{m}{2} \sin \gamma T - \gamma \cos \gamma T \right) = -l \int s'^i dt \cdot c^2 \sin \gamma t - \dots$$

Dans le cas de  $s'$  infiniment petit, le second membre de cette équation se réduit à zéro par rapport au premier, et l'on a

$$0 = \frac{m}{2} \sin \gamma T - \gamma \cos \gamma T,$$

d'où l'on tire

$$\text{tang} \gamma T = \frac{2\gamma}{m};$$

et, comme le temps T est, par la supposition, indépendant de l'arc parcouru, cette valeur de  $\text{tang} \gamma T$  a lieu pour un arc quelconque, ce qui donne, quel que soit  $s'$ ,

$$0 = l \int s'^i dt \cdot c^2 \sin \gamma t + \dots,$$

l'intégrale étant prise depuis  $t=0$  jusqu'à  $t=T$ . En supposant  $s'$  très-petit, cette équation se réduit à son premier terme, et elle ne peut être satisfaite qu'en faisant  $l=0$ ; car, le facteur  $c^2 \sin \gamma t$  étant constamment positif depuis  $t=0$  jusqu'à  $t=T$ , l'intégrale précédente est nécessairement positive dans cet intervalle. Il ne peut donc y avoir de tautochronisme que dans la supposition de

$$n^2 g \frac{dz}{ds'} (1 + s'^2) = ks',$$

ce qui donne pour l'équation de la courbe tautochrone

$$g dz = \frac{h ds}{n} (1 - c^{-ns}).$$

Dans le vide, et lorsque la résistance est proportionnelle à la simple vitesse,  $n$  est nul, et cette équation devient

$$g dz = ks ds,$$

équation à la cycloïde.

Il est remarquable que le coefficient  $n$  de la partie de la résistance, proportionnelle au carré de la vitesse, n'entre point dans l'expression du temps T, et il est visible, par l'analyse précédente, que cette expression serait la même, si l'on ajoutait à la loi précédente de la résistance les termes  $p \frac{ds^3}{dt^3} + q \frac{ds^4}{dt^4} + \dots$ .

Soit, en général, R la force retardatrice le long de la courbe; on aura

$$0 = \frac{d^2 s}{dt^2} + R;$$

$s$  est une fonction du temps  $t$  et de l'arc total parcouru, qui par conséquent est fonction de  $t$  et de  $s$ . En différenciant cette dernière fonction, on aura une équation différentielle de cette forme

$$\frac{ds}{dt} = V,$$

V étant une fonction de  $t$  et de  $s$ , qui doit être nulle, par la condition du problème, lorsque  $t$  a une valeur déterminée et indépendante de l'arc total parcouru. Supposons, par exemple,  $V = ST$ , S étant fonction de  $s$  seul, et  $t$  étant fonction de T seul; on aura

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = T \frac{dS}{ds} \frac{ds}{dt} + S \frac{dT}{dt} = \frac{dS}{ds} \frac{ds^2}{dt^2} + S \frac{dT}{dt},$$

mais l'équation  $\frac{ds}{dt} = ST$  donne  $t$ , et par conséquent  $\frac{dT}{dt}$  égal à une fon-



tion de  $\frac{ds}{dt}$ , fonction que nous désignerons par  $\frac{ds^2}{s^2 dt^2} \psi \left( \frac{ds}{s dt} \right)$ ; on aura donc

$$\frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{ds^2}{s dt^2} \left[ \frac{dS}{ds} + \psi \left( \frac{ds}{s dt} \right) \right] = -R.$$

Telle est l'expression de la résistance qui convient à l'équation différentielle  $\frac{ds}{dt} = ST$ ; et il est facile de voir qu'elle embrasse le cas de la résistance proportionnelle aux deux premières puissances de la vitesse, multipliées respectivement par des coefficients constants. D'autres équations différentielles donneraient d'autres lois de résistance.

## CHAPITRE III.

DE L'ÉQUILIBRE D'UN SYSTÈME DE CORPS.

13. Le cas le plus simple de l'équilibre de plusieurs corps est celui de deux points matériels qui se choquent avec des vitesses égales et directement contraires; leur impénétrabilité mutuelle anéantit évidemment leur vitesse, et les réduit à l'état du repos.

Concevons présentement un nombre  $m$  de points matériels contigus, disposés en ligne droite, et animés de la vitesse  $u$  dans la direction de cette droite. Concevons pareillement un nombre  $m'$  de points contigus, disposés sur la même droite, et animés de la vitesse  $u'$  directement contraire à  $u$ , en sorte que les deux systèmes viennent à se choquer. Il doit exister, pour leur équilibre à l'instant du choc, un rapport entre  $u$  et  $u'$ , qu'il s'agit de déterminer.

Pour cela, nous observerons que le système  $m$ , animé de la vitesse  $u$ , ferait équilibre à un seul point matériel animé de la vitesse  $mu$  dirigée en sens contraire; car chaque point du système détruirait dans ce dernier point une vitesse égale à  $u$ , et par conséquent ses  $m$  points détruiraient la vitesse entière  $mu$ ; on peut donc substituer à ce système un seul point animé de la vitesse  $mu$ . On peut semblablement substituer au système  $m'$  un seul point animé de la vitesse  $m'u'$ ; or, les deux systèmes étant supposés se faire équilibre, les deux points qui en tiennent lieu doivent pareillement se faire équilibre, ce qui exige que leurs vitesses soient égales; on a donc pour la condition de l'équilibre des deux systèmes  $mu = m'u'$ .



La masse d'un corps est le nombre de ses points matériels, et l'on nomme *quantité de mouvement* le produit de la masse par la vitesse; c'est aussi ce que l'on entend par la force d'un corps en mouvement. Pour l'équilibre de deux corps ou de deux systèmes de points qui viennent à se choquer en sens contraire, les quantités de mouvement ou les forces opposées doivent être égales, et par conséquent les vitesses doivent être réciproques aux masses.

La densité des corps dépend du nombre des points matériels qu'ils renferment sous un volume donné. Pour avoir leur densité absolue, il faudrait pouvoir comparer leurs masses à celle d'une substance qui n'aurait point de pores; mais on n'en connaît point de semblables; on ne peut donc avoir que la densité relative des corps, c'est-à-dire, le rapport de leur densité à celle d'une substance donnée. Il est visible que la masse est en raison du volume et de la densité; en nommant donc  $M$  la masse d'un corps,  $U$  son volume et  $D$  sa densité, on a généralement  $M = DU$ , équation dans laquelle on doit observer que les quantités  $M$ ,  $D$  et  $U$  expriment des rapports à des unités de leur espèce.

Ce que nous venons de dire suppose que les corps sont composés de points matériels semblables, et qu'ils ne diffèrent que par la position respective de ces points. Mais, la nature des corps étant inconnue, cette hypothèse est au moins précaire, et il est possible qu'il y ait des différences essentielles entre leurs molécules intégrantes. Heureusement la vérité de cette hypothèse est indifférente à la Mécanique, et l'on peut, sans craindre aucune erreur, en faire usage, pourvu que par *points matériels semblables* on entende des points qui, se choquant avec des vitesses égales et contraires, se font mutuellement équilibre, quelle que soit leur nature.

14. Deux points matériels, dont les masses sont  $m$  et  $m'$ , ne peuvent agir l'un sur l'autre que suivant la droite qui les joint. A la vérité, si les deux points sont liés par un fil qui passe sur une poulie fixe, leur action réciproque peut n'être point dirigée suivant cette droite. Mais on peut considérer la poulie fixe comme ayant à son centre une masse

d'une densité infinie, qui réagit sur les deux corps  $m$  et  $m'$ , dont l'action l'un sur l'autre n'est plus qu'indirecte.

Nommons  $p$  l'action que  $m$  exerce sur  $m'$  au moyen d'une droite inflexible et sans masse, qui est supposée unir ces deux points. En concevant cette droite animée de deux forces égales et contraires  $p$  et  $-p$ , la force  $-p$  détruira dans le corps  $m$  une force égale à  $p$ , et la force  $p$  de la droite se communiquera tout entière au corps  $m'$ . Cette perte de force dans  $m$ , occasionnée par son action sur  $m'$ , est ce que l'on nomme *réaction de  $m'$* ; ainsi, dans la communication des mouvements, *la réaction est toujours égale et contraire à l'action*. L'observation fait voir que ce principe a lieu dans toutes les actions de la nature.

Imaginons deux corps pesants  $m$  et  $m'$  attachés aux extrémités d'une droite horizontale, inflexible et sans masse, qui puisse tourner librement autour d'un de ses points. Pour concevoir l'action de ces corps l'un sur l'autre lorsqu'ils se font équilibre, il faut supposer la droite infiniment peu rompue à son point fixe, et formée de deux droites faisant à ce point un angle qui ne diffère de deux angles droits que d'une quantité infiniment petite  $\omega$ . Soient  $f$  et  $f'$  les distances de  $m$  et  $m'$  au point fixe; en décomposant la pesanteur de  $m$  en deux forces, l'une agissant sur le point fixe, l'autre dirigée vers  $m'$ , cette dernière force sera  $\frac{mg(f+f')}{\omega f}$ ,  $g$  étant la pesanteur. L'action de  $m'$  sur  $m$  sera pareillement  $\frac{m'g(f+f')}{\omega f}$ ; en égalant donc ces deux forces, en vertu de l'équilibre, on aura  $mf = m'f'$ ; ce qui donne la loi connue de l'équilibre du levier, et fait en même temps concevoir l'action réciproque des forces parallèles.

Considérons présentement l'équilibre d'un système de points  $m, m', m'', \dots$  sollicités par des forces quelconques, et réagissant les uns sur les autres. Soient  $f$  la distance de  $m$  à  $m'$ ,  $f'$  la distance de  $m$  à  $m''$ ,  $f''$  la distance de  $m'$  à  $m''$ ,  $\dots$ ; soient encore  $p$  l'action réciproque de  $m$  sur  $m'$ ,  $p'$  celle de  $m$  sur  $m''$ ,  $p''$  celle de  $m'$  sur  $m''$ ,  $\dots$ ; enfin, soient  $mS, m'S, m'S', \dots$  les forces qui sollicitent  $m, m', m'', \dots$ , et  $s, s', s'', \dots$  les droites prises depuis leurs origines jusqu'aux corps  $m, m', m'', \dots$





Cela posé, le point  $m$  peut être considéré comme étant parfaitement libre, et en équilibre en vertu de la force  $mS$  et des forces que lui communiquent les corps  $m', m'', \dots$ ; mais, s'il était assujéti à se mouvoir sur une surface ou sur une courbe, il faudrait ajouter à ces forces la réaction de la surface ou de la courbe. Soit donc  $\delta s$  la variation de  $s$ , et désignons par  $\delta_s f$  la variation de  $f$ , prise en regardant  $m'$  comme fixe. Désignons pareillement par  $\delta_s f''$  la variation de  $f''$ , prise en regardant  $m''$  comme fixe, etc. Soient  $R, R'$  les réactions de deux surfaces qui, par leur intersection, forment la courbe sur laquelle le point  $m$  est assujéti à se mouvoir, et  $\delta r, \delta r'$  les variations des directions de ces dernières forces. L'équation (d) du n° 3 donnera

$$0 = mS \delta s + p \delta_s f + p' \delta_s f' + \dots + R \delta r + R' \delta r'.$$

Pareillement  $m'$  peut être considéré comme un point parfaitement libre, en équilibre en vertu de la force  $m'S'$ , des actions des corps  $m, m'', \dots$ , et des réactions des surfaces sur lesquelles il peut être assujéti à se mouvoir, réactions que nous désignerons par  $R''$  et  $R'''$ . Soient donc  $\delta s'$  la variation de  $s'$ ,  $\delta_s f$  la variation de  $f$  prise en regardant  $m$  comme fixe,  $\delta_s f''$  la variation de  $f''$  prise en regardant  $m''$  comme fixe, etc. Soient de plus  $\delta r'', \delta r'''$  les variations des directions de  $R'', R'''$ ; l'équilibre de  $m'$  donnera

$$0 = m'S' \delta s' + p \delta_s f + p' \delta_s f' + \dots + R'' \delta r'' + R''' \delta r'''.$$

On formera de semblables équations relatives à l'équilibre de  $m'', m''', \dots$ ; en les ajoutant ensuite, et observant que

$$\delta f = \delta_s f + \delta_s f', \quad \delta f' = \delta_s f' + \delta_s f'', \dots,$$

$\delta f, \delta f', \dots$  étant les variations totales de  $f, f', \dots$ , on aura

$$(k) \quad 0 = \Sigma mS \delta s + \Sigma p \delta f + \Sigma R \delta r,$$

équation dans laquelle les variations des coordonnées des différents corps du système sont entièrement arbitraires. On doit observer ici qu'au lieu de  $mS \delta s$ , on peut, en vertu de l'équation (a) du n° 2, sub-

stituer la somme des produits de toutes les forces partielles dont  $m$  est animé par les variations de leurs directions respectives. Il en est de même des produits  $m'S' \delta s', m''S'' \delta s'', \dots$

Si les corps  $m, m', m'', \dots$  sont liés entre eux d'une manière invariable, les distances  $f, f', f'', \dots$  sont constantes, et l'on a pour la condition de la liaison des parties du système

$$\delta f = 0, \quad \delta f' = 0, \quad \delta f'' = 0, \dots$$

Les variations des coordonnées étant arbitraires dans l'équation (k), on peut les assujéti à satisfaire à ces dernières équations, et alors les forces  $p, p', p'', \dots$ , qui dépendent de l'action réciproque des corps du système, disparaissent de cette équation; on peut même en faire disparaître les termes  $R \delta r, R' \delta r', \dots$ , en assujéti les variations des coordonnées à satisfaire aux équations des surfaces sur lesquelles les corps sont forcés de se mouvoir; l'équation (k) devient ainsi

$$(l) \quad 0 = \Sigma mS \delta s;$$

d'où il suit que, dans le cas de l'équilibre, la somme des variations des produits des forces par les éléments de leurs directions est nulle, de quelque manière que l'on fasse varier la position du système, pourvu que les conditions de la liaison de ses parties soient observées.

Ce théorème, auquel nous sommes parvenus dans la supposition particulière d'un système de corps liés entre eux d'une manière invariable, est général, quelles que soient les conditions de la liaison des parties du système. Pour le démontrer, il suffit de faire voir qu'en assujéti les variations des coordonnées à ces conditions, on a dans l'équation (k)

$$0 = \Sigma p \delta f + \Sigma R \delta r;$$

or il est clair que  $\delta r, \delta r', \dots$  sont nuls en vertu de ces conditions; il ne s'agit donc que de prouver que l'on a  $0 = \Sigma p \delta f$ , en assujéti aux mêmes conditions les variations des coordonnées.

Concevons le système animé des seules forces  $p, p', p'', \dots$ , et sup-



posons que les corps soient forcés de se mouvoir sur des courbes qu'ils puissent décrire en vertu des mêmes conditions. Alors ces forces se décomposeront en d'autres, les unes  $q, q', q'', \dots$ , dirigées suivant les droites  $f, f', f'', \dots$ , et qui se détruiraient mutuellement sans produire d'action sur les courbes décrites; les autres  $T, T', T'', \dots$ , perpendiculaires aux courbes décrites; les autres, enfin, tangentielles à ces courbes, et en vertu desquelles le système sera mù. Mais il est aisé de voir que ces dernières forces doivent être nulles; car, le système étant supposé leur obéir librement, elles ne peuvent produire ni pression sur les courbes décrites, ni réaction des corps les uns sur les autres; elles ne peuvent donc pas faire équilibre aux forces  $-p, -p', -p'', \dots; q, q', q'', \dots; T, T', \dots$ ; il faut donc qu'elles soient nulles, et que le système soit en équilibre en vertu des seules forces  $-p, -p', -p'', \dots; q, q', q'', \dots; T, T', \dots$ . Soient  $\delta i, \delta i', \dots$  les variations des directions des forces  $T, T', \dots$ ; on aura, en vertu de l'équation ( $k$ ),

$$0 = \Sigma (q - p) \delta f + \Sigma T \delta i;$$

mais le système étant supposé en équilibre en vertu des seules forces  $q, q', \dots$ , sans qu'il en résulte aucune action sur les courbes décrites, l'équation ( $k$ ) donne encore  $0 = \Sigma q \delta f$ ; partant

$$0 = \Sigma p \delta f - \Sigma T \delta i.$$

Si l'on assujettit les variations des coordonnées à satisfaire aux courbes décrites, on a  $\delta i = 0, \delta i' = 0, \dots$ ; on a donc alors

$$0 = \Sigma p \delta f;$$

et, comme les courbes décrites sont elles-mêmes arbitraires et ne sont assujetties qu'aux conditions de la liaison des parties du système, l'équation précédente a lieu, pourvu que ces conditions soient remplies, et alors l'équation ( $k$ ) se change dans l'équation ( $l$ ). Cette équation est la traduction analytique du principe suivant, connu sous le nom de *principe des vitesses virtuelles*.

*Si l'on fait varier infiniment peu la position d'un système de corps, en l'assujettissant aux conditions qu'il doit remplir, la somme des forces qui le sollicitent, multipliées chacune par l'espace que le corps auquel elle est appliquée parcourt suivant sa direction, doit être égale à zéro dans le cas de l'équilibre du système.*

Non-seulement ce principe a lieu dans le cas de l'équilibre, mais il en assure l'existence. Supposons, en effet, que, l'équation ( $l$ ) ayant lieu, les points  $m, m', \dots$  prennent les vitesses  $v, v', \dots$  en vertu des forces  $mS, m'S', \dots$  qui leur sont appliquées. Ce système serait en équilibre en vertu de ces forces et de celles-ci  $-mv, -m'v', \dots$ ; désignons par  $\delta v, \delta v', \dots$  les variations des directions de ces nouvelles forces; on aura, par le principe des vitesses virtuelles,

$$0 = \Sigma mS \delta s - \Sigma mv \delta v;$$

mais on a, par la supposition,  $0 = \Sigma mS \delta s$ ; on a donc  $0 = \Sigma mv \delta v$ . Les variations  $\delta v, \delta v', \dots$  devant être assujetties aux conditions du système, on peut les supposer égales à  $v dt, v' dt, \dots$ , et alors on a

$$0 = \Sigma mv^2,$$

équation qui donne  $v = 0, v' = 0, \dots$ ; c'est-à-dire que le système est en équilibre en vertu des seules forces  $mS, m'S', \dots$ .

Les conditions de la liaison des parties d'un système peuvent toujours se réduire à des équations entre les coordonnées de ses différents corps. Soient  $u = 0, u' = 0, u'' = 0, \dots$  ces diverses équations; on pourra, par le n° 3, ajouter à l'équation ( $l$ ) la fonction  $\lambda \delta u + \lambda' \delta u' + \dots$ , ou  $\Sigma \lambda \delta u$ ,  $\lambda, \lambda', \dots$  étant des fonctions indéterminées des coordonnées des corps; cette équation deviendra ainsi

$$0 = \Sigma mS \delta s + \Sigma \lambda \delta u;$$

dans ce cas, les variations de toutes les coordonnées seront arbitraires, et l'on pourra évaluer leurs coefficients à zéro, ce qui donnera autant d'équations au moyen desquelles on déterminera les fonctions  $\lambda, \lambda', \dots$



Si l'on compare ensuite cette équation à l'équation (k), on aura

$$\Sigma \lambda \delta u = \Sigma p \delta f + \Sigma R \delta r,$$

d'où il sera facile de conclure les actions réciproques des corps  $m, m', \dots$  et les pressions  $-R, -R', \dots$  qu'ils exercent contre les surfaces auxquelles ils sont assujettis.

15. Si tous les corps du système sont fixement attachés ensemble, sa position sera déterminée par celle de trois de ses points qui ne sont pas en ligne droite; la position de chacun de ces points dépend de trois coordonnées, ce qui produit neuf indéterminées; mais, les distances mutuelles des trois points étant données et invariables, on peut, à leur moyen, réduire ces indéterminées à six autres qui, substituées dans l'équation (l), introduiront six variations arbitraires; en égalant à zéro leurs coefficients, on aura six équations qui renfermeront toutes les conditions de l'équilibre du système. Développons ces équations.

Pour cela, soient  $x, y, z$  les coordonnées de  $m$ ;  $x', y', z'$  celles de  $m'$ ;  $x'', y'', z''$  celles de  $m''$ , etc.; on aura

$$f = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2},$$

$$f' = \sqrt{(x'' - x)^2 + (y'' - y)^2 + (z'' - z)^2},$$

$$f'' = \sqrt{(x''' - x)^2 + (y''' - y)^2 + (z''' - z)^2},$$

$$\dots\dots\dots$$

Si l'on suppose

$$\delta x = \delta x' = \delta x'' = \dots,$$

$$\delta y = \delta y' = \delta y'' = \dots,$$

$$\delta z = \delta z' = \delta z'' = \dots,$$

on aura  $\delta f = 0, \delta f' = 0, \delta f'' = 0, \dots$ ; les conditions à satisfaire seront donc remplies, et l'on aura en vertu de l'équation (l)

$$(m) \quad 0 = \Sigma m S \frac{\partial s}{\partial x}, \quad 0 = \Sigma m S \frac{\partial s}{\partial y}, \quad 0 = \Sigma m S \frac{\partial s}{\partial z};$$

on aura ainsi trois des six équations qui renferment les conditions de l'équilibre du système. Les seconds membres de ces équations sont les sommes des forces du système, décomposées parallèlement aux trois axes des  $x$ , des  $y$  et des  $z$ ; chacune de ces sommes doit donc être nulle dans le cas de l'équilibre.

Les équations  $\delta f = 0, \delta f' = 0, \delta f'' = 0, \dots$  seront encore satisfaites si l'on suppose  $z, z', z'', \dots$  invariables, et si l'on fait

$$\delta x = y \delta \omega, \quad \delta y = -x \delta \omega,$$

$$\delta x' = y' \delta \omega, \quad \delta y' = -x' \delta \omega,$$

$$\dots\dots\dots, \quad \dots\dots\dots,$$

$\delta \omega$  étant une variation quelconque. En substituant ces valeurs dans l'équation (l), on aura

$$0 = \Sigma m S \left( y \frac{\partial s}{\partial x} - x \frac{\partial s}{\partial y} \right).$$

Il est visible que l'on peut changer, dans cette équation, soit les coordonnées  $x, x', \dots$ , soit les coordonnées  $y, y', \dots$ , en  $z, z', \dots$ , ce qui donnera deux autres équations qui, réunies à la précédente, formeront le système suivant d'équations

$$(n) \quad \begin{cases} 0 = \Sigma m S \left( y \frac{\partial s}{\partial x} - x \frac{\partial s}{\partial y} \right), \\ 0 = \Sigma m S \left( z \frac{\partial s}{\partial x} - x \frac{\partial s}{\partial z} \right), \\ 0 = \Sigma m S \left( y \frac{\partial s}{\partial z} - z \frac{\partial s}{\partial y} \right); \end{cases}$$

la fonction  $\Sigma m S y \frac{\partial s}{\partial x}$  est, par le n° 3, la somme des moments de toutes les forces parallèles à l'axe des  $x$ , pour faire tourner le système autour de l'axe des  $z$ . Pareillement, la fonction  $\Sigma m S x \frac{\partial s}{\partial y}$  est la somme des moments de toutes les forces parallèles à l'axe des  $y$ , pour faire tourner le système autour de l'axe des  $z$ , mais en sens contraire des premières forces; la première des équations (n) indique, par conséquent, que la



somme des moments des forces est nulle par rapport à l'axe des  $z$ . La seconde et la troisième de ces équations indiquent semblablement que la somme des moments des forces est nulle, soit par rapport à l'axe des  $y$ , soit par rapport à l'axe des  $x$ . En réunissant ces trois conditions à celle-ci, savoir, que les sommes des forces parallèles à ces axes soient nulles par rapport à chacun d'eux, on aura les six conditions de l'équilibre d'un système de corps invariablement unis ensemble.

Si l'origine des coordonnées est fixe et attachée invariablement au système, elle détruira les forces parallèles aux trois axes, et les conditions de l'équilibre du système autour de cette origine se réduiront à ce que les sommes des moments des forces pour le faire tourner autour des trois axes soient nulles relativement à chacun d'eux.

Supposons que les corps  $m, m', m'', \dots$  ne soient animés que par la pesanteur. Son action étant la même sur tous ces corps, et les directions de la pesanteur pouvant être supposées les mêmes dans toute l'étendue du système, on aura

$$S = S' = S'' = \dots,$$

$$\frac{\partial s}{\partial x} = \frac{\partial s'}{\partial x'} = \frac{\partial s''}{\partial x''} = \dots,$$

$$\frac{\partial s}{\partial y} = \frac{\partial s'}{\partial y'} = \frac{\partial s''}{\partial y''} = \dots,$$

$$\frac{\partial s}{\partial z} = \frac{\partial s'}{\partial z'} = \frac{\partial s''}{\partial z''} = \dots$$

Les trois équations ( $n$ ) seront satisfaites, quelle que soit la direction de  $s$  ou de la pesanteur, au moyen des trois suivantes

$$(o) \quad o = \Sigma m x, \quad o = \Sigma m y, \quad o = \Sigma m z.$$

L'origine des coordonnées étant supposée fixe, elle détruira parallèlement à chacun des trois axes les forces  $S \frac{\partial s}{\partial x} \Sigma m$ ,  $S \frac{\partial s}{\partial y} \Sigma m$ ,  $S \frac{\partial s}{\partial z} \Sigma m$ ; en composant ces trois forces, on aura une force unique égale à  $S \Sigma m$ , c'est-à-dire, égale au poids du système.

Cette origine des coordonnées, autour de laquelle nous supposons ici



le système en équilibre, est un point du système très-remarquable, en ce qu'étant soutenu, le système animé par la pesanteur reste en équilibre, quelque situation qu'on lui donne autour de ce point, que l'on nomme *centre de gravité* du système. Sa position est déterminée par la condition que, si l'on fait passer par ce point un plan quelconque, la somme des produits de chaque corps par sa distance à ce plan est nulle; car cette distance est une fonction linéaire des coordonnées  $x, y, z$  du corps; en la multipliant donc par la masse du corps, la somme de ces produits sera nulle en vertu des équations ( $o$ ).

Pour fixer la position du centre de gravité, soient  $X, Y, Z$  ses trois coordonnées par rapport à un point donné; soient  $x, y, z$  les coordonnées de  $m$ , rapportées au même point;  $x', y', z'$  celles de  $m'$ , et ainsi de suite; les équations ( $o$ ) donneront

$$o = \Sigma m (x - X);$$

mais on a  $\Sigma m X = X \Sigma m$ ,  $\Sigma m$  étant la masse entière du système; on a donc

$$X = \frac{\Sigma m x}{\Sigma m}.$$

On aura pareillement

$$Y = \frac{\Sigma m y}{\Sigma m}, \quad Z = \frac{\Sigma m z}{\Sigma m};$$

ainsi, les coordonnées  $X, Y, Z$  ne déterminant qu'un seul point, on voit que le centre de gravité d'un système de corps est unique. Les trois équations précédentes donnent

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = \frac{(\Sigma m x)^2 + (\Sigma m y)^2 + (\Sigma m z)^2}{(\Sigma m)^2},$$

équation que l'on peut mettre sous cette forme :

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = \frac{\Sigma m (x^2 + y^2 + z^2)}{\Sigma m} - \frac{\Sigma m m' [(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2]}{(\Sigma m)^2},$$

l'intégrale finie  $\Sigma m m' [(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2]$  exprimant la somme de tous les produits semblables à celui qui est renfermé sous la





caractéristique  $\Sigma$ , et que l'on peut former en considérant deux à deux tous les corps du système. On aura donc ainsi la distance du centre de gravité à un point fixe quelconque, au moyen des distances des corps du système à ce même point fixe, et de leurs distances mutuelles. En déterminant de cette manière la distance du centre de gravité à trois points fixes quelconques, on aura sa position dans l'espace; ce qui donne un nouveau moyen de le déterminer.

On a étendu la dénomination de *centre de gravité* à un point d'un système quelconque de corps pesants ou non pesants, déterminé par les trois coordonnées  $X, Y, Z$ .

16. Il est facile d'appliquer les résultats précédents à l'équilibre d'un corps solide de figure quelconque, en le concevant formé d'une infinité de points liés fixement entre eux. Soit donc  $dm$  un de ces points, ou une molécule infiniment petite du corps; soient  $x, y, z$  les coordonnées rectangles de cette molécule; soient encore  $P, Q, R$  les forces dont elle est animée parallèlement aux axes des  $x, y$  et des  $z$ ; les équations ( $m$ ) et ( $n$ ) du numéro précédent se changeront dans les suivantes

$$\begin{aligned} 0 &= \int P dm, & 0 &= \int Q dm, & 0 &= \int R dm, \\ 0 &= \int (Py - Qx) dm, & 0 &= \int (Pz - Rx) dm, & 0 &= \int (Ry - Qz) dm, \end{aligned}$$

le signe intégral  $\int$  étant relatif à la molécule  $dm$ , et devant s'étendre à la masse entière du solide.

Si le corps ne peut que tourner autour de l'origine des coordonnées, les trois dernières équations suffisent pour l'équilibre.

## CHAPITRE IV.

## DE L'ÉQUILIBRE DES FLUIDES.

17. Pour avoir les lois de l'équilibre et du mouvement de chacune des molécules fluides, il faudrait connaître leur figure, ce qui est impossible; mais nous n'avons besoin de déterminer ces lois que pour les fluides considérés en masse, et alors la connaissance des figures de leurs molécules devient inutile. Quelles que soient ces figures et les dispositions qui en résultent dans les molécules intégrantes, tous les fluides pris en masse doivent offrir les mêmes phénomènes dans leur équilibre et dans leurs mouvements, en sorte que l'observation de ces phénomènes ne peut rien nous apprendre sur la configuration des molécules fluides. Ces phénomènes généraux sont fondés sur la mobilité parfaite de ces molécules, qui peuvent ainsi céder au plus léger effort. Cette mobilité est la propriété caractéristique des fluides; elle les distingue des corps solides et sert à les définir. Il en résulte que, pour l'équilibre d'une masse fluide, chaque molécule doit être en équilibre en vertu des forces qui la sollicitent et des pressions qu'elle éprouve de la part des molécules environnantes. Développons les équations qui résultent de cette propriété.

Pour cela, considérons un système de molécules fluides formant un parallélépipède rectangle infiniment petit. Soient  $x, y, z$  les trois coordonnées rectangles de l'angle de ce parallélépipède le plus voisin de l'origine des coordonnées. Soient  $dx, dy, dz$  les trois dimensions de ce parallélépipède; nommons  $p$  la moyenne de toutes les pressions qu'é-

prouvent les différents points de la face  $dydz$  du parallélépipède la plus voisine de l'origine des coordonnées, et  $p'$  la même quantité relative à la face opposée. Le parallélépipède, en vertu de la pression qu'il éprouve, sera sollicité, parallèlement à l'axe des  $x$ , par une force égale à  $(p - p') dy dz$ ;  $p' - p$  est la différence de  $p$  prise en ne faisant varier que  $x$ ; car, quoique la pression  $p'$  agisse en sens contraire de  $p$ , cependant, la pression qu'éprouve un point du fluide étant la même dans tous les sens,  $p' - p$  peut être considéré comme la différence de deux forces infiniment voisines et agissant dans le même sens; on a donc

$$p' - p = \frac{\partial p}{\partial x} dx, \quad \text{et} \quad (p - p') dy dz = -\frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz.$$

Soient  $P, Q, R$  les trois forces accélératrices qui animent d'ailleurs les molécules fluides parallèlement aux axes des  $x, y$  et des  $z$ ; si l'on nomme  $\rho$  la densité du parallélépipède, sa masse sera  $\rho dx dy dz$ , et le produit de la force  $P$  par cette masse sera la force entière qui en résulte pour la mouvoir; cette masse sera par conséquent sollicitée, parallèlement à l'axe des  $x$ , par la force

$$\left(\rho P - \frac{\partial p}{\partial x}\right) dx dy dz.$$

Elle sera pareillement sollicitée, parallèlement aux axes des  $y$  et des  $z$ , par les forces

$$\left(\rho Q - \frac{\partial p}{\partial y}\right) dx dy dz \quad \text{et} \quad \left(\rho R - \frac{\partial p}{\partial z}\right) dx dy dz;$$

on aura donc, en vertu de l'équation (b) du n° 3,

$$0 = \left(\rho P - \frac{\partial p}{\partial x}\right) \delta x + \left(\rho Q - \frac{\partial p}{\partial y}\right) \delta y + \left(\rho R - \frac{\partial p}{\partial z}\right) \delta z,$$

ou

$$\delta p = \rho (P \delta x + Q \delta y + R \delta z).$$

Le second membre de cette équation doit être, comme le premier, une

variation exacte; ce qui donne les équations suivantes aux différences partielles

$$\frac{\partial \rho P}{\partial y} = \frac{\partial \rho Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial \rho P}{\partial z} = \frac{\partial \rho R}{\partial x}, \quad \frac{\partial \rho Q}{\partial z} = \frac{\partial \rho R}{\partial y},$$

d'où l'on tire

$$0 = P \frac{\partial Q}{\partial z} - Q \frac{\partial P}{\partial z} + R \frac{\partial P}{\partial y} - P \frac{\partial R}{\partial y} + Q \frac{\partial R}{\partial x} - R \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Cette équation exprime la relation qui doit exister entre les forces  $P, Q, R$ , pour que l'équilibre soit possible.

Si le fluide est libre à sa surface ou dans quelques parties de cette surface, la valeur de  $p$  sera nulle dans ces parties; on aura donc  $\delta p = 0$ , pourvu que l'on assujettisse les variations  $\delta x, \delta y, \delta z$  à appartenir à cette surface; ainsi, en remplissant ces conditions, on aura

$$0 = P \delta x + Q \delta y + R \delta z.$$

Soit  $\delta u = 0$  l'équation différentielle de la surface; on aura

$$P \delta x + Q \delta y + R \delta z = \lambda \delta u,$$

$\lambda$  étant une fonction de  $x, y, z$ ; d'où il suit, par le n° 3, que la résultante des forces  $P, Q, R$  doit être perpendiculaire aux parties de la surface dans lesquelles le fluide est libre.

Supposons que la variation  $P \delta x + Q \delta y + R \delta z$  soit exacte, ce qui a lieu, par le n° 2, lorsque les forces  $P, Q, R$  sont le résultat de forces attractives. Nommons alors  $\delta \varphi$  cette variation: on aura  $\delta p = \rho \delta \varphi$ ;  $\rho$  doit donc être fonction de  $p$  et de  $\varphi$ , et, comme en intégrant cette équation différentielle on a  $\varphi$  en fonction de  $p$ , on aura  $p$  en fonction de  $\rho$ . La pression  $p$  est donc la même pour toutes les molécules dont la densité est la même; ainsi  $\delta p$  est nul relativement aux surfaces des couches de la masse fluide, dans lesquelles la densité est constante, et l'on a, par rapport à ces surfaces,

$$0 = P \delta x + Q \delta y + R \delta z.$$

Il suit de là que la résultante des forces qui animent chaque molécule



fluide est, dans l'état d'équilibre, perpendiculaire à la surface de ces couches, que l'on a nommées pour cela *couches de niveau*. Cette condition est toujours remplie si le fluide est homogène et incompressible, puisque alors les couches auxquelles cette résultante est perpendiculaire sont toutes de même densité.

Pour l'équilibre d'une masse fluide homogène dont la surface extérieure est libre, et qui recouvre un noyau solide fixe et de figure quelconque, il est donc nécessaire et il suffit : 1° que la différentielle  $P\delta x + Q\delta y + R\delta z$  soit exacte; 2° que la résultante des forces à la surface extérieure soit dirigée vers cette surface et lui soit perpendiculaire.

## CHAPITRE V.

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU MOUVEMENT D'UN SYSTÈME DE CORPS.

18. Nous avons ramené, dans le n° 7, les lois du mouvement d'un point à celles de l'équilibre, en décomposant son mouvement instantané en deux autres, dont l'un subsiste, et dont l'autre est détruit par les forces qui sollicitent ce point; l'équilibre entre ces forces et le mouvement perdu par le corps nous a donné les équations différentielles de son mouvement. Nous allons faire usage de la même méthode pour déterminer le mouvement d'un système de corps  $m, m', m'', \dots$ . Soient donc  $mP, mQ, mR$  les forces qui sollicitent  $m$  parallèlement aux axes de ses coordonnées rectangles  $x, y, z$ ; soient  $m'P', m'Q', m'R'$  les forces qui sollicitent  $m'$  parallèlement aux mêmes axes, et ainsi de suite, et nommons  $t$  le temps. Les forces partielles  $m\frac{dx}{dt}, m\frac{dy}{dt}, m\frac{dz}{dt}$  du corps  $m$ , à un instant quelconque, deviendront dans l'instant suivant

$$m\frac{dx}{dt} + m d\frac{dx}{dt} - m d\frac{dx}{dt} + mP dt,$$

$$m\frac{dy}{dt} + m d\frac{dy}{dt} - m d\frac{dy}{dt} + mQ dt,$$

$$m\frac{dz}{dt} + m d\frac{dz}{dt} - m d\frac{dz}{dt} + mR dt;$$

et, comme les seules forces

$$m\frac{dx}{dt} + m d\frac{dx}{dt}, \quad m\frac{dy}{dt} + m d\frac{dy}{dt}, \quad m\frac{dz}{dt} + m d\frac{dz}{dt}$$





subsistent, les forces

$$-m d \frac{dx}{dt} + mP dt, \quad -m d \frac{dy}{dt} + mQ dt, \quad -m d \frac{dz}{dt} + mR dt$$

seront détruites. En marquant dans ces expressions successivement d'un trait, de deux traits, . . . les lettres  $m, x, y, z, P, Q, R$ , on aura les forces détruites dans les corps  $m', m'', \dots$ . Cela posé, si l'on multiplie respectivement ces forces par les variations  $\delta x, \delta y, \delta z, \delta x', \dots$  de leurs directions, le principe des vitesses virtuelles, exposé dans le n° 14, donnera, en supposant  $dt$  constant, l'équation suivante

$$(P) \begin{cases} 0 = m \delta x \left( \frac{d^2 x}{dt^2} - P \right) + m \delta y \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - Q \right) + m \delta z \left( \frac{d^2 z}{dt^2} - R \right) \\ + m' \delta x' \left( \frac{d^2 x'}{dt^2} - P' \right) + m' \delta y' \left( \frac{d^2 y'}{dt^2} - Q' \right) + m' \delta z' \left( \frac{d^2 z'}{dt^2} - R' \right) \\ + \dots \end{cases}$$

On éliminera de cette équation, au moyen des conditions particulières du système, autant de variations qu'il y a de ces conditions; en égalant ensuite séparément à zéro les coefficients des variations restantes, on aura toutes les équations nécessaires pour déterminer le mouvement des différents corps du système.

19. L'équation (P) renferme plusieurs principes généraux du mouvement, que nous allons développer. On assujettira évidemment les variations  $\delta x, \delta y, \delta z, \delta x', \dots$  à toutes les conditions de la liaison des parties du système, en les supposant égales aux différences  $dx, dy, dz, dx', \dots$ . Cette supposition est donc permise, et alors l'équation (P) donne, en l'intégrant,

$$(Q) \quad \Sigma m \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} = c + 2 \Sigma f m (P dx + Q dy + R dz),$$

$c$  étant une constante arbitraire introduite par l'intégration.

Si les forces  $P, Q, R$  sont le résultat de forces attractives dirigées vers des points fixes, et des forces attractives des corps les uns vers les

autres, la fonction  $\Sigma f m (P dx + Q dy + R dz)$  est une intégrale exacte. En effet, les parties de cette fonction, relatives aux forces attractives dirigées vers des points fixes, sont, par le n° 8, des intégrales exactes. Cela est également vrai par rapport aux parties qui dépendent des attractions mutuelles des corps du système; car, si l'on nomme  $f$  la distance de  $m$  à  $m'$ , et  $m'F$  l'attraction de  $m'$  sur  $m$ , la partie de  $m(P dx + Q dy + R dz)$ , relative à l'attraction de  $m'$  sur  $m$ , sera, par le numéro cité, égale à  $-mm'Fdf$ , la différence  $df$  étant prise en ne faisant varier que les coordonnées  $x, y, z$ . Mais, la réaction étant égale et contraire à l'action, la partie de  $m'(P' dx' + Q' dy' + R' dz')$ , relative à l'attraction de  $m$  sur  $m'$ , est égale à  $-mm'Fdf$ , en ne faisant varier, dans  $f$ , que les coordonnées  $x', y', z'$ ; la partie de la fonction  $\Sigma m(P dx + Q dy + R dz)$ , relative à l'attraction réciproque de  $m$  et de  $m'$ , est donc  $-mm'Fdf$ , tout étant supposé varier dans  $f$ . Cette quantité est une différence exacte lorsque  $F$  est une fonction de  $f$ , ou lorsque l'attraction est comme une fonction de la distance, ainsi que nous le supposons toujours; la fonction  $\Sigma m(P dx + Q dy + R dz)$  est donc une différence exacte, toutes les fois que les forces qui agissent sur les corps du système sont le résultat de leur attraction mutuelle, ou de forces attractives dirigées vers des points fixes. Soit alors  $d\varphi$  cette différence, et nommons  $v$  la vitesse de  $m$ ,  $v'$  celle de  $m'$ , etc.; on aura

$$(R) \quad \Sigma mv^2 = c + 2\varphi.$$

Cette équation est analogue à l'équation (g) du n° 8; elle est la traduction analytique du principe de la conservation des *forces vives*. On nomme *force vive* d'un corps le produit de sa masse par le carré de sa vitesse. Le principe dont il s'agit consiste en ce que la somme des forces vives, ou la force vive totale du système, est constante, si le système n'est sollicité par aucune force; et, si les corps sont sollicités par des forces quelconques, la somme des accroissements de la force vive totale est la même, quelles que soient les courbes décrites par chacun de ces corps, pourvu que leurs points de départ et d'arrivée soient les mêmes.

Ce principe n'a lieu que dans les cas où les mouvements des corps





changent par des nuances insensibles. Si ces mouvements éprouvent des changements brusques, la force vive est diminuée d'une quantité que l'on déterminera de cette manière. L'analyse qui nous a conduits à l'équation (P) du numéro précédent donne alors, au lieu de cette équation, la suivante

$$0 = \Sigma m \left( \frac{\partial x}{\partial t} \cdot \Delta \frac{dx}{dt} + \frac{\partial y}{\partial t} \cdot \Delta \frac{dy}{dt} + \frac{\partial z}{\partial t} \cdot \Delta \frac{dz}{dt} \right) - \Sigma m (P \delta x + Q \delta y + R \delta z),$$

$\Delta \frac{dx}{dt}$ ,  $\Delta \frac{dy}{dt}$  et  $\Delta \frac{dz}{dt}$  étant les différences de  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$  et  $\frac{dz}{dt}$  d'un instant à l'autre, différences qui deviennent finies lorsque les mouvements des corps reçoivent des altérations finies dans un instant. On peut supposer dans cette équation

$$\delta x = dx + \Delta dx, \quad \delta y = dy + \Delta dy, \quad \delta z = dz + \Delta dz,$$

parce que, les valeurs de  $dx$ ,  $dy$ ,  $dz$  se changeant, dans l'instant suivant, dans  $dx + \Delta dx$ ,  $dy + \Delta dy$ ,  $dz + \Delta dz$ , ces valeurs de  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  satisfont aux conditions de la liaison des parties du système; on aura ainsi

$$0 = \Sigma m \left[ \left( \frac{dx}{dt} + \Delta \frac{dx}{dt} \right) \cdot \Delta \frac{dx}{dt} + \left( \frac{dy}{dt} + \Delta \frac{dy}{dt} \right) \cdot \Delta \frac{dy}{dt} + \left( \frac{dz}{dt} + \Delta \frac{dz}{dt} \right) \cdot \Delta \frac{dz}{dt} \right] - \Sigma m [P(dx + \Delta dx) + Q(dy + \Delta dy) + R(dz + \Delta dz)].$$

Cette équation doit être intégrée comme une équation aux différences finies relative au temps  $t$ , dont les variations sont infiniment petites, ainsi que les variations de  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $x'$ ,  $\dots$ . Désignons par  $\Sigma$ , les intégrales finies résultant de cette intégration, pour les distinguer des intégrales finies précédentes, relatives à l'ensemble des corps du système. L'intégrale de  $\Sigma m P(dx + \Delta dx)$  est visiblement la même que  $\Sigma m P dx$ ; on aura donc

$$\text{const.} = \Sigma m \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} + \Sigma, \Sigma m \left[ \left( \Delta \frac{dx}{dt} \right)^2 + \left( \Delta \frac{dy}{dt} \right)^2 + \left( \Delta \frac{dz}{dt} \right)^2 \right] - 2 \Sigma f m (P dx + Q dy + R dz).$$

En désignant donc par  $v$ ,  $v'$ ,  $v''$ ,  $\dots$  les vitesses de  $m$ ,  $m'$ ,  $m''$ ,  $\dots$ , on aura

$$\Sigma mv^2 = \text{const.} - \Sigma, \Sigma m \left[ \left( \Delta \frac{dx}{dt} \right)^2 + \left( \Delta \frac{dy}{dt} \right)^2 + \left( \Delta \frac{dz}{dt} \right)^2 \right] + 2 \Sigma f m (P dx + Q dy + R dz).$$

La quantité renfermée sous le signe  $\Sigma$ , étant nécessairement positive, on voit que la force vive du système diminue par l'action mutuelle des corps, toutes les fois que, durant le mouvement, quelques-unes des variations  $\Delta \frac{dx}{dt}$ ,  $\Delta \frac{dy}{dt}$ ,  $\dots$  sont finies. L'équation précédente offre de plus un moyen fort simple d'avoir cette diminution.

A chaque variation brusque du mouvement du système, on peut concevoir la vitesse de  $m$  décomposée en deux autres, l'une  $v$  qui subsiste dans l'instant suivant, l'autre  $V$  détruite par l'action des autres corps; or la vitesse de  $m$  étant  $\frac{\sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}}{dt}$  avant cette décomposition, et se changeant, après, dans

$$\frac{\sqrt{(dx + \Delta dx)^2 + (dy + \Delta dy)^2 + (dz + \Delta dz)^2}}{dt},$$

il est facile de voir que l'on a

$$V^2 = \left( \Delta \frac{dx}{dt} \right)^2 + \left( \Delta \frac{dy}{dt} \right)^2 + \left( \Delta \frac{dz}{dt} \right)^2;$$

l'équation précédente peut donc être mise sous cette forme :

$$\Sigma mv^2 = \text{const.} - \Sigma, \Sigma m V^2 + 2 \Sigma f m (P dx + Q dy + R dz).$$

20. Si dans l'équation (P) du n° 18 on suppose

$$\delta x' = \delta x + \delta x', \quad \delta y' = \delta y + \delta y', \quad \delta z' = \delta z + \delta z',$$

$$\delta x'' = \delta x + \delta x'', \quad \delta y'' = \delta y + \delta y'', \quad \delta z'' = \delta z + \delta z'',$$

$$\dots, \dots, \dots,$$

en substituant ces variations dans les expressions des variations  $\delta f$ ,  $\delta f'$ ,  $\delta f''$ ,  $\dots$  des distances mutuelles des corps du système, dont on a donné





les valeurs dans le n° 15, on voit que les variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  disparaissent de ces expressions. Si le système est libre, c'est-à-dire, si aucune de ses parties n'a de liaison avec les corps étrangers, les conditions relatives à la liaison mutuelle des corps ne dépendant que de leurs distances mutuelles, les variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$  seront indépendantes de ces conditions : d'où il suit qu'en substituant, au lieu de  $\delta x'$ ,  $\delta y'$ ,  $\delta z'$ ,  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ , leurs valeurs précédentes dans l'équation (P), on doit évaluer séparément à zéro les coefficients des variations  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ ; ce qui donne les trois équations

$$0 = \sum m \left( \frac{d^2 x}{dt^2} - P \right), \quad 0 = \sum m \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - Q \right), \quad 0 = \sum m \left( \frac{d^2 z}{dt^2} - R \right).$$

Supposons que X, Y, Z soient les trois coordonnées du centre de gravité du système; on aura, par le n° 15,

$$X = \frac{\sum m x}{\sum m}, \quad Y = \frac{\sum m y}{\sum m}, \quad Z = \frac{\sum m z}{\sum m};$$

partant

$$0 = \frac{d^2 X}{dt^2} - \frac{\sum m P}{\sum m}, \quad 0 = \frac{d^2 Y}{dt^2} - \frac{\sum m Q}{\sum m}, \quad 0 = \frac{d^2 Z}{dt^2} - \frac{\sum m R}{\sum m};$$

le centre de gravité du système se meut donc comme si, tous les corps  $m, m', \dots$  étant réunis à ce centre, on lui appliquait toutes les forces qui sollicitent le système.

Si le système n'est soumis qu'à l'action mutuelle des corps qui le composent et à leurs attractions réciproques, on aura

$$0 = \sum m P, \quad 0 = \sum m Q, \quad 0 = \sum m R;$$

car, en exprimant par  $p$  l'action réciproque de  $m$  et de  $m'$ , quelle que soit sa nature, et désignant par  $f$  la distance mutuelle de ces deux corps, on aura, en vertu de cette action seule,

$$m P = \frac{p(x-x')}{f}, \quad m Q = \frac{p(y-y')}{f}, \quad m R = \frac{p(z-z')}{f}, \\ m' P' = \frac{p'(x'-x)}{f}, \quad m' Q' = \frac{p'(y'-y)}{f}, \quad m' R' = \frac{p'(z'-z)}{f},$$

d'où l'on tire

$$0 = m P + m' P', \quad 0 = m Q + m' Q', \quad 0 = m R + m' R';$$

et il est clair que ces équations ont lieu dans le cas même où les corps exerceraient les uns sur les autres une action finie dans un instant. Leur action réciproque disparaît donc des intégrales  $\sum m P$ ,  $\sum m Q$ ,  $\sum m R$ , qui par conséquent sont nulles lorsque le système n'est point sollicité par des forces étrangères. Dans ce cas, on a

$$0 = \frac{d^2 X}{dt^2}, \quad 0 = \frac{d^2 Y}{dt^2}, \quad 0 = \frac{d^2 Z}{dt^2},$$

et, en intégrant,

$$X = a + bt, \quad Y = a' + b' t, \quad Z = a'' + b'' t,$$

$a, b, a', b', a'', b''$  étant des constantes arbitraires. En éliminant le temps  $t$ , on aura une équation du premier ordre, soit entre X et Y, soit entre X et Z; d'où il suit que le mouvement du centre de gravité est rectiligne. De plus, sa vitesse étant égale à

$$\sqrt{\left(\frac{dX}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dY}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dZ}{dt}\right)^2}, \quad \text{ou à } \sqrt{b^2 + b'^2 + b''^2},$$

elle est constante, et le mouvement est uniforme.

Il est clair, d'après l'analyse précédente, que cette inaltérabilité du mouvement du centre de gravité d'un système de corps, quelle que soit leur action mutuelle, subsiste dans le cas même où quelques-uns de ces corps perdent dans un instant, par cette action, une quantité finie de mouvement.

21. Si l'on fait

$$\partial x' = \frac{y' \partial x}{y} + \partial x'_1, \quad \partial x'' = \frac{y'' \partial x}{y} + \partial x''_1, \dots, \\ \partial y = \frac{-x \partial x}{y} + \partial y_1, \quad \partial y' = \frac{-x' \partial x}{y} + \partial y'_1, \quad \partial y'' = \frac{-x'' \partial x}{y} + \partial y''_1, \dots,$$

la variation  $\delta x$  disparaît encore des expressions de  $\delta f$ ,  $\delta f'$ ,  $\delta f''$ ,  $\dots$ ; en



supposant donc le système libre, les conditions relatives à la liaison des parties du système n'influent que sur les variations  $\delta f, \delta f', \dots$ , la variation  $\delta x$  en est indépendante, et elle est arbitraire; ainsi, en substituant dans l'équation (P) du n° 18, au lieu de  $\delta x', \delta x'', \dots, \delta y, \delta y', \delta y'', \dots$ , leurs valeurs précédentes, on doit évaluer séparément à zéro le coefficient de  $\delta x$ , ce qui donne

$$0 = \sum m \frac{x d^2 y - y d^2 x}{dt^2} + \sum m (P y - Q x),$$

d'où l'on tire, en intégrant par rapport au temps  $t$ ,

$$c = \sum m \frac{x dy - y dx}{dt} + \sum f m (P y - Q x) dt,$$

$c$  étant une constante arbitraire.

On peut, dans cette intégrale, changer les coordonnées  $y, y', \dots$  dans  $z, z', \dots$ , pourvu que l'on y substitue, au lieu des forces  $Q, Q', \dots$ , parallèles à l'axe des  $y$ , les forces  $R, R', \dots$ , parallèles à l'axe des  $z$ , ce qui donne

$$c' = \sum m \frac{x dz - z dx}{dt} + \sum f m (P z - R x) dt,$$

$c'$  étant une nouvelle arbitraire. On aura de la même manière

$$c'' = \sum m \frac{y dz - z dy}{dt} + \sum f m (Q z - R y) dt,$$

$c''$  étant une troisième arbitraire.

Supposons que les corps du système ne soient soumis qu'à leur action mutuelle et à une force dirigée vers l'origine des coordonnées. Si l'on nomme, comme ci-dessus,  $p$  l'action réciproque de  $m$  et de  $m'$ , on aura, en vertu de cette action seule,

$$0 = m (P y - Q x) + m' (P' y' - Q' x');$$

ainsi l'action mutuelle des corps disparaît de l'intégrale finie  $\sum m (P y - Q x)$ . Soit  $S$  la force qui sollicite  $m$  vers l'origine des coor-

données; on aura, en vertu de cette force seule,

$$P = \frac{-Sx}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad Q = \frac{-Sy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}};$$

la force  $S$  disparaît donc de l'expression de  $P y - Q x$ ; ainsi, dans le cas où les différents corps du système ne sont sollicités que par leur action et leur attraction mutuelle et par des forces dirigées vers l'origine des coordonnées, on a

$$(Z) \quad c = \sum m \frac{x dy - y dx}{dt}, \quad c' = \sum m \frac{x dz - z dx}{dt}, \quad c'' = \sum m \frac{y dz - z dy}{dt}.$$

Si l'on projette le corps  $m$  sur le plan des  $x$  et des  $y$ , la différentielle  $\frac{x dy - y dx}{2}$  sera l'aire que trace, durant l'instant  $dt$ , le rayon vecteur mené de l'origine des coordonnées à la projection de  $m$ ; la somme de ces aires, multipliées respectivement par les masses de ces corps, est donc proportionnelle à l'élément du temps; d'où il suit que, dans un temps fini, elle est proportionnelle au temps. C'est en cela que consiste le principe de la conservation des aires.

Le plan fixe des  $x$  et des  $y$  étant arbitraire, ce principe a lieu pour un plan quelconque, et, si la force  $S$  est nulle, c'est-à-dire, si les corps ne sont assujettis qu'à leur action et à leur attraction mutuelle, l'origine des coordonnées est arbitraire, et l'on peut placer à volonté le point fixe. Enfin il est facile de voir, par ce qui précède, que ce principe subsiste dans le cas même où, par l'action mutuelle des corps du système, il survient des changements brusques dans leurs mouvements.

Il existe un plan par rapport auquel  $c'$  et  $c''$  sont nuls, et qu'il est, par cette raison, intéressant de connaître; car il est visible que l'égalité de  $c'$  et de  $c''$  à zéro doit apporter de grandes simplifications dans la recherche du mouvement d'un système de corps. Pour déterminer ce plan, il est nécessaire de rapporter les coordonnées  $x, y, z$  à trois autres axes ayant la même origine que les précédents. Soient donc  $\theta$  l'inclinaison du plan cherché, formé par deux de ces nouveaux axes, au plan



des  $x$  et des  $y$ , et  $\psi$  l'angle que forme l'axe des  $x$  avec l'intersection de ces deux plans, en sorte que  $\frac{\pi}{2} - \theta$  soit l'inclinaison du troisième axe nouveau sur le plan des  $x$  et des  $y$ , et que  $\frac{\pi}{2} - \psi$  soit l'angle que sa projection sur le même plan fait avec l'axe des  $x$ ,  $\pi$  étant la demi-circonférence.

Pour fixer les idées, imaginons que l'origine des coordonnées soit au centre de la Terre, que le plan des  $x$  et des  $y$  soit celui de l'écliptique, et que l'axe des  $z$  soit la ligne menée du centre de la Terre au pôle boréal de l'écliptique; concevons, de plus, que le plan cherché soit celui de l'équateur, et que le troisième axe nouveau soit l'axe de rotation de la Terre, dirigé vers le pôle boréal;  $\theta$  sera l'obliquité de l'écliptique, et  $\psi$  sera la longitude de l'axe fixe des  $x$ , relativement à l'équinoxe mobile du printemps. Les deux premiers axes nouveaux seront dans le plan de l'équateur, et, en nommant  $\varphi$  la distance angulaire du premier de ces axes à cet équinoxe,  $\varphi$  représentera la rotation de la Terre, comptée du même équinoxe, et  $\frac{\pi}{2} + \varphi$  sera la distance angulaire du second de ces axes au même équinoxe. Nous nommerons *axes principaux* ces trois nouveaux axes. Cela posé :

Soient  $x, y, z$ , les coordonnées de  $m$  rapportées : 1° à la ligne menée de l'origine des coordonnées à l'équinoxe du printemps, les  $x$ , positifs étant pris du côté de cet équinoxe; 2° à la projection du troisième axe principal sur le plan des  $x$  et des  $y$ ; 3° à l'axe des  $z$ ; on aura

$$x = x \cos \psi + y \sin \psi, \quad y = y \cos \psi - x \sin \psi, \quad z = z.$$

Soient  $x', y', z'$ , les coordonnées rapportées : 1° à la ligne de l'équinoxe du printemps; 2° à la perpendiculaire à cette ligne dans le plan de l'équateur; 3° au troisième axe principal; on aura

$$x' = x \cos \theta, \quad y' = y \cos \theta + z \sin \theta, \quad z' = z \cos \theta - y \sin \theta.$$

Enfin, soient  $x'', y'', z''$ , les coordonnées de  $m$  rapportées au premier, au second et au troisième axe principal; on aura

$$x'' = x \cos \varphi - y \sin \varphi, \quad y'' = y \cos \varphi + x \sin \varphi, \quad z'' = z.$$

De là il est facile de conclure

$$\begin{aligned} x &= x'' (\cos \theta \sin \psi \sin \varphi + \cos \psi \cos \varphi) + y'' (\cos \theta \sin \psi \cos \varphi - \cos \psi \sin \varphi) + z'' \sin \theta \sin \psi, \\ y &= x'' (\cos \theta \cos \psi \sin \varphi - \sin \psi \cos \varphi) + y'' (\cos \theta \cos \psi \cos \varphi + \sin \psi \sin \varphi) + z'' \sin \theta \cos \psi, \\ z &= z'' \cos \theta - y'' \sin \theta \cos \varphi - x'' \sin \theta \sin \varphi. \end{aligned}$$

En multipliant ces valeurs de  $x, y, z$  respectivement par les coefficients de  $x''$  dans ces valeurs, on aura, en les ajoutant,

$$x'' = x (\cos \theta \sin \psi \sin \varphi + \cos \psi \cos \varphi) + y (\cos \theta \cos \psi \sin \varphi - \sin \psi \cos \varphi) - z \sin \theta \sin \varphi.$$

En multipliant pareillement les valeurs de  $x, y, z$  respectivement par les coefficients de  $y''$  dans ces valeurs, et ensuite par les coefficients de  $z''$ , on aura

$$\begin{aligned} y'' &= x (\cos \theta \sin \psi \cos \varphi - \cos \psi \sin \varphi) + y (\cos \theta \cos \psi \cos \varphi + \sin \psi \sin \varphi) - z \sin \theta \cos \varphi, \\ z'' &= x \sin \theta \sin \psi + y \sin \theta \cos \psi + z \cos \theta. \end{aligned}$$

Ces diverses transformations des coordonnées nous seront très-utiles dans la suite. En marquant d'un trait en haut, de deux traits, etc. les coordonnées  $x, y, z, x'', y'', z'', x''', y''', z'''$ , on aura les coordonnées correspondantes aux corps  $m', m'', \dots$

De là, en substituant  $c, c', c''$  au lieu de

$$\sum m \frac{x dy - y dx}{dt}, \quad \sum m' \frac{x dz - z dx}{dt}, \quad \sum m'' \frac{y dz - z dy}{dt},$$

il est facile de conclure

$$\begin{aligned} \sum m \frac{x'' dy'' - y'' dx''}{dt} &= c \cos \theta - c' \sin \theta \cos \psi + c'' \sin \theta \sin \psi, \\ \sum m \frac{x'' dz'' - z'' dx''}{dt} &= c \sin \theta \cos \varphi + c' (\sin \psi \sin \varphi + \cos \theta \cos \psi \cos \varphi) \\ &\quad + c'' (\cos \psi \sin \varphi - \cos \theta \sin \psi \cos \varphi), \\ \sum m \frac{y'' dz'' - z'' dy''}{dt} &= -c \sin \theta \sin \varphi + c' (\sin \psi \cos \varphi - \cos \theta \cos \psi \sin \varphi) \\ &\quad + c'' (\cos \psi \cos \varphi + \cos \theta \sin \psi \sin \varphi). \end{aligned}$$



Si l'on détermine  $\psi$  et  $\theta$  de manière que l'on ait

$$\sin \theta \sin \psi = \frac{c''}{\sqrt{c^2 + c'^2 + c''^2}}, \quad \sin \theta \cos \psi = \frac{-c'}{\sqrt{c^2 + c'^2 + c''^2}},$$

ce qui donne

$$\cos \theta = \frac{c}{\sqrt{c^2 + c'^2 + c''^2}},$$

on aura

$$\sum m \frac{x_m dy_m - y_m dx_m}{dt} = \sqrt{c^2 + c'^2 + c''^2},$$

$$\sum m \frac{x_m dz_m - z_m dx_m}{dt} = 0,$$

$$\sum m \frac{y_m dz_m - z_m dy_m}{dt} = 0;$$

les valeurs de  $c'$  et de  $c''$  sont donc nulles par rapport au plan des  $x_m$  et des  $y_m$  déterminé de cette manière. Il n'existe qu'un seul plan qui jouisse de cette propriété; car, en supposant qu'il soit celui des  $x$  et des  $y$ , on aura

$$\sum m \frac{x_m dz_m - z_m dx_m}{dt} = c \sin \theta \cos \varphi,$$

$$\sum m \frac{y_m dz_m - z_m dy_m}{dt} = -c \sin \theta \sin \varphi.$$

En égalant ces deux fonctions à zéro, on aura  $\sin \theta = 0$ , c'est-à-dire que le plan des  $x_m$  et des  $y_m$  coïncide alors avec celui des  $x$  et des  $y$ .

La valeur de  $\sum m \frac{x_m dy_m - y_m dx_m}{dt}$  étant égale à  $\sqrt{c^2 + c'^2 + c''^2}$ , quel que soit le plan des  $x$  et des  $y$ , il en résulte que la quantité  $c^2 + c'^2 + c''^2$  est la même, quel que soit ce plan, et que le plan des  $x_m$  et des  $y_m$ , déterminé par ce qui précède, est celui relativement auquel la fonction  $\sum m \frac{x_m dy_m - y_m dx_m}{dt}$  est la plus grande; le plan dont il s'agit jouit donc de ces propriétés remarquables, savoir: 1<sup>o</sup> que la somme des aires tracées par les projections des rayons vecteurs des corps, et multipliées respectivement par leurs masses, y est le plus grande possible; 2<sup>o</sup> que la même somme, relativement à un plan quelconque qui lui est per-

pendiculaire, est nulle, puisque l'angle  $\varphi$  reste indéterminé. On pourra, au moyen de ces propriétés, retrouver ce plan à un instant quelconque, quelles que soient les variations survenues par l'action mutuelle des corps dans leur position respective, de même que l'on peut facilement retrouver dans tous les temps la position du centre de gravité du système; et, par cette raison, il est aussi naturel de rapporter à ce plan les  $x$  et les  $y$  que de rapporter au centre de gravité l'origine des coordonnées.

22. Les principes de la conservation des forces vives et des aires ont encore lieu, en supposant à l'origine des coordonnées un mouvement rectiligne et uniforme dans l'espace. Pour le démontrer, nommons  $X, Y, Z$  les coordonnées de cette origine, supposée mobile, par rapport à un point fixe, et supposons

$$\begin{aligned} x &= X + x_1, & y &= Y + y_1, & z &= Z + z_1, \\ x' &= X + x'_1, & y' &= Y + y'_1, & z' &= Z + z'_1, \\ & \dots\dots\dots & & \dots\dots\dots & & \dots\dots\dots \end{aligned}$$

$x_1, y_1, z_1, x'_1, y'_1, z'_1, \dots$  seront les coordonnées de  $m, m', \dots$  relativement à l'origine mobile. On aura, par l'hypothèse,

$$d^2X = 0, \quad d^2Y = 0, \quad d^2Z = 0;$$

mais on a, par la nature du centre de gravité, lorsque le système est libre,

$$0 = \sum m (d^2X + d^2x_1) - \sum m P dt^2,$$

$$0 = \sum m (d^2Y + d^2y_1) - \sum m Q dt^2,$$

$$0 = \sum m (d^2Z + d^2z_1) - \sum m R dt^2.$$

L'équation (P) du n<sup>o</sup> 18 deviendra ainsi, en y substituant  $\delta X + \delta x_1, \delta Y + \delta y_1, \dots$  au lieu de  $\delta x, \delta y, \dots$ ,

$$0 = \sum m \delta x_1 \left( \frac{d^2x_1}{dt^2} - P \right) + \sum m \delta y_1 \left( \frac{d^2y_1}{dt^2} - Q \right) + \sum m \delta z_1 \left( \frac{d^2z_1}{dt^2} - R \right),$$

équation exactement de la même forme que l'équation (P), si les forces





P, Q, R ne dépendent que des coordonnées  $x, y, z, x', \dots$ . En lui appliquant donc l'analyse précédente, on en tirera les principes de la conservation des forces vives et des aires par rapport à l'origine mobile des coordonnées.

Si le système n'éprouve point l'action de forces étrangères, son centre de gravité aura un mouvement rectiligne et uniforme dans l'espace, comme on l'a vu dans le n° 20; en fixant donc à ce centre l'origine des coordonnées  $x, y, z$ , ces principes subsisteront toujours. X, Y, Z étant alors les coordonnées du centre de gravité, on aura, par la nature de ce point,

$$0 = \sum m x_i, \quad 0 = \sum m y_i, \quad 0 = \sum m z_i,$$

ce qui donne

$$\sum m \frac{x dy - y dx}{dt} = \frac{X dY - Y dX}{dt} \sum m + \sum m \frac{x_i dy_i - y_i dx_i}{dt}, \dots,$$

$$\sum m \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} = \frac{dX^2 + dY^2 + dZ^2}{dt^2} \sum m + \sum m \frac{dx_i^2 + dy_i^2 + dz_i^2}{dt^2}.$$

Ainsi les quantités résultantes des principes précédents se composent : 1° des quantités qui auraient lieu si tous les corps du système étaient réunis à leur centre commun de gravité; 2° des quantités relatives au centre de gravité supposé immobile; et, comme les premières de ces quantités sont constantes, on voit la raison pour laquelle les principes dont il s'agit ont lieu par rapport au centre de gravité. En fixant donc à ce point l'origine des coordonnées  $x, y, z, x', \dots$  des équations (Z) du numéro précédent, elles subsisteront toujours; d'où il résulte que le plan passant constamment par ce centre, et relativement auquel la fonction  $\sum m \frac{x dy - y dx}{dt}$  est un maximum, reste toujours parallèle à lui-même pendant le mouvement du système, et que la même fonction relative à tout autre plan qui lui est perpendiculaire est nulle.

Les principes de la conservation des aires et des forces vives peuvent se réduire à des relations entre les coordonnées des distances mutuelles des corps du système. En effet, l'origine des  $x$ , des  $y$  et des  $z$  étant

toujours supposée au centre de gravité, les équations (Z) du numéro précédent peuvent être mises sous la forme

$$c \sum m = \sum mm' \frac{(x' - x)(dy' - dy) - (y' - y)(dx' - dx)}{dt},$$

$$c' \sum m = \sum mm' \frac{(x' - x)(dz' - dz) - (z' - z)(dx' - dx)}{dt},$$

$$c'' \sum m = \sum mm' \frac{(y' - y)(dz' - dz) - (z' - z)(dy' - dy)}{dt}.$$

On peut observer que les seconds membres de ces équations multipliées par  $dt$  expriment la somme des projections des aires élémentaires tracées par chaque droite qui joint deux corps du système, dont l'un est supposé se mouvoir autour de l'autre considéré comme immobile, chaque aire étant multipliée par le produit des deux masses que joint la droite.

Si l'on applique aux équations précédentes l'analyse du n° 21, on verra que le plan passant constamment par l'un quelconque des corps du système, et relativement auquel la fonction

$$\sum mm' \frac{(x' - x)(dy' - dy) - (y' - y)(dx' - dx)}{dt}$$

est un maximum, reste toujours parallèle à lui-même dans le mouvement du système, et que ce plan est parallèle au plan passant par le centre de gravité, et relativement auquel la fonction  $\sum m \frac{x dy - y dx}{dt}$  est un maximum. On verra encore que les seconds membres des équations précédentes sont nuls relativement à tout plan passant par le même corps et perpendiculaire au plan dont il s'agit.

L'équation (Q) du n° 19 peut être mise sous la forme

$$\sum mm' \frac{(dx' - dx)^2 + (dy' - dy)^2 + (dz' - dz)^2}{dt^2} = \text{const.} \rightarrow \sum m \cdot \sum fmm' F df,$$

équation relative aux seules coordonnées des distances mutuelles des corps, et dans laquelle le premier membre exprime la somme des car-





rés des vitesses relatives des corps du système les uns autour des autres, en les considérant deux à deux, et en supposant l'un des deux immobile, chaque carré étant multiplié par le produit des deux masses que l'on considère.

23. Reprenons l'équation (R) du n° 19; en la différentiant par rapport à la caractéristique  $\delta$ , on aura

$$\Sigma m v \delta v = \Sigma m (P \delta x + Q \delta y + R \delta z);$$

l'équation (P) du n° 18 devient ainsi

$$0 = \Sigma m \left( \partial x . d \frac{dx}{dt} + \partial y . d \frac{dy}{dt} + \partial z . d \frac{dz}{dt} \right) - \Sigma m dt . v \delta v.$$

Soient  $ds$  l'élément de la courbe décrite par  $m$ ,  $ds'$  l'élément de la courbe décrite par  $m'$ , . . . ; on aura

$$v dt = ds, \quad v' dt = ds', \dots, \\ ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}, \dots,$$

d'où l'on tirera, en suivant l'analyse du n° 8,

$$\Sigma m \delta (v ds) = \Sigma m d \frac{dx \delta x + dy \delta y + dz \delta z}{dt}.$$

En intégrant par rapport à la caractéristique différentielle  $d$ , et en étendant les intégrales aux courbes entières décrites par les corps  $m, m', \dots$  on aura

$$\Sigma \delta \int m v ds = \text{const.} + \Sigma m \frac{dx \delta x + dy \delta y + dz \delta z}{dt},$$

les variations  $\delta x, \delta y, \delta z, \dots$  étant, ainsi que la constante du second membre de cette équation, relatives aux points extrêmes des courbes décrites par  $m, m', \dots$

Il suit de là que, si ces points sont supposés invariables, on a

$$0 = \Sigma \delta \int m v ds,$$

c'est-à-dire que la fonction  $\Sigma \int m v ds$  est un minimum. C'est en cela que consiste le principe de la moindre action, dans le mouvement d'un système de corps, principe qui, comme l'on voit, n'est qu'un résultat mathématique des lois primordiales de l'équilibre et du mouvement de la matière. On voit en même temps que ce principe, combiné avec celui des forces vives, donne l'équation (P) du n° 18, qui renferme tout ce qui est nécessaire à la détermination des mouvements du système. Enfin on voit, par le n° 22, que ce principe a lieu encore quand l'origine des coordonnées est mobile, pourvu que son mouvement soit rectiligne et uniforme, et que le système soit libre.

## CHAPITRE VI.

DES LOIS DU MOUVEMENT D'UN SYSTÈME DE CORPS, DANS TOUTES LES RELATIONS MATHÉMATIQUEMENT POSSIBLES ENTRE LA FORCE ET LA VITESSE.

24. Nous avons observé, dans le n° 5, qu'il y a une infinité de manières d'exprimer la force par la vitesse, qui n'impliquent point contradiction. La plus simple de toutes est celle de la force proportionnelle à la vitesse, et nous avons vu qu'elle est la loi de la nature. C'est d'après cette loi que nous avons exposé, dans le Chapitre précédent, les équations différentielles du mouvement d'un système de corps; mais il est facile d'étendre l'analyse dont nous avons fait usage à toutes les lois mathématiquement possibles entre la vitesse et la force, et de présenter ainsi, sous un nouveau point de vue, les principes généraux du mouvement. Pour cela, supposons que,  $F$  étant la force et  $v$  la vitesse, on ait  $F = \varphi(v)$ ,  $\varphi(v)$  étant une fonction quelconque de  $v$ ; désignons par  $\varphi'(v)$  la différence de  $\varphi(v)$  divisée par  $dv$ . Les dénominations des numéros précédents subsistant toujours, le corps  $m$  sera animé, parallèlement à l'axe des  $x$ , de la force  $\varphi(v) \frac{dx}{ds}$ . Dans l'instant suivant, cette force deviendra

$$\varphi(v) \frac{dx}{ds} + d\left(\varphi(v) \frac{dx}{ds}\right), \text{ ou } \varphi(v) \frac{dx}{ds} + d\left(\frac{\varphi(v)}{v} \frac{dx}{dt}\right),$$

parce que  $\frac{ds}{dt} = v$ . Maintenant,  $P, Q, R$  étant les forces qui animent le corps  $m$  parallèlement aux axes des coordonnées, le système sera, par le n° 18, en équilibre en vertu de ces forces et des différentielles

$d\left(\frac{dx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}\right), d\left(\frac{dy}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}\right), d\left(\frac{dz}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}\right)$ , prises avec un signe contraire; on aura donc, au lieu de l'équation (P) du même numéro, celle-ci

$$(S) 0 = \Sigma m \left\{ \delta x \left[ d\left(\frac{dx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}\right) - P dt \right] + \delta y \left[ d\left(\frac{dy}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}\right) - Q dt \right] + \delta z \left[ d\left(\frac{dz}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}\right) - R dt \right] \right\},$$

qui n'en diffère qu'en ce que  $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}$  y sont multipliés par la fonction  $\frac{\varphi(v)}{v}$ , qui, dans le cas de la force proportionnelle à la vitesse, peut être supposée égale à l'unité. Mais cette différence rend très-difficile la solution des problèmes de Mécanique. Cependant on peut tirer de l'équation (S) des principes analogues à ceux de la conservation des forces vives, des aires et du centre de gravité.

Si l'on change  $\delta x$  en  $dx, \delta y$  en  $dy, \delta z$  en  $dz$ , etc., on aura

$$\Sigma m \left[ \delta x d\left(\frac{dx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}\right) + \delta y d\left(\frac{dy}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}\right) + \delta z d\left(\frac{dz}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}\right) \right] = \Sigma m v dv dt \varphi'(v),$$

et par conséquent

$$\Sigma f m v dv \varphi'(v) = \text{const.} + \Sigma f m (P dx + Q dy + R dz).$$

En supposant  $\Sigma m (P dx + Q dy + R dz)$  une différentielle exacte égale à  $d\lambda$ , on aura

$$(T) \quad \Sigma f m v dv \varphi'(v) = \text{const.} + \lambda,$$

équation analogue à l'équation (R) du n° 19, et qui se change en elle dans le cas de la nature, où  $\varphi'(v) = 1$ . Le principe de la conservation des forces vives a donc lieu dans toutes les lois mathématiquement possibles entre la force et la vitesse, pourvu que l'on entende par *force vive* d'un corps le produit de sa masse par le double de l'intégrale de sa vitesse multipliée par la différentielle de la fonction de la vitesse qui exprime la force.

Si l'on fait, dans l'équation (S),

$$\delta x' = \delta x + \delta x', \quad \delta y' = \delta y + \delta y', \quad \delta z' = \delta z + \delta z', \quad \delta x'' = \delta x + \delta x'', \dots,$$





on aura, en égalant séparément à zéro les coefficients de  $\delta x$ ,  $\delta y$ ,  $\delta z$ ,

$$\begin{aligned} 0 &= \Sigma m \left[ d \left( \frac{dx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} \right) - P dt \right], & 0 &= \Sigma m \left[ d \left( \frac{dy}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} \right) - Q dt \right], \\ & & 0 &= \Sigma m \left[ d \left( \frac{dz}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} \right) - R dt \right]. \end{aligned}$$

Ces trois équations sont analogues à celles du n° 20, d'où nous avons conclu la conservation du mouvement du centre de gravité, dans le cas de la nature, lorsque le système n'est assujéti à d'autres forces qu'à l'action et à l'attraction mutuelle des corps du système. Dans ce cas,  $\Sigma mP$ ,  $\Sigma mQ$ ,  $\Sigma mR$  sont nuls, et l'on a

$$\text{const.} = \Sigma m \frac{dx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}, \quad \text{const.} = \Sigma m \frac{dy}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}, \quad \text{const.} = \Sigma m \frac{dz}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}.$$

$m \frac{dx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}$  est égal à  $m \varphi(v) \frac{dx}{ds}$ , et cette dernière quantité est la force finie du corps décomposée parallèlement à l'axe des  $x$ , la force d'un corps étant le produit de sa masse par la fonction de la vitesse qui exprime la force. Ainsi la somme des forces finies du système, décomposées parallèlement à un axe quelconque, est alors constante, quel que soit le rapport de la force à la vitesse; et ce qui distingue l'état du mouvement de celui du repos est que, dans ce dernier état, cette même somme est nulle. Ces résultats sont communs à toutes les lois mathématiquement possibles entre la force et la vitesse; mais ce n'est que dans la loi de la nature que le centre de gravité se meut d'un mouvement rectiligne et uniforme.

Supposons encore, dans l'équation (S),

$$\begin{aligned} \partial x' &= \frac{y'}{y} \partial x + \partial x', & \partial x'' &= \frac{y''}{y} \partial x + \partial x'', \dots, \\ \partial y &= \frac{-x \partial x}{y} + \partial y, & \partial y' &= \frac{-x' \partial x}{y} + \partial y', \dots \end{aligned}$$

la variation  $\delta x$  disparaîtra des variations des distances mutuelles  $f, f', \dots$  des corps du système, et des forces qui dépendent de ces quantités. Si le

système est libre d'obstacles étrangers, on aura, en égalant à zéro le coefficient de  $\delta x$ ,

$$0 = \Sigma m \left[ x d \left( \frac{dy}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} \right) - y d \left( \frac{dx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} \right) \right] + \Sigma m (Py - Qx) dt,$$

d'où l'on tire, en intégrant,

$$c = \Sigma m \frac{xdy - ydx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} + \Sigma fm (Py - Qx) dt.$$

On aura pareillement

$$c' = \Sigma m \frac{xdz - zdx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} + \Sigma fm (Pz - Rx) dt,$$

$$c'' = \Sigma m \frac{ydz - zdy}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} + \Sigma fm (Qz - Ry) dt,$$

$c, c', c''$  étant des constantes arbitraires.

Si le système n'est soumis qu'à l'action mutuelle de ses parties, on a, par le n° 21,

$$\Sigma m (Py - Qx) = 0, \quad \Sigma m (Pz - Rx) = 0, \quad \Sigma m (Qz - Ry) = 0;$$

d'ailleurs,  $m \left( x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) \frac{\varphi(v)}{v}$  est le moment de la force finie dont le corps  $m$  est animé, décomposée parallèlement au plan des  $x$  et des  $y$ , pour faire tourner le système autour de l'axe des  $z$ : l'intégrale finie

$$\Sigma m \frac{xdy - ydx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v}$$

est donc la somme des moments de toutes les forces finies des corps du système, pour le faire tourner autour du même axe; cette somme est par conséquent constante. Elle est nulle dans l'état d'équilibre; il y a donc ici la même différence entre ces deux états que relativement à la somme des forces parallèles à un axe quelconque. Dans la loi de la nature, cette propriété indique que la somme des aires, décrites autour d'un point fixe par les projections des rayons vecteurs des corps, est

toujours la même en temps égal; mais cette constance des aires décrites n'a point lieu dans d'autres lois.

Si l'on différencie par rapport à la caractéristique  $\delta$  la fonction  $\Sigma f m \varphi(v) ds$ , on aura

$$\delta \Sigma f m \varphi(v) ds = \Sigma f m \varphi(v) \delta ds + \Sigma f m \delta v \varphi'(v) ds;$$

mais on a

$$\delta ds = \frac{dx \delta dx + dy \delta dy + dz \delta dz}{ds} = \frac{1}{v} \left( \frac{dx}{dt} \delta dx + \frac{dy}{dt} \delta dy + \frac{dz}{dt} \delta dz \right);$$

on aura donc, en intégrant par parties,

$$\begin{aligned} \delta \Sigma f m \varphi(v) ds &= \Sigma \frac{m \varphi(v)}{v} \left( \frac{dx}{dt} \delta x + \frac{dy}{dt} \delta y + \frac{dz}{dt} \delta z \right) \\ &\quad - \Sigma f m \left[ \delta x d \left( \frac{dx}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} \right) + \delta y d \left( \frac{dy}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} \right) + \delta z d \left( \frac{dz}{dt} \frac{\varphi(v)}{v} \right) \right] \\ &\quad + \Sigma f m \delta v \varphi'(v) ds. \end{aligned}$$

Les points extrêmes des courbes décrites par les corps du système étant supposés fixes, le terme hors du signe  $f$  disparaît dans cette équation; on aura donc, en vertu de l'équation (S),

$$\delta \Sigma f m \varphi(v) ds = \Sigma f m \delta v \varphi'(v) ds - \Sigma f m dt (P \delta x + Q \delta y + R \delta z).$$

Mais l'équation (T), différenciée par rapport à  $\delta$ , donne

$$\Sigma f m \delta v \varphi'(v) ds = \Sigma f m dt (P \delta x + Q \delta y + R \delta z);$$

on a donc

$$0 = \delta \Sigma f m \varphi(v) ds.$$

Cette équation répond au principe de la moindre action dans la loi de la nature.  $m \varphi(v)$  est la force entière du corps  $m$ ; ainsi ce principe revient à ce que la somme des intégrales des forces finies des corps du système, multipliées respectivement par les éléments de leurs directions, est un minimum: présenté de cette manière, il convient à toutes les lois mathématiquement possibles entre la force et la vitesse. Dans

l'état de l'équilibre, la somme des forces multipliées par les éléments de leurs directions est nulle, en vertu du principe des vitesses virtuelles; ce qui distingue donc, à cet égard, l'état d'équilibre de celui du mouvement, est que la même fonction différentielle, qui est nulle dans l'état d'équilibre, donne, étant intégrée, un minimum dans l'état de mouvement.



## CHAPITRE VII.

DES MOUVEMENTS D'UN CORPS SOLIDE DE FIGURE QUELCONQUE.

25. Les équations différentielles des mouvements de translation et de rotation d'un corps solide peuvent se déduire facilement de celles que nous avons développées dans le Chapitre V; mais leur importance dans la théorie du Système du monde nous engage à les développer avec étendue.

Imaginons un corps solide dont toutes les parties soient sollicitées par des forces quelconques. Nommons  $x, y, z$  les coordonnées orthogonales de son centre de gravité;  $x + x', y + y', z + z'$  les coordonnées d'une molécule quelconque  $dm$  du corps, en sorte que  $x', y', z'$  soient les coordonnées de cette molécule, rapportées au centre de gravité du corps. Soient de plus P, Q, R les forces qui sollicitent la molécule parallèlement aux axes des  $x$ , des  $y$  et des  $z$ . Les forces détruites à chaque instant dans la molécule  $dm$ , parallèlement à ces axes, seront, par le n° 18, en considérant l'élément  $dt$  du temps comme constant,

$$-\frac{d^2x + d^2x'}{dt} dm + P dt dm,$$

$$-\frac{d^2y + d^2y'}{dt} dm + Q dt dm,$$

$$-\frac{d^2z + d^2z'}{dt} dm + R dt dm.$$

Il faut donc que toutes les molécules animées de forces semblables se

fassent mutuellement équilibre. On a vu dans le n° 15 que, pour cela, il est nécessaire que la somme des forces parallèles au même axe soit nulle, ce qui donne les trois équations suivantes

$$S \frac{d^2x + d^2x'}{dt^2} dm = S P dm,$$

$$S \frac{d^2y + d^2y'}{dt^2} dm = S Q dm,$$

$$S \frac{d^2z + d^2z'}{dt^2} dm = S R dm,$$

la lettre S étant ici un signe intégral, relatif à la molécule  $dm$ , et qui doit s'étendre à la masse entière du corps. Les variables  $x, y, z$  sont les mêmes pour toutes les molécules; on peut donc les faire sortir hors du signe S; ainsi, en désignant par  $m$  la masse du corps, on aura

$$S \frac{d^2x}{dt^2} dm = m \frac{d^2x}{dt^2}, \quad S \frac{d^2y}{dt^2} dm = m \frac{d^2y}{dt^2}, \quad S \frac{d^2z}{dt^2} dm = m \frac{d^2z}{dt^2}.$$

On a de plus, par la nature du centre de gravité,

$$S x' dm = 0, \quad S y' dm = 0, \quad S z' dm = 0;$$

partant

$$S \frac{d^2x'}{dt^2} dm = 0, \quad S \frac{d^2y'}{dt^2} dm = 0, \quad S \frac{d^2z'}{dt^2} dm = 0.$$

On aura donc

$$(A) \quad \begin{cases} m \frac{d^2x}{dt^2} = S P dm, \\ m \frac{d^2y}{dt^2} = S Q dm, \\ m \frac{d^2z}{dt^2} = S R dm. \end{cases}$$

Ces trois équations déterminent le mouvement du centre de gravité du corps; elles répondent aux équations du n° 20, relatives au mouvement du centre de gravité d'un système de corps.

On a vu, dans le n° 15, que, pour l'équilibre d'un corps solide, la

somme des forces parallèles à l'axe des  $x$ , multipliées respectivement par leurs distances à l'axe des  $z$ , moins la somme des forces parallèles à l'axe des  $y$ , multipliées par leurs distances à l'axe des  $z$ , est égale à zéro; on aura ainsi

$$(1) \quad \int (x+x') \frac{d^2y'+d^2y''}{dt^2} - (y+y') \frac{d^2x'+d^2x''}{dt^2} dm = S[(x+x')Q - (y+y')P] dm.$$

Or on a

$$S(xd^2y - yd^2x) dm = m(xd^2y - yd^2x);$$

on a pareillement

$$S(Qx - Py) dm = x.SQ dm - y.SP dm;$$

enfin on a

$$\begin{aligned} S(x'd^2y' + x''d^2y'' - y'd^2x' - y''d^2x'') dm \\ = d^2y.Sx' dm - d^2x.Sy' dm + x.Sd^2y' dm - y.Sd^2x' dm; \end{aligned}$$

et, par la nature du centre de gravité, chacun des termes du second membre de cette équation est nul; l'équation (1) deviendra donc, en vertu des équations (A),

$$S \frac{x'd^2y' - y'd^2x'}{dt^2} dm = S(Qx' - Py') dm;$$

en intégrant cette équation par rapport au temps  $t$ , on aura

$$S \frac{x'dy' - y'dx'}{dt} dm = S \int (Qx' - Py') dt dm,$$

le signe intégral  $\int$  se rapportant au temps  $t$ .

De là il est facile de conclure que, si l'on fait

$$S \int (Qx' - Py') dt dm = N,$$

$$S \int (Rx' - Pz') dt dm = N',$$

$$S \int (Ry' - Qz') dt dm = N'',$$

on aura les trois équations suivantes

$$(B) \quad \begin{cases} S \frac{x'dy' - y'dx'}{dt} dm = N, \\ S \frac{x'dz' - z'dx'}{dt} dm = N', \\ S \frac{y'dz' - z'dy'}{dt} dm = N''. \end{cases}$$

Ces trois équations renferment le principe de la conservation des aires; elles suffisent pour déterminer le mouvement de rotation du corps autour de son centre de gravité; réunies aux équations (A), elles déterminent complètement les mouvements de translation et de rotation du corps.

Si le corps est assujéti à tourner autour d'un point fixe, il résulte du n° 15 que les équations (B) suffisent pour cet objet; mais alors il faut fixer à ce point l'origine des coordonnées  $x'$ ,  $y'$ ,  $z'$ .

26. Considérons particulièrement ces équations, en supposant cette origine fixe à un point quelconque, différent ou non du centre de gravité. Rapportons la position de chaque molécule à trois axes perpendiculaires entre eux, fixes dans le corps, mais mobiles dans l'espace. Soit  $\theta$  l'inclinaison du plan formé par les deux premiers axes sur le plan des  $x$  et des  $y$ ; soit  $\varphi$  l'angle formé par la ligne d'intersection de ces deux plans et par le premier axe; enfin, soit  $\psi$  l'angle que fait avec l'axe des  $y$  la projection du troisième axe sur le plan des  $x$  et des  $y$ . Nous nommerons *axes principaux* ces trois nouveaux axes, et nous désignerons par  $x''$ ,  $y''$ ,  $z''$  les trois coordonnées de la molécule  $dm$ , rapportées à ces axes. On aura, par le n° 21,

$$\begin{aligned} x' &= x'' \cos \theta \sin \psi \sin \varphi + \cos \psi \cos \varphi + y'' (\cos \theta \sin \psi \cos \varphi - \cos \psi \sin \varphi) + z'' \sin \theta \sin \psi, \\ y' &= x'' (\cos \theta \cos \psi \sin \varphi - \sin \psi \cos \varphi) + y'' (\cos \theta \cos \psi \cos \varphi + \sin \psi \sin \varphi) + z'' \sin \theta \cos \psi, \\ z' &= z'' \cos \theta - y'' \sin \theta \cos \varphi - x'' \sin \theta \sin \varphi. \end{aligned}$$

Au moyen de ces équations, on pourra développer les premiers mem-





bres des équations (B) en fonctions de  $\theta$ ,  $\psi$  et  $\varphi$  et de leurs différentielles. Mais on simplifiera considérablement le calcul, en observant que la position des trois axes principaux dépend de trois arbitraires, que l'on peut toujours déterminer de manière à satisfaire aux trois équations

$$Sx'y'z'dm = 0, \quad Sx'z'dm = 0, \quad Sy'z'dm = 0.$$

Soit alors

$$S(y'^2 + z'^2) dm = A, \quad S(x'^2 + z'^2) dm = B, \quad S(x'^2 + y'^2) dm = C,$$

et faisons, pour abréger,

$$d\varphi - d\psi \cos \theta = p dt,$$

$$d\psi \sin \theta \sin \varphi - d\theta \cos \varphi = q dt,$$

$$d\psi \sin \theta \cos \varphi + d\theta \sin \varphi = r dt.$$

Les équations (B) se changeront, après toutes les réductions, dans les trois suivantes

$$(C) \begin{cases} Aq \sin \theta \sin \varphi + Br \sin \theta \cos \varphi - Cp \cos \theta = -N, \\ \cos \psi (Aq \cos \theta \sin \varphi + Br \cos \theta \cos \varphi + Cp \sin \theta) + \sin \psi (Br \sin \varphi - Aq \cos \varphi) = -N', \\ \cos \psi (Br \sin \varphi - Aq \cos \varphi) - \sin \psi (Aq \cos \theta \sin \varphi + Br \cos \theta \cos \varphi + Cp \sin \theta) = -N''. \end{cases}$$

Ces trois équations donnent, en les différentiant, et en supposant  $\psi = 0$  après les différentiations, ce qui revient à prendre l'axe des  $x'$  infiniment près de la ligne d'intersection du plan des  $x'$  et des  $y'$  avec celui des  $x''$  et des  $y''$ ,

$$d\theta \cos \theta (Br \cos \varphi + Aq \sin \varphi) + \sin \theta \cdot d(Br \cos \varphi + Aq \sin \varphi) - d(Cp \cos \theta) = -dN,$$

$$d\psi (Br \sin \varphi - Aq \cos \varphi) - d\theta \sin \theta (Br \cos \varphi + Aq \sin \varphi) + \cos \theta \cdot d(Br \cos \varphi + Aq \sin \varphi) + d(Cp \sin \theta) = -dN',$$

$$d(Br \sin \varphi - Aq \cos \varphi) - d\psi \cos \theta (Br \cos \varphi + Aq \sin \varphi) - Cp d\psi \sin \theta = -dN''.$$

Si l'on fait

$$Cp = p', \quad Aq = q', \quad Br = r',$$

ces trois équations différentielles donnent les suivantes

$$(D) \begin{cases} dp' + \frac{B-A}{AB} q' r' dt = dN \cos \theta - dN' \sin \theta, \\ dq' + \frac{C-B}{CB} r' p' dt = -(dN \sin \theta + dN' \cos \theta) \sin \varphi + dN'' \cos \varphi, \\ dr' + \frac{A-C}{AC} p' q' dt = -(dN \sin \theta + dN' \cos \theta) \cos \varphi - dN'' \sin \varphi. \end{cases}$$

Ces équations sont très-commodes pour déterminer le mouvement de rotation d'un corps, lorsqu'il tourne à fort peu près autour de l'un des axes principaux, ce qui est le cas des corps célestes.

27. Les trois axes principaux auxquels nous venons de rapporter les angles  $\theta$ ,  $\psi$  et  $\varphi$  méritent une attention particulière; nous allons déterminer leur position dans un solide quelconque. Les valeurs de  $x'$ ,  $y'$ ,  $z'$  du numéro précédent donnent, par le n° 21, les suivantes

$$x'' = x'(\cos \theta \sin \psi \sin \varphi + \cos \psi \cos \varphi) + y'(\cos \theta \cos \psi \sin \varphi - \sin \psi \cos \varphi) - z' \sin \theta \sin \varphi,$$

$$y'' = x'(\cos \theta \sin \psi \cos \varphi - \cos \psi \sin \varphi) + y'(\cos \theta \cos \psi \cos \varphi + \sin \psi \sin \varphi) - z' \sin \theta \cos \varphi,$$

$$z'' = x' \sin \theta \sin \psi + y' \sin \theta \cos \psi + z' \cos \theta;$$

d'où l'on tire

$$x'' \cos \varphi - y'' \sin \varphi = x' \cos \psi - y' \sin \psi,$$

$$x'' \sin \varphi + y'' \cos \varphi = x' \cos \theta \sin \psi + y' \cos \theta \cos \psi - z' \sin \theta.$$

Soit

$$Sx'^2 dm = a^2, \quad Sy'^2 dm = b^2, \quad Sz'^2 dm = c^2,$$

$$Sx'y' dm = f, \quad Sx'z' dm = g, \quad Sy'z' dm = h;$$

on aura

$$\cos \varphi \cdot Sx'z' dm - \sin \varphi \cdot Sy'z' dm$$

$$= (a^2 - b^2) \sin \theta \sin \psi \cos \psi + f \sin \theta (\cos^2 \psi - \sin^2 \psi) + \cos \theta (g \cos \psi - h \sin \psi),$$

$$\sin \varphi \cdot Sx'z' dm + \cos \varphi \cdot Sy'z' dm$$

$$= \sin \theta \cos \theta (a^2 \sin^2 \psi + b^2 \cos^2 \psi - c^2 + 2f \sin \psi \cos \psi) + (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) (g \sin \psi + h \cos \psi).$$



En égalant à zéro les seconds membres de ces deux équations, on aura

$$\begin{aligned} \text{tang } \theta &= \frac{h \sin \psi - g \cos \psi}{(a^2 - b^2) \sin \psi \cos \psi + f (\cos^2 \psi - \sin^2 \psi)}, \\ \frac{1}{2} \text{tang } 2\theta &= \frac{g \sin \psi + h \cos \psi}{c^2 - a^2 \sin^2 \psi - b^2 \cos^2 \psi - 2f \sin \psi \cos \psi}, \end{aligned}$$

mais on a

$$\frac{1}{2} \text{tang } 2\theta = \frac{\text{tang } \theta}{1 - \text{tang}^2 \theta};$$

en égalant ces deux valeurs de  $\frac{1}{2} \text{tang } 2\theta$ , et en substituant dans la dernière, au lieu de  $\text{tang } \theta$ , sa valeur précédente en  $\psi$ ; en faisant ensuite, pour abrégé,  $\text{tang } \psi = u$ , on trouvera, après toutes les réductions, l'équation suivante du troisième degré

$$0 = (gu + h)(hu - g)^2 + [(a^2 - b^2)u + f(1 - u^2)][(hc^2 - ha^2 + fg)u + gb^2 - gc^2 - hf].$$

Cette équation ayant au moins une racine réelle, on voit qu'il est toujours possible de rendre nulles à la fois les deux quantités

$$\begin{aligned} \cos \varphi \cdot Sx''z'' dm - \sin \varphi \cdot Sy''z'' dm, \\ \sin \varphi \cdot Sx''z'' dm + \cos \varphi \cdot Sy''z'' dm, \end{aligned}$$

et par conséquent la somme de leurs carrés  $(Sx''z'' dm)^2 + (Sy''z'' dm)^2$ , ce qui exige que l'on ait séparément

$$Sx''z'' dm = 0, \quad Sy''z'' dm = 0.$$

La valeur de  $u$  donne celle de l'angle  $\psi$ , et par conséquent celle de  $\text{tang } \theta$  et de l'angle  $\theta$ . Il reste maintenant à déterminer l'angle  $\varphi$ , ce que l'on fera au moyen de la condition  $Sx''y'' dm = 0$ , qui reste à remplir. Pour cela, nous observerons que, si l'on substitue dans  $Sx''y'' dm$ , au lieu de  $x''$ ,  $y''$ , leurs valeurs précédentes, cette fonction deviendra de cette forme

$$H \sin 2\varphi + L \cos 2\varphi,$$

H et L étant fonctions des angles  $\theta$  et  $\psi$  et des constantes  $a^2$ ,  $b^2$ ,  $c^2$ ,  $f$ ,

$g$ ,  $h$ ; en égalant cette expression à zéro, on aura

$$\text{tang } 2\varphi = \frac{-L}{H}.$$

Les trois axes déterminés au moyen des valeurs précédentes de  $\theta$ ,  $\psi$  et  $\varphi$  satisfont aux trois équations

$$Sx''y'' dm = 0, \quad Sx''z'' dm = 0, \quad Sy''z'' dm = 0.$$

L'équation du troisième degré en  $u$  semble indiquer trois systèmes d'axes principaux semblables au précédent; mais on doit observer que  $u$  est la tangente de l'angle formé par l'axe des  $x''$  et par l'intersection du plan des  $x'$  et des  $y'$  avec celui des  $x''$  et des  $y''$ ; or il est clair que l'on peut changer les uns dans les autres les trois axes des  $x''$ , des  $y''$  et des  $z''$ , puisque les trois équations précédentes seront toujours satisfaites; l'équation en  $u$  doit donc également déterminer la tangente de l'angle formé par l'axe des  $x''$  et par l'intersection du plan des  $x'$  et des  $y'$ , soit avec le plan des  $x''$  et des  $y''$ , soit avec le plan des  $x''$  et des  $z''$ , soit enfin avec le plan des  $y''$  et des  $z''$ . Ainsi les trois racines de l'équation en  $u$  sont réelles, et elles appartiennent à un même système d'axes.

Il suit de là que généralement un solide n'a qu'un seul système d'axes qui jouissent de la propriété dont il s'agit. Ces axes ont été nommés *axes principaux de rotation*, à cause d'une propriété qui leur est particulière, et dont nous parlerons dans la suite.

On nomme *moment d'inertie* d'un corps, relativement à un axe quelconque, la somme des produits de chaque molécule du corps par le carré de sa distance à cet axe. Ainsi les quantités A, B, C sont les moments d'inertie du solide que nous venons de considérer par rapport aux axes des  $x''$ , des  $y''$  et des  $z''$ . Nommons présentement C le moment d'inertie du même solide par rapport à l'axe des  $x'$ ; on trouvera, au moyen des valeurs de  $x'$  et de  $y'$  du numéro précédent,

$$C = A \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + B \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + C \cos^2 \theta.$$



Les quantités  $\sin^2\theta \sin^2\varphi$ ,  $\sin^2\theta \cos^2\varphi$  et  $\cos^2\theta$  sont les carrés des cosinus des angles que font les axes des  $x''$ , des  $y''$  et des  $z''$  avec l'axe des  $z'$ ; d'où il suit en général que, si l'on multiplie le moment d'inertie relatif à chaque axe principal de rotation par le carré du cosinus de l'angle qu'il fait avec un axe quelconque, la somme de ces trois produits sera le moment d'inertie du solide relativement à ce dernier axe.

La quantité  $C'$  est moindre que la plus grande des trois quantités  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ; elle est plus grande que la plus petite de ces trois quantités; le plus grand et le plus petit moment d'inertie appartiennent donc aux axes principaux.

Soient  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  les coordonnées du centre de gravité du solide, par rapport à l'origine des coordonnées, que nous fixons au point autour duquel le corps est assujéti à tourner, s'il n'est pas libre;  $x' - X$ ,  $y' - Y$  et  $z' - Z$  seront les coordonnées de la molécule  $dm$  du corps, relativement à son centre de gravité; le moment d'inertie, relatif à un axe parallèle à l'axe des  $z'$  et passant par le centre de gravité, sera donc

$$S[(x' - X)^2 + (y' - Y)^2] dm;$$

or on a, par la nature du centre de gravité,

$$Sx'dm = mX, \quad Sy'dm = mY;$$

le moment précédent se réduit donc à

$$-m(X^2 + Y^2) + S(x'^2 + y'^2) dm.$$

On aura ainsi les moments d'inertie du solide, relativement aux axes qui passent par un point quelconque, lorsque ces moments seront connus par rapport aux axes qui passent par le centre de gravité. On voit en même temps que le plus petit de tous les moments d'inertie a lieu par rapport à l'un des trois axes principaux qui passent par ce centre.

Supposons que, par la nature du corps, les deux moments d'inertie  $A$  et  $B$  soient égaux; on aura

$$C' = A \sin^2\theta + C \cos^2\theta;$$

en faisant donc  $\theta$  égal à l'angle droit, ce qui rend l'axe des  $z'$  perpendiculaire à celui des  $z''$ , on aura  $C' = A$ . Les moments d'inertie relatifs à tous les axes situés dans le plan perpendiculaire à l'axe des  $z''$  sont donc alors égaux entre eux. Mais il est facile de s'assurer que l'on a dans ce cas, pour le système de l'axe des  $z''$  et de deux axes quelconques perpendiculaires entre eux et à cet axe,

$$Sx'y''dm = 0, \quad Sx'z''dm = 0, \quad Sy'z''dm = 0;$$

car, en désignant par  $x''$  et  $y''$  les coordonnées d'une molécule  $dm$  du corps, rapportées aux deux axes principaux, pris dans le plan perpendiculaire à l'axe des  $z''$ , et par rapport auxquels les moments d'inertie sont supposés égaux, nous aurons

$$S(x''^2 + z''^2) dm = S(y''^2 + z''^2) dm,$$

ou simplement

$$Sx''^2 dm = Sy''^2 dm;$$

mais, en nommant  $\varepsilon$  l'angle que l'axe des  $x'$  fait avec l'axe des  $x''$ , on a

$$x' = x'' \cos \varepsilon + y'' \sin \varepsilon,$$

$$y' = y'' \cos \varepsilon - x'' \sin \varepsilon;$$

on a donc

$$Sx'y'dm = Sx''y''dm \cdot (\cos^2 \varepsilon - \sin^2 \varepsilon) + S(y''^2 - x''^2) dm \cdot \sin \varepsilon \cos \varepsilon = 0.$$

On trouvera semblablement

$$Sx'z''dm = 0, \quad Sy'z''dm = 0;$$

tous les axes perpendiculaires à celui des  $z''$  sont donc alors des axes principaux, et, dans ce cas, le solide a une infinité d'axes semblables.

Si l'on a à la fois  $A = B = C$ , on aura généralement  $C' = A$ , c'est-à-dire que tous les moments d'inertie du solide sont égaux; mais alors on a généralement

$$Sx'y'dm = 0, \quad Sx'z'dm = 0, \quad Sy'z'dm = 0,$$

quelle que soit la position du plan des  $x'$  et des  $y'$ , en sorte que tous



les axes sont des axes principaux. C'est le cas de la sphère : nous verrons dans la suite que cette propriété convient à une infinité d'autres solides dont nous donnerons l'équation générale.

28. Les quantités  $p, q, r$ , que nous avons introduites dans les équations (C) du n° 26, ont cela de remarquable, qu'elles déterminent la position de l'axe réel et instantané de rotation du corps, par rapport aux axes principaux. En effet, on a, relativement aux points situés dans l'axe de rotation,

$$dx' = 0, \quad dy' = 0, \quad dz' = 0.$$

En différenciant les valeurs de  $x', y', z'$  du n° 26, et en faisant  $\sin \psi = 0$  après les différentiations, ce qui est permis, puisque l'on peut fixer à volonté la position de l'axe des  $x'$  sur le plan des  $x'$  et des  $y'$ , on aura

$$\begin{aligned} dx' &= x''(d\psi \cos \theta \sin \varphi - d\varphi \sin \varphi) + y''(d\psi \cos \theta \cos \varphi - d\varphi \cos \varphi) + z''d\psi \sin \theta = 0, \\ dy' &= x''(d\varphi \cos \theta \cos \varphi - d\theta \sin \theta \sin \varphi - d\psi \cos \varphi) \\ &\quad + y''(d\psi \sin \varphi - d\varphi \cos \theta \sin \varphi - d\theta \sin \theta \cos \varphi) + z''d\theta \cos \theta = 0, \\ dz' &= -x''(d\theta \cos \theta \sin \varphi + d\varphi \sin \theta \cos \varphi) - y''(d\theta \cos \theta \cos \varphi - d\varphi \sin \theta \sin \varphi - z''d\theta \sin \theta) = 0. \end{aligned}$$

Si l'on multiplie la première de ces équations par  $-\sin \varphi$ , la seconde par  $\cos \theta \cos \varphi$ , et la troisième par  $-\sin \theta \cos \varphi$ , on aura, en les ajoutant,

$$0 = px'' - qz''.$$

Si l'on multiplie la première des mêmes équations par  $\cos \varphi$ , la seconde par  $\cos \theta \sin \varphi$ , et la troisième par  $-\sin \theta \sin \varphi$ , on aura, en les ajoutant,

$$0 = py'' - rz''.$$

Enfin, si l'on multiplie la seconde des mêmes équations par  $\sin \theta$ , et la troisième par  $\cos \theta$ , on aura, en les ajoutant,

$$0 = qy'' - rx''.$$

Cette dernière équation résulte évidemment des deux précédentes; ainsi les trois équations  $dx' = 0, dy' = 0, dz' = 0$  se réduisent à ces deux

équations, qui sont à une ligne droite formant avec les axes des  $x''$ , des  $y''$  et des  $z''$  des angles dont les cosinus sont

$$\frac{q}{\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}}, \quad \frac{r}{\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}}, \quad \frac{p}{\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}}.$$

Cette droite est donc en repos, et forme l'axe réel de rotation du corps.

Pour avoir la vitesse de rotation du corps, considérons le point de l'axe des  $z''$  éloigné de l'origine des coordonnées d'une distance égale à l'unité. On aura ses vitesses parallèlement aux axes des  $x''$ , des  $y''$  et des  $z''$  en faisant  $x'' = 0, y'' = 0, z'' = 1$  dans les expressions précédentes de  $dx', dy', dz'$ , et en les divisant par  $dt$ , ce qui donne, pour ces vitesses partielles,

$$\frac{d\psi}{dt} \sin \theta, \quad \frac{d\theta}{dt} \cos \theta, \quad -\frac{d\psi}{dt} \sin \theta;$$

la vitesse entière du point dont il s'agit est donc  $\frac{\sqrt{d\theta^2 + d\psi^2 \sin^2 \theta}}{dt}$ , ou  $\sqrt{q^2 + r^2}$ . En divisant cette vitesse par la distance du point à l'axe instantané de rotation, on aura la vitesse angulaire de rotation du corps; or cette distance est évidemment égale au sinus de l'angle que l'axe réel de rotation fait avec l'axe des  $z''$ , angle dont le cosinus est  $\frac{p}{\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}}$ ; on aura donc  $\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}$  pour la vitesse angulaire de rotation.

On voit par là que, quel que soit le mouvement de rotation d'un corps autour d'un point fixe ou considéré comme tel, ce mouvement ne peut être qu'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe pendant un instant, mais qui peut varier d'un instant à l'autre. La position de cet axe par rapport aux trois axes principaux et la vitesse angulaire de rotation dépendent des variables  $p, q, r$ , dont la détermination est très-importante dans ces recherches, et qui, exprimant des quantités indépendantes de la situation du plan des  $x'$  et des  $y'$ , sont elles-mêmes indépendantes de cette situation.



29. Déterminons ces variables en fonction du temps  $t$ , dans le cas où le corps n'est sollicité par aucune force extérieure. Pour cela, reprenons les équations (D) du n° 26 entre les variables  $p'$ ,  $q'$ ,  $r'$ , qui sont aux précédentes dans un rapport constant. Les différentielles  $dN$ ,  $dN'$  et  $dN''$  sont alors nulles, et ces équations donnent, en les ajoutant ensemble, après les avoir multipliées respectivement par  $p'$ ,  $q'$  et  $r'$ ,

$$0 = p' dp' + q' dq' + r' dr',$$

et, en intégrant,

$$p'^2 + q'^2 + r'^2 = k^2,$$

$k$  étant une constante arbitraire.

Les équations (D), multipliées respectivement par  $ABp'$ ,  $BCq'$  et  $ACr'$ , et ensuite ajoutées, donnent, en intégrant leur somme,

$$ABp'^2 + BCq'^2 + ACr'^2 = H^2,$$

$H$  étant une constante arbitraire : cette équation renferme le principe de la conservation des forces vives. On tirera de ces deux intégrales

$$q'^2 = \frac{ACk^2 - H^2 + A(B-C)p'^2}{C(A-B)},$$

$$r'^2 = \frac{H^2 - BCk^2 - B(A-C)p'^2}{C(A-B)};$$

ainsi l'on connaîtra  $q'$  et  $r'$  en fonction du temps  $t$ , lorsque  $p'$  sera déterminé. Or la première des équations (D) donne

$$dt = \frac{AB dp'}{(A-B)q'r'},$$

partant

$$dt = \frac{ABC dp'}{\sqrt{[ACk^2 - H^2 + A(B-C)p'^2][H^2 - BCk^2 - B(A-C)p'^2]}}$$

équation qui n'est intégrable que dans l'un des trois cas suivants.  $B = A$ ,  $B = C$ ,  $A = C$ .

La détermination des trois quantités  $p'$ ,  $q'$ ,  $r'$  renferme trois arbitraires  $H^2$ ,  $k^2$ , et celle qu'introduit l'intégration de l'équation différen-

tielle précédente. Mais ces quantités ne donnent que la position de l'axe instantané de rotation du corps sur sa surface ou relativement aux trois axes principaux, et sa vitesse angulaire de rotation. Pour avoir le mouvement réel du corps autour du point fixe, il faut connaître encore la position des axes principaux dans l'espace, ce qui doit introduire trois nouvelles arbitraires relatives à la position primitive de ces axes, et ce qui exige trois nouvelles intégrales, qui, jointes aux précédentes, donnent la solution complète du problème. Les équations (C) du n° 26 renferment trois arbitraires  $N$ ,  $N'$ ,  $N''$ ; mais elles ne sont pas entièrement distinctes des arbitraires  $H$  et  $k$ . En effet, si l'on ajoute ensemble les carrés des premiers membres des équations (C), on a

$$p'^2 + q'^2 + r'^2 = N^2 + N'^2 + N''^2,$$

ce qui donne

$$k^2 = N^2 + N'^2 + N''^2.$$

Les constantes  $N$ ,  $N'$ ,  $N''$  répondent aux constantes  $c$ ,  $c'$ ,  $c''$  du n° 21, et la fonction  $\frac{1}{2}t\sqrt{p'^2 + q'^2 + r'^2}$  exprime la somme des aires décrites pendant le temps  $t$  par les projections de chaque molécule du corps sur le plan relativement auquel cette somme est un maximum.  $N$  et  $N''$  sont nuls relativement à ce plan; en égalant donc à zéro leurs valeurs trouvées dans le n° 26, on aura

$$0 = Br \sin \varphi - Aq \cos \varphi,$$

$$0 = Aq \cos \theta \sin \varphi + Br \cos \theta \cos \varphi + Cp \sin \theta,$$

d'où l'on tire

$$\cos \theta = \frac{p'}{\sqrt{p'^2 + q'^2 + r'^2}},$$

$$\sin \theta \sin \varphi = \frac{-q'}{\sqrt{p'^2 + q'^2 + r'^2}},$$

$$\sin \theta \cos \varphi = \frac{-r'}{\sqrt{p'^2 + q'^2 + r'^2}}.$$

Au moyen de ces équations, on connaîtra les valeurs de  $\theta$  et de  $\varphi$  en fonction du temps, relativement au plan fixe que nous venons de consi-



dérer. Il ne s'agit plus que de connaître l'angle  $\psi$ , que l'intersection de ce plan et de celui des deux premiers axes principaux fait avec l'axe des  $x'$ , ce qui exige une nouvelle intégration.

Les valeurs de  $q$  et de  $r$  du n° 26 donnent

$$d\psi \sin^2 \theta = q dt \sin \theta \sin \varphi + r dt \sin \theta \cos \varphi,$$

d'où l'on tire

$$d\psi = \frac{-k dt (Bq'^2 + Ar'^2)}{AB(q'^2 + r'^2)},$$

or on a, par ce qui précède,

$$q'^2 + r'^2 = k^2 - p'^2, \quad Bq'^2 + Ar'^2 = \frac{H^2 - ABp'^2}{C},$$

on aura donc

$$d\psi = \frac{-k dt (H^2 - ABp'^2)}{ABC(k^2 - p'^2)}.$$

Si l'on substitue, au lieu de  $dt$ , sa valeur trouvée ci-dessus, on aura la valeur de  $\psi$  en fonction de  $p'$ ; les trois angles  $\theta$ ,  $\varphi$  et  $\psi$  seront ainsi déterminés en fonction des variables  $p'$ ,  $q'$ ,  $r'$ , qui seront elles-mêmes déterminées en fonction du temps  $t$ . On connaîtra donc à un instant quelconque les valeurs de ces angles par rapport au plan des  $x'$  et des  $y'$  que nous venons de considérer, et il sera facile, par les formules de la Trigonométrie sphérique, d'en conclure les valeurs des mêmes angles relatives à tout autre plan: ce qui introduira deux nouvelles arbitraires qui, réunies aux quatre précédentes, formeront les six arbitraires que doit renfermer la solution complète du problème que nous venons de traiter. Mais on voit que la considération du plan dont nous venons de parler simplifie ce problème.

La position des trois axes principaux étant supposée connue sur la surface du corps, si l'on connaît à un instant quelconque la position de l'axe réel de rotation à cette surface et la vitesse angulaire de rotation, on aura à cet instant les valeurs de  $p$ ,  $q$ ,  $r$ , puisque ces valeurs, divisées par la vitesse angulaire de rotation, expriment les cosinus des angles que l'axe réel de rotation forme avec les trois axes principaux:

on aura donc les valeurs de  $p'$ ,  $q'$ ,  $r'$ ; or ces dernières valeurs sont proportionnelles aux sinus des angles que les trois axes principaux forment avec le plan des  $x'$  et des  $y'$ , relativement auquel la somme des aires des projections des molécules du corps, multipliées respectivement par ces molécules, est un maximum; on pourra donc alors déterminer à tous les instants l'intersection de la surface du corps par ce plan invariable, et par conséquent retrouver la position de ce plan par les conditions actuelles du mouvement du corps.

Supposons que le mouvement de rotation du corps soit dû à une impulsion primitive qui ne passe point par son centre de gravité. Il résulte, de ce que nous avons démontré dans les n°s 20 et 22, que le centre de gravité prendra le même mouvement que si cette impulsion lui était immédiatement appliquée, et que le corps prendra autour de ce centre le même mouvement de rotation que si ce centre était immobile. La somme des aires décrites autour de ce point par le rayon vecteur de chaque molécule projetée sur un plan fixe, et multipliées respectivement par ces molécules, sera proportionnelle au moment de la force primitive projetée sur le même plan; or ce moment est le plus grand relativement au plan qui passe par sa direction et par le centre de gravité; ce plan est donc le plan invariable. Si l'on nomme  $f$  la distance de l'impulsion primitive au centre de gravité, et  $v$  la vitesse qu'elle imprime à ce point,  $m$  étant la masse du corps,  $mfv$  sera le moment de cette impulsion, et, en le multipliant par  $\frac{1}{2}t$ , le produit sera égal à la somme des aires décrites pendant le temps  $t$ ; mais cette somme, par ce qui précède, est  $\frac{t}{2}\sqrt{p'^2 + q'^2 + r'^2}$ ; on a donc

$$\sqrt{p'^2 + q'^2 + r'^2} = mf v.$$

Si l'on connaît à l'origine du mouvement la position des axes principaux relativement au plan invariable, ou les angles  $\theta$  et  $\varphi$ , on aura à cette origine les valeurs de  $p'$ ,  $q'$  et  $r'$ , et par conséquent celles de  $p$ ,  $q$ ,  $r$ ; on aura donc à un instant quelconque les valeurs des mêmes quantités.



Cette théorie peut servir à expliquer le double mouvement de rotation et de révolution des planètes par une seule impulsion primitive. Supposons, en effet, qu'une planète soit une sphère homogène d'un rayon  $R$ , et qu'elle tourne autour du Soleil avec une vitesse angulaire  $U$ ;  $r$  étant supposé exprimer sa distance au Soleil, on aura  $v = rU$ ; de plus, si l'on conçoit que la planète se meut en vertu d'une impulsion primitive dont la direction a passé à la distance  $f$  de son centre, il est clair qu'elle tournera sur elle-même, autour d'un axe perpendiculaire au plan invariable; en considérant donc cet axe comme le troisième axe principal, on aura  $\theta = 0$ , et par conséquent  $q' = 0$ ,  $r' = 0$ ; on aura donc  $p' = mfc$ , ou  $Cp = mfrU$ . Mais dans la sphère on a  $C = \frac{2}{5}mR^2$ , partant

$$f = \frac{2}{5} \frac{R^2}{r} \frac{p}{U},$$

ce qui donne la distance  $f$  de la direction de l'impulsion primitive, au centre de la planète, qui satisfait au rapport observé entre la vitesse angulaire  $p$  de rotation et la vitesse angulaire  $U$  de révolution autour du Soleil. Relativement à la Terre, on a  $\frac{p}{U} = 366,25638$ ; la parallaxe du Soleil donne  $\frac{R}{r} = 0,00042665$ , et par conséquent  $f = \frac{1}{100}R$ , à fort peu près.

Les planètes n'étant point homogènes, on peut les considérer ici comme étant formées de couches sphériques et concentriques, d'inégale densité. Soit  $\rho$  la densité d'une de ces couches dont le rayon est  $R$ ,  $\rho$  étant fonction de  $R$ ; on aura

$$C = \frac{2m}{3} \cdot \frac{\int \rho R^4 dR}{\int \rho R^2 dR},$$

$m$  étant la masse entière de la planète, et les intégrales étant prises depuis  $R = 0$  jusqu'à sa valeur à la surface; on aura ainsi

$$f = \frac{2}{3} \frac{p}{rU} \cdot \frac{\int \rho R^4 dR}{\int \rho R^2 dR}.$$

Si, comme il est naturel de le supposer, les couches les plus voisines du

centre sont les plus denses, la fonction  $\frac{\int \rho R^4 dR}{\int \rho R^2 dR}$  sera moindre que  $\frac{2}{3}R^2$ ; la valeur de  $f$  sera donc moindre que dans le cas de l'homogénéité.

30. Déterminons présentement les oscillations du corps, dans le cas où il tourne à très-peu près autour du troisième axe principal. On pourrait les déduire des intégrales auxquelles nous sommes parvenus dans le numéro précédent; mais il est plus simple de les tirer directement des équations différentielles (D) du n° 26. Le corps n'étant sollicité par aucune force, ces équations deviennent, en y substituant au lieu de  $p'$ ,  $q'$ ,  $r'$  leurs valeurs  $Cp$ ,  $Aq$  et  $Br$ ,

$$dp + \frac{B-A}{C} qr dt = 0, \quad dq + \frac{C-B}{A} rp dt = 0, \quad dr + \frac{A-C}{B} pq dt = 0.$$

Le solide étant supposé tourner à fort peu près autour de son troisième axe principal,  $q$  et  $r$  sont de très-petites quantités, dont nous négligerons les carrés et les produits; ce qui donne  $dp = 0$ , et par conséquent  $p$  constant. Si dans les deux autres équations on suppose

$$q = M \sin(nt + \gamma), \quad r = M' \cos(nt + \gamma),$$

on aura

$$n = p \sqrt{\frac{(C-A)(C-B)}{AB}}, \quad M' = -M \sqrt{\frac{A(C-A)}{B(C-B)}},$$

$M$  et  $\gamma$  étant deux constantes arbitraires. La vitesse angulaire de rotation sera  $\sqrt{p^2 + q^2 + r^2}$ , ou simplement  $p$ , en négligeant les carrés de  $q$  et de  $r$ ; cette vitesse sera donc à très-peu près constante. Enfin le sinus de l'angle formé par l'axe réel de rotation et par le troisième axe principal sera  $\frac{\sqrt{q^2 + r^2}}{p}$ .

Si à l'origine du mouvement on a  $q = 0$  et  $r = 0$ , c'est-à-dire si l'axe réel de rotation coïncide à cet instant avec le troisième axe principal, on aura  $M = 0$ ,  $M' = 0$ ;  $q$  et  $r$  seront donc toujours nuls, et l'axe de rotation coïncidera toujours avec le troisième axe principal; d'où il suit que, si le corps commence à tourner autour d'un des axes principaux,



il continuera de tourner uniformément autour du même axe. Cette propriété remarquable des axes principaux les a fait nommer *axes principaux de rotation* : elle leur convient exclusivement ; car, si l'axe réel de rotation est invariable à la surface du corps, on a  $dp = 0$ ,  $dq = 0$ ,  $dr = 0$  ; les valeurs précédentes de ces quantités donnent ainsi

$$\frac{B-A}{C}rq = 0, \quad \frac{C-B}{A}rp = 0, \quad \frac{A-C}{B}pq = 0.$$

Dans le cas général où A, B, C sont inégaux, deux des trois quantités  $p$ ,  $q$ ,  $r$  sont nulles en vertu de ces équations, ce qui suppose que l'axe réel de rotation coïncide avec l'un des axes principaux.

Si deux des trois quantités A, B, C sont égales, par exemple si l'on a  $A = B$ , les trois équations précédentes se réduisent à celles-ci

$$rp = 0, \quad pq = 0,$$

et l'on peut y satisfaire par la supposition seule de  $p$  égal à zéro. L'axe de rotation est alors dans un plan perpendiculaire au troisième axe principal ; mais on a vu (n° 27) que tous les axes situés dans ce plan sont des axes principaux.

Enfin, si l'on a à la fois  $A = B = C$ , les trois équations précédentes seront satisfaites, quels que soient  $p$ ,  $q$ ,  $r$  ; mais alors, par le n° 27, tous les axes du corps sont des axes principaux.

Il suit de là que les seuls axes principaux ont la propriété d'être des axes invariables de rotation ; mais ils n'en jouissent pas tous de la même manière. Le mouvement de rotation autour de celui dont le moment d'inertie est entre les moments d'inertie des deux autres axes peut être troublé d'une manière sensible par la cause la plus légère, en sorte qu'il n'y a point de stabilité dans ce mouvement.

On nomme *état stable* d'un système de corps un état tel que le système, lorsqu'il en est infiniment peu dérangé, ne puisse s'en écarter qu'infiniment peu, en faisant des oscillations continues autour de cet état. Concevons, cela posé, que l'axe réel de rotation s'éloigne infiniment peu du troisième axe principal ; dans ce cas, les constantes M

et  $M'$  sont infiniment petites ; et, si  $n$  est une quantité réelle, les valeurs de  $q$  et de  $r$  resteront toujours infiniment petites, et l'axe réel de rotation ne fera jamais que des excursions du même ordre autour du troisième axe principal. Mais, si  $n$  était imaginaire,  $\sin(nt + \gamma)$  et  $\cos(nt + \gamma)$  se changeraient en exponentielles ; les expressions de  $q$  et de  $r$  pourraient donc alors augmenter indéfiniment, et cesser enfin d'être infiniment petites ; il n'y aurait donc point de stabilité dans le mouvement de rotation du corps autour du troisième axe principal. La valeur de  $n$  est réelle, si C est la plus grande ou la plus petite des trois quantités A, B, C ; car alors le produit  $(C - A)(C - B)$  est positif ; mais ce produit est négatif, si C est entre A et B, et dans ce cas  $n$  est imaginaire ; ainsi le mouvement de rotation est stable autour des deux axes principaux dont les moments d'inertie sont le plus grand et le plus petit ; il ne l'est pas autour de l'autre axe principal.

Maintenant, pour déterminer la position des axes principaux dans l'espace, nous supposerons le troisième axe principal à fort peu près perpendiculaire au plan des  $x'$  et des  $y'$ , en sorte que  $\theta$  soit une quantité très-petite dont nous négligerons le carré. Nous aurons, par le n° 26,

$$dz - d\psi = p dt,$$

ce qui donne, en intégrant,

$$\psi = z - pt - \varepsilon,$$

$\varepsilon$  étant une constante arbitraire. Si l'on fait ensuite

$$\sin \theta \sin \varphi = s, \quad \sin \theta \cos \varphi = u,$$

les valeurs de  $q$  et de  $r$  du n° 26 donneront, en éliminant  $d\psi$ ,

$$\frac{ds}{dt} - pu = r, \quad \frac{du}{dt} + ps = -q,$$

et en intégrant,

$$s = \varepsilon \sin(pt + \lambda) - \frac{AM}{Cp} \sin(nt + \gamma),$$

$$u = \varepsilon \cos(pt + \lambda) - \frac{BM'}{Cp} \cos(nt + \gamma).$$





$\varrho$  et  $\lambda$  étant deux nouvelles arbitraires : le problème est ainsi complètement résolu, puisque les valeurs de  $s$  et de  $u$  donnent les angles  $\theta$  et  $\varphi$  en fonction du temps, et que  $\psi$  est déterminé en fonction de  $\varphi$  et de  $t$ . Si  $\varrho$  est nul, le plan des  $x'$  et des  $y'$  devient le plan invariable auquel nous avons rapporté, dans le numéro précédent, les angles  $\theta$ ,  $\varphi$  et  $\psi$ .

31. Si le solide est libre, l'analyse des numéros précédents donnera son mouvement autour de son centre de gravité; si le solide est forcé de se mouvoir autour d'un point fixe, elle fera connaître son mouvement autour de ce point. Il nous reste à considérer le mouvement d'un solide assujéti à se mouvoir autour d'un axe fixe.

Concevons que  $x'$  soit cet axe, que nous supposons horizontal : dans ce cas, la dernière des équations (B) du n° 25 suffira pour déterminer le mouvement du corps. Supposons, de plus, que l'axe des  $y'$  soit horizontal, et qu'ainsi l'axe des  $z'$  soit vertical et dirigé vers le centre de la Terre; supposons enfin que le plan qui passe par les axes des  $y'$  et des  $z'$  passe par le centre de gravité du corps, et imaginons un axe passant constamment par ce centre et par l'origine des coordonnées. Soit  $\theta$  l'angle que ce nouvel axe fait avec celui des  $z'$ ; si l'on nomme  $y''$  et  $z''$  les coordonnées rapportées à ce nouvel axe, on aura

$$y' = y'' \cos \theta + z'' \sin \theta, \quad z' = z'' \cos \theta - y'' \sin \theta,$$

d'où l'on tire

$$\int y' dz' - z' dy' dm = - \frac{d\theta}{dt} \cdot \int dm (y''^2 + z''^2).$$

$\int dm (y''^2 + z''^2)$  est le moment d'inertie du corps relativement à l'axe des  $x'$  : soit  $C$  ce moment. La dernière des équations (B) du n° 25 donnera

$$-C \frac{d^2 \theta}{dt^2} = \frac{dN''}{dt}.$$

Supposons que le corps ne soit sollicité que par l'action de la pesan-

teur; les valeurs de  $P$  et de  $Q$  du n° 25 seront nulles, et  $R$  sera constant, ce qui donne

$$\frac{dN''}{dt} = S R y' dm = R \cos \theta \cdot S y'' dm + R \sin \theta \cdot S z'' dm.$$

L'axe des  $z''$  passant par le centre de gravité du corps, on a  $S y'' dm = 0$ ; de plus, si l'on nomme  $h$  la distance du centre de gravité du corps à l'axe de  $x'$ , on aura  $S z'' dm = mh$ ,  $m$  étant la masse entière du corps; on aura donc

$$\frac{dN''}{dt} = mhR \sin \theta,$$

et par conséquent

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = - \frac{mhR \sin \theta}{C}.$$

Considérons présentement un second corps, dont toutes les parties soient réunies dans un seul point, éloigné de la distance  $l$  de l'axe des  $x'$ ; on aura, relativement à ce corps,  $C = m'l^2$ ,  $m'$  étant sa masse; de plus,  $h$  sera égal à  $l$ ; partant

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = - \frac{R}{l} \sin \theta.$$

Ces deux corps auront donc exactement le même mouvement d'oscillation, si leur vitesse initiale angulaire, lorsque leurs centres de gravité sont dans la verticale, est la même, et si l'on a  $l = \frac{C}{mh}$ . Le second corps dont nous venons de parler est le pendule simple dont on a considéré les oscillations dans le n° 11; on peut donc toujours assigner, par cette formule, la longueur  $l$  du pendule simple dont les oscillations sont isochrones à celles du solide que nous considérons ici, et qui forme un pendule composé. C'est ainsi que l'on a déterminé la longueur du pendule simple qui bat les secondes, par des observations faites sur les pendules composés.



## CHAPITRE VIII.

## DU MOUVEMENT DES FLUIDES.

32. Nous ferons dépendre les lois du mouvement des fluides de celles de leur équilibre, de même que, dans le Chapitre V, nous avons déduit les lois du mouvement d'un système de corps de celles de l'équilibre de ce système. Reprenons donc l'équation générale de l'équilibre des fluides, donnée dans le n° 17,

$$\delta p = \rho (P \delta x + Q \delta y + R \delta z),$$

la caractéristique  $\delta$  ne se rapportant qu'aux coordonnées  $x, y, z$  de la molécule, et n'étant point relative au temps  $t$ . Lorsque le fluide est en mouvement, les forces en vertu desquelles ses molécules seraient en équilibre sont, par le n° 18, en supposant  $dt$  constant,

$$P = \frac{\partial^2 x}{\partial t^2}, \quad Q = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \quad R = \frac{\partial^2 z}{\partial t^2};$$

il faut donc substituer ces forces, au lieu de  $P, Q, R$ , dans l'équation précédente de l'équilibre. En désignant par  $\delta V$  la variation  $P \delta x + Q \delta y + R \delta z$ , que nous supposons exacte, on aura

$$(F) \quad \delta V = \frac{\partial p}{\rho} = \delta x \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \delta y \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \delta z \frac{\partial^2 z}{\partial t^2};$$

cette équation équivaut à trois équations distinctes, puisque, les variations  $\delta x, \delta y, \delta z$  étant indépendantes, on peut évaluer séparément à zéro leurs coefficients.

Les coordonnées  $x, y, z$  sont fonctions des coordonnées primitives et du temps  $t$ ; soient  $a, b, c$  ces coordonnées primitives; on aura

$$\delta x = \frac{\partial x}{\partial a} \delta a + \frac{\partial x}{\partial b} \delta b + \frac{\partial x}{\partial c} \delta c,$$

$$\delta y = \frac{\partial y}{\partial a} \delta a + \frac{\partial y}{\partial b} \delta b + \frac{\partial y}{\partial c} \delta c,$$

$$\delta z = \frac{\partial z}{\partial a} \delta a + \frac{\partial z}{\partial b} \delta b + \frac{\partial z}{\partial c} \delta c.$$

En substituant ces valeurs dans l'équation (F), on pourra évaluer séparément à zéro les coefficients de  $\delta a, \delta b, \delta c$ , ce qui donnera trois équations à différences partielles entre les trois coordonnées  $x, y, z$  de la molécule, ses coordonnées primitives  $a, b, c$ , et le temps  $t$ .

Il nous reste à remplir les conditions de la continuité du fluide. Pour cela, considérons à l'origine du mouvement un parallélépipède fluide rectangle, dont les trois dimensions soient  $da, db, dc$ . En désignant par  $(\rho)$  la densité primitive de cette molécule, sa masse sera  $(\rho) da db dc$ . Nommons (A) ce parallélépipède: il est aisé de voir qu'après le temps  $t$  il se changera dans un parallélépipède obliquangle; car toutes les molécules situées primitivement sur une face quelconque du parallélépipède (A) seront encore dans un même plan, du moins en négligeant les infiniment petits du second ordre: toutes les molécules situées sur les arêtes parallèles de (A) se trouveront sur de petites droites égales et parallèles entre elles. Nommons (B) ce nouveau parallélépipède, et concevons que par les extrémités de l'arête formée par les molécules qui, dans le parallélépipède (A), composaient l'arête  $dc$ , on mène deux plans parallèles à celui des  $x$  et des  $y$ . En prolongeant les arêtes de (B) jusqu'à la rencontre de ces deux plans, on aura un nouveau parallélépipède (C), compris entre eux et égal à (B); car il est clair qu'autant l'un des deux plans retranche du parallélépipède (B), autant l'autre lui ajoute. Le parallélépipède (C) aura ses deux bases parallèles au plan des  $x$  et des  $y$ : sa hauteur comprise entre ses bases sera évidemment



égale à la différence de  $z$ , prise en n'y faisant varier que  $c$ ; ce qui donne  $\frac{\partial z}{\partial c} dc$  pour cette hauteur.

On aura sa base, en observant qu'elle est égale à la section de (B) par un plan parallèle à celui des  $x$  et des  $y$ ; nommons ( $\varepsilon$ ) cette section. Par rapport aux molécules dont elle sera formée, la valeur de  $z$  sera la même, et l'on aura

$$0 = \frac{\partial z}{\partial a} da + \frac{\partial z}{\partial b} db + \frac{\partial z}{\partial c} dc.$$

Soient  $\delta p$  et  $\delta q$  deux côtés contigus de la section ( $\varepsilon$ ), dont le premier soit formé par des molécules de la face  $dbdc$  du parallélépipède (A), et dont le second soit formé par des molécules de sa face  $da dc$ . Si par les extrémités du côté  $\delta p$  on imagine deux droites parallèles à l'axe des  $x$ , et que l'on prolonge le côté du parallélogramme ( $\varepsilon$ ), parallèle à  $\delta p$ , jusqu'à la rencontre de ces droites, elles intercepteront entre elles un nouveau parallélogramme ( $\lambda$ ) égal à ( $\varepsilon$ ), et dont la base sera parallèle à l'axe des  $x$ . Le côté  $\delta p$  étant formé par des molécules de la face  $dbdc$ , relativement auxquelles la valeur de  $z$  est la même, il est aisé de voir que la hauteur du parallélogramme ( $\lambda$ ) est la différence de  $y$ , en supposant  $a$ ,  $z$  et  $t$  constants, ce qui donne

$$dy = \frac{\partial y}{\partial b} db + \frac{\partial y}{\partial c} dc,$$

$$0 = \frac{\partial z}{\partial b} db + \frac{\partial z}{\partial c} dc,$$

d'où l'on tire

$$dy = \frac{\frac{\partial y}{\partial b} \frac{\partial z}{\partial c} - \frac{\partial y}{\partial c} \frac{\partial z}{\partial b}}{\frac{\partial z}{\partial c}} db;$$

c'est l'expression de la hauteur du parallélogramme ( $\lambda$ ). Sa base est égale à la section de ce parallélogramme par un plan parallèle à l'axe des  $x$ ; cette section est formée par des molécules du parallélépipède (A) par rapport auxquelles  $z$  et  $y$  sont constants; sa longueur est

donc égale à la différentielle de  $x$ , prise en supposant  $z$ ,  $y$  et  $t$  constants, ce qui donne les trois équations

$$dx = \frac{\partial x}{\partial a} da + \frac{\partial x}{\partial b} db + \frac{\partial x}{\partial c} dc,$$

$$0 = \frac{\partial y}{\partial a} da + \frac{\partial y}{\partial b} db + \frac{\partial y}{\partial c} dc,$$

$$0 = \frac{\partial z}{\partial a} da + \frac{\partial z}{\partial b} db + \frac{\partial z}{\partial c} dc.$$

Soit, pour abréger,

$$\varepsilon = \frac{\partial x}{\partial a} \frac{\partial y}{\partial b} \frac{\partial z}{\partial c} - \frac{\partial x}{\partial a} \frac{\partial y}{\partial c} \frac{\partial z}{\partial b} + \frac{\partial x}{\partial b} \frac{\partial y}{\partial c} \frac{\partial z}{\partial a} - \frac{\partial x}{\partial b} \frac{\partial y}{\partial a} \frac{\partial z}{\partial c} + \frac{\partial x}{\partial c} \frac{\partial y}{\partial a} \frac{\partial z}{\partial b} - \frac{\partial x}{\partial c} \frac{\partial y}{\partial b} \frac{\partial z}{\partial a};$$

on aura

$$dx = \frac{\varepsilon da}{\frac{\partial y}{\partial b} \frac{\partial z}{\partial c} - \frac{\partial y}{\partial c} \frac{\partial z}{\partial b}};$$

c'est l'expression de la base du parallélogramme ( $\lambda$ ); la surface de ce parallélogramme sera donc  $\frac{\varepsilon da db}{\frac{\partial z}{\partial c}}$ . Cette quantité exprime encore la

surface du parallélogramme ( $\varepsilon$ ); en la multipliant par  $\frac{\partial z}{\partial c} dc$ , on aura  $\varepsilon da db dc$  pour le volume des parallélépipèdes (C) et (B). Soit  $\rho$  la densité du parallélépipède (A) après le temps  $t$ ; on aura  $\rho \varepsilon da db dc$  pour sa masse; en l'égalant à sa masse primitive ( $\rho$ )  $da db dc$ , on aura

$$(G) \quad \rho \varepsilon = (\rho),$$

pour l'équation relative à la continuité du fluide.

33. On peut donner aux équations (F) et (G) une autre forme d'un usage plus commode dans quelques circonstances. Soient  $u$ ,  $v$  et  $w$  les vitesses d'une molécule fluide, parallèlement aux axes des  $x$ , des  $y$  et des  $z$ ; on aura

$$\frac{\partial x}{\partial t} = u, \quad \frac{\partial y}{\partial t} = v, \quad \frac{\partial z}{\partial t} = w.$$



Différentions ces équations, en regardant  $u$ ,  $v$  et  $w$  comme fonctions des coordonnées  $x$ ,  $y$ ,  $z$  de la molécule, et du temps  $t$ ; nous aurons

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} &= \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z}, \\ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} &= \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} &= \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z}.\end{aligned}$$

L'équation (F) du numéro précédent deviendra ainsi

$$(H) \quad \left\{ \begin{aligned} \delta v - \frac{\partial p}{\rho} &= \delta x \left( \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) \\ &+ \delta y \left( \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ &+ \delta z \left( \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right). \end{aligned} \right.$$

Pour avoir l'équation relative à la continuité du fluide, concevons que, dans la valeur de  $\delta$  du numéro précédent,  $a$ ,  $b$ ,  $c$  soient égaux à  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , et que  $x$ ,  $y$ ,  $z$  soient égaux à  $x + u dt$ ,  $y + v dt$ ,  $z + w dt$ , ce qui revient à prendre les coordonnées primitives  $a$ ,  $b$ ,  $c$  infiniment près de  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ; on aura

$$\delta = 1 + dt \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right);$$

L'équation (G) devient

$$\rho dt \left( \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) + \rho - (\rho) = 0.$$

Si l'on considère  $\rho$  comme fonction de  $x$ ,  $y$ ,  $z$  et de  $t$ , on a

$$(\rho) = \rho - dt \frac{\partial \rho}{\partial t} - u dt \frac{\partial \rho}{\partial x} - v dt \frac{\partial \rho}{\partial y} - w dt \frac{\partial \rho}{\partial z};$$

l'équation précédente se change ainsi dans la suivante

$$(K) \quad 0 = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z};$$

c'est l'équation relative à la continuité du fluide, et il est aisé de voir qu'elle est la différentielle de l'équation (G) du numéro précédent, prise par rapport au temps  $t$ .

L'équation (H) est susceptible d'intégration dans un cas fort étendu, savoir, lorsque  $u \delta x + v \delta y + w \delta z$  est une variation exacte de  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ;  $\rho$  étant d'ailleurs une fonction quelconque de la pression  $p$ . Soit alors  $\delta \varphi$  cette variation; l'équation (H) donne

$$\delta v - \frac{\partial p}{\rho} = \delta \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2} \delta \left[ \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)^2 \right],$$

d'où l'on tire, en intégrant par rapport à  $\delta$ ,

$$v - \int \frac{\partial p}{\rho} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)^2 \right].$$

Il faudrait ajouter à cette intégrale une constante arbitraire, fonction de  $t$ ; mais cette constante peut être censée renfermée dans la fonction  $\varphi$ . Cette dernière fonction donne la vitesse des molécules fluides, parallèlement aux axes des  $x$ , des  $y$  et des  $z$ ; car on a

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \quad w = \frac{\partial \varphi}{\partial z}.$$

L'équation (K) relative à la continuité du fluide devient

$$0 = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \rho}{\partial y} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial \rho}{\partial z} \frac{\partial \varphi}{\partial z} + \rho \left( \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \right);$$

ainsi l'on a relativement aux fluides homogènes

$$0 = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}.$$

On peut observer que la fonction  $u \delta x + v \delta y + w \delta z$  est une variation exacte de  $x$ ,  $y$ ,  $z$  à tous les instants, si elle l'est à un seul instant. Supposons, en effet, qu'à un instant quelconque elle soit égale à  $\delta \varphi$ ; dans l'instant suivant, elle sera

$$\delta \varphi + dt \left( \frac{\partial u}{\partial t} \delta x + \frac{\partial v}{\partial t} \delta y + \frac{\partial w}{\partial t} \delta z \right);$$





elle sera donc encore, à ce nouvel instant, une variation exacte, si  $\frac{\partial u}{\partial t} \delta x + \frac{\partial v}{\partial t} \delta y + \frac{\partial w}{\partial t} \delta z$  est une variation exacte au premier instant; or l'équation (H) donne à cet instant

$$\frac{\partial u}{\partial t} \delta x + \frac{\partial v}{\partial t} \delta y + \frac{\partial w}{\partial t} \delta z = \delta V - \frac{\partial p}{\rho} - \frac{1}{2} \delta \left[ \left( \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)^2 \right];$$

le premier membre de cette équation est par conséquent une variation exacte en  $x, y, z$ ; ainsi la fonction  $u \delta x + v \delta y + w \delta z$  est une variation exacte dans l'instant suivant, si elle l'est dans un instant; elle est donc alors une variation exacte à tous les instants.

Lorsque les mouvements sont très-petits, on peut négliger les carrés et les produits de  $u, v$  et  $w$ ; l'équation (H) devient alors

$$\delta V - \frac{\partial p}{\rho} = \frac{\partial u}{\partial t} \delta x + \frac{\partial v}{\partial t} \delta y + \frac{\partial w}{\partial t} \delta z;$$

ainsi, dans ce cas,  $u \delta x + v \delta y + w \delta z$  est une variation exacte, si, comme nous le supposons,  $p$  est fonction de  $\varphi$ ; en nommant donc encore  $\delta \varphi$  cette différence, on aura

$$V - \int \frac{\partial p}{\rho} = \frac{\partial \varphi}{\partial t},$$

et, si le fluide est homogène, l'équation de continuité deviendra

$$0 = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}.$$

Ces deux équations renferment toute la théorie des ondulations très-petites des fluides homogènes.

34. Considérons une masse fluide homogène douée d'un mouvement uniforme de rotation autour de l'axe des  $x$ . Soit  $n$  la vitesse angulaire de rotation, à une distance de l'axe que nous prendrons pour unité de distance; on aura  $v = -nz$ ,  $w = ny$ ; l'équation (H) du numéro précédent deviendra ainsi

$$\frac{\partial p}{\rho} = \delta V + n^2(y \delta y + z \delta z),$$

équation possible, puisque ses deux membres sont des différences exactes. L'équation (K) du même numéro deviendra

$$0 = dt \frac{\partial \rho}{\partial t} + u dt \frac{\partial \rho}{\partial x} + v dt \frac{\partial \rho}{\partial y} + w dt \frac{\partial \rho}{\partial z},$$

et il est visible que cette équation est satisfaite, si la masse fluide est homogène. Les équations du mouvement des fluides sont donc alors satisfaites, et par conséquent ce mouvement est possible.

La force centrifuge à la distance  $\sqrt{y^2 + z^2}$  de l'axe de rotation est égale au carré  $n^2(y^2 + z^2)$  de la vitesse, divisé par cette distance; la fonction  $n^2(y \delta y + z \delta z)$  est donc le produit de la force centrifuge par l'élément de sa direction; ainsi, en comparant l'équation précédente du mouvement du fluide avec l'équation générale de l'équilibre des fluides, donnée dans le n° 17, on voit que les conditions du mouvement dont il s'agit se réduisent à celles de l'équilibre d'une masse fluide, sollicitée par les mêmes forces et par la force centrifuge due au mouvement de rotation, ce qui est visible d'ailleurs.

Si la surface extérieure de la masse fluide est libre, on aura  $\delta p = 0$  à cette surface, et par conséquent

$$0 = \delta V + n^2(y \delta y + z \delta z);$$

d'où il suit que la résultante de toutes les forces qui animent chaque molécule de la surface extérieure doit être perpendiculaire à cette surface; elle doit être, de plus, dirigée vers l'intérieur de la masse fluide. Ces conditions étant remplies, une masse fluide homogène sera en équilibre, en supposant même qu'elle recouvre un solide de figure quelconque.

Le cas que nous venons d'examiner est un de ceux dans lesquels la variation  $u \delta x + v \delta y + w \delta z$  n'est pas exacte; car alors cette variation devient  $-n(z \delta y - y \delta z)$ ; ainsi, dans la théorie du flux et du reflux de la mer, on ne peut pas supposer que la variation dont il s'agit est exacte, puisqu'elle ne l'est pas dans le cas très-simple où la mer n'au-



rait d'autre mouvement que celui de rotation qui lui est commun avec la Terre.

35. Déterminons, maintenant, les oscillations d'une masse fluide recouvrant un sphéroïde doué d'un mouvement de rotation  $nt$  autour de l'axe des  $x$ , et supposons-la très-peu dérangée de l'état d'équilibre, par l'action de forces très-petites. Soit, à l'origine du mouvement,  $r$  la distance d'une molécule fluide au centre de gravité du sphéroïde qu'elle recouvre, et que nous supposerons immobile; soit  $\theta$  l'angle que le rayon  $r$  forme avec l'axe des  $x$ , et  $\varpi$  l'angle que le plan qui passe par l'axe des  $x$  et par ce rayon forme avec le plan des  $x$  et des  $y$ . Supposons qu'après le temps  $t$  le rayon  $r$  se change dans  $r + \alpha s$ , que l'angle  $\theta$  se change dans  $\theta + \alpha u$ , et que l'angle  $\varpi$  se change dans  $nt + \varpi + \alpha v$ ,  $\alpha s$ ,  $\alpha u$  et  $\alpha v$  étant de très-petites quantités dont nous négligerons les carrés et les produits; on aura

$$\begin{aligned}x &= (r + \alpha s) \cos(\theta + \alpha u), \\y &= (r + \alpha s) \sin(\theta + \alpha u) \cos(nt + \varpi + \alpha v), \\z &= (r + \alpha s) \sin(\theta + \alpha u) \sin(nt + \varpi + \alpha v).\end{aligned}$$

Si l'on substitue ces valeurs dans l'équation (F) du n° 32, on aura, en négligeant le carré de  $\alpha$ ,

$$(L) \quad \left\{ \begin{aligned} & \alpha r^2 \delta \theta \left( \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial v}{\partial t} \right) \\ & + \alpha r^2 \delta \varpi \left( \sin^2 \theta \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{2n \sin^2 \theta}{r} \frac{\partial s}{\partial t} \right) \\ & + \alpha \delta r \left( \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} - 2nr \sin^2 \theta \frac{\partial v}{\partial t} \right) \\ & = \frac{n^2}{2} \delta [(r + \alpha s) \sin(\theta + \alpha u)]^2 + \delta V - \frac{\delta p}{\rho}. \end{aligned} \right.$$

À la surface extérieure du fluide, on a  $\delta p = 0$ ; on a de plus, dans l'état d'équilibre,

$$0 = \frac{n^2}{2} \delta [(r + \alpha s) \sin(\theta + \alpha u)]^2 + (\delta V),$$

( $\delta V$ ) étant la valeur de  $\delta V$  qui convient à cet état. Supposons que le fluide dont il s'agit soit la mer; la variation ( $\delta V$ ) sera le produit de la pesanteur multipliée par l'élément de sa direction. Nommons  $g$  la pesanteur, et  $xy$  l'élévation d'une molécule d'eau de sa surface, au-dessus de sa surface d'équilibre, surface que nous regarderons comme le véritable niveau de la mer. La variation ( $\delta V$ ) croîtra par cette élévation, dans l'état de mouvement, de la quantité  $- \alpha g \delta y$ , parce que la pesanteur est à fort peu près dirigée dans le sens des  $xy$  et vers leur origine. En désignant ensuite par  $\alpha \delta V'$  la partie de  $\delta V$  relative aux nouvelles forces qui, dans l'état de mouvement, sollicitent la molécule, et qui dépendent soit des changements qu'éprouvent par cet état les attractions du sphéroïde et du fluide, soit des attractions étrangères, on aura à la surface

$$\delta V = (\delta V) - \alpha g \delta y + \alpha \delta V'.$$

La variation  $\frac{n^2}{2} \delta [(r + \alpha s) \sin(\theta + \alpha u)]^2$  croît de la quantité  $\alpha n^2 \delta y \cdot r \sin^2 \theta$ , en vertu de la hauteur de la molécule d'eau au-dessus du niveau de la mer; mais cette quantité peut être négligée relativement au terme  $- \alpha g \delta y$ , parce que le rapport  $\frac{n^2 r}{g}$  de la force centrifuge à l'équateur, à la pesanteur, est une très-petite fraction égale à  $\frac{1}{289}$ . Enfin le rayon  $r$  est à fort peu près constant à la surface de la mer, parce qu'elle diffère très-peu d'une surface sphérique; on peut donc y supposer  $\delta r$  nulle. L'équation (L) devient ainsi, à la surface de la mer,

$$\begin{aligned} & r^2 \delta \theta \left( \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial v}{\partial t} \right) \\ & + r^2 \delta \varpi \left( \sin^2 \theta \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{2n \sin^2 \theta}{r} \frac{\partial s}{\partial t} \right) = -g \delta y + \delta V'. \end{aligned}$$

les variations  $\delta y$  et  $\delta V'$  étant relatives aux deux variables  $\theta$  et  $\varpi$ .

Considérons, présentement, l'équation relative à la continuité du fluide. Pour cela, concevons, à l'origine du mouvement, un parallélépipède rectangle dont la hauteur soit  $dr$ , dont la largeur soit  $r d\alpha \sin \theta$ , et dont la longueur soit  $r d\theta$ . Nommons  $r'$ ,  $\theta'$  et  $\varpi'$  ce que deviennent  $r$ ,



$\theta$  et  $\varpi$  après le temps  $t$ . En suivant le raisonnement du n° 32, on trouvera qu'après ce temps le volume de la molécule fluide est égal à un parallélépipède rectangle dont la hauteur est  $\frac{\partial r'}{\partial r} dr$ , dont la largeur est

$$r' \sin \theta' \left( \frac{\partial \varpi'}{\partial \varpi} d\varpi + \frac{\partial \varpi'}{\partial r} dr \right),$$

en éliminant  $dr$  au moyen de l'équation

$$0 = \frac{\partial r'}{\partial \varpi} d\varpi + \frac{\partial r'}{\partial r} dr;$$

enfin, dont la longueur est

$$r' \left( \frac{\partial \theta'}{\partial r} dr + \frac{\partial \theta'}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial \theta'}{\partial \varpi} d\varpi \right),$$

en éliminant  $dr$  et  $d\varpi$ , au moyen des équations

$$0 = \frac{\partial r'}{\partial r} dr + \frac{\partial r'}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial r'}{\partial \varpi} d\varpi,$$

$$0 = \frac{\partial \varpi'}{\partial r} dr + \frac{\partial \varpi'}{\partial \theta} d\theta + \frac{\partial \varpi'}{\partial \varpi} d\varpi.$$

En supposant donc

$$\begin{aligned} \varepsilon' = & \frac{\partial r'}{\partial r} \frac{\partial \theta'}{\partial \theta} \frac{\partial \varpi'}{\partial \varpi} - \frac{\partial r'}{\partial r} \frac{\partial \theta'}{\partial \varpi} \frac{\partial \varpi'}{\partial \theta} + \frac{\partial r'}{\partial \theta} \frac{\partial \theta'}{\partial \varpi} \frac{\partial \varpi'}{\partial r} \\ & - \frac{\partial r'}{\partial \theta} \frac{\partial \theta'}{\partial r} \frac{\partial \varpi'}{\partial \varpi} + \frac{\partial r'}{\partial \varpi} \frac{\partial \theta'}{\partial r} \frac{\partial \varpi'}{\partial \theta} - \frac{\partial r'}{\partial \varpi} \frac{\partial \theta'}{\partial \theta} \frac{\partial \varpi'}{\partial r}, \end{aligned}$$

le volume de la molécule après le temps  $t$  sera  $\varepsilon' r'^2 \sin \theta' dr d\theta d\varpi$ ; ainsi, en nommant  $(\rho)$  la densité primitive de cette molécule, et  $\rho$  sa densité correspondante à  $t$ , on aura, en égalant l'expression primitive de sa masse à son expression après le temps  $t$ ,

$$\rho \varepsilon' r'^2 \sin \theta' = (\rho) r^2 \sin \theta;$$

c'est l'équation de la continuité du fluide. Dans le cas présent,

$$r' = r + \alpha s, \quad \theta' = \theta + \alpha u, \quad \varpi' = \varpi + \alpha v;$$

on aura ainsi, en négligeant les quantités de l'ordre  $\alpha^2$ ,

$$\varepsilon' = 1 + \alpha \frac{\partial s}{\partial r} + \alpha \frac{\partial u}{\partial \theta} + \alpha \frac{\partial v}{\partial \varpi}.$$

Supposons qu'après le temps  $t$  la densité primitive  $(\rho)$  du fluide se change en  $(\rho) + \alpha \rho'$ ; l'équation précédente, relative à la continuité du fluide, donnera

$$0 = r^2 \left[ \rho' + (\rho) \left( \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial \varpi} + \frac{u \cos \theta}{\sin \theta} \right) \right] + (\rho) \frac{\partial \cdot r^2 s}{\partial r}.$$

36. Appliquons ces résultats aux oscillations de la mer. Sa masse étant homogène, on a  $\rho' = 0$ , et par conséquent

$$0 = \frac{\partial \cdot r^2 s}{\partial r} + r^2 \left( \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial \varpi} + \frac{u \cos \theta}{\sin \theta} \right).$$

Supposons, conformément à ce qui paraît avoir lieu dans la nature, la profondeur de la mer très-petite relativement au rayon  $r$  du sphéroïde terrestre; représentons-la par  $\gamma$ ,  $\gamma$  étant une fonction très-petite de  $\theta$  et de  $\varpi$ , qui dépend de la loi de cette profondeur. Si l'on intègre l'équation précédente, par rapport à  $r$ , depuis la surface du solide que la mer recouvre jusqu'à la surface de la mer, on voit que la valeur de  $s$  sera égale à une fonction de  $\theta$ ,  $\varpi$  et  $t$ , indépendante de  $r$ , plus à une très-petite fonction qui sera, par rapport à  $u$  et à  $v$ , du même ordre de petitesse que la fonction  $\frac{\gamma}{r}$ ; or, à la surface du solide que la mer recouvre, lorsque les angles  $\theta$  et  $\varpi$  se changent dans  $\theta + \alpha u$  et  $\varpi + \alpha v$ , il est aisé de voir que la distance d'une molécule d'eau, contiguë à cette surface, au centre de gravité de la Terre ne varie que d'une quantité très-petite par rapport à  $\alpha u$  et  $\alpha v$ , et du même ordre que les produits de ces quantités par l'excentricité du sphéroïde recouvert par la mer: la fonction indépendante de  $r$ , qui entre dans l'expression de  $s$ , est donc très-petite du même ordre; ainsi l'on peut négliger généralement  $s$  vis-à-vis de  $u$  et de  $v$ . L'équation du mouvement de la mer à sa surface,



donnée dans le n° 35, devient par là

$$(M) \quad \begin{cases} r^2 \frac{\partial \theta}{\partial t^2} \left( \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial v}{\partial t} \right) \\ + r^2 \frac{\partial \varpi}{\partial t} \left( \sin^2 \theta \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial u}{\partial t} \right) = -g \delta y + \delta V'. \end{cases}$$

L'équation (L) du même numéro, relative à un point quelconque de l'intérieur de la masse du fluide, donne, dans l'état d'équilibre,

$$0 = \frac{n^2}{2} \delta [(r + \alpha s) \sin(\theta + \alpha u)]^2 + (\delta V) - \frac{(\delta p)}{\rho},$$

( $\delta V$ ) et ( $\delta p$ ) étant les valeurs de  $\delta V$  et  $\delta p$  qui, dans l'état d'équilibre, conviennent aux quantités  $r + \delta s$ ,  $\theta + \alpha u$  et  $\varpi + \alpha v$ . Supposons que, dans l'état de mouvement, on ait

$$\delta V = (\delta V) + \alpha \delta V', \quad \delta p = (\delta p) + \alpha \delta p';$$

L'équation (L) donnera

$$\frac{\partial \left( V' - \frac{p'}{\rho} \right)}{\partial r} = \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} - 2nr \sin^2 \theta \frac{\partial v}{\partial t}.$$

L'équation (M) nous montre que  $n \frac{\partial v}{\partial t}$  est du même ordre que  $y$  ou  $s$ , et par conséquent de l'ordre  $\frac{\gamma M}{r}$ ; la valeur du premier membre de cette équation est donc du même ordre; ainsi, en multipliant cette valeur par  $dr$ , et en l'intégrant depuis la surface du sphéroïde que la mer recouvre jusqu'à la surface de la mer, on aura  $V' - \frac{p'}{\rho}$  égal à une fonction très-petite, de l'ordre  $\frac{\gamma s}{r}$ , plus à une fonction de  $\theta$ ,  $\varpi$  et  $t$ , indépendante de  $r$ , et que nous désignerons par  $\lambda$ ; en n'ayant donc égard, dans l'équation (L) du n° 35, qu'aux deux variables  $\theta$  et  $\varpi$ , elle se changera dans l'équation (M), avec la seule différence que le second membre se changera dans  $\delta \lambda$ . Mais,  $\lambda$  étant indépendant de la profondeur à laquelle se trouve la molécule d'eau que nous considérons, si l'on suppose cette

molécule très-voisine de la surface, l'équation (L) doit évidemment coïncider avec l'équation (M); on a donc  $\delta \lambda = \delta V' - g \delta y$ , et par conséquent

$$\delta \left( V' - \frac{p'}{\rho} \right) = \delta V' - g \delta y,$$

la valeur de  $\delta V'$  dans le second membre de cette équation étant relative à la surface de la mer. Nous verrons, dans la théorie du flux et du reflux de la mer, que cette valeur est à très-peu près la même pour toutes les molécules situées sur le même rayon terrestre, depuis la surface du solide que la mer recouvre jusqu'à la surface de la mer; on a donc, relativement à toutes ces molécules,

$$\frac{\delta p'}{\rho} = g \delta y,$$

ce qui donne  $p'$  égal à  $\rho g y$ , plus une fonction indépendante de  $\theta$ ,  $\varpi$  et  $r$ . Or, à la surface du niveau de la mer, la valeur de  $p'$  est égale à la pression de la petite colonne d'eau  $xy$  qui s'élève au-dessus de cette surface, et cette pression est égale à  $\alpha \rho g y$ ; on a donc, dans tout l'intérieur de la masse fluide, depuis la surface du sphéroïde que la mer recouvre jusqu'à la surface du niveau de la mer,  $p' = \rho g y$ ; ainsi un point quelconque de la surface du sphéroïde recouvert par la mer est plus pressé que dans l'état d'équilibre, de tout le poids de la petite colonne d'eau comprise entre la surface de la mer et la surface du niveau. Cet excès de pression devient négatif dans les points où la surface de la mer s'abaisse au-dessous de la surface du niveau.

Il suit de ce que nous venons de voir que, si l'on n'a égard qu'aux variations de  $\theta$  et de  $\varpi$ , l'équation (L) se change dans l'équation (M) pour toutes les molécules intérieures de la masse fluide. Les valeurs de  $u$  et de  $v$ , relatives à toutes les molécules de la mer situées sur le même rayon terrestre, sont donc déterminées par les mêmes équations différentielles; ainsi, en supposant, comme nous le ferons dans la théorie du flux et du reflux de la mer, qu'à l'origine du mouvement les valeurs de  $u$ ,  $\frac{\partial u}{\partial t}$ ,  $v$ ,  $\frac{\partial v}{\partial t}$  ont été les mêmes pour toutes les molécules si-





tuées sur le même rayon, ces molécules resteront encore sur le même rayon durant les oscillations du fluide. Les valeurs de  $r$ ,  $u$  et  $v$  peuvent donc être supposées les mêmes, à très-peu près, sur la petite partie du rayon terrestre comprise entre le solide que la mer recouvre et la surface de la mer; ainsi, en intégrant, par rapport à  $r$ , l'équation

$$0 = \frac{d \cdot r^2 s}{dr} + r^2 \left( \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial \varpi} + \frac{u \cos \theta}{\sin \theta} \right),$$

on aura

$$0 = r^2 s - (r^2 s) + r^2 \gamma \left( \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{\partial v}{\partial \varpi} + \frac{u \cos \theta}{\sin \theta} \right),$$

( $r^2 s$ ) étant la valeur de  $r^2 s$  à la surface du sphéroïde recouvert par la mer. La fonction  $r^2 s - (r^2 s)$  est égale à très-peu près à  $r^2 [s - (s)] + 2r\gamma(s)$ , ( $s$ ) étant ce que devient  $s$  à la surface du sphéroïde; on peut négliger le terme  $2r\gamma(s)$ , vu la petitesse de  $\gamma$  et de ( $s$ ); on aura ainsi

$$r^2 s - (r^2 s) = r^2 [s - (s)].$$

Maintenant, la profondeur de la mer, correspondante aux angles  $\theta + zu$  et  $nt + \varpi + zv$ , est  $\gamma + z[s - (s)]$ ; si l'on fixe l'origine des angles  $\theta$  et  $nt + \varpi$  à un point et à un méridien fixes sur la surface de la Terre, ce qui est permis, comme on le verra bientôt, cette même profondeur sera  $\gamma + zu \frac{\partial \gamma}{\partial \theta} + zv \frac{\partial \gamma}{\partial \varpi}$ , plus l'élévation  $zy$  de la molécule fluide de la surface de la mer au-dessus de sa surface de niveau; on aura donc

$$s - (s) = y + u \frac{\partial \gamma}{\partial \theta} + v \frac{\partial \gamma}{\partial \varpi}.$$

L'équation relative à la continuité du fluide deviendra, par conséquent,

$$(N) \quad y = - \frac{\partial \cdot \gamma u}{\partial \theta} - \frac{\partial \cdot \gamma v}{\partial \varpi} - \frac{\gamma u \cos \theta}{\sin \theta}.$$

On peut observer que, dans cette équation, les angles  $\theta$  et  $nt + \varpi$  sont comptés relativement à un point et à un méridien fixes sur la Terre, et que, dans l'équation (M), ces mêmes angles sont comptés relativement

à l'axe des  $x$  et à un plan qui, passant par cet axe, aurait autour de lui un mouvement de rotation égal à  $n$ ; or cet axe et ce plan ne sont pas fixes à la surface de la Terre, parce que l'attraction et la pression du fluide qui la recouvre doivent altérer un peu leur position sur cette surface, ainsi que le mouvement de rotation du sphéroïde. Mais il est aisé de voir que ces altérations sont aux valeurs de  $zu$  et de  $zv$  dans le rapport de la masse de la mer à celle du sphéroïde terrestre; ainsi, pour rapporter les angles  $\theta$  et  $nt + \varpi$  à un point et à un méridien invariables à la surface de ce sphéroïde dans les deux équations (M) et (N), il suffit d'altérer  $u$  et  $v$  de quantités de l'ordre  $\frac{\gamma u}{r}$  et  $\frac{\gamma v}{r}$ , quantités que nous nous sommes permis de négliger; on peut donc supposer, dans ces équations, que  $zu$  et  $zv$  sont les mouvements du fluide en latitude et en longitude.

On peut observer encore que, le centre de gravité du sphéroïde étant supposé immobile, il faut transporter en sens contraire aux molécules fluides les forces dont il est animé par la réaction de la mer; mais, le centre commun de gravité du sphéroïde et de la mer ne changeant point en vertu de cette réaction, il est clair que le rapport de ces forces à celles dont les molécules sont animées par l'action du sphéroïde est du même ordre que le rapport de la masse fluide à celle du sphéroïde, et par conséquent de l'ordre  $\frac{\gamma}{r}$ ; on peut donc les négliger dans le calcul de  $\delta V$ .

37. Considérons de la même manière les mouvements de l'atmosphère. Nous ferons, dans cette recherche, abstraction de la variation de la chaleur à différentes latitudes et à diverses hauteurs, ainsi que de toutes les causes irrégulières qui l'agitent, et nous n'aurons égard qu'aux causes régulières qui agissent sur elle, comme sur l'océan. Nous supposerons conséquemment la mer recouverte d'un fluide élastique d'une température uniforme; nous supposerons encore, conformément à l'expérience, la densité de ce fluide proportionnelle à sa pression. Cette supposition donne à l'atmosphère une hauteur infinie;





mais il est facile de s'assurer qu'à une très-petite hauteur sa densité est si petite, qu'on peut la regarder comme nulle.

Cela posé, nommons  $s'$ ,  $u'$  et  $v'$ , pour les molécules de l'atmosphère, ce que nous avons nommé  $s$ ,  $u$  et  $v$  pour les molécules de la mer; l'équation (L) du n° 35 donnera

$$\begin{aligned} & \alpha r^2 \partial \theta \left( \frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} - 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial v'}{\partial t} \right) \\ & + \alpha r^2 \partial \omega \left( \sin^2 \theta \frac{\partial^2 v'}{\partial t^2} + 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial u'}{\partial t} + \frac{2n \sin^2 \theta}{r} \frac{\partial s'}{\partial t} \right) \\ & + \alpha \partial r \left( \frac{\partial^2 s'}{\partial t^2} - 2nr \sin^2 \theta \frac{\partial v'}{\partial t} \right) \\ & = \frac{n^2}{2} \partial [(r + \alpha s') \sin(\theta + \alpha u')]^2 + \partial V - \frac{\partial p}{\rho}. \end{aligned}$$

Considérons d'abord l'atmosphère dans l'état d'équilibre, dans lequel  $s'$ ,  $u'$ ,  $v'$  sont nuls. L'équation précédente donne alors, en l'intégrant,

$$\frac{n^2}{2} r^2 \sin^2 \theta + V - \int \frac{\partial p}{\rho} = \text{const.}$$

La pression  $p$  étant supposée proportionnelle à la densité, nous ferons  $p = lg\rho$ ,  $g$  étant la pesanteur dans un lieu déterminé, que nous supposerons être l'équateur, et  $l$  étant une quantité constante qui exprime la hauteur de l'atmosphère, supposée partout de la même densité qu'à la surface de la mer: cette hauteur est très-petite par rapport au rayon du sphéroïde terrestre, dont elle n'est pas la 720<sup>e</sup> partie.

L'intégrale  $\int \frac{\partial p}{\rho}$  est égale à  $lg \log \rho$ ; l'équation précédente de l'équilibre de l'atmosphère devient, par conséquent,

$$lg \log \rho = \text{const.} + V + \frac{n^2}{2} r^2 \sin^2 \theta.$$

A la surface de la mer, la valeur de  $V$  est la même pour une molécule d'air que pour la molécule d'eau qui lui est contiguë, parce que les forces qui sollicitent l'une et l'autre molécule sont les mêmes; mais la

condition de l'équilibre des mers exige que l'on ait

$$V + \frac{n^2}{2} r^2 \sin^2 \theta = \text{const.};$$

on a donc, à cette surface,  $\rho$  constant, c'est-à-dire que la densité de la couche d'air contiguë à la mer est partout la même, dans l'état d'équilibre.

Si l'on nomme  $R$  la partie du rayon  $r$  comprise entre le centre du sphéroïde et la surface de la mer, et  $r'$  la partie comprise entre cette surface et une molécule d'air élevée au-dessus,  $r'$  sera, aux quantités

près de l'ordre  $\left(\frac{n^2 r'}{g}\right)^2$ , la hauteur de cette molécule au-dessus de la surface de la mer: nous négligerons les quantités de cet ordre. L'équation entre  $\rho$  et  $r$  donnera

$$lg \log \rho = \text{const.} + V + r' \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{r'^2}{2} \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{n^2}{2} R^2 \sin^2 \theta + n^2 R r' \sin^2 \theta,$$

les valeurs de  $V$ ,  $\frac{\partial V}{\partial r}$  et  $\frac{\partial^2 V}{\partial r^2}$  étant relatives à la surface de la mer, où l'on a

$$\text{const.} = V + \frac{n^2}{2} R^2 \sin^2 \theta.$$

La quantité  $-\frac{\partial V}{\partial r} - n^2 R \sin^2 \theta$  est la pesanteur à cette même surface: nous la désignerons par  $g'$ . La fonction  $\frac{\partial^2 V}{\partial r^2}$  étant multipliée par la quantité très-petite  $r'^2$ , nous pouvons la déterminer dans la supposition de la Terre sphérique, et négliger la densité de l'atmosphère relativement à celle de la Terre; nous aurons ainsi, à fort peu près,

$$-\frac{\partial V}{\partial r} = g' = \frac{m}{R^2},$$

$m$  étant la masse de la Terre; partant

$$\frac{\partial^2 V}{\partial r^2} = \frac{2m}{R^3} = \frac{2g'}{R};$$



on aura donc

$$\lg \log \rho = \text{const.} - r'g' + \frac{r'^2}{R} g',$$

d'où l'on tire

$$\rho = \Pi c^{-\frac{r'g'}{h}} \left(1 - \frac{r'}{R}\right),$$

$c$  étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, et  $\Pi$  étant une constante, visiblement égale à la densité de l'air à la surface de la mer. Nommons  $h$  et  $h'$  les longueurs du pendule à seconde à la surface de la mer, sous l'équateur, et à la latitude de la molécule aérienne que nous considérons; on aura  $\frac{g'}{g} = \frac{h'}{h}$ , et par conséquent

$$\rho = \Pi c^{-\frac{r'g'}{h}} \left(1 - \frac{r'}{R}\right).$$

Cette expression de la densité de l'air fait voir que les couches de même densité sont partout également élevées au-dessus de la mer, à la quantité près  $\frac{r'(h'-h)}{h}$ ; mais, dans le calcul exact des hauteurs des montagnes par les observations du baromètre, cette quantité ne doit point être négligée.

Considérons présentement l'atmosphère dans l'état de mouvement, et déterminons les oscillations d'une couche de niveau, ou de même densité dans l'état d'équilibre. Soit  $\alpha\varphi$  l'élévation d'une molécule d'air au-dessus de la surface de niveau à laquelle elle appartient dans l'état d'équilibre; il est clair qu'en vertu de cette élévation la valeur de  $\delta V$  sera augmentée de la variation différentielle  $-\alpha g \delta\varphi$ ; on aura ainsi

$$\delta V = (\delta V) - \alpha g \delta\varphi + \alpha \delta V',$$

$(\delta V)$  étant la valeur de  $\delta V$  qui, dans l'état d'équilibre, correspond à la couche de niveau et aux angles  $\theta + \alpha u$  et  $nt + \varpi + \alpha v$ ; et  $\delta V'$  étant la partie de  $\delta V$  due aux nouvelles forces qui, dans l'état de mouvement, agitent l'atmosphère.

Soit  $\varphi = (\rho) + \alpha\varphi'$ ,  $(\rho)$  étant la densité de la couche de niveau dans l'état d'équilibre. Si l'on fait  $\frac{r'}{(\rho)} = y'$ , on aura

$$\frac{\delta\rho}{\rho} = \frac{I g \delta(\rho)}{(\rho)} + \alpha g \delta y';$$

or on a, dans l'état d'équilibre,

$$0 = \frac{n^2}{2} \delta[(r + \alpha s) \sin(\theta + \alpha u)]^2 + (\delta V) - \frac{I g \delta(\rho)}{(\rho)};$$

l'équation générale du mouvement de l'atmosphère deviendra donc, relativement aux couches de niveau, par rapport auxquelles  $\delta r$  est nul à très-peu près,

$$r^2 \delta\theta \left( \frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} - 2n \sin\theta \cos\theta \frac{\partial v'}{\partial t} \right) + r^2 \delta\varpi \left( \sin^2\theta \frac{\partial^2 v'}{\partial t^2} + 2n \sin\theta \cos\theta \frac{\partial u'}{\partial t} + \frac{2n \sin^2\theta}{r} \frac{\partial s'}{\partial t} \right) \\ = \delta V' - g \delta\varphi - g \delta y' + n^2 r \sin^2\theta \delta[s' - (s')],$$

$\alpha(s')$  étant la variation de  $r$  correspondante, dans l'état d'équilibre, aux variations  $\alpha u'$  et  $\alpha v'$  des angles  $\theta$  et  $\varpi$ .

Supposons que toutes les molécules d'air situées à l'origine sur le même rayon terrestre restent constamment sur un même rayon dans l'état de mouvement, ce qui a lieu, par ce qui précède, dans les oscillations de la mer, et voyons si cette supposition peut satisfaire aux équations du mouvement et de la continuité du fluide atmosphérique. Pour cela, il est nécessaire que les valeurs de  $u'$  et de  $v'$  soient les mêmes pour toutes ces molécules; or la valeur de  $\delta V'$  est à très-peu près la même pour ces molécules, comme on le verra lorsque nous déterminerons, dans la suite, les forces d'où résulte cette variation; il est donc nécessaire que les variations  $\delta\varphi$  et  $\delta y'$  soient les mêmes pour ces molécules, et, de plus, que les quantités  $2nr \delta\varpi \sin^2\theta \frac{\partial s'}{\partial t}$  et



$n^2 r \sin^2 \theta \delta [s - (s')] ]$  puissent être négligées dans l'équation précédente.

A la surface de la mer, on a  $\varphi = y$ ,  $zy$  étant l'élevation de la surface de la mer au-dessus de sa surface de niveau. Examinons si les suppositions de  $\varphi$  égal à  $y$ , et de  $y$  constant pour toutes les molécules d'air situées sur le même rayon, peuvent subsister avec l'équation de la continuité de fluide. Cette équation, par le n° 35, est

$$0 = r^2 \left[ \rho' + (\rho) \left( \frac{\partial u'}{\partial \theta} + \frac{\partial v'}{\partial \omega} + \frac{u' \cos \theta}{\sin \theta} \right) \right] + (\rho) \frac{\partial \cdot r^2 s'}{\partial r},$$

d'où l'on tire

$$y' = -l \left( \frac{\partial \cdot r^2 s'}{r^2 \partial r} + \frac{\partial u'}{\partial \theta} + \frac{\partial v'}{\partial \omega} + \frac{u' \cos \theta}{\sin \theta} \right).$$

$r + zs'$  est égal à la valeur de  $r$  de la surface de niveau, qui correspond aux angles  $\theta + zu$  et  $\omega + zv$ , plus à l'élevation de la molécule d'air au-dessus de cette surface: la partie de  $zs'$  qui dépend de la variation des angles  $\theta$  et  $\omega$  étant de l'ordre  $\frac{\alpha n^2 u}{g}$ , on peut la négliger dans l'expression précédente de  $y'$ , et, par conséquent, supposer dans cette expression  $s' = \varphi$ ; si l'on fait ensuite  $\varphi = y$ , on aura  $\frac{\partial \varphi}{\partial r} = 0$ , puisque la valeur de  $\varphi$  est alors la même relativement à toutes les molécules situées sur le même rayon. De plus,  $y$  est, par ce que nous venons de dire, de l'ordre  $l$  ou  $\frac{n^2}{g}$ ; l'expression de  $y'$  deviendra ainsi

$$y' = -l \left( \frac{\partial u'}{\partial \theta} + \frac{\partial v'}{\partial \omega} + \frac{u' \cos \theta}{\sin \theta} \right);$$

ainsi,  $u'$  et  $v'$  étant les mêmes pour toutes les molécules situées primitivement sur le même rayon, la valeur de  $y'$  sera la même pour toutes ces molécules. De plus, il est visible, par ce que nous venons de dire, que les quantités  $2nr\delta\omega \sin^2 \theta \frac{\partial \kappa}{\partial t}$  et  $n^2 r \sin^2 \theta \delta [s - (s')] ]$  peuvent être

négligées dans l'équation précédente du mouvement de l'atmosphère, qui peut alors être satisfaite en supposant que  $u'$  et  $v'$  sont les mêmes pour toutes les molécules de l'air situées primitivement sur le même rayon; la supposition que toutes ces molécules restent constamment sur un même rayon, durant les oscillations du fluide, peut donc subsister avec les équations du mouvement et de la continuité du fluide atmosphérique. Dans ce cas, les oscillations des diverses couches de niveau sont les mêmes, et se déterminent au moyen des équations

$$r^2 \delta \theta \left( \frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} - 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial v'}{\partial t} \right) + r^2 \delta \omega \left( \sin^2 \theta \frac{\partial^2 v'}{\partial t^2} + 2n \sin \theta \cos \theta \frac{\partial u'}{\partial t} \right) = \partial V' - g \partial y' - g \partial y,$$

$$y' = -l \left( \frac{\partial u'}{\partial \theta} + \frac{\partial v'}{\partial \omega} + \frac{u' \cos \theta}{\sin \theta} \right).$$

Ces oscillations de l'atmosphère doivent produire des oscillations analogues dans les hauteurs du baromètre. Pour déterminer celles-ci au moyen des premières, considérons un baromètre fixe à une hauteur quelconque au-dessus de la surface de la mer. La hauteur du mercure est proportionnelle à la pression qu'éprouve sa surface exposée à l'action de l'air; elle peut donc être représentée par  $l g \rho$ ; mais cette surface est successivement exposée à l'action de diverses couches de niveau, qui s'élèvent et s'abaissent comme la surface de la mer; ainsi la valeur de  $\rho$  à la surface du mercure varie: 1° parce qu'elle appartient à une couche de niveau qui, dans l'état d'équilibre, était moins élevée de la quantité  $\alpha y$ ; 2° parce que la densité d'une couche augmente, dans l'état de mouvement, de  $\alpha \rho'$  ou de  $\frac{\alpha(\rho)y'}{l}$ . En vertu de la première cause,

la variation de  $\rho$  est  $-\alpha y \frac{\partial \rho}{\partial r}$  ou  $\frac{\alpha(\rho)y'}{l}$ ; la variation totale de la densité  $\rho$ , à la surface du mercure, est donc  $\alpha(\rho) \frac{y' + y''}{l}$ . Il suit de là que, si l'on nomme  $k$  la hauteur du mercure dans le baromètre, relative à l'état d'équilibre, ses oscillations, dans l'état de mouvement, seront exprimées par la fonction  $\frac{\alpha k (y' + y'')}{l}$ ; elles sont donc semblables à



toutes les hauteurs au-dessus de la mer, et proportionnelles aux hauteurs du baromètre.

Il ne s'agit plus maintenant, pour déterminer les oscillations de la mer et de l'atmosphère, que de connaître les forces qui agitent ces deux masses fluides, et d'intégrer les équations différentielles précédentes; c'est ce que nous ferons dans la suite de cet Ouvrage.

---

## LIVRE II.

DE LA LOI DE LA PESANTEUR UNIVERSELLE ET DU MOUVEMENT  
DES CENTRES DE GRAVITÉ DES CORPS CÉLESTES.

---

### CHAPITRE PREMIER.

DE LA LOI DE LA PESANTEUR UNIVERSELLE, TIRÉE DES PHÉNOMÈNES.

1. Après avoir développé les lois du mouvement, nous allons, en partant de ces lois et de celles des mouvements célestes, présentées avec détail dans l'Ouvrage intitulé : *Exposition du Système du Monde*, nous élever à la loi générale de ces mouvements. Celui de tous les phénomènes qui semble le plus propre à la faire découvrir est le mouvement elliptique des planètes et des comètes autour du Soleil; voyons ce qu'il donne sur cet objet. Pour cela, nommons  $x$  et  $y$  les coordonnées rectangulaires d'une planète, dans le plan de son orbite, et fixons leur origine au centre du Soleil; nommons, de plus,  $P$  et  $Q$  les forces dont cette planète est animée, dans son mouvement relatif autour du Soleil, parallèlement aux axes des  $x$  et des  $y$ , et supposons que ces forces tendent vers l'origine des coordonnées; enfin, soit  $dt$  l'élément du temps, que nous regarderons comme constant; on aura, par le Chapitre II du premier Livre,

$$(1) \quad 0 = \frac{d^2 x}{dt^2} + P,$$

$$(2) \quad 0 = \frac{d^2 y}{dt^2} + Q.$$

Si l'on ajoute la première de ces équations, multipliée par  $-y$ , à la seconde, multipliée par  $x$ , on aura

$$0 = \frac{d(xy - ydx)}{dt^2} + xQ - yP.$$

Il est aisé de voir que  $xy - ydx$  est le double de l'aire que le rayon vecteur de la planète décrit autour du Soleil dans l'instant  $dt$ ; cette aire est proportionnelle à l'élément du temps, suivant la première loi de Kepler, en sorte que l'on a

$$xy - ydx = cdt,$$

$c$  étant une constante; la différentielle du premier membre de cette équation est donc nulle, ce qui donne

$$xQ - yP = 0.$$

Il suit de là que les forces  $P$  et  $Q$  sont entre elles dans le rapport de  $x$  à  $y$ , et qu'ainsi leur résultante passe par l'origine des coordonnées, c'est-à-dire par le centre du Soleil. D'ailleurs, la courbe décrite par la planète étant concave vers le Soleil, il est visible que la force qui la fait décrire tend vers cet astre.

La loi des aires proportionnelles aux temps employés à les décrire nous conduit donc à ce premier résultat remarquable, savoir, que la force qui sollicite les planètes et les comètes est dirigée vers le centre du Soleil.

2. Déterminons maintenant la loi suivant laquelle cette force agit à différentes distances de cet astre. Il est clair que, les planètes et les comètes s'approchant et s'éloignant alternativement du Soleil à chaque révolution, la nature du mouvement elliptique doit nous conduire à cette loi. Reprenons, dans cette vue, les équations différentielles (1) et (2) du numéro précédent. Si l'on ajoute la première, multipliée par  $dx$ , à la seconde, multipliée par  $dy$ , on aura

$$0 = \frac{dx^2 + dy^2}{dt^2} + Pdx - Qdy,$$

et, en intégrant,

$$0 = \frac{dx^2 + dy^2}{dt^2} + 2f(Pdx + Qdy),$$

la constante arbitraire étant indiquée par le signe intégral. En substituant, au lieu de  $dt$ , sa valeur  $\frac{xy - ydx}{c}$ , donnée par la loi de la proportionnalité des aires aux temps, on aura

$$0 = \frac{c^2(dx^2 + dy^2)}{(xy - ydx)^2} + 2f(Pdx + Qdy).$$

Transformons, pour plus de simplicité, les coordonnées  $x$  et  $y$  en rayon vecteur et en angle traversé, conformément aux usages astronomiques. Soit  $r$  le rayon mené du centre du Soleil à celui de la planète, ou son rayon vecteur; soit  $v$  l'angle qu'il forme avec l'axe des  $x$ ; on aura

$$x = r \cos v, \quad y = r \sin v, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

d'où l'on tire

$$dx^2 + dy^2 = r^2 dv^2 + dr^2, \quad xdy - ydx = r^2 dv.$$

Si l'on désigne ensuite par  $\varphi$  la force principale qui anime la planète, on aura, par le numéro précédent,

$$P = \varphi \cos v, \quad Q = \varphi \sin v, \quad \varphi = \sqrt{P^2 + Q^2},$$

ce qui donne

$$Pdx + Qdy = \varphi dr;$$

on aura donc

$$0 = \frac{c^2(r^2 dv^2 + dr^2)}{r^4 dv^2} + 2f\varphi dr,$$

d'où l'on tire

$$(3) \quad dv = \frac{c dr}{r\sqrt{-c^2 - 2r^2 f\varphi dr}}.$$

Cette équation donnera, au moyen des quadratures, la valeur de  $v$  en  $r$ , lorsque la force  $\varphi$  sera connue en fonction de  $r$ ; mais si, cette force



étant inconnue, la nature de la courbe qu'elle fait décrire est donnée, alors, en différenciant l'expression précédente de  $2f\varphi dr$ , on aura, pour déterminer  $\varphi$ , l'équation

$$(4) \quad \varphi = \frac{c^2}{r^2} - \frac{c^2}{2} \frac{dr^2}{r^4 dv^2}.$$

Les orbites des planètes sont des ellipses dont le centre du Soleil occupe un des foyers; or si, dans l'ellipse, on nomme  $\omega$  l'angle que le grand axe fait avec l'axe des  $x$ ; si, de plus, on fixe au foyer l'origine des  $x$ , et que l'on désigne par  $a$  le demi-grand axe et par  $e$  le rapport de l'excentricité au demi-grand axe, on aura

$$r = \frac{a(1-e^2)}{1+e \cos(\omega-\omega)},$$

équation qui devient celle d'une parabole, lorsque  $e = 1$  et que  $a$  est infini, et qui appartient à l'hyperbole, lorsque  $e$  surpasse l'unité et que  $a$  est négatif. Cette équation donne

$$\frac{dr^2}{r^4 dv^2} = \frac{2}{ar(1-e^2)} - \frac{1}{r^2} - \frac{1}{a^2(1-e^2)^2},$$

et par conséquent

$$\varphi = \frac{c^2}{a(1-e^2)} \frac{1}{r^2};$$

ainsi, les orbites des planètes et des comètes étant des sections coniques, la force  $\varphi$  est réciproque au carré de la distance du centre de ces astres à celui du Soleil.

On voit, de plus, que, si la force  $\varphi$  est réciproque au carré de la distance ou exprimée par  $\frac{h}{r^2}$ ,  $h$  étant un coefficient constant, l'équation précédente des sections coniques satisfera à l'équation différentielle (4) entre  $r$  et  $v$ , que donne l'expression de  $\varphi$ , lorsqu'on y change  $\varphi$  dans  $\frac{h}{r^2}$ . On a alors  $h = \frac{c^2}{a(1-e^2)}$ , ce qui forme une équation de condition entre les deux arbitraires  $a$  et  $e$  de l'équation aux sections coniques; les trois

arbitraires  $a$ ,  $e$  et  $\omega$  de cette équation se réduisent donc à deux seules arbitraires distinctes, et, comme l'équation différentielle entre  $r$  et  $v$  n'est que du second ordre, l'équation finie aux sections coniques en est l'intégrale complète.

Il suit de là que, si la courbe décrite est une section conique, la force est en raison inverse du carré des distances; et réciproquement que, si la force suit la raison inverse du carré des distances, la courbe décrite est une section conique.

3. L'intensité de la force  $\varphi$ , relativement à chaque planète et à chaque comète, dépend du coefficient  $\frac{c^2}{a(1-e^2)}$ ; les lois de Kepler donnent encore le moyen de le déterminer. En effet, si l'on nomme  $T$  le temps de la révolution d'une planète, l'aire que son rayon vecteur décrit pendant ce temps étant la surface même de l'ellipse planétaire, elle sera  $\pi a^2 \sqrt{1-e^2}$ ,  $\pi$  étant le rapport de la demi-circonférence au rayon; mais l'aire décrite pendant l'instant  $dt$  est, par ce qui précède,  $\frac{1}{2}c dt$ ; la loi de la proportionnalité des aires aux temps donnera donc la proportion

$$\frac{1}{2}c dt : \pi a^2 \sqrt{1-e^2} :: dt : T,$$

d'où l'on tire

$$c = \frac{2\pi a^2 \sqrt{1-e^2}}{T}.$$

Relativement aux planètes, la loi de Kepler, suivant laquelle les carrés des temps de leurs révolutions sont comme les cubes des grands axes de leurs ellipses, donne  $T^2 = k^2 a^3$ ,  $k$  étant le même pour toutes les planètes; on a donc

$$c = \frac{2\pi \sqrt{a(1-e^2)}}{k}.$$

$2a(1-e^2)$  est le paramètre de l'orbite, et dans diverses orbites les valeurs de  $c$  sont comme les aires tracées par les rayons vecteurs en temps égal; ces aires sont donc comme les racines carrées des paramètres des orbites.



Cette proportion a également lieu relativement aux orbites des comètes, comparées soit entre elles, soit aux orbites des planètes; c'est un des points fondamentaux de leur théorie, qui satisfait si exactement à tous leurs mouvements observés. Les grands axes de leurs orbites et les temps de leurs révolutions étant inconnus, on calcule le mouvement de ces astres dans un orbe parabolique, et, en exprimant par  $D$  leur distance périhélie, on suppose  $c = \frac{2\pi\sqrt{2D}}{k}$ , ce qui revient à faire  $e$  égal à l'unité et  $a$  infini, dans l'expression précédente de  $c$ ; on a donc encore, relativement aux comètes,  $T^2 = k^2 a^3$ , en sorte que l'on peut déterminer les grands axes de leurs orbites, lorsque leurs révolutions sont connues.

Maintenant, l'expression de  $c$  donne

$$\frac{c^2}{a(1-e^2)} = \frac{4\pi^2}{k^2};$$

on a donc

$$\varphi = \frac{4\pi^2}{k^2} \cdot \frac{1}{r^2}.$$

Le coefficient  $\frac{4\pi^2}{k^2}$  étant le même pour toutes les planètes et les comètes, il en résulte que, pour chacun de ces corps, la force  $\varphi$  est réciproque au carré des distances au centre du Soleil, et qu'elle ne varie d'un corps à l'autre qu'à raison de ces distances; d'où il suit qu'elle est la même pour tous ces corps supposés à égale distance du Soleil.

Nous voilà donc conduits par les belles lois de Kepler à regarder le centre du Soleil comme le foyer d'une force attractive qui s'étend à l'infini dans tous les sens, en décroissant en raison du carré des distances. La loi de la proportionnalité des aires décrites par les rayons vecteurs aux temps employés à les décrire nous montre que la force principale qui sollicite les planètes et les comètes est constamment dirigée vers le centre du Soleil; l'ellipticité des orbes planétaires et les mouvements à très-peu près paraboliques des comètes prouvent que, pour chaque planète et pour chaque comète, cette force est réciproque au carré de la distance de ces astres au Soleil; enfin, de la loi de la

proportionnalité des carrés des temps des révolutions aux cubes des grands axes des orbites, ou de celle de la proportionnalité des aires décrites en temps égal par les rayons vecteurs, dans différentes orbites, aux racines carrées des paramètres de ces orbites, loi qui renferme la précédente et qui s'étend aux comètes, il résulte que cette force est la même pour toutes les planètes et les comètes placées à égales distances du Soleil, en sorte que, dans ce cas, ces corps se précipiteraient vers lui avec la même vitesse.

4. Si des planètes nous passons aux satellites, nous trouvons que, les lois de Kepler étant à peu près observées dans leurs mouvements autour de leurs planètes, ils doivent graviter vers les centres de ces planètes, en raison inverse du carré de leurs distances à ces centres; ils doivent pareillement graviter à peu près comme leurs planètes vers le Soleil, afin que leur mouvement relatif autour des planètes soit le même à peu près que si ces planètes étaient immobiles. Les satellites sont donc sollicités, vers les planètes et vers le Soleil, par des forces réciproques au carré des distances. L'ellipticité des orbites des trois premiers satellites de Jupiter est peu considérable; mais l'ellipticité du quatrième est très-sensible. Le grand éloignement de Saturne a jusqu'ici empêché de reconnaître l'ellipticité des orbes de ses satellites, à l'exception du sixième, dont l'orbe paraît sensiblement elliptique. Mais la loi de la gravitation des satellites de Jupiter, de Saturne et d'Uranus se fait principalement sentir dans le rapport de leurs moyens mouvements à leurs moyennes distances au centre de ces planètes. Ce rapport consiste en ce que, pour chaque système de satellites, les carrés des temps de leurs révolutions sont comme les cubes de leurs moyennes distances au centre de la planète. Concevons donc qu'un satellite décrive une orbite circulaire d'un rayon égal à sa moyenne distance au centre de la planète principale; soit  $a$  cette distance,  $T$  le nombre de secondes que renferme la durée de sa révolution sidérale;  $\pi$  exprimant le rapport de la demi-circconférence au rayon,  $\frac{2a\pi}{T}$  sera le petit arc que décrit le satellite pendant une seconde. S'il cessait d'être retenu dans son orbite par la force attractive





de la planète, il s'éloignerait de son centre par la tangente, d'une quantité égale au sinus verse de l'arc  $\frac{2a\pi}{T}$ , c'est-à-dire de la quantité  $\frac{2a\pi^2}{T^2}$ ; cette force attractive le fait donc descendre de cette quantité vers la planète. Relativement à un autre satellite dont  $a'$  est la moyenne distance au centre de la planète et  $T'$  la durée de sa révolution, réduite en secondes, la chute dans une seconde serait  $\frac{2a'\pi^2}{T'^2}$ ; or, si l'on nomme  $\varphi$  et  $\varphi'$  les forces attractives de la planète aux distances  $a$  et  $a'$ , il est clair qu'elles sont comme les quantités dont elles font descendre les deux satellites pendant une seconde; on a donc

$$\varphi : \varphi' :: \frac{2a\pi^2}{T^2} : \frac{2a'\pi^2}{T'^2}.$$

La loi des carrés des temps des révolutions, proportionnels aux cubes des moyennes distances des satellites au centre de leur planète, donne

$$T^2 : T'^2 :: a^3 : a'^3;$$

de ces deux proportions il est facile de conclure

$$\varphi : \varphi' :: \frac{1}{a^2} : \frac{1}{a'^2};$$

ainsi, les forces  $\varphi$  et  $\varphi'$  sont réciproques aux carrés des distances  $a$  et  $a'$ .

5. La Terre n'ayant qu'un satellite, l'ellipticité de l'orbe lunaire est le seul phénomène céleste qui puisse nous faire connaître la loi de sa force attractive; mais le mouvement elliptique de la Lune est très-sensiblement troublé par les forces perturbatrices, et cela peut laisser quelques doutes sur la loi de la diminution de la force attractive de la Terre, en raison du carré des distances à son centre. A la vérité, l'analogie qui existe entre cette force et les forces attractives du Soleil, de Jupiter, de Saturne et d'Uranus nous porte à croire qu'elle suit la même loi de diminution; mais les expériences terrestres sur la pesanteur offrent un moyen direct de constater cette loi.

Pour cela, nous allons déterminer la parallaxe lunaire, d'après les

expériences sur la longueur du pendule à secondes, et la comparer aux observations célestes. Sur le parallèle dont le carré du sinus de la latitude est  $\frac{1}{4}$ , l'espace que la pesanteur fait décrire dans une seconde est, d'après les observations de la longueur du pendule, égal à  $3^m,65548$ , comme on le verra dans le troisième Livre: nous choisissons ce parallèle, parce que l'attraction de la Terre sur les points correspondants de sa surface est à très-peu près, comme à la distance de la Lune, égale à la masse de la Terre, divisée par le carré de sa distance à son centre de gravité. Sur ce parallèle, la pesanteur est plus petite que l'attraction de la Terre, des deux tiers de la force centrifuge due au mouvement de rotation à l'équateur; cette force est  $\frac{1}{288}$  de la pesanteur; il faut donc augmenter l'espace précédent de sa  $432^e$  partie, pour avoir l'espace entier dû à l'action de la Terre, qui, sur ce parallèle, est égale à sa masse divisée par le carré du rayon terrestre: on aura ainsi  $3^m,66394$  pour cet espace. A la distance de la Lune, il doit être diminué dans le rapport du carré du rayon du sphéroïde terrestre au carré de la distance de cet astre, et il est visible qu'il suffit pour cela de le multiplier par le carré du sinus de la parallaxe lunaire; en désignant donc par  $x$  ce sinus sous le parallèle que nous considérons, on aura  $x^2 \cdot 3^m,66394$  pour la hauteur dont la Lune doit tomber dans une seconde, par l'attraction de la Terre. Mais nous verrons, dans la théorie de la Lune, que l'action du Soleil diminue sa pesanteur vers la Terre, d'une quantité dont la partie constante est  $\frac{1}{288}$  de cette pesanteur; de plus, la Lune, dans son mouvement relatif autour de la Terre, est sollicitée par une force égale à la somme des masses de la Terre et de la Lune, divisée par le carré de leur distance mutuelle; il faut donc diminuer l'espace précédent de  $\frac{1}{288}$ , et l'augmenter dans le rapport de la somme des masses de la Terre et de la Lune à la masse de la Terre; or on verra, dans le quatrième Livre, que les phénomènes du flux et du reflux de la mer donnent la masse de la Lune égale à  $\frac{1}{58,7}$  de celle de la Terre; on a donc  $\frac{357}{358} \cdot \frac{59,7}{58,7} \cdot x^2 \cdot 3^m,66394$ , pour l'espace dont la Lune descend vers la Terre, dans l'intervalle d'une seconde.





Maintenant, si l'on nomme  $a$  le rayon moyen de l'orbe lunaire, et  $T$  la durée de la révolution sidérale de la Lune, exprimée en secondes,  $\frac{2a\pi^2}{T^2}$  sera, comme on l'a vu, le sinus verse de l'arc qu'elle décrit pendant une seconde, et il exprime la quantité dont la Lune descend vers la Terre, dans cet intervalle. La valeur de  $a$  est égale au rayon terrestre sous le parallèle que nous considérons, divisé par le sinus de  $x$ ; ce rayon est égal à 6369514 mètres; on a donc

$$a = \frac{6369514^m}{x}$$

Mais, pour avoir une valeur de  $a$  indépendante des inégalités du mouvement de la Lune, il faut prendre, pour sa parallaxe moyenne dont le sinus est  $x$ , la partie de cette parallaxe qui est indépendante de ces inégalités, et que l'on nomme pour cela *constante de la parallaxe*. Ainsi, en prenant pour  $\pi$  le rapport de 355 à 113, et en observant que  $T = 2732166^s$ , l'espace moyen dont la Lune descend vers la Terre sera

$$\frac{2 \cdot (355)^2 \cdot 6369514^m}{(113)^2 \cdot x \cdot (2732166)^2}$$

En égalant les deux expressions que nous venons de trouver pour cet espace, on aura

$$x^2 = \frac{2 \cdot (355)^2 \cdot 358 \cdot 58 \cdot 7 \cdot 6369514}{(113)^2 \cdot 357 \cdot (59 \cdot 7) \cdot (366394) \cdot (2732166)^2}$$

d'où l'on tire 10536", 2 pour la constante de la parallaxe lunaire sous le parallèle dont il s'agit. Cette valeur est très-peu différente de la constante 10540, 7, que Triesnecker a conclue par la comparaison d'un grand nombre d'observations d'éclipses et d'occultations d'étoiles par la Lune; il est donc certain que la force principale qui retient la Lune dans son orbite est la gravité terrestre, affaiblie en raison du carré de la distance; ainsi, la loi de diminution de la pesanteur, qui, pour les planètes accompagnées de plusieurs satellites, est prouvée par la comparaison des temps de leurs révolutions et de leurs distances, est dé-

montrée, pour la Lune, par la comparaison de son mouvement avec celui des projectiles à la surface de la Terre. Il en résulte que c'est au centre de gravité des corps célestes que l'on doit fixer l'origine des distances, dans le calcul de leurs forces attractives sur les corps placés à leur surface ou au delà, puisque cela est prouvé pour la Terre, dont la force attractive est, comme on vient de le voir, de la même nature que celle de tous les corps célestes.

6. Le Soleil et les planètes qui ont des satellites sont, par conséquent, doués d'une force attractive qui, en décroissant à l'infini, réciproquement au carré des distances, embrasse dans sa sphère d'activité tous les corps. L'analogie nous porte à penser qu'une pareille force réside généralement dans toutes les planètes et dans les comètes; mais on peut s'en assurer directement de cette manière. C'est une loi constante de la nature, qu'un corps ne peut agir sur un autre sans en éprouver une réaction égale et contraire; ainsi, les planètes et les comètes étant attirées vers le Soleil, elles doivent attirer cet astre suivant la même loi. Les satellites attirent, par la même raison, leurs planètes; cette propriété attractive est donc commune aux planètes, aux comètes et aux satellites, et par conséquent on peut regarder la gravitation des corps célestes les uns vers les autres comme une propriété générale de cet univers.

Nous venons de voir qu'elle suit la raison inverse du carré des distances; à la vérité, cette raison est donnée par les lois du mouvement elliptique, auxquelles les mouvements célestes ne sont pas rigoureusement assujettis; mais on doit considérer que, les lois les plus simples devant toujours être préférées, jusqu'à ce que les observations nous forent de les abandonner, il est naturel de supposer d'abord que la loi de la gravitation est réciproque à une puissance de la distance, et l'on trouve, par le calcul, que la plus légère différence entre cette puissance et le carré deviendrait extrêmement sensible dans la position des périhélies des orbites planétaires, dans lesquels l'observation n'a fait apercevoir que des mouvements presque insensibles dont nous déve-



lopperons la cause. En général, on verra, dans le cours de cet Ouvrage, que la loi de la gravitation réciproque au carré des distances représente avec une extrême précision toutes les inégalités observées des mouvements célestes : cet accord, joint à la simplicité de cette loi, nous autorise à penser qu'elle est rigoureusement celle de la nature.

La gravitation est proportionnelle aux masses; car il résulte du n° 3 que, les planètes et les comètes étant supposées à la même distance du Soleil et abandonnées à leur gravité vers cet astre, elles tomberaient en temps égal d'une égale hauteur; en sorte que leur pesanteur serait proportionnelle à leur masse. Les mouvements presque circulaires des satellites autour de leurs planètes nous prouvent qu'ils pèsent, comme ces planètes, vers le Soleil, en raison de leurs masses; la plus légère différence à cet égard serait sensible dans le mouvement des satellites, et les observations n'ont fait découvrir aucune inégalité dépendante de cette cause. On voit donc que les comètes, les planètes et leurs satellites, placés à la même distance du Soleil, pèseraient vers cet astre, en raison de leurs masses: d'où il suit, en vertu de l'égalité de l'action à la réaction, qu'ils attireraient dans la même raison le Soleil, et qu'ainsi leur action sur cet astre est proportionnelle à leurs masses divisées par le carré de leurs distances à son centre.

La même loi s'observe sur la Terre; on s'est assuré par des expériences très-précises, faites au moyen du pendule, que sans la résistance de l'air tous les corps se précipiteraient vers son centre avec une égale vitesse; les corps terrestres pèsent donc sur la Terre, en raison de leurs masses, ainsi que les planètes pèsent vers le Soleil et les satellites vers leurs planètes. Cette conformité de la nature avec elle-même, sur la Terre et dans l'immensité des cieux, nous montre de la manière la plus frappante que la pesanteur observée ici-bas n'est qu'un cas particulier d'une loi générale répandue dans l'univers.

La propriété attractive des corps célestes ne leur appartient pas seulement en masse; mais elle est propre à chacune de leurs molécules. Si le Soleil n'agissait que sur le centre de la Terre, sans attirer particulièrement chacune de ses parties, il en résulterait, dans l'océan, des

oscillations incomparablement plus grandes et très-différentes de celles que l'on y observe; la pesanteur de la Terre vers le Soleil est donc le résultat des pesanteurs de toutes ses molécules, qui par conséquent attirent le Soleil en raison de leurs masses respectives. D'ailleurs, chaque corps sur la Terre pèse vers son centre, proportionnellement à sa masse; il réagit donc sur elle, et l'attire suivant le même rapport. Si cela n'était pas, et si une partie quelconque de la Terre, quelque petite qu'on la suppose, n'attirait pas l'autre partie comme elle en est attirée, le centre de gravité de la Terre serait mu dans l'espace en vertu de la pesanteur, ce qui est impossible.

Les phénomènes célestes, comparés aux lois du mouvement, nous conduisent donc à ce grand principe de la nature, savoir, que toutes les molécules de la matière s'attirent mutuellement en raison des masses, et réciproquement au carré des distances. Déjà l'on entrevoit dans cette gravitation universelle la cause des perturbations que les corps célestes éprouvent; car, les planètes et les comètes étant soumises à leur action réciproque, elles doivent s'écarter un peu des lois du mouvement elliptique, qu'elles suivraient exactement, si elles n'obéissaient qu'à l'action du Soleil. Les satellites, troublés dans leurs mouvements autour de leurs planètes par leur attraction mutuelle et par celle du Soleil, s'écarteraient pareillement de ces lois. On voit encore que les molécules de chaque corps céleste, réunies par leur attraction, doivent former une masse à peu près sphérique, et que la résultante de leur action à la surface du corps doit y produire tous les phénomènes de la pesanteur. On voit pareillement que le mouvement de rotation des corps célestes doit altérer un peu la sphéricité de leur figure, et l'aplatir aux pôles, et qu'alors, la résultante de leurs actions mutuelles ne passant point exactement par leurs centres de gravité, elle doit produire dans leurs axes de rotation des mouvements semblables à ceux que l'observation y fait apercevoir. Enfin, on entrevoit que les molécules de l'océan, inégalement attirées par le Soleil et la Lune, doivent avoir un mouvement d'oscillation pareil au flux et au reflux de la mer. Mais le développement de ces divers effets de la pesanteur universelle exige une pro-



fonde analyse. Pour les embrasser avec la plus grande généralité, nous allons donner les équations différentielles du mouvement d'un système de corps soumis à leur attraction mutuelle, et rechercher les intégrales rigoureuses que l'on peut en obtenir. Nous profiterons ensuite des facilités que les rapports des masses et des distances des corps célestes nous présentent, pour avoir des intégrales de plus en plus approchées, et pour déterminer ainsi les phénomènes célestes avec toute l'exactitude que les observations comportent.

## CHAPITRE II.

DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES DU MOUVEMENT D'UN SYSTÈME DE CORPS SOUMIS À LEUR ATTRACTION MUTUELLE.

7. Soient  $m, m', m'', \dots$  les masses des différents corps du système, considérés comme autant de points; soient  $x, y, z$  les coordonnées rectangulaires du corps  $m$ ;  $x', y', z'$  celles du corps  $m'$ , et ainsi du reste. La distance de  $m'$  à  $m$  étant

$$\sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2},$$

son action sur  $m$  sera, par la loi de la pesanteur universelle, égale à

$$\frac{m'}{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}.$$

Si l'on décompose cette action parallèlement aux axes des  $x$ , des  $y$  et des  $z$ , la force parallèle à l'axe des  $x$  et dirigée en sens contraire de leur origine sera

$$\frac{m'(x' - x)}{[(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2]}.$$

ou

$$\frac{1}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \frac{mm'}{\sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}}.$$

On aura pareillement

$$\frac{1}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \frac{mm''}{\sqrt{(x'' - x)^2 + (y'' - y)^2 + (z'' - z)^2}}$$



pour l'action de  $m''$  sur  $m$ , décomposée parallèlement à l'axe des  $x$ , et ainsi du reste. Soit donc

$$\lambda = \frac{mm'}{\sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}} + \frac{mm''}{\sqrt{(x'' - x)^2 + (y'' - y)^2 + (z'' - z)^2}} + \dots,$$

$\lambda$  étant ainsi la somme des produits deux à deux des masses  $m, m', m'', \dots$ , divisés par leurs distances respectives;  $\frac{1}{m} \frac{\partial \lambda}{\partial x}$  exprimera la somme des actions des corps  $m', m'', \dots$  sur  $m$ , décomposées parallèlement à l'axe des  $x$ , en sens contraire de l'origine des coordonnées. En désignant donc par  $dt$  l'élément du temps, supposé constant, on aura, par les principes de Dynamique exposés dans le Livre précédent,

$$0 = m \frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{\partial \lambda}{\partial x}.$$

On aura pareillement

$$0 = m \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{\partial \lambda}{\partial y},$$

$$0 = m \frac{d^2 z}{dt^2} - \frac{\partial \lambda}{\partial z}.$$

Si l'on considère de la même manière l'action des corps  $m, m', \dots$  sur  $m'$ ; celle des corps  $m, m', \dots$  sur  $m''$ , et ainsi du reste, on aura les équations

$$0 = m' \frac{d^2 x'}{dt^2} - \frac{\partial \lambda}{\partial x'}, \quad 0 = m' \frac{d^2 y'}{dt^2} - \frac{\partial \lambda}{\partial y'}, \quad 0 = m' \frac{d^2 z'}{dt^2} - \frac{\partial \lambda}{\partial z'},$$

$$0 = m'' \frac{d^2 x''}{dt^2} - \frac{\partial \lambda}{\partial x''}, \quad 0 = m'' \frac{d^2 y''}{dt^2} - \frac{\partial \lambda}{\partial y''}, \quad 0 = m'' \frac{d^2 z''}{dt^2} - \frac{\partial \lambda}{\partial z''},$$

La détermination des mouvements de  $m, m', m'', \dots$  dépend de l'intégration de ces équations différentielles; mais il n'a été possible jus-

qu'ici de les intégrer complètement que dans le seul cas où le système n'est composé que de deux corps. Dans les autres cas, on n'a pu obtenir qu'un petit nombre d'intégrales rigoureuses, que nous allons développer.

8. Pour cela, considérons d'abord les équations différentielles en  $x, x', x'', \dots$ ; en les ajoutant ensemble, et en observant que, par la nature de la fonction  $\lambda$ , on a

$$0 = \frac{\partial \lambda}{\partial x} + \frac{\partial \lambda}{\partial x'} + \frac{\partial \lambda}{\partial x''} + \dots,$$

on aura

$$0 = \Sigma m \frac{d^2 x}{dt^2},$$

On aura pareillement

$$0 = \Sigma m' \frac{d^2 y}{dt^2}, \quad 0 = \Sigma m'' \frac{d^2 z}{dt^2}.$$

Soient  $X, Y, Z$  les trois coordonnées du centre de gravité du système; on aura, par la propriété de ce centre,

$$X = \frac{\Sigma m x}{\Sigma m}, \quad Y = \frac{\Sigma m y}{\Sigma m}, \quad Z = \frac{\Sigma m z}{\Sigma m};$$

on aura donc

$$0 = \frac{d^2 X}{dt^2}, \quad 0 = \frac{d^2 Y}{dt^2}, \quad 0 = \frac{d^2 Z}{dt^2},$$

d'où l'on tire, en intégrant,

$$X = a + bt, \quad Y = a' + b't, \quad Z = a'' + b''t,$$

$a, b, a', b', a'', b''$  étant des constantes arbitraires. On voit par là que le mouvement du centre de gravité du système est rectiligne et uniforme, et qu'ainsi il n'est point altéré par l'action réciproque des corps du système; ce qui est conforme à ce que nous avons vu dans le Chapitre V du premier Livre.

Reprenons les équations différentielles du mouvement de ces corps.



Si l'on multiplie les équations différentielles en  $y, y', y'', \dots$  respectivement par  $x, x', x'', \dots$ , et qu'on les ajoute aux équations différentielles en  $x, x', x'', \dots$ , multipliées respectivement par  $-y, -y', -y'', \dots$ , on aura

$$\begin{aligned} 0 = & m \frac{x d^2 y - y d^2 x}{dt^2} + m' \frac{x' d^2 y' - y' d^2 x'}{dt^2} + \dots \\ & + y \frac{\partial \lambda}{\partial x} + y' \frac{\partial \lambda}{\partial x'} + \dots \\ & - x \frac{\partial \lambda}{\partial y} - x' \frac{\partial \lambda}{\partial y'} - \dots; \end{aligned}$$

mais la nature de la fonction  $\lambda$  donne

$$0 = y \frac{\partial \lambda}{\partial x} + y' \frac{\partial \lambda}{\partial x'} + \dots - x \frac{\partial \lambda}{\partial y} - x' \frac{\partial \lambda}{\partial y'} - \dots;$$

on aura donc, en intégrant l'équation précédente,

$$c = \sum m \frac{x dy - y dx}{dt}.$$

On trouvera semblablement

$$c' = \sum m \frac{x dz - z dx}{dt}, \quad c'' = \sum m \frac{y dz - z dy}{dt},$$

$c, c', c''$  étant des constantes arbitraires. Ces trois intégrales renferment le principe des aires, que nous avons exposé dans le Chapitre V du premier Livre.

Enfin, si l'on multiplie les équations différentielles en  $x, x', x'', \dots$  respectivement par  $dx, dx', dx'', \dots$ ; celles en  $y, y', \dots$  respectivement par  $dy, dy', \dots$ ; celles en  $z, z', \dots$  respectivement par  $dz, dz', \dots$  et qu'on les ajoute ensemble, on aura

$$0 = \sum m \frac{dx d^2 x + dy d^2 y + dz d^2 z}{dt^2} - d\lambda,$$

et, en intégrant,

$$h = \sum m \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} - 2\lambda,$$

$h$  étant une nouvelle arbitraire. Cette intégrale renferme le principe de la conservation des forces vives, exposé dans le Chapitre V du premier Livre.

Les sept intégrales précédentes sont les seules intégrales rigoureuses que l'on a pu obtenir jusqu'à présent : dans le cas où le système n'est composé que de deux corps, elles réduisent la détermination de leurs mouvements à des équations différentielles du premier ordre, que l'on peut intégrer, comme on le verra dans la suite; mais, lorsque le système est formé de trois ou d'un plus grand nombre de corps, il faut nécessairement recourir aux méthodes d'approximation.

9. Comme on ne peut observer que des mouvements relatifs, on rapporte les mouvements des planètes et des comètes au centre du Soleil, et les mouvements des satellites au centre de leurs planètes. Ainsi, pour comparer la théorie aux observations, il faut déterminer le mouvement relatif d'un système de corps autour d'un corps considéré comme le centre de leurs mouvements.

Soit M ce dernier corps,  $m, m', m'', \dots$  étant les autres corps dont on cherche le mouvement relatif autour de M; soient  $\zeta, \Pi$  et  $\gamma$  les coordonnées rectangulaires de M;  $\zeta + x, \Pi + y, \gamma + z$  celles de  $m$ ;  $\zeta + x', \Pi + y', \gamma + z'$  celles de  $m'$ , etc.; il est visible que  $x, y, z$  seront les coordonnées de  $m$  par rapport à M; que  $x', y', z'$  seront celles de  $m'$  par rapport au même corps, et ainsi du reste. Nommons  $r, r', \dots$  les distances de  $m, m', \dots$  au corps M, en sorte que

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad r' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}, \dots,$$

et supposons

$$\begin{aligned} \lambda = & \frac{mm'}{\sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2 + (z' - z)^2}} \\ & + \frac{mm''}{\sqrt{(x'' - x)^2 + (y'' - y)^2 + (z'' - z)^2}} \\ & + \frac{m'm''}{\sqrt{(x'' - x')^2 + (y'' - y')^2 + (z'' - z')^2}} + \dots \end{aligned}$$



Cela posé, l'action de  $m$  sur  $M$ , décomposée parallèlement à l'axe des  $x$  et en sens contraire de leur origine, sera  $\frac{mx}{r^3}$ ; celle de  $m'$  sur  $M$ , décomposée suivant la même direction, sera  $\frac{m'x'}{r'^3}$ , et ainsi du reste. On aura donc, pour déterminer  $\zeta$ , l'équation différentielle

$$0 = \frac{d^2\zeta}{dt^2} - \sum \frac{mx}{r^3};$$

on aura pareillement

$$0 = \frac{d^2\Pi}{dt^2} - \sum \frac{my}{r^3},$$

$$0 = \frac{d^2\gamma}{dt^2} - \sum \frac{mz}{r^3}.$$

L'action de  $M$  sur  $m$ , décomposée parallèlement à l'axe des  $x$ , et dirigée en sens contraire de leur origine, sera  $-\frac{Mx}{r^3}$ , et la somme des actions des corps  $m', m'', \dots$  sur  $m$ , décomposées suivant la même direction, sera  $\frac{1}{m} \frac{\partial\lambda}{\partial x}$ ; on aura donc

$$0 = \frac{d^2(\zeta+x)}{dt^2} + \frac{Mx}{r^3} - \frac{1}{m} \frac{\partial\lambda}{\partial x};$$

en substituant au lieu de  $\frac{d^2\zeta}{dt^2}$  sa valeur  $\sum \frac{mx}{r^3}$ , on aura

$$(1) \quad 0 = \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{Mx}{r^3} + \sum \frac{mx}{r^3} - \frac{1}{m} \frac{\partial\lambda}{\partial x};$$

on aura pareillement

$$(2) \quad 0 = \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{My}{r^3} + \sum \frac{my}{r^3} - \frac{1}{m} \frac{\partial\lambda}{\partial y};$$

$$(3) \quad 0 = \frac{d^2z}{dt^2} + \frac{Mz}{r^3} + \sum \frac{mz}{r^3} - \frac{1}{m} \frac{\partial\lambda}{\partial z}.$$

Si l'on change successivement, dans les équations (1), (2), (3), les quantités  $m, x, y, z$  dans celles-ci,  $m', x', y', z'$ ;  $m'', x'', y'', z''$ , etc.,

et réciproquement, on aura les équations du mouvement des corps  $m', m'', \dots$  autour de  $M$ .

Si l'on multiplie l'équation différentielle en  $\zeta$  par  $M + \sum m$ , celle en  $x$  par  $m$ , celle en  $x'$  par  $m'$ , et ainsi du reste; en les ajoutant ensemble, et en observant que, par la nature de la fonction  $\lambda$ , on a

$$0 = \frac{\partial\lambda}{\partial x} + \frac{\partial\lambda}{\partial x'} + \dots,$$

on aura

$$0 = (M + \sum m) \frac{d^2\zeta}{dt^2} + \sum m \frac{d^2x}{dt^2},$$

d'où l'on tire, en intégrant,

$$\zeta = a + bt - \frac{\sum mx}{M + \sum m},$$

$a$  et  $b$  étant deux constantes arbitraires. On aura pareillement

$$\Pi = a' + b't - \frac{\sum my}{M + \sum m},$$

$$\gamma = a'' + b''t - \frac{\sum mz}{M + \sum m},$$

$a', b', a'', b''$  étant des constantes arbitraires: on aura ainsi le mouvement absolu de  $M$  dans l'espace, lorsque les mouvements relatifs de  $m, m', \dots$  autour de lui seront connus.

Si l'on multiplie l'équation différentielle en  $x$  par

$$-my + m \frac{\sum my}{M + \sum m},$$

et l'équation différentielle en  $y$  par

$$mx - m \frac{\sum mx}{M + \sum m};$$

si l'on multiplie pareillement l'équation différentielle en  $x'$  par

$$-m'y' + m' \frac{\sum m'y'}{M + \sum m},$$

et l'équation différentielle en  $y'$  par

$$m'x' - m' \frac{\sum mx}{M + \sum m},$$

et ainsi du reste; si l'on ajoute ensuite toutes ces équations, en observant que la nature de la fonction  $\lambda$  donne

$$0 = \sum x \frac{\partial \lambda}{\partial y} - \sum y \frac{\partial \lambda}{\partial x}, \quad 0 = \sum \frac{\partial \lambda}{\partial x}, \quad 0 = \sum \frac{\partial \lambda}{\partial y},$$

on aura

$$0 = \sum m \frac{x d^2 y - y d^2 x}{dt^2} - \frac{\sum mx}{M + \sum m} \sum m \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{\sum my}{M + \sum m} \sum m \frac{d^2 x}{dt^2},$$

équation dont l'intégrale est

$$\text{const.} = \sum m \frac{xdy - ydx}{dt} - \frac{\sum mx}{M + \sum m} \sum m \frac{dy}{dt} + \frac{\sum my}{M + \sum m} \sum m \frac{dx}{dt},$$

ou

$$(4) \quad c = M \sum m \frac{xdy - ydx}{dt} + \sum mm' \frac{(x' - x)(dy' - dy) - (y' - y)(dx' - dx)}{dt},$$

$c$  étant une constante arbitraire. On parviendra de la même manière aux deux intégrales suivantes :

$$(5) \quad c' = M \sum m \frac{x dz - z dx}{dt} + \sum mm' \frac{(x' - x)(dz' - dz) - (z' - z)(dx' - dx)}{dt},$$

$$(6) \quad c'' = M \sum m \frac{y dz - z dy}{dt} + \sum mm' \frac{(y' - y)(dz' - dz) - (z' - z)(dy' - dy)}{dt},$$

$c'$ ,  $c''$  étant deux nouvelles arbitraires.

Si l'on multiplie l'équation différentielle en  $x$  par

$$2m dx - 2m \frac{\sum m dx}{M + \sum m},$$

l'équation différentielle en  $y$  par

$$2m dy - 2m \frac{\sum m dy}{M + \sum m},$$

l'équation différentielle en  $z$  par

$$2m dz - 2m \frac{\sum m dz}{M + \sum m};$$

si l'on multiplie pareillement l'équation différentielle en  $x'$  par

$$2m' dx' - 2m' \frac{\sum m dx}{M + \sum m},$$

l'équation différentielle en  $y'$  par

$$2m' dy' - 2m' \frac{\sum m dy}{M + \sum m},$$

l'équation différentielle en  $z'$  par

$$2m' dz' - 2m' \frac{\sum m dz}{M + \sum m},$$

et ainsi du reste; si l'on ajoute ensuite ces diverses équations, en observant que

$$0 = \sum \frac{\partial \lambda}{\partial x}, \quad 0 = \sum \frac{\partial \lambda}{\partial y}, \quad 0 = \sum \frac{\partial \lambda}{\partial z},$$

on aura

$$0 = 2 \sum m \frac{dx d^2 x + dy d^2 y + dz d^2 z}{dt^2} - \frac{2 \sum m dx}{M + \sum m} \sum m \frac{d^2 x}{dt^2} \\ - \frac{2 \sum m dy}{M + \sum m} \sum m \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{2 \sum m dz}{M + \sum m} \sum m \frac{d^2 z}{dt^2} + 2M \sum \frac{m dr}{r^2} - 2\lambda,$$

ce qui donne, en intégrant,

$$\text{const.} = \sum m \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} - \frac{(\sum m dx)^2 + (\sum m dy)^2 + (\sum m dz)^2}{(M + \sum m) dt^2} - 2M \sum \frac{m}{r} - 2\lambda,$$

ou

$$(7) \quad \left\{ \begin{aligned} h &= M \sum m \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} + \sum mm' \frac{(dx' - dx)^2 + (dy' - dy)^2 + (dz' - dz)^2}{dt^2} \\ &\quad - \left( 2M \sum \frac{m}{r} + 2\lambda \right) (M + \sum m), \end{aligned} \right.$$

$h$  étant une constante arbitraire. Nous sommes déjà parvenus à ces diverses intégrales, dans le Chapitre V du premier Livre, relativement





à un système de corps qui réagissent les uns sur les autres d'une manière quelconque; mais, vu leur utilité dans la théorie du système du monde, nous avons cru devoir les démontrer ici de nouveau.

10. Ces intégrales étant les seules que l'on ait obtenues dans l'état actuel de l'Analyse, on est forcé de recourir aux méthodes d'approximation, et de profiter des facilités qu'offre pour cet objet la constitution du système du monde. Une des principales tient à ce que le système solaire est partagé en systèmes partiels, formés par les planètes et par leurs satellites: ces systèmes sont tels, que les distances des satellites à leur planète sont considérablement plus petites que la distance de la planète au Soleil: il en résulte que, l'action du Soleil étant à peu près la même sur la planète et sur ses satellites, ceux-ci se meuvent à peu près comme s'ils n'obéissaient qu'à l'action de la planète. Il en résulte encore cette propriété remarquable, savoir, que le mouvement du centre de gravité d'une planète et de ses satellites est, à fort peu près, le même que si tous ces corps étaient réunis à ce centre.

Pour le démontrer, supposons que les distances mutuelles des corps  $m, m', m'', \dots$  soient très-petites par rapport à la distance de leur centre commun de gravité au corps M. Soit

$$\begin{aligned} x &= X + x, & y &= Y + y, & z &= Z + z, \\ x' &= X + x', & y' &= Y + y', & z' &= Z + z', \\ & \dots & & & & \dots \end{aligned}$$

X, Y, Z étant les coordonnées du centre de gravité du système des corps  $m, m', m'', \dots$ ; l'origine de ces coordonnées étant, ainsi que celle des coordonnées  $x, y, z, x', y', z', \dots$ , au centre de M. Il est clair que  $x, y, z, x', y', z', \dots$  seront les coordonnées de  $m, m', \dots$ , relativement à leur centre commun de gravité; nous les supposons très-petites du premier ordre par rapport à X, Y, Z. Cela posé, on aura, comme on l'a vu dans le premier Livre, la force qui sollicite le centre de gravité du système parallèlement à une droite quelconque, en prenant la somme des forces qui animent les corps parallèlement à cette

droite, multipliées respectivement par leurs masses, et en divisant cette somme par la somme des masses. On a vu de plus, dans le même Livre, que l'action mutuelle des corps liés entre eux d'une manière quelconque n'altère point le mouvement du centre de gravité du système, et, par le n° 8, l'attraction mutuelle des corps n'influe point sur ce mouvement; il suffit donc, dans la recherche des forces qui animent le centre de gravité du système, d'avoir égard à l'action du corps M, étranger à ce système.

L'action de M sur  $m$ , décomposée parallèlement à l'axe des  $x$  et en sens contraire de leur origine, est  $-\frac{Mx}{r^2}$ ; la force entière qui sollicite parallèlement à cette droite le centre de gravité du système des corps  $m, m', \dots$  est donc

$$-\frac{M \sum \frac{mx}{r^2}}{\sum m}.$$

En substituant au lieu de  $x$  et de  $r$  leurs valeurs, on a

$$\frac{x}{r^2} = \frac{X + x}{[(X + x)^2 + (Y + y)^2 + (Z + z)^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

Si l'on néglige les quantités très-petites du second ordre, c'est-à-dire les carrés et les produits des variables  $x, y, z, x', y', z', \dots$ ; que l'on désigne par R la distance  $\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$  du centre de gravité du système au corps M, on aura

$$\frac{x}{r^2} = \frac{X}{R^2} + \frac{x}{R^2} - \frac{3X(Xx + Yy + Zz)}{R^3}.$$

En marquant successivement d'un trait, de deux traits, etc., dans le second membre de cette équation, les lettres  $x, y, z$ , on aura les valeurs de  $\frac{x'}{r'^2}, \frac{x''}{r''^2}, \dots$ ; mais on a, par la nature du centre de gravité,

$$0 = \sum mx, \quad 0 = \sum my, \quad 0 = \sum mz;$$



on aura donc, aux quantités près du second ordre,

$$-\frac{M \sum \frac{mx}{r^3}}{\sum m} = -\frac{MX}{R^3};$$

ainsi le centre de gravité du système est à très-peu près sollicité parallèlement à l'axe des  $x$  par l'action du corps  $M$ , comme si tous les corps du système étaient réunis à ce centre. Le même résultat a évidemment lieu relativement aux axes des  $y$  et des  $z$ ; en sorte que les forces dont le centre de gravité du système est animé parallèlement à ces axes par l'action de  $M$  sont  $-\frac{MY}{R^3}$  et  $-\frac{MZ}{R^3}$ .

Lorsque l'on considère le mouvement relatif du centre de gravité du système autour de  $M$ , il faut lui transporter en sens contraire la force qui sollicite ce corps. Cette force résultante de l'action de  $m, m', m'', \dots$  sur  $M$ , et décomposée parallèlement aux  $x$  en sens contraire de leur origine, est  $\sum \frac{mx}{r^3}$ ; si l'on néglige les quantités du second ordre, cette fonction est, par ce qui précède, égale à

$$\frac{X \sum m}{R^3}.$$

Pareillement, les forces dont  $M$  est animé par l'action du système parallèlement aux axes des  $y$  et des  $z$ , en sens contraire de leur origine, sont

$$\frac{Y \sum m}{R^3} \quad \text{et} \quad \frac{Z \sum m}{R^3}.$$

On voit ainsi que l'action du système sur le corps  $M$  est à très-peu près la même que si tous les corps de ce système étaient réunis à leur centre commun de gravité. En transportant à ce centre, et avec un signe contraire, les trois forces précédentes, ce point sera sollicité parallèlement aux axes des  $x$ , des  $y$  et des  $z$ , dans son mouvement relatif autour de  $M$ , par les trois forces suivantes :

$$-(M + \sum m) \frac{X}{R^3}, \quad -(M + \sum m) \frac{Y}{R^3}, \quad -(M + \sum m) \frac{Z}{R^3}.$$

Ces forces sont les mêmes que si tous les corps  $m, m', m'', \dots$  étaient réunis à leur centre commun de gravité; ce centre se meut donc, aux quantités près du second ordre, comme si tous ces corps y étaient réunis.

Il suit de là que, si l'on a plusieurs systèmes dont les centres de gravité soient fort éloignés les uns des autres relativement aux distances respectives des corps de chaque système, ces centres seront mus, à fort peu près, comme si les corps de chaque système y étaient réunis; car l'action du premier système sur chaque corps du second système est, par ce qui vient d'être dit, la même à très-peu près que si les corps du premier système étaient réunis à leur centre commun de gravité; l'action du premier système sur le centre de gravité du second sera donc, par ce qui précède, la même que dans cette hypothèse; d'où l'on peut généralement conclure que l'action réciproque des différents systèmes sur leurs centres de gravité respectifs est la même que si les corps de chaque système y étaient réunis, et qu'ainsi ces centres se meuvent comme dans le cas de cette réunion. Il est visible que ce résultat a également lieu, les corps de chaque système étant libres, ou liés entre eux d'une manière quelconque; parce que leur action mutuelle n'influe point sur le mouvement de leur centre commun de gravité.

Le système d'une planète agit donc à très-peu près sur les autres corps du système solaire comme si la planète et ses satellites étaient réunis à leur centre commun de gravité, et ce centre est attiré par les différents corps du système solaire comme dans cette hypothèse.

Chaque corps céleste étant la réunion d'une infinité de molécules douées d'un pouvoir attractif, et ses dimensions étant très-petites relativement à sa distance aux autres corps du système du monde, son centre de gravité est à très-peu près attiré comme si toute sa masse y était réunie, et il agit lui-même sur ces différents corps comme dans cette supposition; on peut donc, dans la recherche du mouvement des centres de gravité des corps célestes, considérer ces différents corps comme autant de points massifs placés à leurs centres de gravité. Mais la sphéricité des planètes et de leurs satellites rend cette supposition,



déjà fort approchée, beaucoup plus exacte encore. En effet, ces divers corps peuvent être considérés comme étant formés de couches à très-peu près sphériques, d'une densité variable suivant une loi quelconque, et nous allons faire voir que l'action d'une couche sphérique sur un corps qui lui est extérieur est la même que si sa masse était réunie à son centre. Pour cela, nous allons établir sur les attractions des sphéroïdes quelques propositions générales qui nous seront très-utiles dans la suite.

11. Soient  $x, y, z$  les trois coordonnées du point attiré, que nous désignerons par  $m$ ; soient  $dM$  une molécule du sphéroïde, et  $x', y', z'$  les coordonnées de cette molécule; si l'on nomme  $\rho$  sa densité,  $\rho$  étant une fonction de  $x', y', z'$ , indépendante de  $x, y, z$ , on aura

$$dM = \rho dx' dy' dz'.$$

L'action de  $dM$  sur  $m$ , décomposée parallèlement à l'axe des  $x$  et dirigée vers leur origine, sera

$$\frac{\rho dx' dy' dz' (x - x')}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{\frac{3}{2}}},$$

et par conséquent elle sera égale à

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\rho dx' dy' dz'}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}},$$

en nommant donc  $V$  l'intégrale

$$\int \frac{\rho dx' dy' dz'}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}},$$

étendue à la masse entière du sphéroïde, on aura  $-\frac{\partial V}{\partial x}$  pour l'action totale du sphéroïde sur le point  $m$ , décomposée parallèlement à l'axe des  $x$  et dirigée vers leur origine.

$V$  est la somme des molécules du sphéroïde divisées par leurs distances respectives au point attiré; pour avoir l'attraction du sphéroïde

sur ce point parallèlement à une droite quelconque, il faut donc considérer  $V$  comme fonction de trois coordonnées rectangulaires, dont l'une soit parallèle à cette droite, et différentier cette fonction relativement à cette coordonnée; le coefficient de cette différentielle, pris avec un signe contraire, sera l'expression de l'attraction du sphéroïde parallèlement à la droite donnée, et dirigée vers l'origine de la coordonnée qui lui est parallèle.

Si l'on représente par  $\xi$  la fonction  $[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{-\frac{1}{2}}$ , on aura

$$V = \int \xi \rho dx' dy' dz'.$$

L'intégration n'étant relative qu'aux variables  $x', y', z'$ , il est clair que l'on aura

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = \int \rho dx' dy' dz' \left( \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} \right);$$

mais on a

$$0 = \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2};$$

on aura donc pareillement

$$(A) \quad 0 = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2};$$

cette équation remarquable nous sera de la plus grande utilité dans la théorie de la figure des corps célestes. On peut lui donner d'autres formes plus commodes dans diverses circonstances; concevons, par exemple, que de l'origine des coordonnées on mène au point attiré un rayon, que nous nommerons  $r$ ; soit  $\theta$  l'angle que ce rayon fait avec l'axe des  $x$ , et  $\omega$  l'angle que le plan formé par  $r$  et par cet axe fait avec le plan des  $x$  et des  $y$ ; on aura

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \cos \omega, \quad z = r \sin \theta \sin \omega,$$

d'où l'on tire

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \tan \omega = \frac{z}{y}.$$



On pourra ainsi avoir les différences partielles de  $r$ ,  $\theta$  et  $\sigma$  relativement aux variables  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , et l'on en conclura les valeurs de  $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}$ ,  $\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$  en différences partielles de  $V$  relatives aux variables  $r$ ,  $\theta$  et  $\sigma$ . Comme nous ferons souvent usage de ces transformations des différences partielles, il est utile d'en rappeler ici le principe. En considérant  $V$  comme fonction des variables  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , et ensuite des variables  $r$ ,  $\theta$  et  $\sigma$ , on a

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial V}{\partial \sigma} \frac{\partial \sigma}{\partial x}.$$

Pour avoir les différences partielles  $\frac{\partial r}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial \theta}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial \sigma}{\partial x}$ , il ne faut faire varier que  $x$  dans les expressions précédentes de  $r$ ,  $\cos \theta$  et  $\tan \sigma$ ; en différenciant donc ces expressions, on aura

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \cos \theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin \theta}{r}, \quad \frac{\partial \sigma}{\partial x} = 0,$$

ce qui donne

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial V}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta}.$$

On aura donc ainsi la différence partielle  $\frac{\partial V}{\partial x}$ , en différences partielles de la fonction  $V$ , prises par rapport aux variables  $r$ ,  $\theta$  et  $\sigma$ . En différenciant de nouveau cette valeur de  $\frac{\partial V}{\partial x}$ , on aura la différentielle partielle  $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$ , en différences partielles de  $V$ , prises par rapport aux variables  $r$ ,  $\theta$  et  $\sigma$ . On aura, par le même procédé, les valeurs de  $\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}$  et  $\frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$ .

On transformera, de cette manière, l'équation (A) dans la suivante

$$(B) \quad 0 = \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 V}{\sin^2 \theta} + r \frac{\partial^2 V}{\partial r^2},$$

et, si l'on fait  $\cos \theta = \mu$ , cette équation deviendra

$$(C) \quad 0 = \frac{\partial \cdot (1 - \mu^2) \frac{\partial V}{\partial \mu}}{\partial \mu} + \frac{\partial^2 V}{1 - \mu^2} + r \frac{\partial^2 V}{\partial r^2}.$$

12. Supposons maintenant que le sphéroïde soit une couche sphérique dont le centre soit à l'origine des coordonnées; il est clair que  $V$  ne dépendra que de  $r$ , et qu'il ne renfermera ni  $\mu$  ni  $\sigma$ ; l'équation (C) donnera donc

$$0 = \frac{\partial^2 \cdot rV}{\partial r^2},$$

d'où l'on tire, en intégrant,

$$V = A + \frac{B}{r},$$

A et B étant deux constantes arbitraires. On a donc

$$-\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{B}{r^2},$$

$-\frac{\partial V}{\partial r}$  exprime, par ce qui précède, l'action de la couche sphérique sur le point  $m$ , décomposée suivant le rayon  $r$  et dirigée vers le centre de la couche; or il est clair que l'action totale de la couche doit être dirigée suivant ce rayon;  $-\frac{\partial V}{\partial r}$  exprime donc l'action totale de la couche sphérique sur le point  $m$ .

Supposons d'abord ce point placé au dedans de la couche. S'il était au centre même, l'action de la couche serait nulle; on a donc  $-\frac{\partial V}{\partial r} = 0$ , ou  $\frac{B}{r^2} = 0$ , lorsque  $r = 0$ , ce qui donne  $B = 0$ , et par conséquent  $-\frac{\partial V}{\partial r} = 0$ , quel que soit  $r$ ; d'où il suit qu'un point placé dans l'intérieur de la couche n'éprouve aucune action, ou, ce qui revient au même, il est également attiré de toutes parts.

Si le point  $m$  est situé au dehors de la couche sphérique, il est visible qu'en le supposant infiniment éloigné de son centre, l'action de la couche sur ce point sera la même que si toute la masse de la couche était réunie à ce centre; en nommant donc  $M$  la masse de cette couche,  $-\frac{\partial V}{\partial r}$  ou  $\frac{B}{r^2}$  deviendra, dans ce cas, égal à  $\frac{M}{r^2}$ , ce qui donne



$B = M$ ; on a donc généralement, par rapport aux points extérieurs,

$$-\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{M}{r^2},$$

c'est-à-dire que la couche sphérique les attire comme si toute sa masse était réunie à son centre.

Une sphère étant une couche sphérique dont le rayon de la surface intérieure est nul, on voit que son attraction sur un point placé à sa surface ou au delà est la même que si sa masse était réunie à son centre.

Ce résultat a encore lieu pour les globes formés de couches concentriques d'une densité variable du centre à la circonférence suivant une loi quelconque, puisqu'il est vrai pour chacune de ces couches : ainsi, le Soleil, les planètes et les satellites pouvant être considérés, à très-peu près, comme des globes de cette nature, ils attirent, à fort peu près, les corps extérieurs comme si l'on supposait leurs masses réunies à leurs centres de gravité, ce qui est conforme à ce que nous avons trouvé par les observations, dans le n° 5. A la vérité, la figure des corps célestes s'écarte un peu de la sphère; mais la différence est très-petite, et l'erreur qui en résulte sur la supposition précédente est du même ordre que cette différence, relativement aux points voisins de leur surface; et, relativement aux points éloignés, l'erreur est du même ordre que le produit de cette différence par le carré du rapport des rayons des corps attirants à leurs distances aux points attirés; car on a vu, dans le n° 10, que la considération seule de l'éloignement des points attirés rend l'erreur de la supposition précédente du même ordre que le carré de ce rapport. Les corps célestes s'attirent donc, à très-peu près, comme si leurs masses étaient réunies à leurs centres de gravité, non-seulement parce qu'ils sont fort éloignés les uns des autres relativement à leurs dimensions respectives, mais encore parce que leurs figures diffèrent très-peu de la sphère.

La propriété dont les sphères jouissent dans la loi de la nature, d'attirer comme si leurs masses étaient réunies à leurs centres, est très-remarquable, et l'on peut être curieux de savoir si elle a lieu dans d'au-

tres lois d'attraction. Pour cela, nous observerons que, si la loi de la pesanteur est telle qu'une sphère homogène attire un point placé au dehors comme si toute sa masse était réunie à son centre, le même résultat doit avoir lieu pour une couche sphérique d'une épaisseur constante; car, si l'on enlève à une sphère une couche sphérique d'une épaisseur constante, on formera une nouvelle sphère d'un plus petit rayon, mais qui aura, ainsi que la première, la propriété d'attirer comme si toute sa masse était réunie à son centre; or il est évident que ces deux sphères ne peuvent avoir cette propriété commune qu'autant qu'elle l'est encore à la couche sphérique qui forme leur différence. Le problème se réduit donc à déterminer les lois d'attraction suivant lesquelles une couche sphérique d'une épaisseur infiniment petite et constante attire un point extérieur comme si toute sa masse était réunie à son centre.

Soit  $r$  la distance du point attiré au centre de la couche sphérique,  $u$  le rayon de cette couche, et  $du$  son épaisseur. Soit  $\theta$  l'angle que le rayon  $u$  fait avec la droite  $r$ ,  $\omega$  l'angle que le plan qui passe par les deux droites  $r$  et  $u$  fait avec un plan fixe passant par la droite  $r$ ; l'élément de la couche sphérique sera  $u^2 du d\omega d\theta \sin \theta$ . Si l'on nomme ensuite  $f$  la distance de cet élément au point attiré, on aura

$$f^2 = r^2 - 2ru \cos \theta + u^2.$$

Représentons par  $\varphi(f)$  la loi de l'attraction à la distance  $f$ ; l'action de l'élément de la couche sur le point attiré, décomposée parallèlement à  $r$  et dirigée vers le centre de la couche, sera

$$u^2 du d\omega d\theta \sin \theta \frac{r - u \cos \theta}{f} \varphi(f);$$

mais on a

$$\frac{r - u \cos \theta}{f} = \frac{\partial f}{\partial r},$$

ce qui donne à la quantité précédente cette forme

$$u^2 du d\omega d\theta \sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} \varphi(f);$$



partant, si l'on désigne  $\int df \varphi(f)$  par  $\varphi_r(f)$ , on aura l'action entière de la couche sphérique sur le point attiré, au moyen de l'intégrale  $u^2 du \int d\sigma d\theta \sin \theta \varphi_r(f)$ , différenciée par rapport à  $r$  et divisée par  $dr$ .

Cette intégrale doit être prise relativement à  $\sigma$ , depuis  $\sigma = 0$  jusqu'à  $\sigma$  égal à la circonférence, et après cette intégration elle devient

$$2\pi u^2 du \int d\theta \sin \theta \varphi_r(f),$$

$\pi$  étant le rapport de la demi-circonférence au rayon. Si l'on différencie la valeur de  $f$  par rapport à  $\theta$ , on aura

$$d\theta \sin \theta = \frac{f df}{ru},$$

et par conséquent

$$2\pi u^2 du \int d\theta \sin \theta \varphi_r(f) = 2\pi \frac{u du}{r} \int f df \varphi_r(f).$$

L'intégrale relative à  $\theta$  doit être prise depuis  $\theta = 0$  jusqu'à  $\theta = \pi$ , et à ces deux limites on a  $f = r - u$  et  $f = r + u$ ; ainsi l'intégrale relative à  $f$  doit être prise depuis  $f = r - u$  jusqu'à  $f = r + u$ ; soit donc  $\int f df \varphi_r(f) = \psi(f)$ ; on aura

$$\frac{2\pi u du}{r} \int f df \varphi_r(f) = \frac{2\pi u du}{r} [\psi(r+u) - \psi(r-u)].$$

Le coefficient de  $dr$ , dans la différentielle du second membre de cette équation prise par rapport à  $r$ , donnera l'attraction de la couche sphérique sur le point attiré, et il est facile d'en conclure que dans la nature, où  $\varphi(f) = \frac{1}{f^2}$ , cette attraction est égale à  $\frac{4\pi u^2 du}{r^2}$ , c'est-à-dire qu'elle est la même que si toute la masse de la couche sphérique était réunie à son centre, ce qui fournit une nouvelle démonstration de la propriété que nous avons établie précédemment sur l'attraction des sphères.

Déterminons maintenant  $\varphi(f)$  d'après la condition que l'attraction de la couche est la même que si sa masse était réunie à son centre.

Cette masse est égale à  $4\pi u^2 du$ , et, si elle était réunie à son centre, son action sur le point attiré serait  $4\pi u^2 du \varphi(r)$ ; on aura donc

$$(D) \quad 2\pi u du \frac{\partial}{\partial r} \left[ \frac{\psi(r+u) - \psi(r-u)}{r} \right] = 4\pi u^2 du \varphi(r);$$

en intégrant par rapport à  $r$ , on aura

$$\psi(r+u) - \psi(r-u) = 2ru \int dr \varphi(r) + rU,$$

U étant une fonction de  $u$  et de constantes, ajoutée à l'intégrale  $2u \int dr \varphi(r)$ . Si l'on représente  $\psi(r+u) - \psi(r-u)$  par R, on aura, en différenciant l'équation précédente,

$$\frac{\partial^2 R}{\partial r^2} = 4u \varphi(r) + 2ru \frac{d\varphi(r)}{dr}, \quad \frac{\partial^2 R}{\partial u^2} = r \frac{\partial^2 U}{\partial u^2},$$

mais on a, par la nature de la fonction R,

$$\frac{\partial^2 R}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 R}{\partial u^2},$$

partant

$$2u \left( 2\varphi(r) + r \frac{d\varphi(r)}{dr} \right) = r \frac{\partial^2 U}{\partial u^2},$$

ou

$$\frac{2\varphi(r)}{r} + \frac{d\varphi(r)}{dr} = \frac{1}{2u} \frac{\partial^2 U}{\partial u^2}.$$

Ainsi, le premier membre de cette équation étant indépendant de  $u$ , et le second membre étant indépendant de  $r$ , chacun de ces membres doit être égal à une constante arbitraire, que nous désignerons par  $3A$ ; on a donc

$$\frac{2\varphi(r)}{r} + \frac{d\varphi(r)}{dr} = 3A,$$

d'où l'on tire, en intégrant,

$$\varphi(r) = Ar + \frac{B}{r^2},$$



B étant une nouvelle constante arbitraire. Toutes les lois d'attraction dans lesquelles une sphère agit sur un point extérieur placé à la distance  $r$  de son centre comme si toute sa masse était réunie à ce centre sont donc comprises dans la formule générale

$$Ar + \frac{B}{r^2},$$

il est aisé de voir qu'en effet cette valeur satisfait à l'équation (D), quels que soient A et B.

Si l'on suppose  $A = 0$ , on aura la loi de la nature, et l'on voit que, dans le nombre infini des lois qui rendent l'attraction très-petite à de grandes distances, celle de la nature est la seule dans laquelle les sphères ont la propriété d'agir comme si leurs masses étaient réunies à leurs centres.

Cette loi est encore la seule dans laquelle un corps placé au dedans d'une couche sphérique, partout d'égale épaisseur, est également attiré de toutes parts. Il résulte de l'analyse précédente que l'attraction de la couche sphérique, dont l'épaisseur est  $du$ , sur un point placé dans son intérieur, a pour expression

$$2\pi u du \frac{\partial}{\partial r} \left[ \frac{\psi(u+r) - \psi(u-r)}{r} \right].$$

Pour que cette fonction soit nulle, on doit avoir

$$\psi(u+r) - \psi(u-r) = rU,$$

U étant une fonction de  $u$  indépendante de  $r$ , et il est facile de voir que cela a lieu dans la loi de la nature où  $\varphi(f) = \frac{B}{f^2}$ . Mais, pour faire voir que cela n'a lieu que dans cette loi, nous désignerons par  $\psi(f)$  la différence de  $\varphi(f)$  divisée par  $df$ ; nous désignerons encore par  $\psi'(f)$  la différence de  $\psi(f)$  divisée par  $df$ , et ainsi de suite; nous aurons ainsi, en différenciant deux fois de suite l'équation précédente par rapport à  $r$ ,

$$\psi''(u+r) - \psi''(u-r) = 0.$$

Cette équation ayant lieu, quels que soient  $u$  et  $r$ , il en résulte que  $\psi'(f)$  doit être égal à une constante, quel que soit  $f$ , et qu'ainsi  $\psi''(f) = 0$ ; or on a, par ce qui précède,

$$\psi'(f) = f\varphi'(f),$$

d'où l'on tire

$$\psi''(f) = 2\varphi'(f) + f\varphi''(f);$$

on a donc

$$0 = 2\varphi'(f) + f\varphi''(f),$$

ce qui donne, en intégrant,  $\varphi(f) = \frac{B}{f^2}$ , et par conséquent la loi de la nature.

13. Reprenons l'équation (C) du n° 11. Si l'on pouvait intégrer généralement cette équation, on aurait une expression de V qui renfermerait deux fonctions arbitraires, que l'on déterminerait en cherchant l'attraction du sphéroïde sur un point situé dans une position qui facilite cette recherche, et en comparant cette attraction à son expression générale. Mais l'intégration de l'équation (C) n'est possible que dans quelques cas particuliers, tels que celui où le sphéroïde attirant est une sphère, ce qui réduit cette équation aux différences ordinaires; elle est encore possible dans le cas où ce sphéroïde est un cylindre dont la base est une courbe rentrante, et dont la longueur est infinie: on verra, dans le troisième Livre, que ce cas particulier renferme la théorie des anneaux de Saturne.

Fixons l'origine des  $r$  sur l'axe même du cylindre, que nous supposons d'une longueur infinie de chaque côté de cette origine. En nommant  $r'$  la distance du point attiré à l'axe, on aura

$$r' = r\sqrt{1 - \mu^2}.$$

Il est visible que V ne dépend que de  $r'$  et de  $\sigma$ , puisqu'il est le même pour tous les points relativement auxquels ces deux variables sont les mêmes; il ne renferme donc  $\mu$  qu'autant que  $r'$  est fonction de cette



variable, ce qui donne

$$\frac{\partial V}{\partial \mu} = \frac{\partial V}{\partial r'} \frac{\partial r'}{\partial \mu} = -\frac{r\mu}{\sqrt{1-\mu^2}} \frac{\partial V}{\partial r'},$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \mu^2} = \frac{r^2 \mu^2}{1-\mu^2} \frac{\partial^2 V}{\partial r'^2} - \frac{r}{(1-\mu^2)^{\frac{3}{2}}} \frac{\partial V}{\partial r'},$$

l'équation (C) devient ainsi

$$0 = r'^2 \frac{\partial^2 V}{\partial r'^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial \omega^2} + r' \frac{\partial V}{\partial r'},$$

d'où l'on tire, en intégrant,

$$V = \varphi(r' \cos \omega + r' \sqrt{-1} \sin \omega) + \psi(r' \cos \omega - r' \sqrt{-1} \sin \omega),$$

$\varphi(r')$  et  $\psi(r')$  étant des fonctions arbitraires de  $r'$ , que l'on pourra déterminer en cherchant l'attraction du cylindre lorsque  $\omega$  est nul, et lorsqu'il est égal à un angle droit.

Si la base du cylindre est un cercle,  $V$  sera évidemment une fonction de  $r'$ , indépendante de  $\omega$ : l'équation précédente aux différences partielles deviendra ainsi

$$0 = r'^2 \frac{\partial^2 V}{\partial r'^2} + r' \frac{\partial V}{\partial r'},$$

ce qui donne, en intégrant,

$$-\frac{\partial V}{\partial r'} = \frac{H}{r'},$$

$H$  étant une constante. Pour la déterminer, nous supposons  $r'$  extrêmement grand par rapport au rayon de la base du cylindre, ce qui permet de considérer le cylindre comme une ligne droite infinie. Soit  $A$  cette base, et  $z$  la distance d'un point quelconque de l'axe du cylindre au point où cet axe est rencontré par  $r'$ ; l'action du cylindre, considéré comme concentré sur son axe, sera, parallèlement à  $r'$ , égale à

$$\int \frac{A r' dz}{(r'^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

l'intégrale étant prise depuis  $z = -\infty$  jusqu'à  $z = \infty$ , ce qui réduit cette intégrale à  $\frac{2A}{r'}$ ; c'est l'expression de  $-\frac{\partial V}{\partial r'}$ , lorsque  $r'$  est très-considérable. En la comparant à la précédente, on a  $H = 2A$ , et l'on voit que, quel que soit  $r'$ , l'action du cylindre sur un point extérieur est  $\frac{2A}{r'}$ .

Si le point attiré est au dedans d'une couche cylindrique circulaire, d'une épaisseur constante et d'une longueur infinie, on a encore  $-\frac{\partial V}{\partial r'} = \frac{H}{r'}$ ; et, comme l'attraction est nulle lorsque le point attiré est sur l'axe même de la couche, on a  $H = 0$ , et par conséquent un point placé dans l'intérieur de la couche est également attiré de toutes parts.

14. On peut étendre au mouvement d'un corps les équations (A), (B) et (C) du n° 11, et en tirer une équation de condition très-utile, soit pour vérifier les calculs de la théorie, soit pour vérifier la théorie même de la pesanteur universelle. Les équations différentielles (1), (2), (3) du n° 9, qui déterminent le mouvement relatif de  $m$  autour de  $M$ , peuvent être mises sous cette forme

$$(i) \quad \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{\partial Q}{\partial y}, \quad \frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{\partial Q}{\partial z},$$

$Q$  étant égal à

$$\frac{M+m}{r} - \sum \frac{m' (xx' + yy' + zz')}{r'^3} + \frac{\lambda}{m};$$

et il est facile de voir que l'on a

$$(E) \quad 0 = \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial z^2},$$

si les variables  $x, y, z, x', y', z', \dots$  que  $Q$  renferme, sont indépendantes des  $x, y$  et  $z$ .

Transformons les variables  $x, y, z$  en d'autres plus commodes pour les usages astronomiques.  $r$  étant le rayon mené du centre de  $M$  à celui





de  $m$ , nous nommerons  $\varphi$  l'angle que la projection de ce rayon sur le plan des  $x$  et des  $y$  fait avec l'axe des  $x$ , et  $\theta$  l'inclinaison de  $r$  sur le même plan; on aura

$$x = r \cos \theta \cos \varphi,$$

$$y = r \cos \theta \sin \varphi,$$

$$z = r \sin \theta.$$

L'équation E) rapportée à ces nouvelles variables sera, par le n° 11.

$$F) \quad 0 = r^2 \frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} + 2r \frac{\partial Q}{\partial r} + \frac{\partial^2 Q}{\cos^2 \theta} + \frac{\partial^2 Q}{\partial \theta^2} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \frac{\partial Q}{\partial \theta}.$$

Si l'on multiplie la première des équations (i) par  $\cos \theta \cos \varphi$ , la seconde par  $\cos \theta \sin \varphi$ , la troisième par  $\sin \theta$ , et si, pour abrégér, on fait

$$M' = \frac{d^2 r}{dt^2} - \frac{r dv^2}{dt^2} \cos^2 \theta - \frac{r d\theta^2}{dt^2},$$

on aura, en les ajoutant,

$$M' = \frac{\partial Q}{\partial r}.$$

Pareillement, si l'on multiplie la première des équations (i) par  $-r \cos \theta \sin \varphi$ , la seconde par  $r \cos \theta \cos \varphi$ , et qu'ensuite on les ajoute, et que l'on suppose

$$N' = \frac{d \left( r^2 \frac{dv}{dt} \cos^2 \theta \right)}{dt},$$

on aura

$$N' = \frac{\partial Q}{\partial v}.$$

Enfin, si l'on multiplie la première des équations (i) par  $-r \sin \theta \cos \varphi$ , la seconde par  $-r \sin \theta \sin \varphi$ , qu'on les ajoute à la troisième, multipliée par  $r \cos \theta$ , et que l'on fasse

$$P' = r^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2} + r^2 \frac{dv^2}{dt^2} \sin \theta \cos \theta + \frac{2r dr d\theta}{dt^2},$$

on aura

$$P' = \frac{\partial Q}{\partial \theta}.$$

Les valeurs de  $r$ ,  $\varphi$  et  $\theta$  renferment six arbitraires introduites par les intégrations. Considérons trois quelconques de ces arbitraires, que nous désignerons par  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ; l'équation  $M' = \frac{\partial Q}{\partial r}$  donnera les trois suivantes

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} \frac{\partial r}{\partial a} + \frac{\partial^2 Q}{\partial r \partial v} \frac{\partial v}{\partial a} + \frac{\partial^2 Q}{\partial r \partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial a} = \frac{\partial M'}{\partial a},$$

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} \frac{\partial r}{\partial b} + \frac{\partial^2 Q}{\partial r \partial v} \frac{\partial v}{\partial b} + \frac{\partial^2 Q}{\partial r \partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial b} = \frac{\partial M'}{\partial b},$$

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} \frac{\partial r}{\partial c} + \frac{\partial^2 Q}{\partial r \partial v} \frac{\partial v}{\partial c} + \frac{\partial^2 Q}{\partial r \partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial c} = \frac{\partial M'}{\partial c}.$$

On tirera de ces équations la valeur de  $\frac{\partial^2 Q}{\partial r^2}$ , et si l'on fait

$$m = \frac{\partial v}{\partial b} \frac{\partial \theta}{\partial c} - \frac{\partial v}{\partial c} \frac{\partial \theta}{\partial b},$$

$$n = \frac{\partial v}{\partial c} \frac{\partial \theta}{\partial a} - \frac{\partial v}{\partial a} \frac{\partial \theta}{\partial c},$$

$$p = \frac{\partial v}{\partial a} \frac{\partial \theta}{\partial b} - \frac{\partial v}{\partial b} \frac{\partial \theta}{\partial a},$$

$$\varepsilon = \frac{\partial r}{\partial a} \frac{\partial v}{\partial b} \frac{\partial \theta}{\partial c} - \frac{\partial r}{\partial a} \frac{\partial v}{\partial c} \frac{\partial \theta}{\partial b} + \frac{\partial r}{\partial b} \frac{\partial v}{\partial c} \frac{\partial \theta}{\partial a} - \frac{\partial r}{\partial b} \frac{\partial v}{\partial a} \frac{\partial \theta}{\partial c} + \frac{\partial r}{\partial c} \frac{\partial v}{\partial a} \frac{\partial \theta}{\partial b} - \frac{\partial r}{\partial c} \frac{\partial v}{\partial b} \frac{\partial \theta}{\partial a},$$

on aura

$$\varepsilon \frac{\partial^2 Q}{\partial r^2} = m \frac{\partial M'}{\partial a} + n \frac{\partial M'}{\partial b} + p \frac{\partial M'}{\partial c}.$$

Si l'on fait pareillement

$$m' = \frac{\partial r}{\partial c} \frac{\partial \theta}{\partial b} - \frac{\partial r}{\partial b} \frac{\partial \theta}{\partial c},$$

$$n' = \frac{\partial r}{\partial a} \frac{\partial \theta}{\partial c} - \frac{\partial r}{\partial c} \frac{\partial \theta}{\partial a},$$

$$p' = \frac{\partial r}{\partial b} \frac{\partial \theta}{\partial a} - \frac{\partial r}{\partial a} \frac{\partial \theta}{\partial b},$$



l'équation  $N' = \frac{\partial Q}{\partial v}$  donnera

$$\varepsilon \frac{\partial^2 Q}{\partial v^2} = m \frac{\partial N'}{\partial a} + n \frac{\partial N'}{\partial b} + p \frac{\partial N'}{\partial c}.$$

Enfin, si l'on fait

$$m'' = \frac{\partial r}{\partial b} \frac{\partial v}{\partial c} - \frac{\partial r}{\partial c} \frac{\partial v}{\partial b},$$

$$n'' = \frac{\partial r}{\partial c} \frac{\partial v}{\partial a} - \frac{\partial r}{\partial a} \frac{\partial v}{\partial c},$$

$$p'' = \frac{\partial r}{\partial a} \frac{\partial v}{\partial b} - \frac{\partial r}{\partial b} \frac{\partial v}{\partial a},$$

l'équation  $P' = \frac{\partial Q}{\partial \theta}$  donnera

$$\varepsilon \frac{\partial^2 Q}{\partial \theta^2} = m'' \frac{\partial P'}{\partial a} + n'' \frac{\partial P'}{\partial b} + p'' \frac{\partial P'}{\partial c}.$$

L'équation (F) deviendra ainsi

$$G \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 = mr^2 \cos^2 \theta \frac{\partial M'}{\partial a} + nr^2 \cos^2 \theta \frac{\partial M'}{\partial b} + pr^2 \cos^2 \theta \frac{\partial M'}{\partial c} \\ + m' \frac{\partial N'}{\partial a} + n' \frac{\partial N'}{\partial b} + p' \frac{\partial N'}{\partial c} \\ + m'' \cos^2 \theta \frac{\partial P'}{\partial a} + n'' \cos^2 \theta \frac{\partial P'}{\partial b} + p'' \cos^2 \theta \frac{\partial P'}{\partial c} \\ + \varepsilon (2rM' \cos^2 \theta - P' \sin \theta \cos \theta). \end{array} \right.$$

Dans la théorie de la Lune, on néglige les perturbations que son action produit dans le mouvement relatif du Soleil autour de la Terre, ce qui revient à regarder sa masse comme infiniment petite. Alors les variables  $x', y', z'$ , relatives au Soleil, sont indépendantes de  $x, y, z$ , et l'équation (G) a lieu dans cette théorie; il faut donc que les valeurs trouvées pour  $r, v$  et  $\theta$  y satisfassent, ce qui donne un moyen de vérifier ces valeurs. Si les inégalités observées dans le mouvement de la Lune sont le résultat de l'attraction mutuelle de ces trois corps, le Soleil, la Terre et la Lune, il faut que les valeurs de  $r, v$  et  $\theta$ , tirées des observations, satisfassent à l'équation (G), ce qui donne un moyen de véri-

fier la théorie de la pesanteur universelle; car les longitudes moyennes de la Lune, de son périée et de son nœud ascendant entrent dans ces valeurs, et l'on peut prendre pour  $a, b, c$  ces longitudes.

Pareillement, si, dans la théorie des planètes, on néglige le carré des forces perturbatrices, ce qui est presque toujours permis, alors, dans la théorie de la planète dont les coordonnées sont  $x, y, z$ , on peut supposer que les coordonnées  $x', y', z', x'', \dots$  des autres planètes sont relatives à leur mouvement elliptique, et par conséquent indépendantes de  $x, y, z$ ; l'équation (G) a donc encore lieu dans cette théorie.

15. Les équations différentielles du numéro précédent,

$$(H) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 r}{dt^2} - r \frac{dv^2}{dt^2} \cos^2 \theta - r \frac{d\theta^2}{dt^2} = \frac{\partial Q}{\partial r}, \\ \frac{d}{dt} \left( r^2 \frac{dv}{dt} \cos^2 \theta \right) = \frac{\partial Q}{\partial v}, \\ r^2 \frac{d^2 \theta}{dt^2} + r^2 \frac{dv^2}{dt^2} \sin \theta \cos \theta + 2r \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} = \frac{\partial Q}{\partial \theta}, \end{array} \right.$$

ne sont qu'une combinaison des équations différentielles (i) du même numéro, mais elles sont plus commodes et plus adaptées aux usages astronomiques. On peut leur donner d'autres formes qui peuvent être utiles dans diverses circonstances.

Au lieu des variables  $r$  et  $\theta$ , considérons celles-ci  $u$  et  $s$ ,  $u$  étant égal à  $\frac{1}{r \cos \theta}$  ou à l'unité divisée par la projection du rayon vecteur sur le plan des  $x$  et des  $y$ , et  $s$  étant égal à  $\tan \theta$  ou à la tangente de la latitude de  $m$  au-dessus du même plan. Si l'on multiplie la seconde des équations (H) par  $r^2 dv \cos^2 \theta$ , et qu'ensuite on l'intègre, on aura

$$\left( \frac{dv}{u^2 dt} \right)^2 = h^2 + 2 \int \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv}{u^2},$$

$h$  étant une constante arbitraire; on a donc

$$dt = \frac{dv}{u^2 \sqrt{h^2 + 2 \int \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv}{u^2}}}.$$



Si l'on ajoute la première des équations (H), multipliée par  $-\cos\theta$ , à la troisième, multipliée par  $\frac{\sin\theta}{r}$ , on aura

$$-\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{1}{u} \frac{dv^2}{dt^2} = u^2 \frac{\partial Q}{\partial u} + us \frac{\partial Q}{\partial s},$$

d'où l'on tire

$$d \frac{du}{u^2 dt} + \frac{dv^2}{u dt^2} = u^2 dt \left( \frac{\partial Q}{\partial u} + \frac{s}{u} \frac{\partial Q}{\partial s} \right).$$

En substituant pour  $dt$  sa valeur précédente et regardant  $dv$  comme constant, on aura

$$0 = \frac{d^2 u}{dv^2} + u + \frac{\frac{\partial Q}{\partial v} \frac{du}{u^2 dv} - \frac{\partial Q}{\partial u} \frac{s}{u} \frac{\partial Q}{\partial s}}{h^2 + 2 \int \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv}{u^2}}.$$

La troisième des équations (H) deviendra de la même manière, en y traitant  $dv$  comme constant,

$$0 = \frac{d^2 s}{dv^2} + s + \frac{\frac{ds}{dv} \frac{\partial Q}{\partial v} - (1+s^2) \frac{\partial Q}{\partial s} - us \frac{\partial Q}{\partial u}}{u^2 \left( h^2 + 2 \int \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv}{u^2} \right)}.$$

On aura donc, au lieu des trois équations différentielles (H), les suivantes

$$(K) \begin{cases} dt = \frac{dv}{u^2 \sqrt{h^2 + 2 \int \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv}{u^2}}}, \\ 0 = \frac{d^2 u}{dv^2} + u + \frac{\frac{\partial Q}{\partial v} \frac{du}{u^2 dv} - \frac{\partial Q}{\partial u} \frac{s}{u} \frac{\partial Q}{\partial s}}{h^2 + 2 \int \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv}{u^2}}, \\ 0 = \frac{d^2 s}{dv^2} + s + \frac{\frac{ds}{dv} \frac{\partial Q}{\partial v} - us \frac{\partial Q}{\partial u} - (1+s^2) \frac{\partial Q}{\partial s}}{u^2 \left( h^2 + 2 \int \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv}{u^2} \right)}. \end{cases}$$

Si l'on veut éviter les fractions et les radicaux, on pourra donner à ces

équations la forme suivante

$$(L) \begin{cases} 0 = \frac{d^2 t}{dv^2} + \frac{2 du dt}{u dv^2} + u^2 \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv^2}{dv^2}, \\ 0 = \left( \frac{d^2 u}{dv^2} + u \right) \left( 1 + \frac{2}{h^2} \int \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv}{u^2} \right) + \frac{1}{h^2} \left( \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{du}{u^2 dv} - \frac{\partial Q}{\partial u} \frac{s}{u} \frac{\partial Q}{\partial s} \right), \\ 0 = \left( \frac{d^2 s}{dv^2} + s \right) \left( 1 + \frac{2}{h^2} \int \frac{\partial Q}{\partial v} \frac{dv}{u^2} \right) + \frac{1}{h^2 u^2} \left[ \frac{ds}{dv} \frac{\partial Q}{\partial v} - us \frac{\partial Q}{\partial u} - (1+s^2) \frac{\partial Q}{\partial s} \right]. \end{cases}$$

En employant d'autres coordonnées, on formerait de nouveaux systèmes d'équations différentielles : supposons, par exemple, que l'on change les coordonnées  $x$  et  $y$  des équations (i) du n° 14 en d'autres relatives à deux axes mobiles situés sur le plan de ces coordonnées, et dont le premier indique la longitude moyenne du corps  $m$ , tandis que le second lui est perpendiculaire. Soient  $x$ , et  $y$ , les coordonnées de  $m$  relativement à ces axes, et désignons par  $nt + \epsilon$  la longitude moyenne de  $m$  ou l'angle que l'axe mobile des  $x$ , fait avec l'axe des  $x$ ; on aura

$$x = x \cos(nt + \epsilon) - y \sin(nt + \epsilon), \quad y = x \sin(nt + \epsilon) + y \cos(nt + \epsilon),$$

d'où l'on tire, en supposant  $dt$  constant,

$$d^2 x \cos(nt + \epsilon) + d^2 y \sin(nt + \epsilon) = d^2 x, = n^2 x, dt^2 - 2n dy, dt,$$

$$d^2 y \cos(nt + \epsilon) - d^2 x \sin(nt + \epsilon) = d^2 y, = n^2 y, dt^2 + 2n dx, dt.$$

En substituant dans  $Q$ , au lieu de  $x$  et de  $y$ , leurs valeurs précédentes, on aura

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial x} \cos(nt + \epsilon) - \frac{\partial Q}{\partial y} \sin(nt + \epsilon),$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \sin(nt + \epsilon) + \frac{\partial Q}{\partial y} \cos(nt + \epsilon).$$

Cela posé, les équations différentielles (i) donneront les trois suivantes

$$(M) \begin{cases} 0 = \frac{d^2 x}{dt^2} - n^2 x, - 2n \frac{dy}{dt} - \frac{\partial Q}{\partial x}, \\ 0 = \frac{d^2 y}{dt^2} - n^2 y, + 2n \frac{dx}{dt} - \frac{\partial Q}{\partial y}, \\ 0 = \frac{d^2 z}{dt^2} - \frac{\partial Q}{\partial z}. \end{cases}$$



Après avoir donné les équations différentielles du mouvement d'un système de corps soumis à leur attraction mutuelle, et après en avoir déterminé les seules intégrales exactes que l'on ait pu obtenir jusqu'à présent, il nous reste à intégrer ces équations par des approximations successives. Dans le système solaire, les corps célestes se meuvent à peu près comme s'ils n'obéissaient qu'à la force principale qui les anime, et les forces perturbatrices sont peu considérables; on peut donc, dans une première approximation, ne considérer que l'action mutuelle de deux corps, savoir, celle d'une planète ou d'une comète et du Soleil dans la théorie des planètes et des comètes, et l'action mutuelle d'un satellite et de sa planète dans la théorie des satellites. Nous commencerons ainsi par donner une détermination rigoureuse du mouvement de deux corps qui s'attirent : cette première approximation nous conduira à une seconde dans laquelle nous aurons égard à la première puissance des forces perturbatrices; ensuite nous considérerons les carrés et les produits de ces forces; en continuant ainsi, nous déterminerons les mouvements célestes avec toute la précision que les observations comportent.

## CHAPITRE III.

PREMIÈRE APPROXIMATION DES MOUVEMENTS CÉLESTES, OU THÉORIE  
DU MOUVEMENT ELLIPTIQUE.

16. Nous avons déjà fait voir, dans le premier Chapitre, qu'un corps attiré vers un point fixe par une force réciproque au carré de la distance décrit une section conique; or, dans le mouvement relatif du corps  $m$  autour de  $M$ , ce dernier corps étant considéré comme en repos, il faut transporter en sens contraire à  $m$  l'action que  $m$  exerce sur  $M$ ; ainsi, dans ce mouvement relatif,  $m$  est sollicité vers  $M$  par une force égale à la somme des masses  $M$  et  $m$  divisée par le carré de leur distance; le corps  $m$  décrit donc une section conique autour de  $M$ . Mais l'importance de cet objet dans la théorie du système du monde exige que nous le reprenions sous de nouveaux points de vue.

Pour cela, considérons les équations (K) du n° 15. Si l'on fait  $M + m = \mu$ , il est visible, par le n° 14, qu'en n'ayant égard qu'à l'action réciproque de  $M$  et de  $m$ ,  $Q$  est égal à  $\frac{\mu}{r}$  ou à  $\frac{\mu u}{\sqrt{1-s^2}}$ ; les équations (K) deviennent ainsi

$$\begin{aligned} dt &= \frac{dv}{hu^2}, \\ 0 &= \frac{d^2 u}{dt^2} + u - \frac{\mu}{h^2(1-s^2)^{\frac{3}{2}}}, \\ 0 &= \frac{d^2 s}{dt^2} + s. \end{aligned}$$

L'aire décrite pendant l'élément de temps  $dt$  par la projection du rayon



vecteur étant égale à  $\frac{1}{2} \frac{dv}{u^2}$ , la première de ces équations nous apprend que cette aire est proportionnelle à cet élément, et qu'ainsi, dans un temps fini, elle est proportionnelle au temps. La dernière équation donne, en l'intégrant,

$$s = \gamma \sin(v - \varpi),$$

$\gamma$  et  $\theta$  étant deux arbitraires. Enfin la seconde donne par son intégration

$$u = \frac{\mu}{h^2(1+\gamma^2)} [\sqrt{1+s^2} + e \cos(v-\varpi)] = \frac{\sqrt{1+s^2}}{r},$$

$e$  et  $\sigma$  étant deux nouvelles arbitraires. En substituant dans cette expression de  $u$ , au lieu de  $s$ , sa valeur en  $v$ , et substituant ensuite cette expression dans l'équation  $dt = \frac{dv}{hu^2}$ , l'intégrale de cette équation donnera  $t$  en fonction de  $v$ ; on aura donc ainsi  $v$ ,  $u$  et  $s$  en fonction du temps.

On peut simplifier considérablement ce calcul, en observant que la valeur de  $s$  indique que l'orbite est toute dans un plan dont  $\gamma$  est la tangente d'inclinaison sur le plan fixe, et dont  $\theta$  est la longitude du nœud, comptée de l'origine de l'angle  $v$ . En rapportant donc à ce plan le mouvement de  $m$ , on aura  $s = 0$  et  $\gamma = 0$ , ce qui donne

$$u = \frac{1}{r} = \frac{\mu}{h^2} [1 + e \cos(v - \varpi)].$$

Cette équation est à une ellipse dans laquelle l'origine des  $r$  est au foyer;  $\frac{h^2}{\mu(1-e^2)}$  est le demi-grand axe, que nous désignerons par  $a$ ;  $e$  est le rapport de l'excentricité au demi-grand axe; enfin  $\varpi$  est la longitude du périhélie. L'équation  $dt = \frac{dv}{hu^2}$  devient ainsi

$$dt = \frac{a^3(1-e^2)^{\frac{3}{2}} dv}{\sqrt{\mu} [1 + e \cos(v - \varpi)]^2}.$$

Développons le second membre de cette équation dans une série de

cosinus de l'angle  $v - \varpi$  et de ses multiples. Pour cela, nous commencerons par développer  $\frac{1}{1 + e \cos(v - \varpi)}$  dans une série semblable. Si l'on fait

$$\lambda = \frac{e}{1 + \sqrt{1 - e^2}},$$

on aura

$$\frac{1}{1 + e \cos(v - \varpi)} = \frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} \left( \frac{1}{1 + \lambda e^{(v-\varpi)\sqrt{-1}}} - \frac{\lambda e^{-(v-\varpi)\sqrt{-1}}}{1 + \lambda e^{-(v-\varpi)\sqrt{-1}}} \right),$$

$e$  étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. En développant le second membre de cette équation en série, savoir, le premier terme relativement aux puissances de  $e^{(v-\varpi)\sqrt{-1}}$ , et le second terme relativement aux puissances de  $e^{-(v-\varpi)\sqrt{-1}}$ , et en substituant ensuite, au lieu des exponentielles imaginaires, leurs expressions en sinus et cosinus, on trouvera

$$\frac{1}{1 + e \cos(v - \varpi)} = \frac{1}{\sqrt{1 - e^2}} [1 - 2\lambda \cos(v - \varpi) + 2\lambda^2 \cos 2(v - \varpi) - 2\lambda^3 \cos 3(v - \varpi) + \dots].$$

Nommons  $\varphi$  le second membre de cette équation, et faisons  $q = \frac{1}{e}$ ; nous aurons généralement

$$\frac{1}{[1 + e \cos(v - \varpi)]^{m+1}} = \pm \frac{e^{-m-1} d^m \frac{q}{m}}{1.2.3 \dots m dq^m},$$

$dq$  étant supposé constant, et les signes  $+$  ou  $-$  ayant lieu, suivant que  $m$  est pair ou impair. De là il est aisé de conclure que, si l'on fait

$$\frac{1}{[1 + e \cos(v - \varpi)]^2} = (1 - e^2)^{-\frac{3}{2}} [1 + E^{(1)} \cos(v - \varpi) + E^{(2)} \cos 2(v - \varpi) + E^{(3)} \cos 3(v - \varpi) + \dots],$$

on aura, quel que soit  $i$ ,

$$E^{(i)} = \pm \frac{2e^i (1 + i\sqrt{1 - e^2})}{(1 + \sqrt{1 - e^2})^i},$$

le signe  $+$  ayant lieu si  $i$  est pair, et le signe  $-$  ayant lieu si  $i$  est



impair; en supposant donc  $n = a^{-\frac{3}{2}}\sqrt{\mu}$ , on aura

$$ndt = dv[1 + E^{(1)} \cos(v - \varpi) + E^{(2)} \cos 2(v - \varpi) + E^{(3)} \cos 3(v - \varpi) + \dots],$$

et, en intégrant,

$$nt + \varepsilon = v + E^{(1)} \sin(v - \varpi) + \frac{1}{2} E^{(2)} \sin 2(v - \varpi) + \frac{1}{3} E^{(3)} \sin 3(v - \varpi) + \dots,$$

$\varepsilon$  étant une arbitraire. Cette expression de  $nt + \varepsilon$  est fort convergente lorsque les orbites sont peu excentriques, telles que les orbites des planètes et des satellites; et l'on peut, par le retour des suites, en conclure la valeur de  $v$  en  $t$ : nous nous occuperons de cet objet dans les numéros suivants.

Lorsque la planète revient au même point de son orbite,  $v$  est augmenté de la circonférence, que nous représenterons toujours par  $2\pi$ ; en nommant donc  $T$  le temps d'une révolution, on aura

$$T = \frac{2\pi}{n} = \frac{2\pi a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\mu}}.$$

Cette expression de  $T$  peut être immédiatement déduite de l'expression différentielle de  $dt$ , sans recourir aux séries. Reprenons, en effet, l'équation  $dt = \frac{dv}{hu^2}$ , ou  $dt = \frac{r^2 dv}{h}$ . Elle donne  $T = \frac{\int r^2 dv}{h}$ ;  $\int r^2 dv$  est le double de la surface de l'ellipse, et par conséquent il est égal à  $2\pi a^2 \sqrt{1 - e^2}$ ; de plus,  $h^2$  est égal à  $\mu a(1 - e^2)$ ; on aura ainsi la même expression de  $T$  que ci-dessus.

Si l'on néglige les masses des planètes relativement à celle du Soleil, on a  $\sqrt{\mu} = \sqrt{M}$ ; la valeur de  $\sqrt{\mu}$  est alors la même pour toutes les planètes;  $T$  est donc proportionnel alors à  $a^{\frac{3}{2}}$ , et par conséquent les carrés des temps des révolutions sont comme les cubes des grands axes des orbites. On voit que la même loi a lieu dans le mouvement des satellites autour de leur planète, en négligeant leurs masses relativement à celle de la planète.

17. On peut encore intégrer de cette manière les équations du mouvement de deux corps  $M$  et  $m$ , qui s'attirent en raison réciproque du carré des distances. Reprenons les équations (1), (2) et (3) du n° 9; elles deviennent, en ne considérant que l'action des deux corps  $M$  et  $m$ , et faisant  $M + m = \mu$ ,

$$(0) \quad \begin{cases} 0 = \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\mu x}{r^3}, \\ 0 = \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{\mu y}{r^3}, \\ 0 = \frac{d^2z}{dt^2} + \frac{\mu z}{r^3}. \end{cases}$$

Les intégrales de ces équations donneront, en fonction du temps  $t$ , les trois coordonnées  $x, y, z$  du corps  $m$ , rapportées au centre de  $M$ ; on aura ensuite, par le n° 9, les coordonnées  $\zeta, \Pi$  et  $\gamma$  du corps  $M$ , rapportées à un point fixe, au moyen des équations

$$\zeta = a + bt - \frac{mx}{M+m}, \quad \Pi = a' + b't - \frac{my}{M+m}, \quad \gamma = a'' + b''t - \frac{mz}{M+m}.$$

Enfin, on aura les coordonnées de  $m$  par rapport au même point fixe, en ajoutant  $x$  à  $\zeta$ ,  $y$  à  $\Pi$ , et  $z$  à  $\gamma$ ; on aura ainsi le mouvement relatif des corps  $M$  et  $m$  et leur mouvement absolu dans l'espace. Tout se réduit donc à intégrer les équations différentielles (0).

Pour cela, nous observerons que, si l'on a, entre les  $n$  variables  $x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}, \dots, x^{(n)}$ , et la variable  $t$  dont la différence est supposée constante, un nombre  $n$  d'équations différentielles données par la suivante

$$0 = \frac{d^s x^{(s)}}{dt^s} + A \frac{d^{s-1} x^{(s)}}{dt^{s-1}} + B \frac{d^{s-2} x^{(s)}}{dt^{s-2}} + \dots + H x^{(s)},$$

dans laquelle on suppose  $s$  successivement égal à 1, 2, 3, ...,  $n$ ; A, B, ..., H étant des fonctions des variables  $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots$  et de  $t$ , symétriques par rapport aux variables  $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}$ , c'est-à-dire telles qu'elles restent les mêmes lorsque l'on y change une quelconque de



ces variables dans une autre et réciproquement, on peut supposer

$$\begin{aligned} x^{(1)} &= a^{(1)}x^{(n-i+1)} + b^{(1)}x^{(n-i+2)} + \dots + h^{(1)}x^{(n)}, \\ x^{(2)} &= a^{(2)}x^{(n-i+1)} + b^{(2)}x^{(n-i+2)} + \dots + h^{(2)}x^{(n)}, \\ &\dots\dots\dots \\ x^{(n-i)} &= a^{(n-i)}x^{(n-i+1)} + b^{(n-i)}x^{(n-i+2)} + \dots + h^{(n-i)}x^{(n)}. \end{aligned}$$

$a^{(1)}, b^{(1)}, \dots, h^{(1)}$ ;  $a^{(2)}, b^{(2)}, \dots$  étant des arbitraires dont le nombre est  $i(n-i)$ . Il est clair que ces valeurs satisfont au système proposé des équations différentielles; de plus, elles réduisent ces équations à  $i$  équations différentielles entre les  $i$  variables  $x^{(n-i+1)}, x^{(n-i+2)}, \dots, x^{(n)}$ . Leurs intégrales introduiront  $i^2$  nouvelles arbitraires, qui, réunies aux  $i(n-i)$  précédentes, formeront les  $in$  arbitraires que doit donner l'intégration des équations différentielles proposées.

Si l'on applique ce théorème aux équations (O), on voit que  $z = ax + by$ ,  $a$  et  $b$  étant deux arbitraires. Cette équation est celle d'un plan passant par l'origine des coordonnées; ainsi l'orbite de  $m$  est tout entière dans un même plan.

Les équations (O) donnent

$$(O) \quad \begin{cases} 0 = d\left(r^2 \frac{d^2x}{dt^2}\right) + \mu dx, \\ 0 = d\left(r^2 \frac{d^2y}{dt^2}\right) + \mu dy, \\ 0 = d\left(r^2 \frac{d^2z}{dt^2}\right) + \mu dz. \end{cases}$$

Or, en différentiant deux fois de suite l'équation  $rdr = xdx + ydy + zdz$ , on a

$$r d^2r + 3 dr d^2r = x d^2x + y d^2y + z d^2z + 3(dx d^2x + dy d^2y + dz d^2z),$$

et par conséquent

$$d\left(r^3 \frac{d^2r}{dt^2}\right) = r^2\left(x \frac{d^2x}{dt^2} + y \frac{d^2y}{dt^2} + z \frac{d^2z}{dt^2}\right) + 3r^2\left(dx \frac{d^2x}{dt^2} + dy \frac{d^2y}{dt^2} + dz \frac{d^2z}{dt^2}\right).$$

En substituant dans le second membre de cette équation, au lieu de

$d^2x, d^2y, d^2z$ , leurs valeurs données par les équations (O'), et ensuite, au lieu de  $d^2x, d^2y, d^2z$ , leurs valeurs données par les équations (O), on trouvera

$$0 = d\left(r^3 \frac{d^2r}{dt^2}\right) + \mu dr.$$

Si l'on compare cette équation aux équations (O'), on aura, en vertu du théorème exposé ci-dessus, en considérant  $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}, \frac{dr}{dt}$  comme autant de variables particulières  $x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}, x^{(4)}$ , et  $r$  comme fonction du temps  $t$ ,

$$dr = \lambda dx + \gamma dy,$$

$\lambda, \gamma$  étant des constantes, et, en intégrant,

$$r = \frac{h^2}{\mu} + \lambda x + \gamma y,$$

$\frac{h^2}{\mu}$  étant une constante. Cette équation, combinée avec celles-ci

$$z = ax + by, \quad r^2 = x^2 + y^2 + z^2,$$

donne une équation du second degré, soit en  $x$  et  $y$ , soit en  $x$  et  $z$ , soit en  $y$  et  $z$ ; d'où il suit que les trois projections de la courbe décrite par  $m$  autour de  $M$  sont des lignes du second ordre, et qu'ainsi, cette courbe étant toute dans un même plan, elle est elle-même une ligne du second ordre ou une section conique. Il est facile de s'assurer, par la nature de ce genre de courbes, que, le rayon vecteur  $r$  étant exprimé par une fonction linéaire des coordonnées  $x, y$ , l'origine de ces coordonnées doit être au foyer de la section. Maintenant l'équation

$$r = \frac{h^2}{\mu} + \lambda x + \gamma y$$

donne, en vertu des équations (O),

$$0 = \frac{d^2r}{dt^2} + \mu \frac{r - \frac{h^2}{\mu}}{r^3}.$$



En multipliant cette équation par  $dr$  et en l'intégrant, on aura

$$r^2 \frac{dr^2}{dt^2} - 2\mu r + \frac{\mu r^2}{a} + h^2 = 0,$$

$a$  étant une constante arbitraire. De là on tire

$$dt = \frac{r dr}{\sqrt{\mu} \sqrt{2r - \frac{r^2}{a} - \frac{h^2}{\mu}}};$$

cette équation donnera  $r$  en fonction de  $t$ ; et, comme  $x, y, z$  sont donnés, par ce qui précède, en fonction de  $r$ , on aura les coordonnées de  $m$  en fonction du temps.

18. On peut parvenir à ces diverses équations par la méthode suivante, qui a l'avantage de donner les arbitraires en fonction des coordonnées  $x, y, z$  et de leurs premières différences, ce qui nous sera très-utile dans la suite.

Supposons que  $V = \text{const.}$  soit une intégrale du premier ordre des équations (O),  $V$  étant une fonction de  $x, y, z, \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}$ ; nommons  $x', y', z'$  ces trois dernières quantités. L'équation  $V = \text{const.}$  donnera par sa différentiation

$$0 = \frac{\partial V}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial V}{\partial z} \frac{dz}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x'} \frac{dx'}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y'} \frac{dy'}{dt} + \frac{\partial V}{\partial z'} \frac{dz'}{dt};$$

mais les équations (O) donnent

$$\frac{dx'}{dt} = -\frac{\mu x}{r^3}, \quad \frac{dy'}{dt} = -\frac{\mu y}{r^3}, \quad \frac{dz'}{dt} = -\frac{\mu z}{r^3};$$

on a donc l'équation identique aux différences partielles

$$(I) \quad 0 = x' \frac{\partial V}{\partial x} + y' \frac{\partial V}{\partial y} + z' \frac{\partial V}{\partial z} - \frac{\mu}{r^3} \left( x \frac{\partial V}{\partial x} + y \frac{\partial V}{\partial y} + z \frac{\partial V}{\partial z} \right).$$

Il est clair que toute fonction de  $x, y, z, x', y', z'$  qui, substituée

pour  $V$  dans cette équation, la rend identiquement nulle devient, en l'égalant à une constante arbitraire, une intégrale du premier ordre des équations (O).

Supposons

$$V = U + U' + U'' + \dots,$$

$U$  étant fonction des trois variables  $x, y, z$ ;  $U'$  étant fonction des six variables  $x, y, z, x', y', z'$ , mais du premier ordre relativement à  $x', y', z'$ ;  $U''$  étant fonction des mêmes variables, et du second ordre relativement à  $x', y', z'$ ; et ainsi de suite. Substituons cette valeur dans l'équation (I), et comparons séparément : 1° les termes sans  $x', y', z'$ ; 2° ceux qui renferment la première puissance de ces variables; 3° ceux qui renferment leurs carrés et leurs produits, et ainsi de suite; nous aurons

$$(I) \quad \begin{cases} 0 = x \frac{\partial U'}{\partial x'} + y \frac{\partial U'}{\partial y'} + z \frac{\partial U'}{\partial z'}, \\ x' \frac{\partial U}{\partial x} + y' \frac{\partial U}{\partial y} + z' \frac{\partial U}{\partial z} = \frac{\mu}{r^3} \left( x \frac{\partial U''}{\partial x'} + y \frac{\partial U''}{\partial y'} + z \frac{\partial U''}{\partial z'} \right), \\ x' \frac{\partial U'}{\partial x} + y' \frac{\partial U'}{\partial y} + z' \frac{\partial U'}{\partial z} = \frac{\mu}{r^3} \left( x \frac{\partial U'''}{\partial x'} + y \frac{\partial U'''}{\partial y'} + z \frac{\partial U'''}{\partial z'} \right), \\ x' \frac{\partial U''}{\partial x} + y' \frac{\partial U''}{\partial y} + z' \frac{\partial U''}{\partial z} = \frac{\mu}{r^3} \left( x \frac{\partial U'''}{\partial x'} + y \frac{\partial U'''}{\partial y'} + z \frac{\partial U'''}{\partial z'} \right), \\ \dots \end{cases}$$

L'intégrale de la première de ces équations est, comme l'on sait par la théorie des équations à différences partielles,

$$U' = \text{fonct.}(xy' - yx', xz' - zx', yz' - zy', x, y, z).$$

La valeur de  $U'$  devant être linéaire en  $x', y', z'$ , nous la supposons de cette forme

$$U' = A(xy' - yx') + B(xz' - zx') + C(yz' - zy'),$$

A, B, C étant des constantes arbitraires. Arrêtons ensuite la valeur de  $V$  au terme  $U''$ , en sorte que  $U''$ ,  $U'''$ , ... soient nuls; la troisième des



équations (I) deviendra

$$0 = x' \frac{\partial U'}{\partial x} + y' \frac{\partial U'}{\partial y} + z' \frac{\partial U'}{\partial z}.$$

La valeur précédente de  $U$  satisfait encore à cette équation. La quatrième des équations (I) devient

$$0 = x'' \frac{\partial U''}{\partial x} + y'' \frac{\partial U''}{\partial y} + z'' \frac{\partial U''}{\partial z},$$

équation dont l'intégrale est

$$U'' = \text{fonct.} (xy' - yx', xz' - zx', yz' - zy', x', y', z').$$

Cette fonction doit satisfaire à la seconde des équations (I), et le premier membre de cette équation multipliée par  $dt$  est évidemment égal à  $dU$ ; le second membre doit donc être la différentielle exacte d'une fonction de  $x, y, z$ . Or il est facile de voir que l'on satisfait à la fois à cette condition, à la nature de la fonction  $U''$ , et à la supposition que cette fonction doit être du second ordre en  $x', y', z'$ , en faisant

$$U'' = (Dy' - Ex')(xy' - yx') + (Dz' - Fx')(xz' - zx') \\ + (Ez' - Fy')(yz' - zy') + G(x'^2 + y'^2 + z'^2),$$

D, E, F, G étant des constantes arbitraires, et alors,  $r$  étant égal à  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , on a

$$U = -\frac{\mu}{r} (Dx + Ey + Fz + 2G);$$

on aura donc ainsi les valeurs de  $U, U', U''$ , et l'équation  $V = \text{const.}$  deviendra

$$\text{const.} = -\frac{\mu}{r} (Dx + Ey + Fz + 2G) + (A + Dy' - Ex')(xy' - yx') \\ + (B + Dz' - Fx')(xz' - zx') + (C + Ez' - Fy')(yz' - zy') + G(x'^2 + y'^2 + z'^2).$$

Cette équation satisfait à l'équation (I), et par conséquent aux équations différentielles (O), quelles que soient les arbitraires A, B, C, D,

E, F, G. En les supposant toutes nulles, 1° à l'exception de A, 2° à l'exception de B, 3° à l'exception de C, etc., et restituant  $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}$  au lieu de  $x', y', z'$ , on aura les intégrales

$$(P) \begin{cases} c = \frac{xdy - ydx}{dt}, & c' = \frac{xdz - zdx}{dt}, & c'' = \frac{ydz - zdy}{dt}, \\ 0 = f + x \left( \frac{\mu}{r} - \frac{dy^2 + dz^2}{dt^2} \right) + \frac{ydydx}{dt^2} + \frac{zdzdx}{dt^2}, \\ 0 = f' + y \left( \frac{\mu}{r} - \frac{dx^2 + dz^2}{dt^2} \right) + \frac{xdxdy}{dt^2} + \frac{zdzdy}{dt^2}, \\ 0 = f'' + z \left( \frac{\mu}{r} - \frac{dx^2 + dy^2}{dt^2} \right) + \frac{xdxdz}{dt^2} + \frac{ydydz}{dt^2}, \\ 0 = \frac{\mu}{a} - \frac{2\mu}{r} + \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2}; \end{cases}$$

$c, c', c'', f, f', f''$  et  $a$  étant des constantes arbitraires.

Les équations différentielles (O) ne peuvent avoir que six intégrales distinctes du premier ordre, au moyen desquelles, si l'on élimine les différences  $dx, dy, dz$ , on aura les trois variables  $x, y, z$  en fonction du temps  $t$ ; il faut donc qu'au moins l'une des sept intégrales précédentes rentre dans les six autres. On voit même *a priori* que deux de ces intégrales doivent rentrer dans les cinq autres. En effet, puisque l'élément seul du temps entre dans ces intégrales, elles ne peuvent pas donner les variables  $x, y, z$  en fonction du temps, et par conséquent elles sont insuffisantes pour déterminer complètement le mouvement de  $m$  autour de  $M$ . Examinons comment ces intégrales n'équivalent qu'à cinq intégrales distinctes.

Si l'on multiplie la quatrième des équations (P) par  $\frac{zdy - ydz}{dt}$ , et qu'on l'ajoute à la cinquième multipliée par  $\frac{xdz - zdx}{dt}$ , on aura

$$0 = f \frac{zdy - ydz}{dt} + f' \frac{xdz - zdx}{dt} \\ + z \frac{xdy - ydx}{dt} \left( \frac{\mu}{r} - \frac{dx^2 + dy^2}{dt^2} \right) + \frac{xdy - ydx}{dt} \left( \frac{xdxdz}{dt^2} + \frac{ydydz}{dt^2} \right).$$



En substituant, au lieu de  $\frac{x dy - y dx}{dt}$ ,  $\frac{x dz - z dx}{dt}$ ,  $\frac{y dz - z dy}{dt}$ , leurs valeurs données par les trois premières des équations (P), on aura

$$0 = \frac{f'c' - fc''}{c} + z \left( \frac{\mu}{r} \frac{dx^2 + dy^2}{dt^2} \right) + \frac{x dx dz}{dt^2} + \frac{y dy dz}{dt^2}.$$

Cette équation rentre dans la sixième des intégrales (P), en y faisant  $f'' = \frac{f'c' - fc''}{c}$ , ou  $0 = fc'' - f'c' + f''c$ . Ainsi la sixième des intégrales (P) résulte des cinq premières, et les six arbitraires  $c, c', c'', f, f', f''$  sont liées entre elles par l'équation précédente.

Si l'on prend les carrés des valeurs de  $f, f', f''$ , données par les équations (P), qu'ensuite on les ajoute ensemble, et que, pour abrégér, on fasse  $f^2 + f'^2 + f''^2 = l^2$ , on aura

$$l^2 - \mu^2 = \left[ r^2 \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} - \left( \frac{r dr}{dt} \right)^2 \right] \left( \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} - \frac{2\mu}{r} \right);$$

mais, si l'on carre les valeurs de  $c, c', c''$ , données par les mêmes équations, qu'ensuite on les ajoute, et que l'on fasse  $c^2 + c'^2 + c''^2 = h^2$ , on aura

$$r^2 \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} - \left( \frac{r dr}{dt} \right)^2 = h^2;$$

l'équation précédente devient ainsi

$$0 = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} - \frac{2\mu}{r} + \frac{\mu^2 - l^2}{h^2}.$$

En comparant cette équation à la dernière des équations (P), on aura l'équation de condition

$$\frac{\mu^2 - l^2}{h^2} = \frac{\mu}{a}.$$

La dernière des équations (P) rentre conséquemment dans les six premières, qui n'équivalent elles-mêmes qu'à cinq intégrales distinctes, les sept arbitraires  $c, c', c'', f, f', f''$  et  $a$  étant liées par les deux équations de condition précédentes. De là il résulte que l'on aura l'expres-

sion la plus générale de  $V$  qui satisfasse à l'équation (1), en prenant pour cette expression une fonction arbitraire des valeurs de  $c, c', c'', f$  et  $f'$  données par les cinq premières des équations (P).

19. Quoique ces intégrales soient insuffisantes pour déterminer  $x, y, z$  en fonction du temps, elles déterminent cependant la nature de la courbe décrite par  $m$  autour de  $M$ . En effet, si l'on multiplie la première des équations (P) par  $z$ , la seconde par  $-y$ , et la troisième par  $x$ , on aura, en les ajoutant,

$$0 = cz - c'y + c''x,$$

équation à un plan dont la position dépend des constantes  $c, c', c''$ .

Si l'on multiplie la quatrième des équations (P) par  $x$ , la cinquième par  $y$ , et la sixième par  $z$ , on aura

$$0 = fx + f'y + f''z + \mu r - r^2 \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} + \frac{r^2 dr^2}{dt^2};$$

mais on a, par le numéro précédent,

$$r^2 \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} - \frac{r^2 dr^2}{dt^2} = h^2;$$

partant,

$$0 = \mu r - h^2 + fx + f'y + f''z.$$

Cette équation, combinée avec celles-ci

$$0 = c''x - c'y + cz, \quad r^2 = x^2 + y^2 + z^2,$$

donne l'équation aux sections coniques, l'origine des  $r$  étant au foyer. Les planètes et les comètes décrivent donc à très-peu près, autour du Soleil, des sections coniques dont cet astre occupe un des foyers, et ces astres s'y meuvent de manière que les aires décrites par les rayons vecteurs croissent comme les temps. En effet, si l'on nomme  $dv$  l'angle infiniment petit intercepté par les rayons  $r$  et  $r + dr$ , on aura

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = r^2 dv^2 + dr^2;$$



l'équation

$$r^2 \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} - \frac{r^2 dr^2}{dt^2} = h^2$$

deviendra ainsi  $r^4 dv^2 = h^2 dt^2$ , partant

$$dv = \frac{h dt}{r^2}.$$

On voit par là que l'aire élémentaire  $\frac{1}{2} r^2 dv$ , décrite par le rayon vecteur  $r$ , est proportionnelle à l'élément de temps  $dt$ ; l'aire décrite pendant un temps fini est donc proportionnelle à ce temps. On voit encore que le mouvement angulaire de  $m$  autour de  $M$  est, à chaque point de l'orbite, réciproque au carré du rayon vecteur; et comme on peut, sans erreur sensible, prendre des intervalles de temps très-courts pour des instants infiniment petits, on aura, au moyen de l'équation précédente, les mouvements horaires des planètes et des comètes dans les divers points de leurs orbites.

Les éléments de la section conique décrite par  $m$  sont les constantes arbitraires de son mouvement; ils sont par conséquent fonctions des arbitraires précédentes  $c, c', c'', f, f', f''$  et  $\frac{h}{a}$ ; déterminons ces fonctions. Soit  $\theta$  l'angle que forme avec  $x$  l'intersection du plan de l'orbite avec celui des  $x$  et des  $y$ , intersection que l'on nomme *ligne des nœuds*; soit  $\varphi$  l'inclinaison mutuelle des deux plans. Si l'on nomme  $x'$  et  $y'$  les coordonnées de  $m$ , rapportées à la ligne des nœuds comme axe des abscisses, on aura

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta + y \sin \theta, \\ y' &= y \cos \theta - x \sin \theta. \end{aligned}$$

On a d'ailleurs

$$z = y' \tan \varphi;$$

on aura donc

$$z = y \cos \theta \tan \varphi - x \sin \theta \tan \varphi.$$

En comparant cette équation à celle-ci

$$0 = c'x - c'y + cz,$$

on aura

$$c' = c \cos \theta \tan \varphi,$$

$$c'' = c \sin \theta \tan \varphi,$$

d'où l'on tire

$$\tan \theta = \frac{c''}{c'},$$

$$\tan \varphi = \frac{\sqrt{c'^2 - c''^2}}{c}.$$

Ainsi la position des nœuds et l'inclinaison de l'orbite sont déterminées en fonction des constantes arbitraires  $c, c', c''$ .

Au périhélie, on a

$$r dr = 0, \text{ ou } x dx + y dy + z dz = 0;$$

soient donc  $X, Y, Z$  les coordonnées de la planète à ce point; la quatrième et la cinquième des équations (P) du numéro précédent donneront

$$\frac{Y}{X} = \frac{f'}{f}.$$

Mais si l'on nomme  $I$  la longitude de la projection du périhélie sur le plan des  $x$  et des  $y$ , cette longitude étant comptée de l'axe des  $x$ , on a

$$\frac{Y}{X} = \tan I, \text{ partant } \tan I = \frac{f'}{f},$$

ce qui détermine la position du grand axe de la section conique.

Si de l'équation

$$r^2 \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2} - \frac{r^2 dr^2}{dt^2} = h^2$$

on élimine  $\frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{dt^2}$ , au moyen de la dernière des équations (P),

on aura

$$2\mu r - \frac{\mu r^2}{a} - \frac{r^2 dr^2}{dt^2} = h^2;$$



mais  $dr$  est nul aux extrémités du grand axe; on a donc à ces points

$$0 = r^2 - 2ar + \frac{ah^2}{\mu}.$$

La somme des deux valeurs de  $r$  dans cette équation est le grand axe de la section conique, et leur différence est le double de l'excentricité; ainsi  $a$  est le demi-grand axe de l'orbite ou la distance moyenne de  $m$  à  $M$ , et  $\sqrt{1 - \frac{h^2}{\mu a}}$  est le rapport de l'excentricité au demi-grand axe. Soit  $e$  ce rapport; on a, par le numéro précédent,

$$\frac{\mu}{a} = \frac{\mu^2 - l^2}{h^2};$$

on aura donc  $\mu e = l$ . On connaîtra ainsi tous les éléments qui déterminent la nature de la section conique et sa position dans l'espace.

20. Les trois équations finies trouvées dans le numéro précédent entre  $x$ ,  $y$ ,  $z$  et  $r$  donnent  $x$ ,  $y$ ,  $z$  en fonction de  $r$ ; ainsi, pour avoir ces coordonnées en fonction du temps, il suffit d'avoir le rayon vecteur  $r$  dans une fonction semblable, ce qui exige une nouvelle intégration. Pour cela, reprenons l'équation

$$2\mu r - \frac{\mu r^2}{a} - \frac{r^2 dr^2}{dt^2} = h^2;$$

on a, par le numéro précédent,

$$h^2 = \frac{a}{\mu} (\mu^2 - l^2) = a\mu(1 - e^2);$$

on aura donc

$$dt = \frac{r dr}{\sqrt{\mu} \sqrt{2r - \frac{r^2}{a} - a(1 - e^2)}}.$$

Pour intégrer cette équation, soit  $r = a(1 - e \cos u)$ ; on aura

$$dt = \frac{a^2 du}{\sqrt{\mu}} (1 - e \cos u),$$

d'où l'on tire, en intégrant,

$$(S) \quad t + T = \frac{a^3}{\sqrt{\mu}} (u - e \sin u),$$

$T$  étant une constante arbitraire. Cette équation donne  $u$ , et par conséquent  $r$  en fonction de  $t$ ; et comme  $x$ ,  $y$ ,  $z$  sont donnés en fonction de  $r$ , on aura les valeurs de ces coordonnées pour un instant quelconque.

Nous voilà donc parvenus à intégrer complètement les équations différentielles (O) du n° 17, ce qui a introduit les six arbitraires  $a$ ,  $e$ ,  $l$ ,  $\theta$ ,  $\varphi$  et  $T$ : les deux premières dépendent de la nature de l'orbite, les trois suivantes dépendent de sa position dans l'espace, et la dernière est relative à la position du corps  $m$  à une époque donnée, ou, ce qui revient au même, elle dépend de l'instant de son passage au périhélie.

Rapportons les coordonnées du corps  $m$  à des coordonnées plus commodes pour les usages astronomiques, et pour cela nommons  $v$  l'angle que le rayon vecteur  $r$  fait avec le grand axe, en partant du périhélie; l'équation à l'ellipse sera

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos v}.$$

L'équation  $r = a(1 - e \cos u)$  du numéro précédent indique que  $u$  est nul au périhélie, en sorte que ce point est l'origine des deux angles  $u$  et  $v$ , et il est facile de s'assurer que l'angle  $u$  est formé par le grand axe de l'orbite et par le rayon mené de son centre au point où la circonférence décrite sur le grand axe comme diamètre est rencontrée par l'ordonnée menée du corps  $m$  perpendiculairement sur le grand axe. Cet angle est ce que l'on nomme *anomalie excentrique*, et l'angle  $v$  est l'*anomalie vraie*. En comparant les deux expressions de  $r$ , on a

$$1 - e \cos u = \frac{1 - e^2}{1 - e \cos v},$$

d'où l'on tire

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} v = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \operatorname{tang} \frac{1}{2} u.$$



Si l'on fixe l'origine du temps  $t$  à l'instant même du passage du corps  $m$  par le périhélie,  $T$  sera nul, et, en faisant pour abrégir  $\frac{\sqrt{\mu}}{a^{\frac{3}{2}}} = n$ , on aura  $nt = u - e \sin u$ . En rassemblant ces équations du mouvement de  $m$  autour de  $M$ , on aura

$$(f) \quad \begin{cases} nt = u - e \sin u, \\ r = a(1 - e \cos u), \\ \text{tang} \frac{1}{2} v = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \text{tang} \frac{1}{2} u. \end{cases}$$

l'angle  $nt$  étant ce que l'on nomme *anomalie moyenne*. La première de ces équations donne  $u$  en fonction du temps  $t$ , et les deux autres donneront  $r$  et  $v$ , lorsque  $u$  sera déterminé. L'équation entre  $u$  et  $t$  est transcendante, et ne peut être résolue que par approximation. Heureusement les circonstances des mouvements célestes donnent lieu à des approximations rapides. En effet, les orbites des corps célestes sont ou presque circulaires, ou fort excentriques, et dans ces deux cas on peut déterminer  $u$  en  $t$  par des formules très-convergentes que nous allons développer. Pour cela, nous donnerons sur la réduction des fonctions en séries quelques théorèmes généraux qui nous seront utiles dans la suite.

21. Soit  $u$  une fonction quelconque de  $x$ , que l'on propose de développer par rapport aux puissances de  $x$ . En représentant ainsi cette suite,

$$u = u + \alpha q_1 + \alpha^2 q_2 + \alpha^3 q_3 + \dots + \alpha^n q_n + \alpha^{n+1} q_{n+1} + \dots,$$

$u, q_1, q_2, \dots$  étant des quantités indépendantes de  $x$ , il est clair que  $u$  est ce que devient  $u$  lorsqu'on y suppose  $x = 0$ , et que l'on a, quel que soit  $n$ ,

$$\frac{\partial^n u}{\partial x^n} = 1.2.3 \dots n q_n + 2.3 \dots (n+1) \alpha q_{n+1} + \dots,$$

la différence  $\frac{\partial^n u}{\partial x^n}$  étant prise en faisant varier tout ce qui dans  $u$  doit

varier avec  $x$ . Partant, si l'on suppose après les différentiations  $x = 0$  dans l'expression de  $\frac{\partial^n u}{\partial x^n}$ , on aura

$$q_n = \frac{\partial^n u}{1.2.3 \dots n}.$$

Si  $u$  est fonction des deux quantités  $x$  et  $x'$ , et que l'on propose de le développer par rapport aux puissances et aux produits de  $x$  et de  $x'$ , en représentant ainsi cette suite,

$$u = u + \alpha q_{1,0} + \alpha^2 q_{2,0} + \dots \\ + \alpha' q_{0,1} + \alpha \alpha' q_{1,1} + \dots \\ + \alpha^2 q_{0,2} + \dots \\ + \dots,$$

le coefficient  $q_{n,n'}$  du produit  $x^n x'^{n'}$  sera pareillement égal à

$$\frac{\partial^{n+n'} u}{\partial x^n \partial x'^{n'}} \\ 1.2.3 \dots n.1.2.3 \dots n',$$

$x$  et  $x'$  étant supposés nuls après les différentiations.

En général, si  $u$  est fonction de  $x, x', x'', \dots$ , et qu'en le développant dans une suite ordonnée par rapport aux puissances et aux produits de  $x, x', x'', \dots$ , on représente par  $x^n x'^{n'} x''^{n''} \dots q_{n,n',n'', \dots}$  le terme de cette suite qui a pour facteur le produit  $x^n x'^{n'} x''^{n''} \dots$ , on aura

$$q_{n,n',n'', \dots} = \frac{\partial^{n+n'+n''+\dots} u}{\partial x^n \partial x'^{n'} \partial x''^{n''} \dots} \\ 1.2.3 \dots n.1.2.3 \dots n'.1.2.3 \dots n'' \dots,$$

pourvu que l'on suppose  $x, x', x'', \dots$  nuls après les différentiations.

Supposons maintenant que  $u$  soit fonction de  $x, x', x'', \dots$  et des variables  $t, t', t'', \dots$ ; si, par la nature de cette fonction ou par une équation aux différences partielles qui la représente, on parvient à obtenir

$$\frac{\partial^{n+n'+\dots} u}{\partial x^n \partial x'^{n'} \dots}$$



en fonction de  $u$  et de ses différences prises par rapport à  $t, t', \dots$ ; en nommant  $F$  cette fonction lorsqu'on y change  $u$  dans  $u$ ,  $u$  étant ce que devient  $u$  lorsqu'on y suppose  $x, x', \dots$  égaux à zéro, il est visible que l'on aura  $q_{n, n', \dots}$ , en divisant  $F$  par le produit  $1.2.3 \dots n.1.2.3 \dots n' \dots$ ; on aura donc la loi de la série dans laquelle  $u$  est développé.

Soit d'abord  $u$  égal à une fonction quelconque de  $t + x, t' + x', t'' + x'', \dots$ , que nous désignerons par  $\varphi(t + x, t' + x', t'' + x'', \dots)$ ; dans ce cas, la différence quelconque  $i^{\text{ième}}$  de  $u$ , prise par rapport à  $x$  et divisée par  $dx^i$ , est évidemment égale à cette même différence prise par rapport à  $t$  et divisée par  $dt^i$ . La même égalité a lieu entre les différences prises par rapport à  $x'$  et  $t'$ , ou par rapport à  $x''$  et  $t''$ , etc.; d'où il suit que l'on a généralement

$$\frac{\partial^{n+n'+n''+\dots} u}{\partial x^n \partial x'^n \partial x''^n \dots} = \frac{\partial^{n+n'+n''+\dots} u}{\partial t^n \partial t'^n \partial t''^n \dots}$$

En changeant dans le second membre de cette équation  $u$  en  $u$ , c'est-à-dire en  $\varphi(t, t', t'', \dots)$ , on aura, par ce qui précède,

$$q_{n, n', n'', \dots} = \frac{\frac{\partial^{n+n'+n''+\dots} \varphi(t, t', t'', \dots)}{\partial t^n \partial t'^n \partial t''^n \dots}}{1.2.3 \dots n.1.2.3 \dots n'.1.2.3 \dots n'' \dots}$$

Si  $u$  est seulement fonction de  $t + x$ , on aura

$$q_n = \frac{d^n \varphi(t)}{1.2.3 \dots n dt^n}$$

partant

$$(i) \quad \varphi(t+x) = \varphi(t) + x \frac{d\varphi(t)}{dt} + \frac{x^2}{1.2} \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} + \frac{x^3}{1.2.3} \frac{d^3\varphi(t)}{dt^3} + \dots$$

Supposons ensuite que  $u$ , au lieu d'être donné immédiatement en  $x$  et  $t$  comme dans le cas précédent, soit une fonction de  $x$ ,  $x$  étant donné par l'équation aux différences partielles  $\frac{\partial x}{\partial z} = z \frac{\partial x}{\partial t}$ , dans laquelle  $z$  est une fonction quelconque de  $x$ . Pour réduire  $u$  dans une suite ordonnée par rapport aux puissances de  $x$ , il faut déterminer la valeur de  $\frac{\partial^n u}{\partial x^n}$

dans le cas de  $x=0$ ; or on a, en vertu de l'équation proposée aux différences partielles,

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial z} = z \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t};$$

on aura donc

$$(k) \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial \cdot f z du}{dt}$$

En différenciant cette équation par rapport à  $x$ , on aura

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \cdot f z du}{\partial x \partial t};$$

or l'équation (k) donne, en y changeant  $u$  en  $fz du$ ,

$$\frac{\partial \cdot f z du}{\partial x} = \frac{\partial \cdot f z^2 du}{\partial t};$$

partant,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \cdot f z^2 du}{\partial t^2}$$

En différenciant encore par rapport à  $x$ , on aura

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = \frac{\partial^3 \cdot f z^2 du}{\partial x \partial t^2};$$

or l'équation (k) donne, en y changeant  $u$  en  $fz^2 du$ ,

$$\frac{\partial \cdot f z^2 du}{\partial x} = \frac{\partial \cdot f z^3 du}{\partial t};$$

partant,

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} = \frac{\partial^3 \cdot f z^3 du}{\partial t^3}$$

En suivant ce procédé, il est aisé d'en conclure généralement

$$\frac{\partial^n u}{\partial x^n} = \frac{\partial^n \cdot f z^n du}{\partial t^n} = \frac{\partial^{n-1} \cdot z^n \frac{\partial u}{\partial t}}{\partial t^{n-1}}$$

Supposons maintenant qu'en faisant  $x=0$  on ait  $x=T$ ,  $T$  étant



une fonction de  $t$ ; on substituera cette valeur de  $x$  dans  $z$  et dans  $u$ . Soient  $Z$  et  $u$  ce que deviennent alors ces quantités; on aura, dans la supposition de  $\alpha = 0$ ,

$$\frac{\partial^n u}{\partial z^n} = \frac{d^{n-1} Z^n \frac{du}{dt}}{dt^{n-1}},$$

et par conséquent on aura, par ce qui précède,

$$q^n = \frac{d^{n-1} Z^n \frac{du}{dt}}{1.2.3 \dots n dt^{n-1}},$$

ce qui donne

$$(p) \quad u = u + \alpha Z \frac{du}{dt} + \frac{\alpha^2}{1.2} \frac{d.Z \frac{du}{dt}}{dt} + \frac{\alpha^3}{1.2.3} \frac{d^2.Z \frac{du}{dt}}{dt^2} + \dots$$

Il ne s'agit plus maintenant que de déterminer la fonction de  $t$  et de  $\alpha$  que  $x$  représente, en intégrant l'équation aux différences partielles

$$\frac{\partial x}{\partial z} = z \frac{\partial x}{\partial t}. \quad \text{Pour cela, on observera que}$$

$$dx = \frac{\partial x}{\partial t} dt + \frac{\partial x}{\partial z} dz;$$

en substituant, au lieu de  $\frac{\partial x}{\partial z}$ , sa valeur  $z \frac{\partial x}{\partial t}$ , on aura

$$dx = \frac{\partial x}{\partial t} (dt + z dz) = \frac{\partial x}{\partial t} \left[ d(t + \alpha z) - \alpha \frac{\partial z}{\partial x} dx \right];$$

on aura donc

$$dx = \frac{\frac{\partial x}{\partial t} d(t + \alpha z)}{1 - \alpha \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t}},$$

ce qui donne, en intégrant,  $x = \varphi(t + \alpha z)$ ,  $\varphi(t + \alpha z)$  étant une fonction arbitraire de  $t + \alpha z$ , en sorte que la quantité que nous avons nommée  $T$  est égale à  $\varphi(t)$ . Ainsi, toutes les fois que l'on aura entre  $x$  et  $z$  une équation réductible à cette forme  $x = \varphi(t + \alpha z)$ , la valeur

de  $u$  sera donnée par la formule (p), dans une suite ordonnée par rapport aux puissances de  $\alpha$ .

Supposons maintenant que  $u$  soit une fonction des deux variables  $x$  et  $x'$ , ces variables étant données par les équations aux différences partielles

$$\frac{\partial x}{\partial z} = z \frac{\partial x}{\partial t}, \quad \frac{\partial x'}{\partial z} = z' \frac{\partial x'}{\partial t},$$

dans lesquelles  $z$  et  $z'$  sont fonctions quelconques de  $x$  et  $x'$ . Il est facile de s'assurer que les intégrales de ces équations sont

$$x = \varphi(t + \alpha z), \quad x' = \psi(t' + \alpha' z'),$$

$\varphi(t + \alpha z)$  et  $\psi(t' + \alpha' z')$  étant des fonctions arbitraires, l'une de  $t + \alpha z$ , et l'autre de  $t' + \alpha' z'$ . On a de plus

$$\frac{\partial u}{\partial z} = z \frac{\partial u}{\partial t}, \quad \frac{\partial u}{\partial z'} = z' \frac{\partial u}{\partial t'}.$$

Cela posé, si l'on conçoit  $x'$  éliminé de  $u$  et de  $z$  au moyen de l'équation  $x' = \psi(t' + \alpha' z')$ ,  $u$  et  $z$  deviendront des fonctions de  $x$ ,  $\alpha'$  et  $t'$ , sans  $\alpha$  ni  $t$ ; on aura donc, par ce qui précède,

$$\frac{\partial^n u}{\partial z^n} = \frac{\partial^{n-1} z^n \frac{\partial u}{\partial t}}{dt^{n-1}}.$$

Si l'on suppose  $\alpha = 0$  après les différentiations, et si, de plus, on fait dans le second membre de cette équation  $x = \varphi(t + \alpha z^n)$ , et par conséquent  $\frac{\partial u}{\partial z} = z^n \frac{\partial u}{\partial t}$ , on aura dans ces suppositions

$$\frac{\partial^n u}{\partial z^n} = \frac{\partial^{n-1} \frac{\partial u}{\partial z}}{\partial t^{n-1}},$$

et par conséquent

$$\frac{\partial^{n+n'} u}{\partial z^n \partial \alpha'^{n'}} = \frac{\frac{\partial^{n-1} \frac{\partial u}{\partial z}}{\partial \alpha'^{n'}}}{\partial t^{n-1}}.$$





On aura pareillement

$$\frac{\partial^{n'} u}{\partial x^{n'}} = \frac{\partial^{n'-1}}{\partial t^{n'-1}} \frac{\partial u}{\partial x'}$$

en supposant  $x'$  nul après les différentiations, et en supposant de plus, dans le second membre de cette équation,  $x' = \psi(t + \alpha' z'^{n'})$ ; on aura donc

$$\frac{\partial^{n+n'} u}{\partial x^n \partial x'^{n'}} = \frac{\partial^{n+n'-2}}{\partial t^{n-1} \partial t'^{n'-1}} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x'}$$

pourvu que l'on fasse  $x$  et  $x'$  nuls après les différentiations, et que, de plus, on suppose dans le second membre de cette équation

$$x = \varphi(t + \alpha z^n), \quad x' = \psi(t' + \alpha' z'^{n'})$$

ce qui revient à supposer dans ce second membre, comme dans le premier,

$$x = \varphi(t + \alpha z), \quad x' = \psi(t' + \alpha' z')$$

et à changer, dans la différence partielle  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x'}$ , de ce second membre,  $z$  en  $z^n$  et  $z'$  en  $z'^{n'}$ . On aura ainsi dans ces suppositions, et en changeant de plus  $z$  en  $Z$ ,  $z'$  en  $Z'$ , et  $u$  en  $u$ ,

$$q_{n, n'} = \frac{\partial^{n+n'-2}}{1.2.3 \dots n.1.2.3 \dots n'. \partial t^{n-1} \partial t'^{n'-1}} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x'}$$

En suivant ce raisonnement, il est facile d'en conclure que, si l'on a les  $r$  équations

$$\begin{aligned} x &= \varphi(t + \alpha z), \\ x' &= \psi(t' + \alpha' z'), \\ x'' &= \Pi(t'' + \alpha'' z''), \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

$z, z', z'', \dots$  étant des fonctions quelconques de  $x, x', x'', \dots$  et si l'on

suppose  $u$  fonction des mêmes variables, on aura généralement

$$q_{n, n', n'', \dots} = \frac{\partial^{n+n'+n''+\dots-r} u}{1.2.3 \dots n.1.2.3 \dots n'.1.2.3 \dots n''. \dots \partial t^{n-1} \partial t'^{n'-1} \partial t''^{n''-1} \dots}$$

pourvu que, dans la différence partielle  $\frac{\partial^r u}{\partial x \partial x' \partial x'' \dots}$ , on change  $x$  en  $z^n$ ,  $z'$  en  $z'^{n'}$ ,  $\dots$ , et qu'ensuite on change  $z$  en  $Z$ ,  $z'$  en  $Z'$ ,  $z''$  en  $Z''$ ,  $\dots$  et  $u$  en  $u$ .

S'il n'y a qu'une variable  $x$ , on aura

$$\frac{\partial u}{\partial x} = z \frac{\partial u}{\partial t}; \quad \text{partant} \quad q_n = \frac{\partial^{n-1} Z^n \frac{\partial u}{\partial t}}{1.2.3 \dots n. \partial t^{n-1}}$$

S'il y a deux variables  $x$  et  $x'$ , on aura

$$\frac{\partial u}{\partial x} = z \frac{\partial u}{\partial t};$$

en différenciant cette équation par rapport à  $x'$ , on aura

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x'} = \frac{\partial z}{\partial x'} \frac{\partial u}{\partial t} + z \frac{\partial^2 u}{\partial x' \partial t}$$

or on a  $\frac{\partial u}{\partial x'} = z' \frac{\partial u}{\partial t'}$ , et, en changeant dans cette équation  $u$  en  $z$ , on a

$$\frac{\partial z}{\partial x'} = z' \frac{\partial z}{\partial t'}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x'} = z \frac{\partial z'}{\partial t'} \frac{\partial u}{\partial t} + z' \frac{\partial z}{\partial t'} \frac{\partial u}{\partial t}$$

En supposant dans le second membre de cette équation  $\alpha$  et  $\alpha'$  nuls, et en y changeant  $z$  en  $Z^n$ ,  $z'$  en  $Z'^{n'}$ , et  $u$  en  $u$ , on aura la valeur de

$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x'}$  dans les mêmes suppositions, ce qui donne

$$q_{n, n'} = \frac{\partial^{n+n'-2} (Z^n Z'^{n'} \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial t'} + Z'^{n'} \frac{\partial Z^n}{\partial t'} \frac{\partial u}{\partial t} + Z^n \frac{\partial Z'^{n'}}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial t'})}{1.2.3 \dots n. \partial t^{n-1}. 1.2.3 \dots n'. \partial t'^{n'-1}}$$



En continuant ainsi, on aura la valeur de  $q_n, q', q'', \dots$  pour un nombre quelconque de variables.

Quoique nous ayons supposé  $u, z, z', z'', \dots$  fonctions de  $x, x', x'', \dots$ , sans  $t, t', t'', \dots$ , on peut cependant supposer qu'elles renferment ces dernières variables; mais alors, en y désignant ces variables par  $t, t', t'', \dots$  il faudra supposer  $t, t', t'', \dots$  constants dans les différentiations, et restituer après ces opérations  $t, t', \dots$  au lieu de  $t, t', \dots$ .

22. Appliquons ces résultats au mouvement elliptique des planètes. Pour cela, nous reprendrons les équations ( $f$ ) du n° 20. Si l'on compare l'équation

$$nt = u - e \sin u, \text{ ou } u = nt + e \sin u$$

avec celle-ci

$$x = \varphi(t + xz),$$

$x$  se changera en  $u, t$  en  $nt, z$  en  $e, z$  en  $\sin u$ , et  $\varphi(t + xz)$  en  $nt + e \sin u$ ; la formule ( $p$ ) du numéro précédent deviendra donc

$$(q) \psi(u) = \psi(nt) + e\psi'(nt) \sin nt + \frac{e^2}{1.2} \frac{d[\psi'(nt) \sin^2 nt]}{ndt} + \frac{e^3}{1.2.3} \frac{d^2[\psi'(nt) \sin^3 nt]}{n^2 dt^2} + \dots$$

$\psi'(nt)$  étant égal à  $\frac{d\psi(nt)}{ndt}$ . Pour développer cette formule, nous observerons que,  $c$  étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, on a

$$\sin^i nt = \left( \frac{e^{nt\sqrt{-1}} - e^{-nt\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}} \right)^i, \quad \cos^i nt = \left( \frac{e^{nt\sqrt{-1}} + e^{-nt\sqrt{-1}}}{2} \right)^i,$$

$i$  étant quelconque. En développant les seconds membres de ces équations et en substituant ensuite, au lieu de  $e^{nt\sqrt{-1}}$  et de  $e^{-nt\sqrt{-1}}$ , leurs valeurs  $\cos rnt + \sqrt{-1} \sin rnt$  et  $\cos rnt - \sqrt{-1} \sin rnt$ ,  $r$  étant quelconque, on aura les puissances  $i$  de  $\sin nt$  et de  $\cos nt$  développées en

sinus et cosinus de l'angle  $nt$  et de ses multiples. Cela posé, on trouvera

$$\begin{aligned} \sin nt + \frac{e}{1.2} \sin^2 nt + \frac{e^2}{1.2.3} \sin^3 nt + \frac{e^3}{1.2.3.4} \sin^4 nt + \dots \\ = \sin nt - \frac{e}{1.2.2} (\cos 2nt - 1) \\ - \frac{e^2}{1.2.3.2^2} (\sin 3nt - 3 \sin nt) \\ + \frac{e^3}{1.2.3.4.2^3} \left( \cos 4nt - 4 \cos 2nt + \frac{1}{2} \cdot \frac{4.3}{1.2} \right) \\ + \frac{e^4}{1.2.3.4.5.2^4} \left( \sin 5nt - 5 \sin 3nt + \frac{5.4}{1.2} \sin nt \right) \\ - \frac{e^5}{1.2.3.4.5.6.2^5} \left( \cos 6nt - 6 \cos 4nt + \frac{6.5}{1.2} \cos 2nt - \frac{1}{2} \cdot \frac{6.5.4}{1.2.3} \right) \\ \dots \end{aligned}$$

Soit  $P$  cette fonction; on la multipliera par  $\psi'(nt)$ , et l'on différenciera chacun de ses termes, par rapport à  $t$ , un nombre de fois indiqué par la puissance de  $e$  qui le multiplie,  $dt$  étant supposé constant; on divisera ces différentielles par la puissance correspondante de  $ndt$ . Soit  $P'$  la somme de ces différentielles ainsi divisées; la formule ( $q$ ) deviendra

$$\psi(u) = \psi(nt) + e P'.$$

Il sera facile d'obtenir par cette méthode les valeurs de l'angle  $u$  et des sinus et cosinus de cet angle et de ses multiples. En supposant, par exemple,  $\psi(u) = \sin iu$ , on aura  $\psi'(nt) = i \cos int$ . On multipliera la valeur précédente de  $P$  par  $i \cos int$ , et l'on développera ce produit en sinus et cosinus de l'angle  $nt$  et de ses multiples. Les termes multipliés par les puissances paires de  $e$  seront des sinus, et les termes multipliés par les puissances impaires seront des cosinus. On changera ensuite un terme quelconque de la forme  $K e^{2r} \sin^i nt$  dans  $\pm K e^{2r} s^{2r} \sin^i nt$ , le signe  $+$  ayant lieu si  $r$  est pair, et le signe  $-$  ayant lieu si  $r$  est impair. On changera pareillement un terme quelconque de la forme  $K e^{2r+1} \cos^i nt$  dans  $\mp K e^{2r+1} s^{2r+1} \sin^i nt$ , le signe  $-$  ayant lieu si  $r$  est



pair, et le signe + ayant lieu si  $r$  est impair. La somme de tous ces termes sera la valeur de  $P'$ , et l'on aura

$$\sin iu = \sin int + eP'.$$

Si l'on suppose  $\psi(u) = u$ , on aura  $\psi'(nt) = 1$ , et l'on trouvera

$$\begin{aligned} u = nt + e \sin nt + \frac{e^2}{1.2.2} \cdot 2 \sin 2nt + \frac{e^3}{1.2.3.2^2} (3^2 \sin 3nt - 3 \sin nt) \\ + \frac{e^4}{1.2.3.4.2^3} (4^2 \sin 4nt - 4 \cdot 2^2 \sin 2nt) \\ + \frac{e^5}{1.2.3.4.5.2^4} (5^2 \sin 5nt - 5 \cdot 3^2 \sin 3nt + \frac{5 \cdot 4}{1.2} \sin nt) \\ + \dots \end{aligned}$$

Cette série est fort convergente pour les planètes. Ayant ainsi déterminé  $u$  pour un instant quelconque, on en tirera, au moyen des équations ( $f$ ) du n° 20, les valeurs correspondantes de  $r$  et de  $v$ ; mais on peut avoir directement ces dernières quantités en séries convergentes, de cette manière.

Pour cela, nous observerons que l'on a, par le n° 20,  $r = a(1 - e \cos u)$ ; or si, dans la formule ( $g$ ), on suppose  $\psi(u) = 1 - e \cos u$ , on aura  $\psi'(nt) = e \sin nt$ , et par conséquent

$$1 - e \cos u = 1 - e \cos nt + \frac{e^2}{1.2} \frac{d \sin^2 nt}{ndt} + \frac{e^3}{1.2.3} \frac{d^2 \sin^3 nt}{n^2 dt^2} + \dots$$

On aura donc, par l'analyse précédente,

$$\begin{aligned} \frac{r}{a} = 1 + \frac{e^2}{2} - e \cos nt - \frac{e^2}{2} \cos 2nt \\ - \frac{e^3}{1.2.2^2} (3 \cos 3nt - 3 \cos nt) \\ - \frac{e^4}{1.2.3.2^3} (4^2 \cos 4nt - 4 \cdot 2^2 \cos 2nt) \\ - \frac{e^5}{1.2.3.4.2^4} \left( 5^2 \cos 5nt - 5 \cdot 3^2 \cos 3nt + \frac{5 \cdot 4}{1.2} \cos nt \right) \\ - \frac{e^6}{1.2.3.4.5.2^5} \left( 6^2 \cos 6nt - 6 \cdot 4^2 \cos 4nt + \frac{6 \cdot 5}{1.2} \cdot 2^2 \cos 2nt \right) \\ + \dots \end{aligned}$$

Considérons présentement la troisième des équations ( $f$ ) du n° 20; elle donne

$$\frac{\sin \frac{1}{2} v}{\cos \frac{1}{2} v} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \frac{\sin \frac{1}{2} u}{\cos \frac{1}{2} u}.$$

En substituant dans cette équation, au lieu des sinus et des cosinus, leurs valeurs en exponentielles imaginaires, on aura

$$\frac{e^{v\sqrt{-1}} - 1}{e^{v\sqrt{-1}} + 1} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \frac{e^{u\sqrt{-1}} - 1}{e^{u\sqrt{-1}} + 1};$$

en supposant donc

$$\lambda = \frac{e}{1 + 1 - e^2},$$

on aura

$$e^{v\sqrt{-1}} = e^{u\sqrt{-1}} \frac{1 - \lambda e^{-u\sqrt{-1}}}{1 - \lambda e^{u\sqrt{-1}}},$$

et par conséquent

$$v = u + \frac{\log(1 - \lambda e^{-u\sqrt{-1}}) - \log(1 - \lambda e^{u\sqrt{-1}})}{\sqrt{-1}};$$

d'où l'on tire, en réduisant les logarithmes en séries,

$$v = u + 2\lambda \sin u + \frac{2\lambda^2}{2} \sin 2u + \frac{2\lambda^3}{3} \sin 3u + \frac{2\lambda^4}{4} \sin 4u + \dots$$

On aura, par ce qui précède,  $u$ ,  $\sin u$ ,  $\sin 2u$ , ... en séries ordonnées par rapport aux puissances de  $e$ , et développées en sinus et cosinus de l'angle  $nt$  et de ses multiples; il ne s'agit donc, pour avoir  $v$  exprimé dans une suite semblable, que de développer les puissances successives de  $\lambda$  en séries ordonnées par rapport aux puissances de  $e$ .

L'équation  $u = 2 - \frac{e^2}{u}$  donnera, par la formule ( $p$ ) du numéro précédent,

$$\frac{1}{u} = \frac{1}{2} + \frac{ie^2}{2^{3+2}} + \frac{i(i+3)}{1.2} \frac{e^4}{2^{5+1}} + \frac{i(i+4)(i+5)}{1.2.3} \frac{e^6}{2^{7+4}} + \dots$$



et, comme on a  $u = 1 + \sqrt{1 - e^2}$ , on aura

$$\lambda' = \frac{e^i}{2^i} \left[ 1 + i \left( \frac{e}{2} \right)^2 + \frac{i(i+3)}{1.2} \left( \frac{e}{2} \right)^4 + \frac{i(i+4)(i+5)}{1.2.3} \left( \frac{e}{2} \right)^6 + \dots \right].$$

Cela posé, on trouvera, en ne portant l'approximation que jusqu'aux quantités de l'ordre  $e^4$  inclusivement,

$$v = nt + \left( 2e - \frac{1}{2}e^3 + \frac{5}{96}e^5 \right) \sin nt + \left( \frac{5}{4}e^2 - \frac{11}{24}e^4 + \frac{17}{192}e^6 \right) \sin 2nt + \left( \frac{13}{12}e^3 - \frac{43}{64}e^5 \right) \sin 3nt \\ + \left( \frac{103}{96}e^4 - \frac{451}{480}e^6 \right) \sin 4nt + \frac{1097}{960}e^5 \sin 5nt + \frac{1223}{960}e^6 \sin 6nt.$$

Les angles  $v$  et  $nt$  sont ici comptés du périhélie; mais, si l'on veut compter ces angles de l'aphélie, il est clair qu'il suffit de faire  $e$  négatif dans les expressions précédentes de  $r$  et de  $v$ . Il suffirait encore d'augmenter, dans ces expressions, l'angle  $nt$  de la demi-circonférence, ce qui rend négatifs les sinus et les cosinus des multiples impairs de  $nt$ ; ainsi, les résultats de ces deux méthodes devant être identiques, il faut que, dans les expressions de  $r$  et de  $v$ , les sinus et les cosinus des multiples impairs de  $nt$  soient multipliés par des puissances impaires de  $e$ , et que les sinus et cosinus des multiples pairs du même angle soient multipliés par des puissances paires de cette quantité. C'est, en effet, ce que le calcul confirme *a posteriori*.

Supposons qu'au lieu de compter l'angle  $v$  du périhélie on fixe son origine à un point quelconque; il est clair que cet angle sera augmenté d'une constante, que nous désignerons par  $\varpi$ , et qui exprimera la longitude du périhélie. Si, au lieu de fixer l'origine de  $t$  à l'instant du passage au périhélie, on la fixe à un instant quelconque, l'angle  $nt$  sera augmenté d'une constante, que nous désignerons par  $\varepsilon - \varpi$ ; les expressions précédentes de  $\frac{r}{a}$  et de  $v$  deviendront ainsi

$$\frac{r}{a} = 1 + \frac{1}{2}e^2 - \left( e - \frac{3}{8}e^3 \right) \cos(nt + \varepsilon - \varpi) - \left( \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{3}e^4 \right) \cos 2(nt + \varepsilon - \varpi) - \dots \\ v = nt + \varepsilon + \left( 2e - \frac{1}{4}e^3 \right) \sin(nt + \varepsilon - \varpi) + \left( \frac{5}{4}e^2 - \frac{11}{24}e^4 \right) \sin 2(nt + \varepsilon - \varpi) + \dots$$

$v$  est la longitude vraie de la planète, et  $nt + \varepsilon$  est sa longitude moyenne, ces deux longitudes étant rapportées au plan de l'orbite.

Rapportons maintenant le mouvement de la planète à un plan fixe, peu incliné à celui de l'orbite. Soit  $\varphi$  l'inclinaison mutuelle de ces deux plans, et  $\theta$  la longitude du nœud ascendant de l'orbite, comptée sur le plan fixe; soit  $\ell$  cette longitude comptée sur le plan de l'orbite, en sorte que  $\theta$  soit la projection de  $\ell$ ; soit encore  $v$ , la projection de  $v$  sur le plan fixe. On aura

$$\tan(v - \theta) = \cos \varphi \tan(v - \ell).$$

Cette équation donne  $v$ , en  $\ell$ , et réciproquement; mais on peut avoir ces deux angles l'un par l'autre, en séries fort convergentes, de cette manière.

On a conclu précédemment la série

$$\frac{1}{2}v = \frac{1}{2}u + \lambda \sin u + \frac{\lambda^2}{2} \sin 2u + \frac{\lambda^3}{3} \sin 3u + \dots$$

de l'équation

$$\tan \frac{1}{2}v = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{1}{2}u,$$

en faisant

$$\lambda = \frac{\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} - 1}{\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} + 1}.$$

Si l'on change  $\frac{1}{2}v$  en  $v$ ,  $-\theta$ ,  $\frac{1}{2}u$  en  $v - \ell$ , et  $\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}$  en  $\cos \varphi$ , on aura

$$\lambda = \frac{\cos \varphi - 1}{\cos \varphi + 1} = -\tan^2 \frac{1}{2}\varphi;$$

l'équation entre  $\frac{1}{2}v$  et  $\frac{1}{2}u$  se changera dans l'équation entre  $v$ ,  $-\theta$  et  $v - \ell$ , et la série précédente donnera

$$v - \theta = v - \ell - \tan^2 \frac{1}{2}\varphi \sin 2(v - \ell) + \frac{1}{2} \tan^4 \frac{1}{2}\varphi \sin 4(v - \ell) - \frac{1}{3} \tan^6 \frac{1}{2}\varphi \sin 6(v - \ell) + \dots$$

Si dans l'équation entre  $\frac{1}{2}v$  et  $\frac{1}{2}u$  on change  $\frac{1}{2}v$  en  $v - \ell$ ,  $\frac{1}{2}u$  en  $v$ ,  $-\theta$  et  $\sqrt{\frac{1+e}{1-e}}$  en  $\frac{1}{\cos \varphi}$ , on aura

$$\lambda = \tan^2 \frac{1}{2}\varphi,$$



et

$$v - \epsilon = v - \theta + \text{tang}^2 \frac{1}{2} \varphi \sin 2(v - \theta) + \frac{1}{2} \text{tang}^4 \frac{1}{2} \varphi \sin 4(v - \theta) + \frac{1}{8} \text{tang}^6 \frac{1}{2} \varphi \sin 6(v - \theta) + \dots$$

On voit ainsi que les deux séries précédentes se changent réciproquement l'une dans l'autre, en changeant le signe de  $\text{tang}^2 \frac{1}{2} \varphi$  et en changeant l'un dans l'autre les angles  $v - \theta$  et  $v - \epsilon$ . On aura  $v - \theta$  en fonction de sinus et de cosinus de  $nt$  et de ses multiples, en observant que l'on a, par ce qui précède,

$$v = nt + \epsilon + eQ,$$

$Q$  étant une fonction des sinus de l'angle  $nt + \epsilon - \alpha$  et de ses multiples, et que la formule (i) du n° 21 donne, quel que soit  $i$ ,

$$\begin{aligned} \sin i(v - \epsilon) = \sin i(nt + \epsilon - \epsilon + eQ) &= \left(1 - \frac{i^2 e^2 Q^2}{1.2} + \frac{i^4 e^4 Q^4}{1.2.3.4} - \dots\right) \sin i(nt + \epsilon - \epsilon) \\ &+ \left(i e Q - \frac{i^3 e^3 Q^3}{1.2.3} + \frac{i^5 e^5 Q^5}{1.2.3.4.5} - \dots\right) \cos i(nt + \epsilon - \epsilon). \end{aligned}$$

Enfin,  $s$  étant la tangente de la latitude de la planète au-dessus du plan fixe, on a

$$s = \text{tang} \varphi \sin(v - \theta),$$

et, si l'on nomme  $r$ , le rayon vecteur  $r$  projeté sur le plan fixe, on aura

$$r = r(1 + s^2)^{-\frac{1}{2}} = r\left(1 - \frac{1}{2}s^2 + \frac{3}{8}s^4 - \dots\right);$$

on pourra donc ainsi déterminer  $v$ ,  $s$  et  $r$ , en séries convergentes de sinus et de cosinus de l'angle  $nt$  et de ses multiples.

23. Considérons présentement les orbites fort excentriques, telles que celles des comètes, et pour cela reprenons les équations du n° 20

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v},$$

$$nt = u - e \sin u,$$

$$\text{tang} \frac{1}{2} v = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \text{tang} \frac{1}{2} u.$$

Dans le cas des orbites fort excentriques,  $e$  diffère très-peu de l'unité; nous supposons ainsi  $1 - e = \alpha$ ,  $\alpha$  étant fort petit. Si l'on nomme  $D$  la distance périhélie de la comète, on aura  $D = a(1 - e) = \alpha a$ ; l'expression de  $r$  deviendra donc

$$r = \frac{(2 - \alpha) D}{2 \cos^2 \frac{1}{2} v - \alpha \cos v} = \frac{D}{\cos^2 \frac{1}{2} v \left(1 + \frac{\alpha}{2 - \alpha} \text{tang}^2 \frac{1}{2} v\right)},$$

ce qui donne, en réduisant en série,

$$r = \frac{D}{\cos^2 \frac{1}{2} v} \left[1 - \frac{\alpha}{2 - \alpha} \text{tang}^2 \frac{1}{2} v + \left(\frac{\alpha}{2 - \alpha}\right)^2 \text{tang}^4 \frac{1}{2} v - \dots\right].$$

Pour avoir le rapport de  $v$  au temps  $t$ , nous observerons que l'expression de l'arc par la tangente donne

$$u = 2 \text{tang} \frac{1}{2} u \left(1 - \frac{1}{3} \text{tang}^2 \frac{1}{2} u + \frac{1}{5} \text{tang}^4 \frac{1}{2} u - \dots\right);$$

or on a

$$\text{tang} \frac{1}{2} u = \sqrt{\frac{\alpha}{2 - \alpha}} \text{tang} \frac{1}{2} v;$$

on aura donc

$$u = 2 \sqrt{\frac{\alpha}{2 - \alpha}} \text{tang} \frac{1}{2} v \left[1 - \frac{1}{3} \frac{\alpha}{2 - \alpha} \text{tang}^2 \frac{1}{2} v + \frac{1}{5} \left(\frac{\alpha}{2 - \alpha}\right)^2 \text{tang}^4 \frac{1}{2} v - \dots\right];$$

on a ensuite

$$\sin u = \frac{2 \text{tang} \frac{1}{2} u}{1 + \text{tang}^2 \frac{1}{2} u} = 2 \text{tang} \frac{1}{2} u \left(1 - \text{tang}^2 \frac{1}{2} u + \text{tang}^4 \frac{1}{2} u - \dots\right),$$

d'où l'on tire

$$e \sin u = 2(1 - \alpha) \sqrt{\frac{\alpha}{2 - \alpha}} \text{tang} \frac{1}{2} v \left[1 - \frac{\alpha}{2 - \alpha} \text{tang}^2 \frac{1}{2} v + \left(\frac{\alpha}{2 - \alpha}\right)^2 \text{tang}^4 \frac{1}{2} v - \dots\right].$$

En substituant ces valeurs de  $u$  et de  $e \sin u$  dans l'équation

$$nt = u - e \sin u,$$

on aura le temps  $t$  en fonction de l'anomalie  $v$ , par une suite très-con-



vergente; mais, avant que de faire cette substitution, nous observerons que l'on a, par le n° 20,  $n = a^{-\frac{3}{2}}\sqrt{\mu}$ , et, comme  $D = za$ , on aura

$$\frac{1}{n} = \frac{D^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{\mu}}.$$

On trouvera, cela posé,

$$t = \frac{2D^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{(2-\alpha)\mu}} \tan^{\frac{1}{2}}v \left[ 1 + \frac{2-\alpha}{2-\alpha} \tan^2 \frac{1}{2}v - \frac{(\frac{4}{5}-\alpha)\alpha}{(2-\alpha)^2} \tan^4 \frac{1}{2}v + \dots \right].$$

Si l'orbite est parabolique,  $\alpha = 0$ , et par conséquent

$$r = \frac{D}{\cos^2 \frac{1}{2}v},$$

$$t = \frac{D^{\frac{3}{2}}\sqrt{2}}{\sqrt{\mu}} \left( \tan^{\frac{1}{2}}v + \frac{1}{3} \tan^{\frac{3}{2}}v \right).$$

Le temps  $t$ , la distance  $D$  et la somme  $\mu$  des masses du Soleil et de la comète sont des quantités hétérogènes qui, pour être comparables, doivent être divisées chacune par des unités de leur espèce. Nous supposons donc que la moyenne distance du Soleil à la Terre est l'unité de distance, en sorte que  $D$  est exprimé en parties de cette distance. Nous observerons ensuite que, si l'on nomme  $T$  le temps d'une révolution sidérale de la Terre, que nous supposons partir du périhélie, on aura, dans l'équation

$$nt = u - e \sin u,$$

$u = 0$  au commencement de la révolution, et  $u = 2\pi$  à la fin,  $\pi$  étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité; on aura donc  $nT = 2\pi$ ; mais on a  $n = a^{-\frac{3}{2}}\sqrt{\mu} = \sqrt{\mu}$ , à cause de  $a = 1$ ; partant

$$\sqrt{\mu} = \frac{2\pi}{T}.$$

La valeur de  $\mu$  n'est pas exactement la même pour la Terre que pour

la comète, puisque, dans le premier cas, elle exprime la somme des masses du Soleil et de la Terre; au lieu que, dans le second cas, elle exprime la somme des masses du Soleil et de la comète; mais, les masses de la Terre et de la comète étant beaucoup moindres que celle du Soleil, on peut les négliger, et supposer que  $\mu$  est le même pour tous ces corps, et qu'il exprime la masse du Soleil. En substituant donc au lieu de  $\sqrt{\mu}$  sa valeur  $\frac{2\pi}{T}$  dans l'expression précédente de  $t$ , on aura

$$t = \frac{D^{\frac{3}{2}}T}{\pi\sqrt{2}} \left( \tan^{\frac{1}{2}}v + \frac{1}{3} \tan^{\frac{3}{2}}v \right).$$

Cette équation ne renferme plus que des quantités comparables entre elles; elle donnera facilement  $t$  lorsque  $v$  sera connu; mais, pour avoir  $v$  au moyen de  $t$ , il faut résoudre une équation du troisième degré, qui n'est susceptible que d'une seule racine réelle. On peut se dispenser de cette résolution en faisant une Table des valeurs de  $v$  correspondantes à celles de  $t$ , dans une parabole dont la distance périhélie est l'unité, ou égale à la moyenne distance de la Terre au Soleil. Cette Table donnera le temps correspondant à l'anomalie  $v$ , dans une parabole quelconque dont  $D$  est la distance périhélie, en multipliant par  $D^{\frac{3}{2}}$  le temps qui correspond à la même anomalie dans la Table. On aura l'anomalie  $v$  correspondante au temps  $t$ , en divisant  $t$  par  $D^{\frac{3}{2}}$ , et en cherchant dans la Table l'anomalie qui répond au quotient de cette division.

Supposons maintenant que l'on cherche l'anomalie  $v$  correspondante au temps  $t$  dans une ellipse fort excentrique. Si l'on néglige les quantités de l'ordre  $\alpha^2$ , et que l'on remette  $1 - e$  au lieu de  $\alpha$ , l'expression précédente de  $t$  en  $v$ , dans l'ellipse, donnera

$$t = \frac{D^{\frac{3}{2}}\sqrt{2}}{\sqrt{\mu}} \left[ \tan^{\frac{1}{2}}v + \frac{1}{3} \tan^{\frac{3}{2}}v + (1-e) \tan^{\frac{1}{2}}v \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \tan^2 \frac{1}{2}v - \frac{1}{3} \tan^4 \frac{1}{2}v \right) \right].$$

On cherchera, par la Table du mouvement des comètes, l'anomalie qui répond au temps  $t$  dans une parabole dont  $D$  serait la distance péri-



hélié; soit  $U$  cette anomalie, et  $U + x$  l'anomalie vraie dans l'ellipse, correspondante au même temps,  $x$  étant un très-petit angle. Si l'on substitue dans l'équation précédente  $U + x$  au lieu de  $v$ , et que l'on réduise le second membre en série ordonnée par rapport aux puissances de  $x$ , on aura, en négligeant le carré de  $x$  et le produit de  $x$  par  $1 - e$ ,

$$t = \frac{D^{\frac{3}{2}} \sqrt{a}}{\sqrt{\mu}} \left[ \operatorname{tang}^{\frac{1}{2}} U + \frac{1}{4} \operatorname{tang}^{\frac{3}{2}} U + \frac{x}{2 \cos^{\frac{1}{2}} U} + \frac{1-e}{4} \operatorname{tang}^{\frac{1}{2}} U (1 - \operatorname{tang}^{\frac{1}{2}} U - \frac{3}{8} \operatorname{tang}^{\frac{3}{2}} U) \right];$$

mais on a, par la supposition,

$$t = \frac{D^{\frac{3}{2}} \sqrt{a}}{\sqrt{\mu}} (\operatorname{tang}^{\frac{1}{2}} U + \frac{1}{4} \operatorname{tang}^{\frac{3}{2}} U);$$

on aura donc, en substituant au lieu du petit arc  $x$  son sinus,

$$\sin x = \frac{1}{4} (1 - e) \operatorname{tang}^{\frac{1}{2}} U (4 - 3 \cos^{\frac{1}{2}} U - 6 \cos^{\frac{3}{2}} U).$$

Ainsi, en formant une Table des logarithmes de la quantité

$$\frac{1}{4} \operatorname{tang}^{\frac{1}{2}} U (4 - 3 \cos^{\frac{1}{2}} U - 6 \cos^{\frac{3}{2}} U),$$

il suffira de leur ajouter le logarithme de  $1 - e$  pour avoir celui de  $\sin x$ ; on aura par conséquent la correction à faire à l'anomalie  $U$ , calculée dans la parabole, pour avoir l'anomalie correspondante dans une ellipse fort excentrique.

24. Il nous reste à considérer le mouvement dans une orbite hyperbolique. Pour cela, nous observerons que, dans l'hyperbole, le demi-grand axe  $a$  devient négatif, et l'excentricité  $e$  surpasse l'unité. En faisant donc, dans les équations (f) du n° 20,  $a = -a'$  et  $u = \frac{u'}{\sqrt{-1}}$ , et en substituant au lieu des sinus et des cosinus leurs valeurs en exponentielles imaginaires, la première de ces équations donnera

$$\frac{t \sqrt{\mu}}{a^{\frac{3}{2}}} = \frac{e}{2} (e^{u'} - e^{-u'}) - u'.$$

La seconde deviendra

$$r = a' \left[ \frac{1}{2} e (e^{u'} + e^{-u'}) - 1 \right];$$

enfin, si l'on prend convenablement le signe du radical de la troisième équation pour que  $v$  croisse avec  $t$  et, par conséquent, avec  $u'$ , on aura

$$\operatorname{tang}^{\frac{1}{2}} v = \sqrt{\frac{e+1}{e-1} \frac{e^{u'}-1}{e^{u'}+1}}.$$

Supposons dans ces formules  $u' = \log \operatorname{tang}(\frac{1}{4}\pi + \frac{1}{2}\varpi)$ ,  $\pi$  étant la demi-circumference dont le rayon est l'unité, et le logarithme précédent étant hyperbolique; on aura

$$\frac{t \sqrt{\mu}}{a^{\frac{3}{2}}} = e \operatorname{tang} \varpi - \log \operatorname{tang}(\frac{1}{4}\pi + \frac{1}{2}\varpi),$$

$$r = a' \left( \frac{e^{\varpi}}{\cos \varpi} - 1 \right),$$

$$\operatorname{tang}^{\frac{1}{2}} v = \sqrt{\frac{e+1}{e-1}} \operatorname{tang}^{\frac{1}{2}} \varpi.$$

L'arc  $\frac{t \sqrt{\mu}}{a^{\frac{3}{2}}}$  est le moyen mouvement angulaire durant le temps  $t$  du

corps  $m$ , supposé mù circulairement autour de  $M$ , à la distance  $a'$ . Cet arc est facile à déterminer, en le réduisant en parties du rayon: la première des équations précédentes donnera par des essais la valeur de l'angle  $\varpi$  correspondante au temps  $t$ ; les deux autres équations donneront ensuite les valeurs correspondantes de  $r$  et de  $v$ .

25. T exprimant la révolution sidérale d'une planète dont  $a$  est la moyenne distance au Soleil, la première des équations (f) du n° 20 donnera  $nT = 2\pi$ ; mais on a par le même numéro  $\frac{\sqrt{\mu}}{a^{\frac{3}{2}}} = n$ ; on aura donc

$$T = \frac{2\pi a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\mu}}.$$

Si l'on néglige les masses des planètes par rapport à celle du Soleil,



$\mu$  exprimera la masse de cet astre, et cette quantité sera la même pour toutes les planètes; ainsi, pour une seconde planète dont  $a'$  et  $T'$  seraient la distance moyenne au Soleil et le temps de la révolution sidérale, on aura encore

$$T' = \frac{2\pi a'^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\mu}};$$

on aura donc

$$T^2 : T'^2 :: a^3 : a'^3;$$

c'est-à-dire que les carrés des temps des révolutions de différentes planètes sont entre eux comme les cubes des grands axes de leurs orbites, ce qui est une des lois découvertes par Kepler. On voit par l'analyse précédente que cette loi n'est pas rigoureuse, et qu'elle n'a lieu qu'autant que l'on néglige l'action des planètes les unes sur les autres et sur le Soleil.

Si l'on prend pour mesure du temps le moyen mouvement de la Terre, et pour unité de distance sa moyenne distance au Soleil,  $T$  sera dans ce cas égal à  $2\pi$ , et l'on aura  $a = 1$ ; l'expression précédente de  $T$  donnera donc  $\mu = 1$ ; d'où il suit que la masse du Soleil doit alors être prise pour unité de masse. On peut ainsi, dans la théorie des planètes et des comètes, supposer  $\mu = 1$ , et prendre pour unité de distance la moyenne distance de la Terre au Soleil; mais alors le temps  $t$  est mesuré par l'arc correspondant du moyen mouvement sidéral de la Terre.

L'équation

$$T = \frac{2\pi a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\mu}}$$

donne un moyen fort simple de déterminer les rapports des masses des planètes qui ont des satellites à la masse du Soleil. En effet,  $M$  représentant cette masse, si l'on néglige la masse  $m$  de la planète vis-à-vis de  $M$ , on aura

$$T = \frac{2\pi a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{M}}.$$

Si l'on considère ensuite un satellite d'une planète quelconque  $m'$ ; que

l'on désigne par  $p$  la masse de ce satellite, par  $h$  sa moyenne distance au centre de  $m'$ , et par  $\tau$  le temps de sa révolution sidérale, on aura

$$\tau = \frac{2\pi h^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{m' + p}};$$

partant,

$$\frac{m' + p}{M} = \frac{h^3}{a^3} \left( \frac{T}{\tau} \right)^2.$$

Cette équation donne le rapport de la somme des masses de la planète  $m'$  et de son satellite à la masse  $M$  du Soleil; en négligeant donc la masse du satellite eu égard à celle de sa planète, ou en supposant le rapport de ces masses connu, on aura le rapport de la masse de la planète à celle du Soleil. Nous donnerons, en traitant de la théorie des planètes, les valeurs des masses de celles autour desquelles on a observé des satellites.