




文書名	牛山先生生活套	No.
所蔵者 住所・氏名	九州大学中央図書館	
撮影年月日	昭和56年 7月 15日	
福岡県文化会館		







暢以通聖教則如方夕望雪其心
凜然方者做也。古自宋才不為不
多矣。文豪花者擬眸於白雪之橫
案也。掉雪者動思於明月之照沙
也。牛山先生物故已久矣。其所著
之書隨前哲之轍而術亦精裁。
蕃木林氏校心其寫本而欲弘于

世焉所謂待後世之予雲者也。乞
予作序固辭不許。故纘鄙言書其
端云。安永戊戌仲冬日。

知果敬人書




李東陽書



牛山先生生活卷之上目錄

感冒	一	傷寒	一	時疫	溫病
中寒	土	中暑	注夏瘟	中濕	百合病
飲食	久	內傷	三	癰症	大頭瘟
咳嗽	有聲無痰	喘急	十	腹痛	蠶蟆瘟
脇痛	有痙攣	肩臂痛	四	心痛	大頭瘡
頭痛	項痛	泄瀉	六	瘻飲	瘻瘍
痢疾	四	霍亂	七	瘻疾	瘻瘍
膈噉	翻胃	脚氣	八		
膈逆	呃逆	補益	九		
健忘	五十四	虛勞	骨蒸		
怔忡	驚悸				



參敗毒散

○風寒感冒レ惡寒發熱レ頭痛レ鼻塞アキラカリ咽痛者云男女老幼共三人參敗毒散ヲ用ヨ汗出テ解スル也其脉多々浮數十

ルモノ也

十神湯
桔子正麻葛陳
稚兒丸ミツル美

參蘿丸

○感冒ノ症汗出ニ支ナク熱甚ク頭痛破ハバクルカ如ク脉浮緊ヒヨウニテ傷寒ノ初發ノ症ノ如ク尤ニ六十神湯ヲ用ヘシ

九味羌活湯
羌防弓芷地
芩蒼細甘

○感冒ノ症熱甚ク惡寒レ咳嗽甚ク咽痛聲音重濁或声声カレ

テ不出ノ類ハ參蘿丸飲ヲ用ベシ或ハ鼻塞テ咳嗽レ或ハ鼻清涕

ヲ流スニモ參蘿丸飲ニ宜レ其脉多々浮濁

○感冒ノ症寒熱共ニ甚ク頭項苦痛レ腰脊強痛凡者二敗
毒十神ノ類ヲ用テモ解セサルハ九味羌活湯ヲ用ヘシ其脉多ク
ハ緊數十九者十

弓立香散

五積

霍香正氣丸
人參之養胃
散邪湯

○春時ノ感冒ニ八芎芷香蘿丸散或ハ敗毒散ニ宜レ
○夏時ノ感冒ハ多々濕麪ノ類或ハ甜瓜西瓜ノ類ヲ過食シテ
内ヲ冷レ外ハ涼臺水館ニ涼ヲ納ル故ニ内外ヨリ感スル者多キ也
霍香正氣散ヲ用ユヘレ或ハ寒熱甚ク其症瘧アフタ似ルニ人參養
胃湯ヲ用ユ或ハ散邪湯ニ宜レ門ニ出フ其脉多々浮數ヲ滑ナ
ル勢アル者也

○秋時ノ感冒ハ多々收欬飲清肅ノ殺氣ニ中テ咳嗽スル也參蘿
丸飲ニ宜レ

○冬時ノ感冒ハ多々傷寒ニ屬ス十神湯九味羌活湯ヲ用ヘ

冬ハ寒氣血脉ヲ凝滯スル者ナハ血ヲ活メ發ニ三宜
用テ効ヲ取也其脉多々浮緊數

五積散

卷之三

不換金正氣

行氣香薷散

蒼术

ヨカルモ可也

○感冒溫三屬者寒熱往來レ鼻^ニ清涕^ヲ流レ咽痛咳嗽頭痛
レ或咽渴^{ナカ}レ恶心嘔吐或泄浮十ド^ヲ兼タルハ多ハ外感ニ内
傷^{サトハサ}火者也藿香正氣散ニ宜シ或ハ行氣香薷散ヲ用ルモ
又可也其脉多ハ浮數^ヲ滑^{ナカ}ラ帶也

○老人ノ感冒ハ血ヲ助ケテ發スヘレ五積散ニ宜シ

○小兒感冒ニハ猩々散ヲ用ヘレ或ハ寒熱咳嗽スル者藿香
正氣散不換金正氣散ヲ用ヘレ總メ小兒ノ病ハ十二八九ハ
食滯ト痰トヨリ發スト知ルベシ

猩々散

八解散

補中益氣

六君子

黃連

香薷

○虛弱ノ人ノ感冒ニ發散ノ劑ヲ用吏四五貼ニメ解ス汗出テ
倦憊ノ體見ニハ八解散ヲ用ベレ虛甚キ者補中益氣湯
ニ唐防風羌活茯苓半夏ヲ加テ用ニ或ハ六君子湯桔梗山梔
子升麻此胡^ヲ加毛宣^シ

○感冒約治

○四時ノ感冒ノ推拿^ヲ香薷散參蘆飲敗毒散ヲ用ヘレ此等
藥ヲ用ヒ事五六貼ニテ毛熱解シ難キ時ハ輕キ感冒ト云難
レ傷寒瘟疫ノ病三屬メ治ヲ施スヘレ夏月ノ感冒ニ發散ノ劑ヲ
用テ解レ難ハ黃連^ヲ蒿薷飲ヲ用ヘシ其効速也世間往々大
家或ハ富家多人ヲ仕フ者藿香正氣散ヲ多ク修合^シ等男
女老少ヲ不問四時ノ感冒ニ發シムレ莫近來^キノ風習ナリ此

藥ハ發散ノ刑アリタ有レバ輕者ハ二貼ニメ愈也庸医習テ

察セス此藥ハ外感内傷ノ治ヲカ子テ医ヲ知ラヌ俗人ノ藥

賞美シレモ亦好テ此方ヲ用ル者多レ然ニ此藥陽明經口
リ熱ヲ發スル刑ニメ太陽表症ニハ其効ナキノミナク腸胃ヲ
乾メ其害夥シ医タラン者ハ其脉ヲ察シ症ヲ明ノ其經絡ノ容
邪ヲ去ルヘシ太陽ノ表症ニ發表ノ刑ヲ用テ其邪熱解タルニ
リ三發散ノ刑ヲ用エハ表氣虛ノ却テ熱出咳嗽再び起心者
ヲ引添タリトテ弦發散ノ刑ト云フコトヲシラシテ再ヒ風
也此時ニ庸医ハ發散ノ科ト云フコトヲシラシテ再ヒ風
脾肺ノ氣虛レ虛熱骨蒸ノ勞咳ノ症トナル藿香正氣散ヲ
用ヒ過レテモ又内乾ヒテ虛熱起リテ勞咳トナル共ニ皆其脉

黃芩蜜甲

細數ナル者也如此ノ症ニ輕キ時ハ六君子湯補中益氣湯ニ加減シ
テ用ヘシ舊書其条加減
逐二載宜参考重キ者ハ黃芩蜜甲湯ヲ用ヘシ其効如神

懶メ發散ノ刑ヲ用タル後ハ六君子湯ヲ用ヘ

○傷寒

○冬月正傷寒ノ証汗大キ者ニ麻黃湯汗孔者ニ桂枝湯ヲ用
ト云ハ仲景ノ確論ニメ不及議大陽ノ表証ヲ分別メ用ヘシ近來醫
徒賢ノ製丸所ノ麻黃湯桂枝湯甲春陽
寒門出アリ此方仲景ノ方ニ加減
シタル者ナリ是モ亦功能アリテ効ヲ取リ多シ太陽症ヲ分別シテ
用ヘキ也

○近時ノ俗ノ傷寒ト云ハ多ハ瘟疫ノ病時行ノ熱病ヲ指テ傷

寒ト云ナリ此症初發ノ時ハ多ハ感冒ノ治療同レ熱甚シ惡

白桂附
桂芍羌防
弓木日

雲林麻黃
川桂枝
麻黃湯
麻杏桂弓
薄防姜附

陽裏

寒レ頭痛裂カ如ク腰脊強痛スル者六九味羌活湯ヲ用ヘ此

胡蒼朮ヲ加テ其効如神十神湯ヲ用王奇ナリ

柴葛解肌
白虎

○傷寒四五日發表ノ剂ヲ用テ汗出熱未解表上ニ八大熱解スル

ニ似テ内熱甚シク目痛鼻痛鼻乾キ煩渴メ眠ナラ得サルハ陽明

經ノ症也升麻葛根湯ノ加減或ハ此葛解肌湯又ハ白虎湯ヲ用

ヘシ

○傷寒五七日發表ノ剂ヲ用又ハ陽明ノ藥ヲ用テ後耳鳴耳聾胸脇痛三寒熱ヲ發スル者ハ邪半表半裏ニ在也是ヲ少陽經ノ症ト云也小茈胡湯ヲ用ヘシ此方ハ仲景ノ妙剤ニシテ傷寒溫疫諸ノ熱病ノ類皆此方ニ加減メ治ル也委曲ノ加減ハ才萬三載ス参考ヘシ

小柴故

升麻葛根

○傷寒七八日發表和解ノ剤ヲ用テ後譖言妄語撮空ノ症出テ衣ヲ撒キ床ヲ捲リ飲食不入久ニ垂シタル者ニ陶氏升陽散火湯ヲ用ベシ因生起火ノ妙剤也惣メ傷寒熱病ノ類危症壞症ヲ治スル聖剤也此方ヲ用ニ口傳多シ

○傷寒七八日ノ後微熱往来シ虛煩シ飲食不進夜眠ナアタタクズ或ハ譖言スル者ハ溫膽湯ノ加減或ハ竹茹溫膽湯ヲ用ヘシ

ル者ニ葛連解毒湯或ハ涼膈散ノ加減ヲ用ヘシ

○傷寒七八日ノ後テモ大熱未解胸中煩悶シ譖言妄語スル者ニ竹葉石膏湯ヲ用ベシ此方ヲ用ル時節アリ口傳多シ

○傷寒十餘日ノ後テ大便不通其燥糞丸故ニ熱甚シ譖

葛連解毒
涼膈散
竹葉石膏

大柴胡
大小差氣

言妄語不亂者三、大柴胡湯調胃兼氣湯、大小差氣湯ノ類見合テ燥糞ヲ下ス才ハ愈ル也。然レニ下ス症ノヨク分別メ脉ト腹トノ體ヲク見合テ可下也。

○傷寒發班ノ症、六、小柴胡湯ト升麻葛根湯ヲ合メ連翹或玄參ヲ加テ用ベシ。發班ノ症ハ惡ケ治スレバ、大更ニ變スルト心得ベシ。黑班ハ治レ難ト知ルベシ。又、消班青黛飲即春傷寒門出ヲ用ユルモ可也。

○傷寒、蛇虫トテ白虫ヲ吐スル者アリ。冒中ノ寒也。理中湯ニ加減メ用ベシ。又、理中安蛔湯即春傷寒門出ヲ用モ可也。

益氣養神
兵部解方
劉伯知便
苟陳外日

劉伯知便
苟陳外日

○傷寒、愈テ後勞動シ、或ハ人ニ對メタ言レ、或ハ新二瘡テ房事ヲチシテ發熱スル者ヲ勞復ト名シ。又、益氣養神湯ヲ用ヘシ。

安蛔湯

○傷寒、新二瘡テ房更ナセバ、熱甚ク元ノ如クニ變スル者也能能見極テ其更ナ尋子間テ益氣養神湯、山施子、秦艽ヲ加テ此胡フ信スベシ。

○傷寒瘥テ後必飲食ヲ欲シ飢ヤスキヨリ病者不覺過食レ。傍人ハ食ニアラサレ、羸瘦何ヨリテカ培即春傷寒門出セントテ強モ食セム。是ヨツテ大熱ヲ發シ、或ハ譯言之狂人今如是ヲ食復ノ病ト名ク。鹿エハ驚怖メ療治ヲ辞シ、或ハ傍人ハ嘵日人參ヲ用外ニ因テ氣上リテノ數卦ト醫即春傷寒門出セント議ス。必驚怖スベカ奥山施子豆豉湯ヲ用ベシ。其効如神。傍人不體分食物之氣ヲ外テ止カヘサムハ愈也。口傳多シ。

加減益氣

○體虛人或ハ勤勞ノ人或ハ老人或ハ夏月ニ勞役、汗出ル過多、夜寒熱往来シ、或ハ初冬ニ寒ニ感メ頭痛發熱スル者ハ俗ニ類傷寒ト云也。加味益氣湯ヲ用ヘシ。

○傷寒約治

○凡傷寒ノ病初發二三日ノ間ハ感冒ノ療治ノ如ク發散ノ汗ヲ取ベシ。麻黃湯桂枝湯敗毒散十神湯九味羌活湯ノ類ヲ大料トナレテ古傳多レ貼ノ分量其症ト脉ヲ考テ其方ヲ撰用ス。レ四五日ニ至テ表上ノ熱解スルニ似テ裏熱甚ク。譖言毎語目痛三鼻乾キ不得眠或ハ煩心煩悶發班等ノ証ラアラウス寸ハ小疏胡湯白虎湯升麻葛根湯此葛解肌湯竹葉石膏湯ノ類ヲ以テ其症ト其脉トヲ考合セテ用ユベシ。加減委ク考ヘシ。

十餘日ニ至テ後大便燥結レ燥糞アルニ因テ譖言亢疾燥糞ヲ下スベシ。大小兼氣調胃兼氣湯大茈胡湯ヲ用ヘシ甚シキ者ハ蜜導モロカイヲ用ヘシ。輕キ時ハ胡麻ノ油或ハ蜂蜜ノ類ヲ肛門ニスルベシ。下斯疾、容易ニ計リカタレ好脉ト見合セ。下スベシ十分ツナリタル時ニ下藥ヲ用ヘシ。多口傳七八日ノ以後危キトアラワシ譖言妄語耳聾レ人更ラ不知撮空レ床ヲ搜リ衣ヲ撤キ大小便自利スル者ハ惡症也。十二メ七ハハ茲ス此症ヲ救シトナラバ獨參湯口傳ノ大料ニ陳皮三分ガ一生姜七分ガ一ヲ加テ煎ジ時々是ヲ用ヒ本藥ニ六陶武州陽散火湯ヲ大料トナス用ヘシ。其効如神。獨參湯ノ分量散火湯ノ人参黃芩ノ分量ニ口傳アリ。此方ハ傷寒危証ヨクウノ聖剣ニレテ

百發百中其妙不可言也又傷寒汗吐下後壞症ニ有タル者又ハ手足厥冷レ或ハ舌黒ク焦レタルモ此方ヲ用テ取効ト多


シ手足厥冷ニハ理中湯附子理中湯參附湯ヲ用ヒテ元氣ヲ無カウ可有ノ地ヨリ生スルト多シ臨機應變ノ術ハ醫ノ必スナル處也平生ニ其心鏡ヲ琢磨メ虛靈物ヲウツスノ器品ニ非スニハ傳へ難ク傳テ得難、傷寒ノ治法ナリ

○傷寒温熱ノ類ノ火熱ノ病必耳聾ラヌ也藥ヲ用テ耳聾少ニテモ開通スレハ藥効ノ機發ト知ルベシ

○傷寒諸ノ熱病ノ類舌裂舌黒ク口中黒ク大小便自利ノ人豆ヲ不知者ハ危篤ノ症ト知ベシ

○傷寒ノ症危篤ニ至テ石羔ノ用ルト人參ヲ用ヒトハ時節ヲ知

リ得ナハ十全八効ヲ取更也是口授傳意ノ神祕也近時ノ庸医多ハ補ニ偏也傷寒ノ危症ヲ見テハ虛實ノ辨モナク大料ノ獨參湯ヲ用ヒ已カ本藥ノ中ニモ人參ヲ加エ一爻ニ爻ニ至修合ノ劑ハワツカニ一爻ノ内外ノ分量ナル小劑ニ多分ノ人參ヲ入用ヒニヨツチ方ノ君臣佐使ノ差別モナク只病人ヲシテ游二人參ヲ服セシム故邪氣ヲ補住メ熱洩ルアタハズ多ハ久ニ至ル其中百エ一人モ脾胃ヲク元氣壯丸者自然ト熱盡テ愈ル類レバ其ヲ証據ニノ已カ術ヲ術ヒ能ヲ券ル又如是人參ビタシニモ效スル者ハカホドニ大丸補ヒ湯ヲ用テモ其補及サシハ術ニシテ已カ術ノ拙キラ人參ニテ飾ヒ病家素ヨリ愚昧ナル者多シベ其理ヲサトフズ人參ノ價貴キ物ナル其程ノ効サク云叶フ



シテ思ヒ世俗ノ風習トナリテ人參ヲ用ル医師ヲ上手ト号メ
治ラセ也適此道理ヲ覺リタル病家アヒ医師ノ説此病ハ
スベキ正病家古今メ人參ヲ買サルニヨリ見スく病者ヲ殺
スド云此時父母ノ病ニアタリテハ否云ヒ難ク貧家ハ婦ヲ賣
リ子ヲ販キテ父母ノ命ヲ救ハシトス况ヤ富家ノ財ヲ費スア
テ數々難シ如是金銀ヲ費スノ三方病苦ヲ増シ百年ノ夭歟ヲ
夭折ス嗚呼可嘆云云近來如是補藥ヲ用ルノ治世ノ人生質
虚怯ナルシ以テ故也大明三百年ノ治世ニメ人必不智リ氣ヲ遣
テ形ヲ安逸ニスル故ニ世間ノ人生質虛弱ナルニ猶元氣虛怯
久弊已出テ天下大補ヲ用テ其効多シ日本王百有餘年
リ治世尤大補行テ其利多シ是ヲ以世醫補ニ偏也然庄其

此余程論
不可忘ニ
大余也

偏寧者

太病之名

用時節ノ知ス謾ニ人參ヲ用ルニヨリテ其害夥シ又カク云バ人參
ヲ嫌不蛇蝎ノ如不人醫アリ是亦鴻ニ偏ニ其害猶夥シ醫タラ
者ハ補浮ノ間ラエ夫タ詳々治療スシ可怖可憚

○婦人ノ傷寒ノ治方男子ト同シ然庄婦ノ月經ノ時ニ風寒感
ズレハ熱入血室ノ症トテ太熱ヲ發シ諭言妄語ニ危急ノ症ヲア
ラワス也小茈胡湯ニ四物湯ヲ合シ桃仁紅花薬木ヲ加テ用レハ
其熱解スルナリ

○婦人妊娠ノ時ノ傷寒溫疫ノ症ハ大熱ヨツテ必胎墜元ノ
多胎禁ノ藥ヲ用シ心ヲ付ヘシ五ヶ月ヨリ前ノ胎禁ノ藥
忌怖ルノ販毒散九味恙涼湯ヲ用テ發散スヘシ其後ハ此
胡湯ノ類ニ加減用シ裏熱アリトテ謾三下スカフス大熱

温熱ノ邪ニ中リ或ハ山嵐氣感スル也治療ノ法ハ多ハ傷寒初發ノ如ク發散スル宜シ風ヨリ濕ニ勝ノ理ナベ風藥ヲ用レハ濕熱退也但シ濕熱ノ症ハ言語濁リテ瓶中ヨリ云ガ如クアリテ熱氣表ニ浮バヌメ根ツヨク底ニ沈ム者有其脉多浮數中ニ輕滑ノ氣味ヲ兼テ強緊ノ勢ナレ發散ハ利コベシ加テ用ヘシ其効神ノ如シ加減速ニ者甚ニ載ス参考スジ用ルト四五日ニ至テ毛熱退キ凡時ハ冒冬湯ニ茈胡黃芩升陽散火湯ノ類加減ノ用ベシ加減委ク参考ニ載ス参考スベシ是亦石恙ト人參トヲ用ル時節アリ口授ノ傳ノ古也

(1) 大頭瘡、症、頭脢ニ如オ或ハ耳根腫痛、頭ニ瓶ナドラ

アリト云謾、石羔ノ類ヲ用ヘカラス六角ノ後ハ大既其胎堅固ナハ胎禁ノ削上テモ害ニキ者ナリ其上内經ニ有故無損亦無殃トアハ太熱ノ邪氣ニ其藥應スルニ因テ胎ニハ妨ナシト知ニ姪婦トテ餘リニ大支ガリ過シ手エルキ療治ヲスレバ其熱ツリテ胎ヲ燒キ落ス類多シヒトリ、傷寒、瘟疫ノニアラス或ハ瘧熱利熱ノ類ノ症モ心ヲ付テ療治スキ更也

○小兒ノ傷寒ノ療治大人ニ同じ去ナカラ其藥ノ分量多少ソノ小兒ノ年數ノ大小三從^ノテ加減アルト也是王多父發散ノ後ハ小茈胡湯ヲ本藥メ加減メ用ヘシ分量ノ多少口傳アリ

○時疫、瘟疫、○大頭瘡、○蝦蟆瘡、○百合病、○百日病

○時疫、瘡疫ノ病六疫瘡ノ類ニ一般ニ流行スニ熱病ナリ多ハ

被夕ル如ク上カガキニ成テ大熱ヲ致ス也其脉多浮太ニ
メ數ナリ荆防敗毒散ニ黃芩、黃連牛房子ヲ加テ用テ發レ
或ハ牛房芩連湯ヲ用共ニ神効アリ

○蝦蟆瘧ノ症ハ両ノ腮ヨリ耳ノ根ニカケテ頬ニテ腫テ蝦蟆ノ
狀ノ如ナリテ大熱發ス今時ノ和俗コレヲ江戸挾箱ト云治法多
ハ大頭瘟ニ同シ荆防敗毒散ニ牛房子、黃連、黃芩ヲ加テ用又ハ
牛房芩連湯モ宜シ或ハ老人或ハ血虛ノ人或ハ冬月嚴寒ノ
時血濁テ熱發シ難キ類ハ五積散ニ牛房子芩連湯ヲ加テ用シ
神効アリ此症右ノ藥方ノ類ヲ十貼計用ハ多ハ愈也但シソ
ニテモ治ニカヌル時ハ茈胡清肝湯清肝益采湯ヲ用ヒ或ハ加
味逍遙散ニ連翹黃芩酒黃連ヲ加テ用ベシ有神効

○大頭瘟蝦蟆瘧ノ症ニ普濟消毒飲ヲ用ヒ防風通聖散ヲ用
テ神効アリ

○傷寒百合病ト云症アリ多ハ傷寒、瘟疫後虛勞ノ臓腑不平
變メ此病トナル其証寒ニ非ス熱ニ非ス飲食セント欲メ食矣行
ト欲メ不行坐セント欲メ不坐藥ヲ服スハ即吐シ小便赤ク鬼ヲ
見シ如ク丸ヲ百合病ト名ク茈胡百合湯ヲ用ヘシ其効如神

○惣メ傷寒瘟疫ノ類諸ノ熱病ヲ治スル方ハ多ハ皆小茈胡湯
ヨリ變化シ來ノ方ナリ諸ノ熱病ヲ治スル加減委ク方者ニ載タリ
可参考

○諸ノ熱病ノ類ニ發散和解温補滋陰降火ノ劑ヲ用テ在熱
退クナリ肌膚ノ間ニ熱アリテ烘か如クノ不止コニ兩月或半年

カリモ如是モノ有東垣ノ升陽散火湯ヲ角レハ三五貼ニ其熱解スル也此太秘藏ノニメ奇々妙々東垣ノ流ニ渦潤スル人ニ非シバ此理笄トシ難シ可秘

○中寒

○中寒ノ證ハ寒氣直ニ榮分ニ入ノ病也口禁メ音ヲ失シ腹痛吐瀉シ四肢強直シ多ハ四肢厥冷レ其脉多ハ緊濶ナル者ナリ此症体虛勞疫勤動ノ人暴卒ニ嚴寒ノ氣ニ中ル也傷寒溫疫十ドハ違テ殊ノ外尤急証ナハ油斷スル其儘工平日ノ中二度モノ也早ク驚キ理中湯ヲ大料ニ用ベシ必附子肉桂ヲ加シ腹痛甚キハ下子木香ヲ加ヘシ四肢厥冷スルニハ逆湯ヲ用ベシ○中寒ノ症寒熱往来シ身痛腰背強痛項背拘攣ニ腹痛ス

ハ者ハ五積散ヲ用ヘシ寒ノ榮分ニク者十七八血分ノ榮ヲ用テ榮分ヲメ温散スル寒邪自解スル也頭痛如裂ニ細辛新加ヘシ
○中寒ノ症五積散理中湯ノ類ヲ用ニ汗出寒熱可口テ後ニ體憊ニ脉微細丸時ハ六君子湯ニ當故炮姜ヲ加ヘ或ハ肉桂少計ヲ加テ調理スレシ虛甚キ者ハ補中益氣湯ニ炮姜肉桂ヲ加テ用ヘシ或ハ異功散ニ當故炮姜ヲ加ルモ佳也

○中暑○中暘○注夏病

○暑邪ノ症ニ二ツ有動テ得之謂中熱或ハ中暘ト名ク靜ニメ得之謂中暑也皆熱火ノ病也暑ハ氣傷ル故ニ其脉多ハ虛ス弦芤浮數ラアハ其脉狀無餘モノ也輕キ者ハ香薷散ニ香

需ヲ倍加用ベレ

○夏ノ時ハ内ハ甜瓜西瓜冷濕ノ麪類過食シ外ハ深堂冷臺
水館ニ涼ヲ納レ富貴ノ家ハ他人ノ揮扇ニヨリ或ハ竹婦人自身ヲ
冷ニ因テ内外ヨリ冷テ却テ煩也藿香正氣散ヲ與ヘレ多ハ泄瀉ヲカ
ヌルモノセ

○暑邪熱甚キ者ニハ黃連香薷散ヲ用ベレ

○暑熱ノ邪伏ノ身體困倦シ神昏ク頭重ク吐利ノ症ヲ兼ル

ニ六十味香薷飲ヲ用奇効アリ

○暑邪ニ中リ或ハ長夏ノ濕熱ニ感シ寒熱往來シ或ハ譫言汗
出テ煩シ精神減少氣高ノ喘シ小便黃々數少或ハ大便滯泄
飲食ヲ不思者ニハ清暑益氣湯ヲ用ベレ此症ニ藿香正氣散ヲ

用ルト清暑益氣湯ヲ用ルトノ分別アリ藿香正氣散ハ發ノ熱
ヲ解スル也清暑益氣湯ハ收テ熱ヲ解スル天壤リ違ヒ也口授

心傳ノ祕也

○暑ニ中リ寒熱シ咽喝シ泄浮スル者ニ益元散ヲ用ベレ或夏
月小便黃ニ少ク或ハ夏中長途ヲ步行シ或ハ藍輿ニ乘テ

旋行スレバ淋病ヲ發スルトタレ益元散ヲ用ハ其効如神

○夏月行路ノ旅人炎暑ニ中リ身熱シ口渴キ前板齒燥キ
舌燥テ胎ラ生ジ大ニ煩渴シ甚キ者ハ人更ヲ不知ニハ人參白
虎湯曲春中暑ニ出方モ可有

人条下可参考

○老人體人暑邪ニ中リタルハ張玉錫が近製清暑益氣湯

用シ銀或白木散モ可也或ハ生脉散ヲ用ル症モ多シ方考生
脉散ノ条下可参考

○暑熱ノ時節霜雨ナド降テ俄ニ冷氣行ル六諸人是ニ感ソ
一般ニ咳嗽寒熱鼻清涕ヲ流スヲ患也和俗コレヲ寢冷ト云
或ハ夜深ニテ軒外庭上ニ納涼シ冷酒ヲ飲テ坐卧シ不覺睡
眠レ夜服ヲ覆フ一ナケレバ夜氣ニウタヒテ是亦前証ノ如レ共ニ
寢冷トム多ハ薦替正氣散ヲ用ヒ愈ニ也又ハハ解散三葛根
炮姜ヲ加テ用モ宜シ又ハ君子湯ニ羌活蒼朮葛根炮姜ヲ

加テ用エ其効如神

○注夏病トムハ春ノ末夏ノ初ヨリ頭痛レ身ニ微熱アリテ
手足ノ心熱アリ形体倦憊レ小便黃ニ好テ晝寢ヲ近テ脚

軟弱ニメ行歩立キ色萎黄ニ形体羸瘦レ飲食不進也和
俗ニテ夏病トムハ夏病也病トム甲子年湯炮姜砂仁當归橘梗
用ヘ或興功散ニ并麻此胡當散ヲ加ヘ或咽喉スルニ八錢皆
脉散ニ陳皮當归ヲ加ヘ或生脉散ニ當歸陳皮等加用ヘ多
少虛弱之人及年老者事無不順因是春熱也此誰不參酸益
元湯即春中暑門ノ用ア佳制加減圓春ニ詳也可考

○中濕ノ症ノ布用中中濕外中濕也外中濕ノ人多
山風大溼氣ニテ山谷ノ間界煙火如クニ德勝平氣
火之症ヲ云或而濕氣特行而湿裏表裏也山川道路
水立浦ノ或久久湿地坐レ或温難スハ辛ア達ノ行

汗出テ衣裏ニ通リ名ラヌキカレル其汗冷ト湿トナリ此症

寒ニ或ノ新ニ家ヲ造作ノ其壁未乾ニ移リテ其湿感スル

也其症頭重タ目眩キ身体疼痛手足酸軟麻木シ腰脛

腫痛シ休重又如山頭重ノ病ヲ飛^ハルか如ノ寒熱往来シ其脉

多ハ濡緩也内ノ中濕トハ生冷水菓濕麯厚味ヲ過食レ醇

酒過多子レハ濕内ヲ優^シル其症或ハ外湿ノ候ノ如レ其湿脾ニ

着テ三焦ト氣本運小腸ノ疝氣出テ偏墜又累九腫痛ニ

手足面白浮腫レ目中黃ニ小便赤黃或泄濁^ハ其脉多ハ

濡緩^ハ濡小ヨ兼或ハ渭^ハ帶也

外濕ノ者ハ胃苓湯五苓散ヲ用テ小便ヲ通^ハル外湿

變^ハ也或ハ行氣香薷散^ハ蒼朮ヲ加^ハ或敗毒散^ハ類風藥

ヲ用テ濕ニ勝^ト吉

○内濕症^ハ薦者正氣散不換金正氣散ニ加減^ハ或平胃散^ハ加減^ハ無^ハ也

○濕症^ハ外共^ハ滲溫湯脚門出^ハ加減^ハ用^ハベシ

○内濕症^ハ症眼黃^ハ腹痛^ハ者多ハ脹滿^ハ變^{スル}者也平胃散^ハ換金正氣散等^ハ加減^ハ可用

○新^ハ達^ハ家壁未乾^ハ移^ハリ其湿^ハ中^ハテ多^ハ浮腫

身体^ハ重^ハリ寒熱^ハ發^ハ也眼黃^ハ類^ハ證^ヲアラワス也平胃散^ハ

苓湯等^ハ少^ハ風藥^ヲ加^ハ用^ハレ^ハ或^ハ藿香正氣散^ハ蒼朮^ハ

藤^ヲ加^ハ用^ハ若^可也

○外濕^ハ內濕共^ハ小腸^ニ著^ハ也病氣混^ハ翠丸^ハ腫痛^レ或

○外濕^ハ內濕共^ハ小腸^ニ著^ハ也病氣混^ハ翠丸^ハ腫痛^レ或

偏墜寒熱ヲ發スニハ行氣香蘇散ヲ用ヘ加減季病氣門出又鳥鳴通氣散王可也

○旅途中或ノ舟中ニテ霜雨ニヨカサルハ其濕ニマタルト

不換金正氣散ニ加減メ用ヘシ

○下云多湿ヲ減メ宜シ才換金ニ加減メ宜

○今時仕官ノ人或商人モ東武ニ至リテ鬱氣ニ足膝痙攣

ニシテ日虛浮レ飲食不進者ヲ俗ニ清月煩ト云是皆水土ニ

賅セサノ類也故御ニ歛ルトテ箱根山ヲ越ヒ多ハ其病不治メ

自古平服不牛馬官ニ在時汗屋ニテ西國ノ諸候ノ屋敷ヲ

日間ス三日所ニモ此病アラスト云フナレ多ハ不換金正氣散

○用テ宜虛鬱ヲ除ム者必ズ效ス濕ヲ治メ不愈者ハ必速ニ故鄉ニ歛ルムベシ箱根ヲ越ヒハ自ラ愈ル也一奇良藥也國牧ノ傳

医タラ著知ラスハアルベカラズ

○風濕ニ中シ脚腫痛不著多シ委々痛風門ニ薦可参考

○中風

○中風ノ症真中類中ノニツアリ近時ノ中風ハ氣体虛弱ノ人或ハ酒食過度レ或ハ七情ノ大過ニ因テ真氣耗散メ邪虛ニ乘スル也卒ニ倒仆ノ口眼喰斜レ口噤テ不語痰沫ヲ吐レシ或ハ食物ヲ吐出シ人事ヲ不知者ハ先獨合香圓延齡丹ノ類ヲ牙齒ニスリヌリ生姜汁ニテ咽ニ入ヨムス薦ルす

○卒中風ノ症先右ノ如ク陳藥ヲ牙及リヌリ通關散

風門

卷之三

十一

鼻中三次入嚥者、可治。嘔吐者、不可治。

水

三生飲ヲ用ベ。如是メモ元氣不蘊其色、蔚睡ノ如ニメ人、更ヲ不知者ハ多ハ夢中ナガラ歟ス。如是、症烏藥圓_{朴制ヲ用}或人參三生飲或ハ獨參湯參附湯ノ類ヲ用ヒ破粥摩爛湯ナドヲヒ蛤壳ニテ入ヲケバ或ハ四五日六七日ヨ歷テ夢ノ覺タクが如二ノ元氣蘊生スル者アリ。此時ニ至テ或ハ左半身カ右半身カ力不遂コラ見ル也。多ハ男、左女ハ右ナルベシ。去ナガラ夫モ人ニヨル事ナリ。此時ヨク脉ヲ診メ氣虛血虛ヲ弁ヒ或ハ痰ヲ兼レマ否ヤトエリヲ辨メ治スベシ。

○中風元氣蘊リテ後ハ多ハ氣ヲ順ベシ烏藥順氣散ハ味順氣散張王錫カ增減順氣散ノ類ヲ見合テ用ヘシ加減委ク

若舊ニ載ス可参考

- 卒中急証痰喘甚キ者ニハ續命湯或ハ導痰湯ノ類ヲ用ヨ痰喘收リテ後順氣ノ劑ヲ用ベシ。
- 中風急証多ハ退テ後但手足不遂或ハ言語蹇澁スル氣血ノ虛也。八物湯加減加味大補湯五論湯ノ類用ヘシ。
- 中風氣虛ニ属スル者ハ補中益氣湯ニ加減スヘシ氣虛手足不遂ニハ補中益氣湯ニ木瓜附子ヲ加ヘシ氣虛ノ言語蹇澁スル六補中益氣湯ニ石菖蒲附子遠志ヲ加ヘシ氣虛ノ痰アラハ補中益氣湯ニ茯苓半夏ヲ加ヨ。
- 中風氣血虛ノ痰ヲ煎ルニハ五積散ニ加減スベシ。
- 中風ノ症腎氣虛メ陰血枯竭ス故耳足不遂ノ類多

六味丸八味丸若飯丸在飯丸ノ類三加減ノ用ヘシ此等ノ藥ニ本

心薏苡仁虎胫骨穿山甲ヲ加減スリ可秘ヘ口授心傳ノ妙也

○總メ中風ノ療治ハ多ハ氣血ヲ補テ氣ヲ順レ痰ヲ驅ヘシ大

補湯ニ陳湯ヲ合ヒ烏藥羶蚕ヲ加テ其効如神

○中風ノ脉ハ浮ラ吉トス滑ハ痰ヲ兼ル也浮ニメ遲ナル者ハ

吉トスニ疾ノ者ハ皮ス

○中風ノ惡症ハ口開キ手ヲ撒キ眼合シ遺尿シ沫ヲキ直視

上竇ニ面ソ色赤ク喉駕^{ヨコア}ノ如ク卒ニ肉脫^{モモ}筋骨痛ヲシ汗

出テ連珠ノ如ク髮直^{カタマタ}頭ヲフリ動ク寸ニキリニ筋痛モノハ皮

証ナリト知ヘシ

○類中風ノ症ハ或ニ寒ニ中テ卒中風ノ如ナルアリ附子理中湯

五積散ヲ用ヘシ暑ニ中テ卒中ノ如クナル六黃連香薷散ヲ用ヘシ

食滯ニテ卒中ノ如クナル三鬱金香正氣散不換金ノ加減ヲ用ヘシ

○預メ中風ヲ防ヘト云方ヲ諦書ニ出ヒドモ無益也只酒食ヲ慎ミ

房事ヲ慎ムヨリ外預メ防ケ術ナヘト知ヘシ

○飲食

○飲食ニ傷ル者ハ氣口ノ脉緊盛ナル者也食消化セガラシム

其脉浮滑ニメ疾急也

○飲食ニ傷レテ寒熱ヲ發シ或ハ上吐シ下泻ス者ハ鬱金香正氣散ニ加減ヲ用ヘシ其中吐逆甚キ者ハ藿香白芷桔梗^{カクヤウ}杏

ベニ不換金正氣散モ可也

○飲食大過ノ腹痛シ吐逆ス者ハ不換金正氣散ノ用ヘシ

○内八生冷之食物ヲ大過レ外ハ風寒温ノ氣感ニ腹痛寒
熱ヲ發ス者或特病ニ疝氣アル人食滞ニ因テ疝氣起リテ
腹痛小腹痛スル者云共二行氣香藥散ヲ用ヘレ加減方薦三
載

○飲食ヲ大過レ腹痛レ吐逆モナク浮下モナク悶乱苦痛甚
テ久須刻ニアル者ニ番用ノ家傳神通ノ振蕩ヲ用ヘレ番用

無部火輔經考朝鮮医李整菴ニ傳所ノ神通湯方

良姜 下香 沉香 木香 陳皮 茯苓・大腹皮

吳茱萸 砂仁 連翹 乾姜 枇杷葉 右十味

此藥ノ妙、連翹ト枇杷葉トヨリ分量ニ白傳所甚人ニ非

六傳ナサカレ此藥ナツ食滞全限ニズ一印ノ病危急


メ一息切斷ノ時ニ至テ一呷スハ立トロニ神効アリ呼吸レテ
其後虛實ヲ分別メ治スベシ其効遂ニ速カタレ口授心傳ノ
妙方ナリ

○飲食大過ノ腹痛甚キ者八玉樞丹ヲ用ヘレ或八勝紅丸
神通丸ヲ用ヨ甚キ者ハ備急圓ニテ下スヘ

○食滯ノ症吐導スルヲアタワズ悶乱苦痛ノ久須刻間ニル
者ニ勿氣飲ヲ用テ胸膈ヲ開ケハ必吐メ危急ヲ救フ其効

神ノ如大秘事也其人非ノ傳所ナカレ可祕
○酒傷ノ症八平胃散ニ葛根砂仁ヲ加テ用ヨ甚キ者ニ葛

花解醒湯ヲ用ヨ
○強飯餅團子ノ類ニ過食之寒熱腹痛七平胃散不換



ノヨク参考スヘ、脾胃内傷ノ治方ハトカク東垣ヲ元トスレ
内傷ノ症飲食不甘或ハ泄泻一兩行身体倦憊スル者ニ興
功散或ハ六君子湯或ハ七味白朮散參苓白朮散ノ類ヲ見合
テ用ベレ食ヲサシハサウ者ハ香砂平胃散香砂銀胃湯香砂六

君子湯ノ類ヲ用ベシ

○内傷ノ發熱烘カ如クニテ又退キ苦寒ノ剂ヲ用テモソノ弊
不除補陰降火ヲ用テモ其熱退キ又アラキニ東垣ノ升陽散

火湯ヲ用ハ其効如神

○内傷ノ病補藥ヲ用テ胸塞キモツモツリ飲食進三難キニ石菖蒲一

味細末ノ用ハ其効如神

○内傷ノ症ハ參芪ノ類ノ補藥ヲ用ルノ數十貼ニノ其病漸々

此条治病之
大原也不可
忘遺于

重複スル行氣香薷ヲ二三貼用テ又補藥ヲ用六補藥ノ功甚
速也此以肝氣鬱多脾氣少也因テ也行氣香薷散ヲ用

補藥ノ滯リラ回バ更ニ知ヘ太極車也又逍遙散ニ砂仁苡草

ヲ加テ補陰剤ヲ用ユル間ニ服スルニ二三貼スルモ妙也

①虚弱ノ人形体羸瘦シ飲食不進面色委黃ニノ大便秘泄
不時者ノ肝胃虛勞ノ證ト云必ス咳嗽ノ發スハナリ龜王真
勞咳虛勞ノ證トノ多滋陰降火ヲ用テ久ニ至ル如是ナルニハ

六君子湯ニ朴麻此胡桔梗山梔子ヲ加ヘ或ハ虛甚ニ補中益

氣湯ニ茯苓半夏五味子ヲ加ヘ異功散ニ朴麻桔當歸ヲ加

テ用ヘ可矣

①内傷虛弱ノ症形瘦弱ヘテ殊ニ著シナシラクト氣色

アーチニ升陽益胃湯ヲ用ヘシ又ハ雲林潤身丸_{〔春内〕}楊門出_{〔外〕}特業

ニ用ルモ吉

○肉傷ノ證五更ノ時ニ泄浮亢者アリ多々脾腎浮_{〔變〕}不穀者アリ此病多々夜食ヲ過ス故ニ脾胃虛ソ浮_{〔升〕}東垣ノ升陽湯ヲ用ヨ其効如神

○總ノ內傷_{〔屬スル病〕}其品多シ其病證ニレタカツテ治爻レ其見_{〔アキラク〕}所ノ病ヲ見_{〔アキラク〕}其門ニ求ムベキ也

○辨證

○肺証氣血凝結ノ不散ノ病アリ其脉多_{〔沈〕}休止也

○氣弱ノ證三分之氣飲ヲ用ヘシ多_{〔少〕}室女寡婦獨在ノ輩

○或ハ始メハ富貴ニ交後三貧賤ナル者或_{〔寡〕}舅姑三不得_{〔子〕}婦人

或ハ夫婦中不和或勤番近習ノ士或勤学ノ人等多氣弱ノ諸病ニ變也而經三五百病氣ヨリ生スサアト_{〔アト〕}氣ヲ猶_{〔シテ〕}六煎散也

○瘀蔚ノ症ニ陳湯四七湯ノ類ニテ胸膈ノ瘀ヲ開散_{〔スル〕}矣

○川芎枳實湯_{〔〔春蔚〕門出清〕}抑膽湯ニ加減ノ可用

○血蔚ノ症ハ當取活血湯_{〔〔春蔚〕門〕}或ハ正氣天香湯ニ當取亦

芩桑紅花ヲ加テ用ヘ

○食蔚ハ香砂平胃散_{〔〔春蔚〕門〕}ヲ用_{〔スル〕}或_{〔アリ〕}不換金ノ加減ヲ用ヨ

○熱蔚ハ火蔚也火蔚湯_{〔〔春蔚〕門〕}ヲ用ヘシ升陽散火湯モ妙也

○諸ノ蔚症何共見分難キ者也此時ハ六煎湯ヲ用ヨ此方諸蔚ヲ解_{〔スル〕}妙方ナリ可秘

六煎湯方
各門考不補
達古_{〔良〕}使_{〔良〕}效
景川引_{〔良〕}效
本草全書

○婦人氣滯々血不行月經閉塞レ腹脹鼓脹トナリ者多不
救モ也指迷七氣湯ヲ用ヘシ或ハ丸藥ニ用ルモ佳也勝紅丸
神通丸モ可也

○前証肝經ヲ衝テ股脰疼痛スル者多大七氣湯或ハ行氣
香蕤散ヲ用ヨ或ハ小茈胡湯ト正氣天香湯ヲ合ノ用ヨ甚ニ八
左金丸利氣丸曲春門ノ類可也芍藥ヲ加ルフ妙才ス

○痰飲

○痰飲ノ病ハ明ノ難シ何ノ病ニ毛痰ヲ挿ササガスハ稀ナリ其脉多
八滑セ多ハ沈弦細タヂカラ兼ルナリ

○痰飲ノ症頭運ク目眩レ耳鳴或口眼蠕動レ眉棱骨痛
噫氣吞酸心下嘈雜カツザツニ陳導痰湯ノ類ニ加減製用

○痰飲ノ胸痛之火ハ四七湯ヲ用ヘシ

○痰飲ニ結核ヲ手足ニ出レ或ハ何ノ處ニモ腫出テ不痛不
痒者三六導痰湯清濕化痰湯清熱導痰湯ニ加減ノ用ヘシ外
ノ腫名九处ニ生天南星ノ末ヲ糊ミテラレセ紙ニシケテ上ヨ

○貼スベシ

○頸項ノメクリ癰瘍馬刀ノ類ノ核アリ者此痰核多茈胡
清肝湯ヲ用ヘシ其勁如神

○痰證竇孔者ハ潔痰丸ヲ用ヘシ此方奇妙ノテ主治病

加減壽考卷二載奇考

○想メ痰症ニ陳湯ヲ用ヒ或ハ吐方ヲ用テ痰ヲ吐ヘシ痰沫出
レ多大長ヨリ万病何共見分難キノ疾トナツ治スレ古久所謂
怪病ハ疾トナレテ治セヨ急病ハ火トナレテ治セヨト善哉此言也
痰飲ノ症咽塞一息切斷ノ時八家傳神通ノ振出レラ用レハ
其効如神可祕

○咳嗽

○四時ノ感冒多ハ咳嗽ヲ兼ル也發熱惡寒痰ヲ吐クモノハ
參蘆飲ヲ用ヘシ是肺氣ヲ外ヨリ束タル故ニ咳嗽ヲ發スナリ
○一切ノ咳嗽上焦ニ痰壅盛スル者ハ清肺湯ヲ用ヘ
○咳嗽甚キ者三分心氣飲ヲ用テ其効ヲ得シタ多シ

○咳嗽痰盛ナスニ陳湯ヲ加減或清熱導痰湯ヲ用ヘ
○咳嗽久胸膈結痛スル證ニハ裏枳實湯ヲ用ヘ
○咳嗽久不正者脾肺ノ氣必々損不其上ニ發散ノ剂ヲ
過レシ或ハ驅痰ノ剂ヲ過用スルニ因ニ脾肺ノ氣既傷損入于君子
湯ニ桔梗山楂子ヲ加テ用ハ其効如神虛甚者補中益氣
湯三茯苓半夏ヲ加テ用ヘ肺氣虛耗不入于補中益氣湯ニ麥
門冬五味子ヲ加用ヘ
○咳嗽久不正風藥ヲ用ルト大過スル盜汗出ニ虛瘦加ハ
是ニ風房ノ證ト云黃芪蠶油湯用ハ其効如神
三變久也男女皆十六七ヨリ三十歳ニ止ム咳嗽アラ早止ム

滋陰至寶湯滋陰降火湯類見合用ヘシ多脉細數十九者也若脉不細數虛弱テ、舒ニ難キ、脾肺之虛ト知ヘシ。君子湯補中益氣湯加減ヲ用ヘ。

○室女或近習ノ仕官ノ人氣弱ノ咳嗽或好言ヲ誦レ或前富貴ノ後貧賤尤者ハ多々氣弱ノ咳嗽又正氣大香湯分心氣飲ヲ用ヘ庸医王ス所ノ治療テ多々此等ノ方ニテ愈也然在此証ハ多ハ思テ脾ヲ傷名十六君子湯加減ニテ多ハ愈也或ハ此證ニ滋陰降火ヲ用ル医アリ地黃、苦寒知母、黃柏、太寒イヨ、脾胃ノ生發ヲ克候スニ因テ咳嗽ノ增ノミナ外至者多能ク工夫ヲスヘシ。

○老人ノ咳嗽ニ五積散ニ加減又シ冬月ノ咳嗽不此方ヲ用

シ老人咳嗽ニ難ニ復次之寶湯見于金匱七卷ノ用ヘシ其効如神

○小兒ノ咳嗽多食大谷所也薦香正氣散不換金氣散
人用ヘシ痰盛ニ吐乳下アツハニ陳湯ニ黃芩連壳ヲ加ヨ小兒
人數ハ多ハ虫氣ヨリ發人也氣傳保童圓用ヘシ人謂之諸
咳嗽乃可也此等ノ藥ヲ用テ效キ有三、錢氏曰木散ヲ用
ヘシ其功如神

○妊娠咳嗽ハ干嗽ト名久嗽兼和氣飲ヲ用テ宜シ

○總ノ咳嗽ノ療治四時共ニ參蘿飲ヲ用テ加減又シ夏月ノ
暑濕ニリ咳嗽甚シ諸方不應ニ黃連香薷散ヲ用テ食滯太子王
如神食滯ハムテ咳嗽不除又崔香正氣散ヲ用テ食滯太子王

咳不甚人解散用三七草根參之入風寒中リテ咳尤
ニ行氣香蘇散或大十氣湯ヲ用ヘシ何レノ咳嗽三十至八十
不止ハ寒熱虛實ラ不問六君子湯加減ヲ用ヨ福ニ方薦
載不可考

○喘急附則略

○喘急ハ多在其人生質ニ痰之子外七氣主之安者性者秋
ノ夜飲氣遇肺氣之逆也因之發之者先少後多飲食
ヲ用發ノ取ヘシ必ス愈ニナリ

○喘癇譯ハ喘動之疾聲如牛角而其氣粗濶湯用三
火上リテ喘スル者食ヲ得ハ減シ食止ハ喘シ頭汗出テ如
喘息者也清肺湯

○喘息短氣呼吸短促ニテ痰声無也四君子湯曲木
端門ヲ用ヘシ

○吼哮ノ症ハ喘息同候中水雞ノ声ノ如ク十九吼哮ト云
正傳三出名引專ラ肺家中ニ痰氣也五虎二陳湯用

○痘人喘息治人初發ハ先ノ參桂飲ヲ用ヘシ其後ハ九
寶湯銀翫湯蘋子降氣湯沈香降氣湯ノ類ヲ用ヨ清神湯
類見合テ用ヘシ痰喘急促丸時一家傳神通ノ振濟ヲ用ユ
ヒ即時効ヲ取也此藥ヲ用ハ時節アリ其時ヲ知ヒ大秘
密也其人非ハ傳之不可

以淳熙十四歲春月二十九日戊辰旦而達成都

六月小滿日七月大滿日八月小伏辰

九月大滿日十月小滿日同三日己巳晚

盤門

自同三日成都發行至十月三日晚入盤門日數
百二十日

讀范石湖至能城大先生所著吳船錄

一號出蜀記

四川棲道圖說

玉雞古陳念縣也南門度渭水十五里至

閔尹臺故宅左為沿漢直入皇石梁之可

掘又十丈為棧道高岸柳雲額以僊室童閣

即大散關也閔下水北流入渭南流入漢堪

輿家謂為中龍過脈平坂虎豹畫夷

道傍二十金步則起獨樓雅以櫈屏昂三

烟突聚落亦砾木爲城壁庭之自東新店

偏橋路絕處抑找崖壁間偏山架木不

臨白水之流始真棧也白屋鶴至以屋以板

真雨城俗矣戎俗矣又上下鳳嶺五十里至三

全者一去直去棲霞云郿也蜀道在羣山枯

壑中昔孔明出斜谷節此嶺南北人食白

水江陳倉峻嶺僅容單人西行三百里為汚

之百丈波韓淮陰明修棧道暗度陳倉者

是三千里為松林驛十重上紫閣後下重為

柴柏署前列雙峰尤山深處有寺樹石蒼

翠錯落岱中第一勝地也當署早沙如磁晴

雨皆可人此地者山交馳緣水中貫豐林

前擁登躋後隨表未杳無其跡馬鹿

江深處約丈餘皆巨石激湍時有小鷗

鷁千百為群飛立水際盤上青橋峯巒

難步又三千里上七盤盤盡為雞禍巖名

如鶴羽起逼漢下俯後出至魚鱉崖

尤為出棧最奇處郵子真畔焉彌勤客

也

阿史之谷

屋漏水行

謝解

屋

嘉慶丙寅年夏月天寧寺大像院在

廣德縣

寺地號舟藏唐開元中僧道海始鑿山為窟

窟

佛像以磚之高四三百丈文頂圍丈

目廣丈為樓十三層自頭及其足極天下

佛像之大而耳以木為之佛足高江數步

萬

像之大而耳以木為之佛足高江數步


萬

像之大而耳以木為之佛足高江數步

萬

像之大而耳以木為之佛足高江數步

萬



○持病喘大后者平日三六昧丸ヲ服スハ腎氣下盛ニ
メ虛陽上生無因火發者多シ摺又喘息稱病ハ年老
火發亦下薄レ火故テ上氣少キノ故ナリ

○腹痛

○腹痛證ハ多大食滯ノ才入所也其脉多大關脉緊小ニシテ
急ナル者也九種ノ腹痛アリ寒熱血食濕痰虫虛實也
問春ノ腹痛ヲ見合テ療治スヘン

○腹痛症ヲ治セハ先食傷ノ仕掛ニスベシ家傳神通ノ振華ヲ
用ヘシ多愈ル也甚者ハ反魂丹計應丸奇効丸命復丸万病
解毒丸玉樞丹ノ類ヲ用ヘシ或保和丸勝紅丸神通丸ヲ
用ヘシ

○腹痛食滯ノ者ハ香砂平胃散不換金ノ加減ヲ用ヘシ食滯

甚ク痛ヒリナラバ枳實大黃湯ヲ用ヒ或備急圓ヲ用テ下ス
ベシ是即實痛ノ症也

○腹痛證歟血瘀血ニテ痛者ハ平胃散ニ白芍赤芍牡丹皮
玄胡紫川芎芍藥坤桃仁紅花肉桂ヲ加テ用ヘシ

○腹痛證血屬元者ハ平胃散ニ烏梅花椒木香川棗子
枳榔使君子ヲ加テ用ヘシ

○腹痛虛ニ属ニ有者ハ六君子湯ニ木香炮姜良姜ヲ用ニベシ
虛痛ニ難ニ黄連建中湯ヲ用ヘシ此藥ニ鉛ヲ用ルト甘草ヲ
用ヘトニ口傳アリ

○腹痛諸藥不應ニ木香良姜益智三味ヲ用テ煎服スハ立ト
ヨロニ止ム其効專ラ也

○腹痛甚キ者諸藥不應ニ野猪ノ膽五分ヲ用テ煎服スハ

其効如神熊膽王可也

○諸ノ食毒或ハ藥毒ナドニ中テ腹痛スルニ白腐豆一味一錢
五分煎服スハ其効如神生姜五分ヲ加ルモ吉

○婦人ノ怒りヤスク員セスキニ因テ肝氣急縮ノ或ハ心腹絞
痛シ脇下急痛スル時胡湯ニ黃連木香青皮等藥加用ヘシ

○妊娠ノ腹痛ニ安胎禁藥ヲ用ルトナカレ多ハ胎動ナバ
附蔴和氣飲ヲ加減又用ヘシ

○小兒ノ腹痛多食滞す平胃散ヲ用ヘシ或ハ虫痛疳瘡
ノ痛モアリ保童圓潤丸湯ノ類ヲ用ヘシ

○寒氣酷烈人特ニ寒ニ中テ腹痛スルニ五味散ニ加減スベシ
又寒氣中テ腹痛手足厥冷者ニ附子理中湯治中湯
ヲ用ヘシ子肉桂ヲ加テ其効如神

○想ノ腹痛ノ治法先溫石ヲ燒テ腹ヲ熨ヒト熱鹽ヲ煎テ中
ニ包テ熨ヒヨ或ハ瓦土器ヲ燒テ熨ヒヨ是亦ツシテ手段也

○心痛曰用疏痛也其脉多微緊急也甚者兼伏入死也

其治法、多ハ腹痛ノ仕様、如ス「胸脇ノ間ニ癰氣不兩寸」

心痛胸痛ヲ發スル也。陳湯ニ加減ノ用ヘン。

○心痛痰三屬え者、陳湯四七湯極編、陳湯ニ加減レテ

用ヘン。

○心腹痞滿冗者、大半氣湯ニ加減ノ用ヘン。

○婦人室女或ハ勤仕ノ人或ハ前貴後賤ノ人等氣弱入心痛

スルハ分心氣飲ヲ用テ効アリ。輕き者、香蘇散不啻半夏章

豆蔻ヲ加テ用ヘ。痛甚者、利氣丸細門ヲ用心不可也。

○室女或ハ官女等氣弱入心痛又止正氣天香湯、山梔子

貝母草豆蔻ヲ加エ用ヘ。

○男女ヲ不問平日思慮ヲタメ氣不舒長々寐而夢多シ塞キ

テ心痛不當ハ清心抑膽湯ニ加減ノ用ヘン。

○寒氣留滞ノ心痛又心氣相湧_{神門}ノ用ヘン。

○虛寒久久心痛ハ理中湯三貝母草豆蔻ヲ加テ其効如神

○胸中真中賴りニ痛者或ハ心氣ノ勞傷ノ痛者ニ清心抑胆

湯ヲ用ヘ。或ハ峻脾湯貞母草豆蔻ヲ加モ可也。

○胸正中痛甚久心ニニタニ堪_持が多ハ大切證ト知ヘレ多

ハ頗少々者也又ハ真心痛上_右三發ノタニ外レタニ發_左三

三處スノ類者多シ何ニテ正中痛_上者、太切丸証ト心得ヘン。

○熱胃口_火傷テ瘀血胃口ニ留_火心痛_火者アリ多ハ黒血ヲ

吐_火者也或ハ婦人_火氣過_火上_火攻_火此證ニ

吐_火者也或ハ婦人_火氣過_火上_火攻_火此證ニ

變スル者アリ。香蘇散、當川芎、大黃芩ヲ加テ効ヲ取

タレ又韋蕤丸脚氣痛門ヲ用ヒ可也。此丸ヲ煎湯ニメ用ヒ可也。

○酒傷ミテニ痛スル者ニ葛花解醒湯ヲ可用

○何見分がタキ心痛ハ先シ家傳神通ノ振藥ニ生姜ヲスリテ如ヘ熱湯ハ振出ノ用ヘ此藥ヲ用ヒ急ナ止痛ハ止也マニ後ニ何ノ症ハ夫ニテニ薬方ヲ定テ治ヲ施ベシ是更也。

○腸痛

○脇痛ハ多ハ肝氣ノ鬱滯也。其脉多ハ強緊急ナリ。王ノ先陳肘ハ飲此胡荽散湯脚氣痛門用ベシ。

○瘧飲ハ因テ脇痛也。汗出流氣飲清財熱利湯或清心抑胆湯ヲ用ベシ。

○氣滯三因テ脇痛セハ指迷七氣湯ヲ用ベシ。或沈香升降湯ヲ用ベシ。

○龙ノ脇下三塊アリテ痛ラチメ不移者ハ是瘀血也。行氣香蘇散ニ當歸尾赤芍藥玄胡索青皮紅花杜丹皮肉桂ヲ加テ用ヒ。

○右ノ脇下三塊アリテ痛ラナス者ハ食積也。香砂平胃散ニ青皮木香山楂子神蘇麥芽乾姜ヲ加テ用ベシ。

○疝氣横逆ハ脇痛也。三行氣香蘇散ニ加減スベシ。委克書者ニ載ス。

○摠ノ脇痛、肝經ノ虧也。小此胡湯ニ木香吳茱萸芍藥ヲ

加テ用ベシ。怒氣甚メ脇痛スルニ小此胡湯ニ青皮木香芍藥内

桂ラ加テ妙也

○肝經鬱滯レ脇痛スル諸藥ヲ用テ効ナキ三肝經ラユムヒ其
痛ヤム也逍遙散ニ川芎山梔子芍藥ヲ加テ用ベシ其効如神

○脇痛甚キ者三龍金丸當取龍膽丸ヲ用ヘシ或曰楊梅瘡毒
ミテ脇痛スル者アリ一方共ニ用テ妙也

○脇痛ノ藥ニ何ノ方ニ王鈎藤鉤ヲ加テ奇ニ妙ニ大秘要也

○肩臂痛

○肩臂痛ハ多ニ痰ニ屬スル也二木湯肩痛ヲ用ベシ或ハ二陳湯
ニ蒼朮木少薏苡仁枳實釣藤鉤ヲ加テ用ヘ奇ニ妙也

○臂痛風寒濕ニ搏レテ發スル者或ハ睡後手フ被ノ下ニシキ或ハ
乳母臂ヲ以テ鬼枕生メ風湿ラクニ類ノ如キ六五積散加減宜

○中風少臂痛或ハ効術文火拳石藝ヲ勤ムル人臂痛スルハ
烏藥順氣散加減用

○肝胆少風熱血燥ニテ臂痛スル者ニ蘇丸地黃湯ヲ用ベシ
此藥ハ諸家藥用テモ効アラズ或ハ他医ノ種々ノ療治ヲナ
人主愈カヌニ此方ヲ用ヘ奇ニ妙ニ大秘方ナリ

○寒因元臂痛スル者ニ五積散ニ加減ノ用ベシ

○湿因元臂痛スル者ニ蠲癒湯臂痛ヲ用ベシ

○臂痛

○背痛多汗瘀瘀テナ处也瘀合湯背痛ヲ用ベシ

○肩背痛甚ニ面顧スベガラサニハ通氣湯風湯ヲ用ヘ東垣
加減議論卷之方薦ニ載可考

○肩背痛甚々腰脹ヒダリ腰多者六韶痰湯ヲ用ヘシ背痛

○瘦著肩背痛至二日陳湯ニ木瓜葛根仁薑茶海桐皮鉤藤鉢ノ如テ用ベ其効如神

○寒三中リノ背痛セハ五積散ヲ用ヘシ
○氣病因テ背痛者外心氣飲或ノ歸湯ヲ用ヘシ其効如神

○氣病ノ背痛者小此胡湯ニ陳湯各一テ各木瓜山

施子ヲ加テ用ヘシ其効如神

○腰痛附腰痛

○腰痛人症多々腎虛三極也其脉多ハ沈久緊弦也タ
風濕中之腰痛之或在氣三テ腰痛入ルモアリ先五積散ヲ與

フヒ腰三經腎虛三經多々効ヲ得ナリ

○疝氣發腰痛丸者寒熱往來メ頭痛レ腰痛テ如折ニメ
小腰三經坐立牽引痛也衝刺香蘇散ニ疝氣ノ減ラ用ヘシ
委外方考ニ載可考又ハ三經散ヲ用ヘシ其効如神

○氣滯テ腰痛入ニハ烏藥順氣散ヲ用ヘシ

○瘀血滯元腰痛スル者ハ調采活絡湯腰痛ヲ用ヘシ

○濕疹アリテ腰痛スル清潤化瘀湯ニ宜シ

○重キ物ヲ持揚ナレ腰ヲグジキテ腰痛レ或ハ跌蹠メ瘀血凝滯メ腰痛スル調采活絡湯ニ宜

○總メ腰痛腿痛ノ證筋骨疼痛スル者ハ經絡ヲ溫散スル五

積散王方也又親血湯腰痛ヲ用ハ多々効ヲ得ナリ如是方

ヲ用テモ効ナキハ腎虛也八物湯ニ杜仲牛膝茴香破胡紙沈

本草綱目卷之二十一

卷之二十一

香母下子乳杏沒藥ヲ加ヘ用ヨ

腰痛緩ヒラハハ味丸六味丸右脚丸五錢丸ノ様用ヨ

○頭痛附頸痛

○頭痛ノ證外感内傷何ノ病ニ兼ミツテ見ル者十其所々ニ依テ治方ヲ考ヘ、多々外来ノ風寒暑湿ノ氣三感ノ致ヘナレバ發散不_レ也輕キ者、川芎茶調散川芎茶調散ノ散藥ニ用ヘ効ヲ取也或ハ葛根香薷散ヲ用ヘ、頭痛ノ脉多々弦緊數見入也。

○痰厥ヒヤクノ頭痛ハ眼昏ク頭重ク頭剝裂惡心煩滿レ人ニ對スレバ眩暈シ心神顛倒レ常ニ風雲ノ中ニ坐ススが如身重キ丁山ノ如ク言語懶_シ何モスシイワレスシ特惡辛ノ冒虛不癆停止也半夏白朮天麻湯ヲ用ヘ其効如神ヒツク也。

○婦人室女ノ頭痛想_シ氣鬱メ心惡キニ半夏白朮天麻湯ヲ用ヒヨ其効如神ヒツク也。

○熟厥カクノ頭痛ハ冬天嚴寒ノ時ニ風寒ニアタルヲ好ニ風ヲヒ六臂ク止ムカク火ナ処ニ來リ或ハ煙火ヲ見レハ痛復作ル也清上酒火湯曲春頭痛ヲ用ヘシ

○風ニ中テ頭痛シ熱甚キ者ハ川味羌活湯ニ柴胡蒿本ヲ加テ用ヘン

○寒ニ中テ頭痛不_レ五積散三蒿本蔓荆子ヲ加テ用ヘ_レ甚_シ者手足厥冷吐利セ_レ理中湯ニ白朮蔻ヲ加フ

○氣虛ノ頭痛ハ八解散補中益氣湯ニ蔓荆子蒿本白朮蔻ヲ加テ用ヘシ

○血虛頭痛ハ四物湯ニ香附子山梔子黄柏蔓荆子ヲ加テ

用ヘ

○食傷頭痛齋香正氣散不換金正氣散ニ宜シ吐逆アルニ
八藿香白芷桔梗ヲ去テ白豆蔻ヲ加ヘシ又平胃散三蒿茶白
豆蔻ヲ加テ用ヘシ

○氣血虛ノ頭痛若クハ諸ノ頭痛ヲ治スル藥剂ヲ用テ効ナ
キ才或ノ頭痛數月ヲ經テモ不止者二十全大補湯ニ白豆蔻

蔓荆子天麻ヲ加テ用レハ其効如神

○頭痛如裂ニメ熱甚キ者三小柴胡湯ニ蒿本ヲ加テ其効如

神甚キハ石羔ヲ加ヘヨ

○頭痛甚キ者ハ必ス吐逆ス者也先家傳神通ノ振藥ヲ用

テ吐ラマテ後三何ノ證ト云フヲヨク見分テ治療スヘシ

○頭痛諸藥不應者ニ加味逍遙散ヲ用テ肝經ヲ緩クスハ
其効如神後正一味地黃丸ヲ服シテ腎水ヲ生スハ甚効ヲ得
也是大秘良也

○項痛ノ證ハ頭痛ト同治也其中ニ蒿本柴胡防風ヲ加フヘシ
通氣防風湯ヲ用テ其効如神或ニ烏藥順氣散羌活獨活末
ムヲ加テ用生宣シ

○眉棱骨痛ハ風熱上痰トノナス処也選奇湯田春頭痛ヲ用ヘシ其
効速ガリ

○雷頭痛トテ頭面瘡瘍增寒壯熱頭痛如裂傷寒ノ如クナニ
升麻湯田春頭痛ヲ用テ効ヲ取リ多ニ此藥ハ兼味少其効速ガリ

選奇湯方
酒芩
葛根
甘草
五味子
夏

○真頭痛アマニ症アマニアヤニツツニ二發メタニ外アマニタニ二發メタニ久スナリ脳
痛アマニテ首會アマニノ穴アマニ邊氣味悪ク痛アリ共ニ治シ難シ五積散ニ細
辛ラ加テ効ヲ取フ多シニ證共ニ真心痛ナントノ類ニメ治方及カ
タキ證也

○痛風

○痛風アマニ遍身骨節走注疼痛アマニ也痛風ノ脉多浮濶ニ繁
ラ見シ又ハ沈弦也

○痛風人症血氣風濕痰火ニ属ス者共ニ羌活湯アマニ用
○痛風熱甚者三財毒散アマニ蒼朮當歸鈎藤鈎口加半用


○痛風虛寒ニ属スル者ハ溫散スヘシ五積散アマニ加葛根メ用ヘレ若
ニ委リ載ス加味五積散アマニ用


○痛風痰膿アマニ者ハ胸背疼痛アマニ背心冷ル更水アマニノ如ニ喘息
咳嗽アマニ或腫塊アマニ者也清濕化癆湯アマニ治風寒本無香
沒藥木瓜薏苡仁アマニ加八味丸

○痛風勞多氣血枯竭アマニ風濕相搏テ經絡骨節疼痛スルナリ
四物湯アマニ羌活防風蒼朮蒼朮子海桐皮沒藥乳香黃柏鈎藤
鉤牛膝威靈仙木瓜アマニ加八味牛山堂アマニ痛風ラ治スルニ此方ヲ用
些百發百中ニ不應者鮮

○痛風ノ證晝輕夕夜重者多々血虛也是酒色過度ノ人筋
脈空虛ニ風寒湿感之也陳經治血湯アマニ用ヨ有神効

○痛風諸藥無効者ニ病解毒丹錦袋子紫金錠アマニ煎服ス





夏月初秋ノ瘧ニ黄連香薷飲十味香薷飲ノ類ヲ可用

○瘧疾間日三寒熱發ニ二發ノ時ヨリ人參銀胃湯ヲ用

ニシ

清中堅症散
平胃方内加紫砂

黃芩舟郎玉夏
草果生姜

草果生姜
火薑六味丸也

○瘧疾四五太發ノ時ハ七味清脾湯九味清脾湯ヲ見合テ用ニ
シ清中堅症散ヲ用王可也加減委ノ方考ニ載入

○飲食ヲ兼々止瘧ニ霍香正氣散ニ麥芽神鞠ヲ加メ或ハ行氣
香薷散ニ加減スレ委々考ニ載入或ハ勝紅丸家傳神通丸保

利丸ニ角ア効果得牛多シ

不二欽掌兵
知其生大葉葉

高良子常集
知良種甘生大

宝印原陳榮昇兒青生大以八味

於平胃散方内
加當山烏梅草
葛三味而異巧

○瘧疾發寒熱解消導全其變甚シク病人生貨實ニ左氣
附強心者如截藥ヲ用ヘシ不一飲截瘧常山飲七寶飲ノ類_{諸方}如是
諸書ノ瘧門共用今之醫籍草黃丹等分極細奉トナ母服支目
出可参考

○瘧疾發寒熱解消導全其變甚シク病人生貨實ニ左氣
附強心者如截藥ヲ用ヘシ不一飲截瘧常山飲七寶飲ノ類_{諸方}如是
諸書ノ瘧門共用今之醫籍草黃丹等分極細奉トナ母服支目
出可参考

○瘧疾ノ未明ニ令水又溫湯主工用テ神効アリサレ比今時ノ人
火候ノ虛弱子也ハ截藥ヲ用ハシ等分清脾湯驅邪飲ノ類ヲ用テ
見合ニ置キセシムニ熱退テ瘧勢止也又世間ノ人截藥ノイヘ
珠ノ外驚半惊ア服ハシニ無ニ因テ緩々治ラ施_{火候}瘧症トナ
ル者多ニ医師主瘧ハ落ガタキコラ知テ説ニトカク瘧ノ療治、
落ス者ニテ無トニテ元氣サヘスコヤカナレバ瘧ハ自ラ去ナドムテ
人參ヲ服セシムリニ因テ邪氣ヲ補性_{火候}熱退_{火候}ニシテ瘧症トナ
ル是有故無損ト云ノ理ヲ知ラズ脉ト病証トヲ争ヘサル鹿工多テ
ハ如是也可憐

○瘧疾ノ發熱ニ多温熱ニヨル故ニ古人ノ說ニ疫木也、瘧ヲ
ナシトナト云リ疫多キ者ニハニ陳湯ニ柴胡黃芩枳實草葉

ヲ加テ用ヘレ

○温ニ因テ瘧ヲ發シ或ハ旅途中或ハ船中ナリニ瘧ヲ發レ
或ハ水土ニ服シメ瘧ヲ發スル者ニ六胃苓湯ニ柴胡、黃芩、草朶
烏梅ヲ加テ其効如神

何首二味伏苓

一錢

●瘧疾諸藥ヲ用テ無効者ニ何首烏_{ヨウモク}ニ及茯苓ニ水
煎レ服スレ其効如神

○想又瘧疾ノ療治三二發ニテ云卷散ノ劑ヲ用ヘ散邪散柴
芩湯ノ類是ナリ四五發後人參鬚冒湯七味九味ノ清脾湯
驅瘧飲ノ類ヲ用ヘ如是ニメ七落サル時實剛丸者六截藥
ハ剝ヲ用ヘ不二錢常山飲七寶飲ノ類是也虛弱十暑六八
斛散三味胡黃芩草朶ヲ加テ用ヒ或ハ四獸飲尤妙也考瘧散

出不愈者六葵片鰐甲湯ヲ用テ尤妙也如是次第ニ治方ヲ施
入時ノ治者不即愈者在來如是急足施之後寒熱漸勢漸々退
極俗ノ云五苓散ナストムか如ナリテ元氣虛弱形体朱瘦ニ者
六君子湯ニ木香炮姜草朶當歸ヲ加テ用或ハ補中益氣湯
ニ本香炮姜砂仁ヲ加テ用ヒ其効如神

○鬼瘧ノ症ナリ初發ヨリ暴變甚ク譖言妄語鬼神ニ目力
如久弗宗病ニ似タシ者アリ黃連解毒湯ニ草朶ヲ加テ用ヘ
其効如神

○瘧疾ノ寒熱止ミ餘熱アリテ煩悶嘈雜ニ夜眠ルアタマサル
者ニ竹茹溫胆湯高枕無憂散ヲ用テ可也

○瘧疾寒熱退ニ後對金飲ニラ用ヘレ四五發ノ時ニ落レ

草藥或加姜皮
者也

四獸丸易簡方

參抱腹陳

半葉梅甘

大生甘味
附六君子方內加
茱萸二味也

此方用ヘノ假令四獸益氣ノ補利ニ立落名著尾先
三貼此藥ヲ用ヘレ大秘密也瘧ハトカク痞ヨリ起ル病ニ
ノヤ生スレ瘧リヤスケハ北方ヲ用テ胸膈ヲ清クタスレ奇
妙也

瘧荆ノ症ナテ初秋此濕變三感ノ寒熱ノ瘧變ニ變スリ
多シ入參親胃湯三黃連ヲ加ヘテ奇効アリ此症ハ多々虛証ニ變
テ救ヒカタキニ至ル者ナリイカドナレ瘧ハカリニテ干暴瘧ノ病

于元氣ヲ損ボル者也其上ニ刺下ニ元氣ヲ損ズノ病ヲ添ヌハ宜

此哉壞症ニ變スルナリ此症久ク不愈末八峻補ノ剂ヲ用ナシ公

此根治外溼補中益氣湯ニ白扁豆木香生地姜蜜各二加可用

五ベシ有神妙

○總メ瘧疾ハ汗ヲ發スレシ汗出ハ必ス愈也此症春夏ニ治
セシ秋冬ニ治レ難シ別ハニ非ズ春夏ニ汗出ヤスク妹冬ニ汗出
カタキ故也古人王云ヲヤヒテ汗ヲ曰エニシタル支抱ニ瘧ノ
藥ヲ用ハ大料ニスベレ一貼ノ分量ニタヨリ三女ニテノ間ニスベ
瘧ハ暴瘧ノ邪氣ナヒハ小料ノ藥剤ニアリ其藥病勢ニ勝方タキ
ト知ベレ

○姪婦ハ瘧ハ熱甚キ寸ハ墮胎スルト有者ナリヨクヘシラバ
テ治スレシ五六ヶ月ニテハ胎禁ノ藥ヲ犯スガラク七月已後ハ
大抵ノ胎禁ノ剤モ苦レカラニ初發ノ時ハ人參親胃湯ニ加減ソ
用ヘレ大抵有故無損又無損ト云ル理ヲアキラムテ意ヲ以テ
推擴可施治

婦人月水來時ニ瘡ノ患レハ其瘡血室ニ入テ證言ニ語入
ル甚シ人參銀胃湯ニ四物湯ヲ合シ桃仁紅花ヲ加エ甚者

六其上三藥木ヲ加テ用ヨ其効如神

用モ落ガタク毎日ニ寒熱出テ形体柴瘦スル者ニハ淨脉湯ニ
宜シ倭俗是ヲ型瘡ト云ヒ又ハ序カイトムフ皆僻病ノ病ナリ
家傳保童圓ヲ用テ有神効脾ノ俞章門天樞病根京門等
灸ノ佳ナリ瘡ハ外邪サヘ去ズ大人小兒共ニ多治ヘレ
時節ヲ能見合スレシ是口授傳心ノ祕密也。此余最感也。

○瘡疾赤白共ニ濕熱トナメ治スヘシ其脉多ハ滑也細沈尤

者生キ洪濤大者次ス、
○瘡疾之患証八種、嘔吐不食者、呃逆不食者、鮮血ヲ下ス者、豆腐水
如者、室漏水ノ如者、糞色黑焦者、ノ類身熱スル者、其下入物甚
臭、抱壞雞子ノ如者、俱ニ治シ難ト知ヘシ其中三王大使黒牛
者十三七八外證ド知ヘシ常ニ可得ヨリ不可失意。

○瘡疾ノ初發ハ多ハ水鴻ヨリ赤痢ニ變ジ白痢ニ變充也又初
ヨリ赤痢ヲナスアリ初ヨリ白痢ヲ下スアリ大抵先赤白雜テ下ル裏
急後重ヲナス也泄泻ヨリ痢ニ變充者ハ東垣ノ枯李湯ニ加減
メ用ヘシ又火燄蒸湯ノ加減ヲ用ヘシ加減委々方甚三載ス上四十
年者三胃苓湯ニ黃連芍藥ヲ加テ其効如神裏急甚き者

○東垣夜交湯
方於之令繁
内空木公芳
既考禁半晉
含之味
○瘡乃有吸
大黃
本名肉桂甘
謂太陰方
山地

宿便
慢

山地

名猪陳也

二、再上木香枳榔ヲ加ヨ

真常易方一效茶事二宣一猪椛也
上九味足州像西之石京也

芍酸芩也
桔梗桔梗

○瘡疾赤白兼下リ裏急後重甚キ者ニ木香導滞湯

刺門

○瘡連丸
○瘡票散方

○瘡疾下半日久ク度數毛城不トイヒイテ止カタシ者ニ参

金根方
陳家所存

○瘡票散方
○瘡連丸

○瘡疾裏急後重甚キ者ニ瘡連丸ヲ用ヨ其効如神

○瘡連丸
○瘡票散方

○瘡疾下半日久ク度數毛城不トイヒイテ止カタシ者ニ参

金根方
陳家所存

○瘡連丸
○瘡票散方

○瘡疾裏急後重甚キ者ニ瘡連丸ヲ用ヨ其効如神

○瘡連丸
○瘡票散方

○瘡疾下半日久ク度數毛城不トイヒイテ止カタシ者ニ参

金根方
陳家所存

休息而心

○木令發金

○猪霍鳥

○金合木方

炮姜白扁豆益智加元用ヘシ其効速ナリ

○痢疾諸藥ヲ用テ愈テ後亦十日程乃キ下利シ亦四五日愈

テ下利ノ數月ヲ經テ愈カ多者ノ休息痢ト云也此脾胃虛寒

スル也七味白朮散參苓白朮散東垣升陽湯補中益氣湯ノ類

木吸陳升麻

柴胡葛根芍藥甘草以上八味

ラ用ヒ加減スシ委テ考三載ス葱者以止味

○痢疾度數八九十度ヨリ百度ノ余ナニ寒熱虛實亦自ア

問丁方創廩散ヲ用ヘシ人參ノ分量ニ多少ナリ其見合品傳ア

リ此方ハ世間ノ医師ノ疫痢變ゾヨモ者ニシ用ヒ心得テ上提

ノ義尼ノ理ヲ知ス其辨論委細ニ考者ノ創廩散ノ余下三載ス

可参考

○痢疾人療治ノ補湯ノ間ニ有口傳七八日ヲ經テ毒物盡ト

真養胎方

栗參附子

芍藥

當歸

桂枝

白朮

白芍

白朮

其保補藥ヲ用或之雜藥ヲ用テ下利捨元氣ヲ補炭火シ再
余日ノ後土毒物未盡者ニ洪藥ヲ用或之補藥ヲ用六邪氣
外多氣血數之急急火之氣毒之益火能見之火
真火銀藏湯新門土人類方又ハ訶子肉豆蔻蜜棗設阿片
チトノ入之並藥ノ類其家々傳レ妙藥都鄙共多レ其病症ト
寒性相應ノ時ハ其効如神ナレ其病證ニ相應セザシテ火
人ノ殺ス能ク眼ソケテ其時節ノ見究ヘシ其更口傳多レ其
人ニ非シ傳火才也故ニ此書又ハ考者之淡藥ノ類ヲ載ルト
ナレ口授スベシ

○痢疾諸藥ヲ用テ効ナキ者ニ附子理中湯ニ桂益智加

テ妙火取ト名レ

冬法

○諸ノ病疾寒熱虛實共ニ天樞ノ穴氣海ノ穴スヘン裏急後重悉ニ止ニ愈ナリ鹿工ハ誤アリ因ニ灸治温緩ノ治ヲ施ニ因テ後ニ八癆症トナリ病者元氣虛弱シ冬治ニ堪ガ

冬ニ至ル是亦冬治時節ニ見合スニ口傳アリ可祕

○諸ノ痢疾三藥餌ヲナレテ愈ル者多シ寒暖ノ餅ノ味増三テ煮テ食シ或ニ鰻ノ汁或ニ鹽漬ノ海鰻汁鹽ノ鹽漬霜柳ノ砂糖漬ニレタル類品々俗用ニスルト多シ効ヲ取リ也是亦其時節ヲ能見究ムニ有リ食餌ノ法ハトガクニ蓬クスベニ初發時食餌ヲナセバ邪毒ヲ助ケ腹痛裏急ヲ增長ナリ其時節ヲ知ル

○口傳アリ可祕
○刺疾愈ア後六君子湯ニ外麻柴根當歸白芍仁加補

○六君子湯

在甘草夏

中益氣湯扶苓益智白扁豆方加元謂理スレ

○小兒之刺疾多ハ大人ノ治同ニ荆ニ多少花ノ熱去刺ノ色赤ニ減ジ裏急減セハ鐵爪白朮散ニ芍藥當歸砂仁ヲ加テ用ヘシ此加減百發百中ノ妙剂也小兒ノ刺疾愈テ後公其腿足志ヲ付テ見ヘニ必ニ腫瘻チ細ク膿ノ血大少者也之ヲ刺後ノ鶴膝風ト名付久又小兒刺後三行歩ニ何トナク足クジケコケマスキアルハト名付久又小兒刺後六君子湯ニ對テ兼テ尋

鶴膝風ニ變ベルト知ベシ如是ナルヲ刺後六君子湯ニ對テ兼テ尋問ヘキ也鶴膝風ノ治方ハ其本条ニ詳ナリ可考
○痢病ノ暴病ナハ思ノ外ニ元氣虛憊スニ因テ其者ニテモ實性ナル者ニテモ次ニ至ルト多シ又暴病ニメ甚タ羸瘦スル日數ヲ經ル病ナハ故ニ思ノ外ニ次ガル者多シ此病尤今小兒十三八

泄得

三二五
四四

九度ホドノ數ヲアス、何ホド元氣盛ニ見ルトモ大變ニ

變ホシ知ヘン

○胃風湯方
人木枝散弓
等投粟未
空八味

ヲ用テ可也

泄瀉

○泄瀉ノ症、脾胃虛弱、飲食過度、外ハ六淫、氣感、發
熱ナリ。其治脾胃ヲ健ニシ、濕ヲ燥レ、小便ヲ利スレ、其脉多ハ
沈ナリ。

○脾胃不和ノ腹痛泄瀉セハ、胃苓湯ニ加減ノ用ヘ
○飲食ニ因テ腹痛泄瀉止者、二八木換金正氣散、藿香正氣

名周參湯

散香砂平胃散、香砂六君子湯、姜砂六君子湯等ニ加減シテ
用ヘン。

○溫ニ因テ泄瀉スルニハ、五苓散、四逆散ニ加減スヘン。

○暑ニ因テ泄瀉スルニハ、黃連香薷飲、十味香薷飲ニ加減スヘン。

○寒ニ因テ泄瀉スルニハ、理中湯、加減スヘン。

○風冷腸胃ニ因テ泄瀉スルニハ、胃風湯ニ加減スヘン。

○脾胃虛メ久ク泄瀉レ、飲食不進、水穀不分者、二八木換金正氣散、藿香正氣

散七味白朮散ニ加減スヘン。

○脾胃虛弱ニハ、大便不實、飲食不思、或ハ泄瀉腹痛、或ハ脾

胃虛ニ清晨ニ泄ス者、脾腎湯十名ノ四神丸ヲ用ヘ、或ハ

東垣ノ升陽湯ヲ用ベ、有神効又參木健脾丸(附)用ヘ、元七

脾門穴

西神丸方丸射
破瘀逐瘀吳茱萸
上四味

名周參湯

可ナリ

○ 惑ノ泄泻ノ症ハ多ハ飲食傷ニ、ニ因テ發スレバ其食物復
ヲ離ルテ熱物ニ傷ム一す、寒藥ヲ用ヒ寒冷物ニ傷ム者ハ
藥ヲ用ヒ多ハ不換金正氣散、藿香正氣散、香砂平胃散ノ類
ニ加減」用エヘン如是ノ方ヲ用ヒモ不正ナハ香砂六君子湯、製砂
六君子湯、錢氏白朮散ノ類ヲ用ヘシ如是ノ方ヲ用テモ不正ナハ
脾胃虛寒ノ症ト知ルベシハ君子湯、異功散、柴胡外麻白扁豆
砂仁ヲ加ヘ或、東垣人升陽湯、參苓白朮散、調中益氣湯、補中益
氣湯、升陽益胃湯ノ類ニ加減ノ用ヒ夜分分食可減スシ
○ 泄泻ノ症服藥敷貼ヲ用テ其症大半愈テ未全快者ハ湯
藥ヲ止メシタスノ後、白朮散、異功散、白扁豆山藥砂仁等ヲ
ナレニ度數ヲ用ルト大祕蜜ノト也

○ 霽乱
加テ極細末米飲湯ヲ用ヒ、火湯藥ヲ服スハ脾胃ニ
湿ヲ去テ泄泻止ムトナレ粉藥ヲ用ルト大祕蜜ノト也食糲生
上火熱カリ、食せムトナレ是否亦脾胃ニ湿ヲ留テ泄泻ヤム
ナレニ度數ヲ用ルト大祕蜜ノト也

○ 霽乱
○ 霽乱ノ症ハ卒時ニ心腹疼痛レ上吐レ下泻レ揮霍ノ間ニ
變乱ナ也或ハ四肢厥冷六脉沉伏ノ欲絕也此ヲ湿霍亂ト名
久若吐泻入ルト多々心腹绞痛レ手足厥冷スル者ヲ乾霍亂ト
名ク若轉筋腹入ル者必不外ス急証ト知ルベシ
○ 湿霍亂吐泻腹痛スル者其脉多ハ滑也食滞ノ療治ノ
仕掛ニスヘン不換金正氣散、藿香正氣散ニ加減ノ用ヘシ甚キ

異功散
四君子湯
加味
陳皮
一方

生山房集解 卷之二

者ノ吐渦止タク手足厥寒ノ脉沈伏空虚子理中湯ニ
加減ノ用ヘシ

○夏月暑ニ由リ生冷菓物ヲ過食入ハ多ハ霍乱ノ症ヲナス
香需飲ナ味香薷飲ニ加減ノ用ヘシ

○乾霍乱ノ症心腹飽脹绞痛ノ吐渦ノ子スイフノ手足厥寒
シ脉沈ニメ絶スル者三分之象傳神通ニ振出ノ用ニ或ニ三神圓
ヲ塩湯ニテ用ヒ急ニ指ヲ得テ咽ニ入テ探リ吐ノ理中湯ノ加減

ヲ用ヘシ

○霍乱ノ症已ニ次レ腹ニ暖キチ氣少ニモニ火勝中ニ塗ラ
埋テ灸ニバシセサシニ即熱ルナリ

○霍乱轉筋急者藜麥ニ地ニ煎天足膠ヲ洗ヘ有効

○嘔吐ノ證分多々食滯ノ人久所禁其食久所何物ト云ウト
尋問テ治癒ノ施スニレ未抵食物ノ仕掛けニスヘシ先ツ象傳神通ノ振

柔テ用火多々止ムナリ其後虛實ヲ見定テ治療スヘシ不換金正
氣散ニ加減レ藿香正氣散ニ加減スヘシ嘔吐ノ症大人ニヨリ藿香

白芷唐芻本ノ香氣ヲ惡者アリ見合テ去ヘシ

○嘔吐止ナ一方飲食不平者ニ保中湯(通春)ニ加減ノ用ヘシ
不正者

○胃寒メ清水ヲ嘔吐ル者ハ理中湯ニ陳皮下子椒仁益智肉
桂ヲ加テ用ヒ有神效

○胃熱ニ煩渴レ嘔吐スル者ハ竹茹溫胆湯ニ加減ノ用ユヘシ有
神效

經方 卷之二
倒飲食不下吐
霍乱
藿
芩
桔
連
陳
姜

○痰涎アリテ嘔吐スル者ハ痰火也清熱導痰湯ヲ用ヘシ

○飽食メ後嘔吐スル者ハ香砂平胃散加減ノ用ヘシ

○酒傷ノ嘔吐ス葛花解釀湯ヲ用ヘシ

○婦人怒氣盛ニ或ハ妊娠甚キ者ハ必上逆メ嘔吐ス牛リ小柴胡湯ニ木香青皮芍藥山梔子砂仁ヲ加テ用ヘ其者ニハ

其上真茱萸ヲ加ヘ其効如神

○婦人妊娠二三月ノ時必嘔吐スル者多シ是ヲ惡阻ノ症ト云ニ陳湯ニ紫蘇砂仁黃芩ヲ加テ用ヘ其効如神又ハ紫蘇和氣飲

ニ加減ノ用ルモ佳ナリ

○小兒ノ嘔吐乳ノ症ハ多分食滞ニ因テ胸膈留痰アリニ陳湯ニ砂仁木香黃連ヲ加テ用ヘ其効如神少シ連翹ヲ加ヘシ想テ

大人小兒共ニ嘔吐止ス外キニ桑ヲ用ルニハ連翹ヲ何ノ藥方ノ中三毛子家傳太極醫也曰授心傳其全非大傳也子午年大病久病後胃虛メ嘔吐レ穀ヲ納ム者ニハ七味白朮散ニ砂仁連翹ヲ加ヘ或ハ君子湯ニ砂仁伏龍肝連翹ヲ加ヘ或ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏砂仁連翹ヲ加ヘ見合テ用ヘシ効アラカルナレニ加テ用ヒ肝經ヲ緩クスルハ脾胃平和ニナリテ嘔吐止ム者ナリ是大秘蜜ノ一也

○膈噎有翻胃

○膈噎翻胃ノ証ニ七情之氣太過ニ五藏ノ火動レ津液蒸蒸メ痰益盛ニ脾胃漸々衰ヘ飲食流行不平ナリテ嘔吐止ム此病

ト大三十已前ノ者、多瘦ニ因テ致病。四十已後ノ者、多氣血枯衰、津液竭、膈喧ス。治シ難シ。五十已後ノ膈之治方ナド古人モ云置ルトナリ。其脉多クハ堅濶ナルモナリ。

○膈喧ノ初訣、先胸痛テ飲食胸ノ間ラカヌル如ニシテ也。二陳湯、蒼朮厚朴草豆蔻ヲ加或、草豆蔻丸ノ類ヲ用テ、胸膈ノ痰ヲ去ヒ其病自ラ愈セ。

○七情多キ人或、憂鬱多キ人寡婦ノ類思慮多キ人多々此症ヲ患ル者也。分心氣飲三加減メ用ヘシ。

○積聚アシテ胸膈攻上^茶テ此症ヲ大々者アリ。大七氣湯或ハ

利氣九勝紅丸等ヲ用ヘシ。

半胃以於保
陽方内去芩桔
冬辰草薑烏
者也

翻胃ヲ用ヘシ

回春湯

翻胃ヲ用ヘシ

回春

翻胃ヲ用ヘシ

効如神

回春

翻胃ヲ用ヘシ

回春

○脾胃虛スル者食スルオハ喧スルナクメ、或ハ半日若ハ一日アツテ後其食物消化セバ、其儘吐スル者アリ。此ヲ翻胃ト云治シガタレ。

七味白朮散六君子湯、欽神散補中益氣湯ノ類ニ加減シテ用ヘシ。

○五十以上ノ人血液枯燥ノ膈喧スルニ四物湯ニ陳湯ヲ合シ、黃柏ヲ加テ用ヘシ有効。

○昔ヨリ本朝ノ武家一國ヲ知ホドノ家ヲ起、大將多ハ膈ノ患ル也。是ヲ以テ之ヲ見ハセ、七情ヲ過シ思慮ヲ回

其上癰亂ラ精液ヲ耗散ス故也今世ニ知裏ノ貴人或公卿
家ニ至大分ノ業作ラス類ノ者此病ヲ生ス也加様ナリ全
ハ六君子湯ニ木香砂仁山梔子石菖蒲ノ類ヲ加テ煎湯ニシテ
六味地黃丸ヲ用テ愈者十二ノ三三人王アリ病深キ者イカ
ヤウニメモ治シ難キ也和俗ノ諺ニ此病ヲ龍馬ト云將恭ノ駒ニ
ヒトレ角ノ才ハイタスベキ方便ニアレニ角ナガテ龍馬ニナリタ
ハ四角八方ニカクルキテ押ヘ難シト云フ誠ニラカレキノガラ
コトハリナシナリ

○膈喧ノ病ニ腹中ニ奇怪な蟲アリテ食ヲキカヘス証アリ此
類ノ病者ニ孩兒サントウノ喰シテ或ハ北國人海シマノヤガフ蟲ムツニ物
更シテ飲シハム胸膈上癰カクノ食ミヌ

○總メ膈喧ノ証ヲ治癒ノ傳授アリ食ヲ吐、食物ノクテ
通り兼ル証ナフ其食物ヲ與ルニ術アリ一日ニ合三丁生ニ合
ニテモ其人ノ虛實ヲ見合テ用ルニ譬ヘハ一度ニ五夕食ニテモ一
合食ニテモ食スル病者ナズ一度ノ食ヲ五分一分テ少々充食
セレムベシ此証時ニヨリテ咽潤ヒツクヒト食通リ安キ夏アレ病入王悦
ビ食物ノ通ハシ少モ多ク食スベント云脇看病人王強テ進ム
ニヨリテ却テ食過キ下ヨリ衝上アヒテテ吐スル也一度ニ一著ホト完
少許食ゼメ飢テハ少シ用ヒスベ吐スルナキ者也加様ニ虫
ヲ殺スル剤スルラ用ヒ實証ナハ治スル也凡此証痰ニヨリ氣ニヨリ積
ニヨリ虫ニヨル者ハ右云所ノ如ク食ヲ減ノ藥ヲ用ヒ十三メ二
人壬治スル者アリ五十以上人津液枯竭ノ此病ヲ患ル者ハ一

日ハ兼ノ効アリト雖庄終ニ鬼祿ニ上元ト心得キ也

呃逆

○呃逆ノ証ハ多ハ胃火上衝メ發スル也病者自覺ハ上膈ヨリ起ルト知ルハ治シ易シ臍下ヨリ衝上ルト覺ル者ハ治レ難也

其脉多ハ弦急セ浮緩尤者宜

○呃逆ノ症胃口虛寒シ手足冷脉沈細是寒逆也理申湯丁子肉桂附子ヲ加テ用ヘシ或ハ香桂帶湯田春ニ用ヘシ

○痰火ニヨツテ呃逆スル者ニハニ陳湯ニ砂仁山梔子黃連竹茹木香沈香ヲ加テ用ヘシ

○腑下ノ氣上衝メ呃逆スル者ニハ滋陰降火湯ニ砂仁茴香沈香杏仁梔子桔梗ヲ加ヘ甚者ニハ辰砂ヲ加シ

○呃逆ノ症多ハ中氣不足メ發スル也六君子湯ニ升麻柴胡丁子砂仁ニ加ヘ或ハ補中益氣湯ニ茯苓半夏五味子丁子ヲ加テ用ヘ其効如神

○冬病人或ハ太病ノ後呃逆發テ不止者ハ惡証ト知ヘシ如是症氣海ノ穴ニ灸スルトニ三五壯メ効アリ參附湯或ハ生脉散ナドノ頻ノ利ノ藥味少キラ大料ニメ先フ氣ヲ無何有ノ鄉ニ返スノ理アリ可秘

補益

○補益トハ病名ニ非ス諸ノ病ニヨリテ虛損スベ必補藥ヲ用テ元氣ヲ補益スベシ氣虛セシ四君子湯ニ加減メ用ヘシ血虛セハ四物湯ニ加減メ用ヘシ脾胃虛セハ六君子湯ニ加減メ用ヘシ

氣血兩少ガス虚也ハ物湯或十全大補湯ニ加減ノ用ヘト

氣虛セバ六味九八味九右飯丸左飯丸類見合テ用ヘト

ク方考其方ノ条下ニ加減ノ可考

○一切ノ虛損ノ症ニ先フ補中益氣湯ニ加減ノ用シ

○一切ノ虛損ノ症或ハ父母ヨリ禀受スル所ノ元氣虛弱ナル者

ニハ諸ノ補益ノ刑多シ見合テ用ヘレ延齡固本丹神仙巨勝子

圓打光復丸無比山藥圓是ラ和俗ハ之字丸名合後丸ナリ或酒ノ方諸

方書ニ多ク見タルリ考合テ用ヘキ也左ハ雖サ王様ノ藥ハ皆

腎水ヲ増シ陽氣ヲ發スハ乘ナハ却テ此乘ラタ情欲ラ恣

ニメ元氣ヲ盡ノ類ノ者多シ医家者此心ヲタ知覓々人ニ教

ニベホト第ニ全夏也麻不空タマノムカヒ人也

○虛勞骨蒸之證陰虛相火動メ肺金ノ浸淫ニ因テ發熱或潮熱

自汗盜汗咳嗽吐痰甚辛者ハ吐血咯血ナル也其脉多々細數ナ

ル者也陰虛火動火丸泉ヨリ起ル者治レ難シ虛勞人藥ヲ

用ハ泄瀉レ補藥ヲ用ハ泥帶テ苦寒ノ刑又ハ血刑ヲ用ユハ

泄浮心者治レ難シ心得ヘシ

○虛勞骨蒸ノ症ニハ世醫多ハ滋陰降火湯ヲ用ユ加減委ク方

考文ハ四春三載也可参考去ナガラ此證ノ始多ハ脾胃ノ氣虛

痞人歸脾メ咳嗽發熱スル也牛山常ニ六君子湯ニ桔梗木香

山梔子紫朮白皮ヲ加ハ或補中益氣湯三昧參半夏厚母

五味子交門冬ヲ加ヘテ効ヲ取ト多人參ノ製法黃芪ノ梨法

并分量古傳子可祕

○骨蒸ノ症熱甚ク咽喉疼痛シ咳嗽甚キ者ニ蒸丸扶羸湯
ヲ用ベシ

○骨蒸ノ症陰降火湯或清離滋坎湯四春虚勞ノ類ハ味九
六味丸ノ類ヲ用ヒハ常ニ世医ノ能見及シ聞覺未ハ考
合テ其症的中ナル方ヲ用ヘキト也加減ノハ諸書三出タリ参
考スベシ

○虛勞骨蒸ノ症初ハ多ハ氣蔚ヨリ發スル者多シ或ハ仕官勤
労ノ人初ハ王君ニ得テ後寵裏テラヤシ者又室女環懷思想
カナワズ或ハ婦人ノ男ニ得乙ス又ハ舅姑ニ得ラヒ花類ノ者必
氣蔚メ骨蒸勞久外ナルケ様ノ症ニ分心氣飲ヲ用テ取効ト多

○前三云所ノ如キ症氣鬱滯ノ虛痞トツテ咳嗽吐痰潮熱盜
汗其病狀骨蒸少咳ノ如クナルキレタル症アリ此症ハ多ハ脈
滑數ニ浮細數ノ狀子キヨ證據トスベシケ様ナル症ニ滋陰
ノ剂ヲ用レハ弥々虛痞メ痰アソリ熱ハジケ甚ク成テ後ニ真ノ勞
咳トナリテ效ニ難ニ至ル也如是ノ症ハ脉ヲヨク診シ得丁病人
ノ腹ヲ見出メ太七氣湯或ハ香砂六君子湯四春宿門ノ方集リノ類ヲ
用ヒバ痞退テ諸症愈也神通丸ヲ兼用モ佳也

○痴氣ノツカヘ前三云如ク虛勞ノ症ニギル、更多く是又ヨク
脉ヲ診シ極テ行氣香蘇散ニ竈氣ノ加減方考二卷記ヲ用ベシ神効
アリ婦人ハ正氣天香湯ニ多ハ妙ヲ取ナリ

○骨蒸咳久ク熱アリテ汗多キ者ニ黄芪鱉甲湯ヲ用ユベシ

其効如神

○骨蒸勞瘵ノ症ニ懶肝カクシンヲ煎テ用或懶肉カクシナヲ味噌汁ニテ
煮テ餌セタルモヨシ是物療患ヲ治スノ妙アル也落益常ニ
用テ効ヲ得タルト多シ秘藏イテ

○骨蒸勞咳ニ兼用テ多ハ効キ者也灸治ノ効ヲ取リ多
シ膏肓患門四花七九噫嘻ノ穴脾俞腎俞腰眼ヲ灸スヘレ
ニ痞塊アラハ承満中脘天樞ヲ灸スヘレ章門京門痞根全多
スベシ

○薰臍ノ法入門ニ登載虚勞ニ用ル者アレ正火カクヒタスニテ損
アソテ益少キ也馨益ハ心得難因テ此方ヲ施ス干希ナリ去
ナカラ咳少ク熱必久唯フスグト心持恩ク脾腎ノ陽氣虛怯

丸者此方ヲ施ス効ヲ取リ多シ聚ニ心得ヘカラス

○勞咳骨蒸ノ症ニ滋陰降火ノ割ヲ用テ治スル寸ハ十四五貼
モ滋陰ノ割ヲ用テ一日丸一日丸八香砂六君子湯カ行氣香薷
散カヨニ二貼ホド用テ又滋陰ノ割ヲ用丸がヨキ也此見合二
方ノ中ヲ用ニ口傳アリ

○脾胃虛心肺不足ノ勞咳骨蒸トニ症アリ此ノ脾胃虛
勞上俗ニ云フ多ハ泄泻ヲ兼ル也補中益氣湯異功散飯脾湯東
垣升陽湯ノ類ニ加減テ用テ效ヲ上ルノ多シ

○風邪ノ症トテ人風寒ニ感シ或ハ四時不正ノ氣ニ中ルニ医師
發散ノ剂ヲ用ヒ過多ナハ元氣衰弱ニ至リテ肺脾ノ氣虛耗
メ咳嗽發熱メ必方咳骨蒸トナル此ニ風邪ト名ク黃芩葛根
湯ヲ用ヒ其效如神脾肺ノ氣虛スルト甚キ者ニ補中益氣湯
ニ茯苓半夏貝母五味子麥門冬ヲ加テ如神又ハ六君子湯
桔梗山梔子素白皮ヲ加ルモ佳也異功散ニ升麻柴胡當歸
母ヲ加ルモアリ此三方合三口投心傳アリ可也

健忘

○健忘ノ健ハ強ナリ上テノテ物忘リス病ニテ初アリテ終リ
ナク色ガ各ラモ忘ル未だノナ也此病ハ心氣元ヨリ不足人思
慮ヘ過度ノ發シ或ハ精神短少ナル者心竅ニ痰ヲツメテ此病

トナレ類要ノ先サニテ、療治セハ飯脾湯ニ加減メ用ヘシ或ハ
天王補心丹狀元丸回春朱砂安神丸ノ類ヲ加減メ用ヘキ也
○痰心竅ニ迷テ健忘スルニハ瓜萎枳實湯清心抑胆湯ノ類ニ
加減メ用ヨ有神効

○腎水枯涸メ心腎既濟セザハ必健忘スル者多シ畫ハ飯脾湯
清心蓮子飲ノ類ヲ加減メ用ヒ夜ハ六味丸ヲ用ヒニ有神効

怔忡

附驚悸

○怔忡ハ多々思慮過度心血不足ノ魚ノ水ナキガ如ニ因テ心
中動跳メ人ノ捕捉シスル貌ノ如ク胸サウギスル也四物安神
湯回春三宜レ又ハ飯脾湯或ハ補中益氣湯ニ加減ソ用ヘント
カクニ遠志酸棗仁石菖蒲茯神ヲ主トメ方ヲ製メ加減メ用ヒ

卷之二 肝要也

○此症ニモ痰ヲ心トメテ火ニヨツテ征仲スル者多シ 陳湯ニ
達志酸棗石菖蒲當歸ヲ加テ効ラ得トアリ或ハ枳實姜製ノ
黃連酒炒黃連竹茹ノ類ヲ加テ有効或ハ清心抑胆湯ニ加減
メ用テ有効

○驚悸ノ治法王多ハ征仲ニ同シ銀血安神湯四春加減シ或ハ
酸脾湯ニ加減シ朱砂安神丸ニ宣シ是モ痰ヲ根ノ類多シ
二陳湯清心抑胆湯溫胆湯ニ加減メ用ヘシ

牛山先生活套卷之上

牛山先生活套卷之中目錄

諸氣一	嘔氣 <small>嘈雜</small> 二	疝氣 <small>吞酸</small> 三	痞滿六
積聚六	鼓脹五	水腫六	五疽七
諸血 <small>吐血 咳血 咽血 嘴血</small> 七	汗症十	癲狂十二	
癰症十二	不寐十三	邪祟十三	消渴十四
瘡病十六	麻木十七	瘻癰十七	鶴膝風十八
鬚髮十九	面病二十	耳病廿一	鼻病廿二
口舌廿三	牙齒廿八	眼目廿九	咽喉喉核氣廿
濁症廿九	遺精三十	淋病三十	遺溺卅三
小便閉三十	大便閉三十一	大小便閉三十二	痔漏三十三

脱肛

牛山先生活套卷之中
被髮翁 貞菴 香月啓益著

諸氣

- 諸氣人病ト号スルハ七情ノ大過ラム也其脉多ハ沈伏スルナリ
- 男子婦人共ニ諸氣不和憂愁思慮忿怒ニ因テ神ヲ傷リ
抑鬱ノ氣留滞メ不散呑酸噫氣嘔噋心頭目昏眩シ四肢
倦怠シ面色癥黃シ口苦ク舌乾キ飲食減少シ日々羸瘦スル
人類ノ症アルヲム氣胸ノ病ラム也分心氣飲元減メ用ヘシ委フ
- 方考三出不可參考
- 諸氣不和喘咳シ脇肋刺痛シ胸膈痞悶スル者六小降氣

湯沈香降氣湯俞山人降氣湯ノ類ヲ見合テ加減スベシ

○七情ノ氣鬱滞メ順ラズ胸膈痞悶シ面目虛浮シ四肢腫
滿スル者ハ木香流氣飲ヲ用ベシ或ハ上下分消導氣湯田春氣門

ヲ用ベシ

○七情ノ氣鬱結レ胸膈疼痛レ心腹脇肋刺痛レ眩暈氣惱
ノ者ハ利氣丸大七氣湯ノ類ヲ用ベシ

○七情ノ氣鬱滞正者ニハ四七湯ヲ用ベシ

○婦人室女寡尼ノ類ハ七情ノ氣鬱シ易レ正氣天香湯行

氣香薰散ノ類ヲ用ヒ加減メ用ベシ氣惱即解ス

○右ノ藥方ノ類ハ皆七情ノ氣ノ鬱滞ヲ開斂スルノ剂也氣ノ

實ヲ治スルノ方也氣虛スル者ノ宜キ所ニ非ズ氣虛ニ因テ

氣惱シ羸弱者ニハ六君子湯ニ木香炮姜砂仁大
麻ヲ加ヘ四君子湯異功散補中益氣湯ノ類ニ加減メ用ベシ委ク
補益門ニ出ス可参考

○痰厥ノ氣惱シエモイヘヤ心持チ惡キト云者アリ半夏白朮天
麻湯ヲ用ベシ其効如神

○婦人ノ氣惱諸ノ解鬱降氣ノ剂ヲ用テモ愈ガタキ者ニ道
遙散ニ加減メ用ベシ加味餒脾湯ニ加減メ用ルモ甚効アリ

○憲テ氣ヨリ生ズルノ病品ニアリ經ニモ百病ハ氣ヨリ生ズト
アレバ人ハ此一氣ニ因テ生ラ保ツ者也唯此氣ノ鬱シ易ク滯リ
易シ蔚滞スルト冬々バ虛レ易シ故ニ氣病ヲ治スルハ初先ッ蔚
滞ヲ散ズベシ其後ハ氣ヲ順行スベシ其後ハ氣ヲ補フベシ如是治

ヲ施ス時ハ治セズト云ナレ

嘔氣附嘈雜吞酸

○嘔氣トハ胸膈ノ氣ヲ嘔ノ上升スルノ症也嘈雜トハ胸膈ノ氣自
テ不易懊惱煩心レ飢ニ似テ飢ニ非ス痛ニ似テ痛ニ非ズ食不得レ
ハ暫ク止ム也呑酸トハ胸膈ノ氣蔚滯メ水即チ心ヲ刺也此三症ハ
多々皆膈中ノ病ニメ食ト痰ト火トニ属スルノ病也何レモ二陳湯
ニ山梔子砂仁黃連等ノ桑ヲ用ヘシ痰ニ香砂平胃散ニ加減
メ用ヨ爵ニ六味湯平肝飲子ヲ用ヘシ痰ニ清心化痰湯枳編
ニ陳湯黃連竹茹湯ノ類ヲ用ヘシ火ニハ涼膈散竹茹溫胆湯
ニ黃連黃芩連翹ヲ加ベシ如是ニメモ治レ難キ者ハ提脾胃ノ
氣虛弱ト知ヘシ六君子湯ニ木香砂仁山梔子姜製ノ黃連ヲ

加元用ベシ或ハ補中益氣湯ニ黃芩ヲ去テ砂仁半夏山梔子
ヲ加テ用ヒ味白朮散ニ加減メ用生可也

疝氣

○疝氣ノ症ハ七症アリト雖モ多ハ肝腎兩經鬱滯スルノ病
也其脉多々強急ナリ
○疝氣ノ症ハ多々惡寒戰慄レ少腹疼痛レ畢丸ニ引テ腫痛
ス行氣香薷散ニ加減メ用ヒ季方考三載ス或ハ神功湯烏苓
通氣散(疝氣)ヲ見合テ用ベシ
○疝氣ノ症甚キ者ニハ三和散加減メ用ベシ
○疝氣ノ症積聚ツヨキ者ニハ大七氣湯ニ加減メ用ベシ
九勝紅丸神通丸ノ類ノ丸藥ヲ用エヨシ

- 痘氣偏墜シテ墨丸腫痛者六五苓散ニ香薷散ヲ合シ
苗杏山施子沈香木香橘核ヲ加テ其効如神
- 痘氣ノ症癰甚キ者六山施子炒一味二爻煎ノ服ス奇
効アリ甚妙アリ
- 老人之疝氣ニ五積散三木香曲香沈香ヲ加テ用ヘシ其効如
神寒濕ニ申リテ疝痛丸ニ王妙ナリ
- 老人虛人ノ疝氣疎導ノ利ヲ用テ効ナキ者三八六君子湯
三木香苗杏山施子青皮砂仁本通ヲ加テ用ヘシ神効アリ
- 諸ノ疝氣ノ症諸藥ヲ用テモ効ナキ時ハ逍遙散ニ木香川
芎苗香山施子青皮ヲ加テ用テ肝經ヲルムレバ立速ニ効ア
リ此奇く妙可祕

瘡滿

- 痘滿ノ症胸腹飽悶ジテ舒暢セザル也其脉多小滑大也此七
情ノ氣順ラバシト飲食二陽ジル、脾虛ノ運化セザルニ属スナリ
先づ香砂平胃散香砂類用ベシ
- 七情ノ氣結メ心下痞スルニ分心氣飲ニ加減ノ用ヨ
- 食積中滿下痞スルニ_{田春門ニ}加減ノ用ベシ
- 脾胃運化セズ下痞スルニ六君子湯ニ木香砂仁炮姜升
麻柴胡青皮ヲ加テ用ヘシ有奇効
- 脾胃虛弱ニ運化スル不能心下痞スルニ補中益氣湯ニ
木香砂仁半夏姜製ノ黃連ヲ以許加テ用ヘシ其効如神

積聚

四

○五積六聚婦人ノ癰痕皆同類ニメ氣と食トニ因テ發アリテ久
血ヲ積テ此症トナリ或ハ婦人月經不通積テ益塊トナリ其脉多ハ
沈伏ス骨脊ノ者也先潰堅湯田春積門ヲ用ヒ加減レ痰ヲ消シ氣ヲ
順シ血ヲ活シ脾胃ヲ健カニスルラ主トスベキ也

○積聚アシテ疼痛スル者ニハ廣茂瀆堅湯ニ加減ノ用ヨ

○積聚熱ニ属スル者ニハ柴胡湯田春積門ニ加減ノ用ベレ

○積聚寒熱ヲ不問太七氣湯ヲ用テ可行此方積聚ヲ治スル

ノ聖藥ナリ

○總火積聚化者ハ煎湯ヲ嫌フ者多シ必ス丸藥ニテ攻ルニ
宜シ勝紅丸神通丸瀆堅湯田春積門ヲ用ヒ其効如神

○婦人血塊アシテ月經不通腹脹スル者ニハ大七氣湯ヨリ丸藥

鐵湯田春積門ヲ用ベジ何モ其効如神

鼓脹

○鼓脹ノ証脾胃ノ氣虛弱ニテ津液精微ヲ運化スルヲア

タワス中空虛ニテ外堅ク鼓ニ似タルヲ以名ク或ハ形瘦ヤセテ如鬼
手足細瘦オサセメ腹大ニ其形蟹鉗カニケンノ如ク脹突ツヅク出スル者ハ百ニメ一生
モナシ總テ鼓脹ノ症ハ虛ニ属スル故多ハ富貴奉娘ノ家ニ多シ

貧賤ノ者ハコレアル少レ其中十三メニ生スル者アリ其脉多

ハ弦數ナリ

生川水氣丸

卷之二

二

○脹滿ノ初發ハ先脾濕ヲ燥スヘシ分消湯回春鼓脹ニ加減シテ

用之

○脹滿氣財ニ屬スル者ハ分心氣飲ニ加減ノ用ヘレ

ニ

○脾胃虛弱ニメ脹滿スルハ補中治濕湯ニ加減ノ用ヘシ方考

ニ委々載ス可考

ニ

○飲食停滞ノ脹滿ニ積聚甚者ハ大七氣湯ヲ用ベシ其効

如神廣歲瀆堅湯回春鼓脹モ可也

○婦人月經不通ノ腹脹滿者多シ大七氣湯ニ蘿木スツウ紅花吳茱萸ヲ加テ細末ノ橘子ソ大桂丸シ每服四五十丸ヲ用

ハ其効如神數月服スベシ速効ヲ求ナリ勿レ

○總之脹滿之治無先ツ疎導ノ剤ヲ用テ其蔚端ノ積聚ヲ

去ルベシ其後ニ六君子湯補中治濕湯補中益風湯并陽益胃湯ニ加減ノ用ヒ其脾胃ヲ補ベシ此其治ナリ

水腫

○水腫ノ証ハ遍身浮腫ノ皮薄クメ光アリ手ニテ按セバ察ヲ成シ手ヲ舉ヒハ如本其脉多ハ沉遲ナリ

○水腫ノ症初發ハ先濕ヲ去リ小便ヲ利レ脾胃ヲ行スヘシ

實脾飲回春三加減ノ用ヘシ或以胃苓湯或仁蔵柳大腹皮山查ヲ加テ奇効アリ

○水腫脹ニ塊アリ者ハ木香流氣飲ニ加減ノ用ヘシ

○水腫氣惱ニ屬スル者痰喘氣急ノ者ニ刀心氣飲ニ加

減ノ用ヘシ

○脾胃虛弱中氣不行水腫スルニハ六君子湯ニ汎泻木通
木香砂仁炮姜ヲ加テ用ヨ神妙アリ虛甚者ハ補中益氣湯
補中治濕湯茯苓沢泻車前子砂仁ヲ加ヘ或升陽益胃湯ニ
加減メ用ヨ

○腎水虛竭レ水脾充者ニハ鐵金匱腎氣丸補益ニ加減メ
用ヘシ其效如神

○小瘡セラトノ病セラ外ヨリキビシキ貼染ラナシ或ハ沐浴セラナ
ドスレバ其瘡内セラ入り其毒肉セラ攻ム喘急甚セラ遍身浮腫スル
1タレ荆防敗毒散ヲ用テ發スレバ其瘡外ニ出テ腫消スル也
又分氣飲セラ用毛膏宜シ熱ツヨク甚者ニハ防風通聖散
モ可也其内セラニモ虛實ヲ辨治合シ皮膚之氣虛セラ小瘡之毒

五疽

○黃疽ノ症ハ五疽ノ名アリト雖凡俱ニ皆脾胃ノ水穀濕熱
相蒸テ黄ヲ發スル也先づ四苓散五苓散ノ類ニ茵陳ヲ加テ
濕熱ヲ去ルベシ又ハ胃苓湯ニ茵陳ヲ加ルモ可也

○發黃甚キ者ニハ茵陳散田春ニ加減メ用ヘシ

○黃疽ノ症大便結實スル者ハ茵陳大黃湯ヲ用テ下スレ有
奇効

○黃疽ノ症ニ六補脾ノ劑ヲ用ヒカタレ多ハ胃苓湯香砂平胃
散ノ類ニ加減スヘシ其内脾胃極ホトコトテ虛弱ナル者ニハ六君子湯ニ

木香蒼术沢泻ヲ加テ有神効

○黄疽ノ症生米葉茶壁土灰ノ類ヲ好テ食フ者アリ西春ノ

四寶丹ニ宜シ加減製法本条ニ詳也可考

○黄疽ノ症黃丸^ト變メ黒色ト丸者ハ必死也不可治

○黃胖^ハ病ト云アリ黄疽ノ種類ニメ脾留ノ敦阜ニメ濕熱積實ノ病也和俗フク病ト云ヒ又吸下^ト云平胃散ニ鉄粉ヲ加テ細末メ用ヒ其効如神此症ヲ治スルニ本邦ニ傳來スル所ノ粉藥アリ皆鐵粉ヲ加味スルナリ方考消胖散ノ条下ニ詳ニ載ス可参考

諸血 蓋衄血 咳血 喘血 潰血 便血 腸血 腸血

○諸血ヲ見入者ハ其脉多ハ芤^ト沈細大者ハ治太^ト洪

華多ハ清涼劑ヲ用テ治ス^トキナリ

○諸人血証ノ中吐血ノ証ヲ治^トス其中暴カニ紫血ヲ吐スル
更多キ者無事ナリ是平日熱傷ノ瘀血胃口^トアリ吐キ盡メ佳
也多ハ多酒ノ人冒口ニ酒熱ノ毒アシテ吐血スル者ナリ若止ムル
早ク吐^ト盡サレハ血結シテ塊トナリテ治^トレ難キ也吐血ノ証ヲ治セ

ハ犀角地黃湯^ト春^ト加減ノ用ベシ此方ハ吐血ノ三ニラズ衄血喀

衄ノ上竅ヨリ出血スル者ニ用ル所ノ主方也

○吐血ノ症血嘔^トシ或ハ人更^ト不知者ハ先苦菜湯二入參ヲ倍

加メ振出メ用^トシ可^ト也

○壯氣急メ上竅ヨリ出血ノ人更^ト不知者ハ生脉散ヲ用

レニ奇ノ妙

○婦人怒ニ依テ吐血スル者六小柴胡湯ニ川芎當歸芍藥青皮山梔子ヲ加テ用ヘシ奇ノ妙ニ遙遠散^{ツバツ}莎草山梔子牡丹皮青皮ヲ加テ用モ吉

○先痰ヲ吐テ後血ヲ吐セ者ニ熱ニ依痰火十七也二陳湯三四物湯ヲ合シ山梔子萊菔酒黃芩側柏葉地榆ヲ加テ用ヘシ其効如神

○先ツ吐血アリテ後痰ヲ吐セ者ハ陰虛火動也滋陰降火湯滋陰至寶湯ノ類^ト加減角用ヘシ有神効

○懶テ上竅ヨリ出血スル者ニ清火滋陰湯^{回春}血門ヲ用テ其効如神

○勞役ヲタヌ吐衄血者六補中益氣湯ニ麥門冬五味子達志茯神山梔子酒芍藥桑^ト加テ有奇効或^ト加味飯脾^ト附^ト枝^ト六君子湯ニ月母當歸川芎側柏葉ヲ加テ用ヘシ其効多端也

○腎水枯竭^ト吐血レ^ト盜汗遺溺^ト者ニハ六味丸料ニ麥門冬五味子ヲ加テ用ヘシ有奇効

○卒ニ吐血レ^ト更ニ不知脉絶スルハ獨參湯黑炒^ト乾姜ヲ加テ用ヘシ有奇効

○氣逆上^ト上竅ヨリ血ヲ見ス者ニハ諸ノ煎湯三童便少許加^ト口^ト妙アリ

○衄血モ多^ト吐血ノ治方ニ同シ清衄湯^{回春}血門ヲ用ヒ或^ト六味

ト

ト

ト

ト

ト

ト

ト

ト

ト

ト

ト

ト

山施子

○山施子ラ熱湯ヲケテ温ニ鼻ノ肉入テ塞クニ甚効如神

○咳血^{田春}清咳湯^{血門}ヲ用ベシ効才キ才ハ六君子湯ニ桔梗貝

母山施子當飯ヲ加テ有奇効

○咯血上火痰中ニ糸ノ如クナル筋アルラム也是ハ腎中ニ火アリ也

清咯湯^{血門}ヲ用ベシ無効才ハ補中益氣湯^{田春}自母山施

子葵花當飯ヲ加テ有奇効

○唾血玉腎中ノ虛火動スル也清唾湯^{血門}ヲ用ヘシ無効才

分前ノ補中益氣湯ノ加減ヲ用ベシ

○諸上竅益出ノ症止テ後ハ調理スレ^シ補榮湯^{田春}三加減ノ

用ヨ或^シ補中益氣湯ニ當飯ヲ倍^シ其藥味同^シ山施子^ヲ加

ヨ痰氣者六君子湯ニ當飯ヲ兼麥門冬五味子貝母^ヲ

加テ調理スベシ

○便與大便ニ血ヲ出ス下血ニ同シ多^シ臍腑ニ濕熱ノ^{積^シ温^ス}

ル也糞前糞後ニ不問或^シ腸風下血ノ類ニ先^づ清肺湯^{田春}

血門ニ加減メ用ベシ

○下血不止者諸人血劑ヲ用テ無効者或^シ氣^ヲ尠^シレ^タ或^シ役^ヤ

儀^ギ効^{タロウ}方ノ人下血ニ類^シ香薷散ニ當飯ヲ加テ用ヨ其効如神

大祕密ノ^ト也黑炒ノ乾姜ヲ加^フ口傳

○脾氣下陷ニ脾腎虛弱ノ^ト能^シ下血スル者ニハ神

中益氣湯^{田春}地榆側柏葉ヲ加^フ有奇効

○下血諸藥無効者或^シ婦人ノ下血十^二逍遙散^{ニ川芎山}

梔子地榆側柏葉阿膠ヲ加^フ有神効

○溺血ノ尙健ニ血ヲ出スハ清腸湯四春血門ニ加減メ用ヘシ道遙

散ニ木通瞿麥山梔子車前子ヲ加テ有効

○溺血ノ症ニ東垣、升陽益胃湯ヲ用テ有効

○夏月溺血スル者益元散ヲ用テ効アルト多シ

汗証

○汗ノ脉ハ浮虚ヲ見ス也自汗盜汗共ニ多ハ陽盛ニ陰虛スルノ症也當取六黃湯ニ加減メ用ベシ此方盜汗ヲ治スルノ聖藥ナリ

○自汗入暑者ニ參芪湯四春汗症ニ加減メ用ヘシ

○脾胃虛弱ニ自汗盜汗スル者ニ補中益氣湯ニ牡蠣附小麥ヲ加用ヘシ有奇効

○氣血兩虛ノ者自汗盜汗者ニ大補湯ニ牡蠣浮小麦龍骨加元用参芪湯汗症ニ加減メ用ヘシ

○腎氣虛弱ニ盜汗スルハ六味丸ニ加減メ有効

○陰虛火動ノ症勞咳自汗盜汗スル者ニ黃芩養甲湯或ハ

葛根甘草湯ニ加減メ用ヘシ

○風寒之感ノ發散ノ剂ヲ用ヒ過ハ汗出テ不止寸ハ元氣虛乏ニメ風寒ノ證ナキト多シ六君子湯ニ黃芩當取ヲ加用ヘシ或ハ補中益氣湯或ハ黃芩養甲湯ニ加減メ用ヨ有奇効

○黃汗ノ症ノ汗出テ衣ノ裏ヲ染柏汁ノ如レ是濕熱皮表ニ
蔚スル也茯苓補心湯ヲ用テ有奇効四春三仙酒ノ方ヲ用生

可也。正酒煎、藥を以人、依テ胸心患ノ如ア別症ヲ生

スル莫アリ斟シヤウ酌ヤクノ用ヨ

○血汗ノ症トテ血ノ如ク丸汗出テ衣ノ裏ヲ紅色ニ染ル症アリ
多小脾田目不和ノ致ス所也。補中益氣湯ニ酒萬葉防風益智
ヲ加テ有効。補心ノ劑モ可也。敗脾湯有奇効。憩テ汗出ル症ハ
生姜ヲ忌メシ。何方ニモ生姜ヲ去テ用キナリ。

癲狂

○癲狂ノ症ハ多ハ痰心竅ニ塞テノ所也。其脉多弦急滑實
ノ類見也。類血瀆心湯回春癲狂ニ加減ノ用。心甚者ハ防風通
聖散ニ牡丹皮生地黃桃仁ヲ加テ効アリ。

○火熱ニ因テ癲狂不止者ハ黃連解毒湯ニ加減ノ用ヘシ。火熱

心ヲ犯スオハ多ハ笑ヒ狂スル也。此方ニ半夏竹瀝姜汁ヲ加テ有
効也。

○心火ニ因テ發スルニ朱砂安神丸ニ宜レ。

○痰火甚クメ心竅ニ迷ヒ癲狂シ。親疎ラサケズ狂言笑哭スル者

ニ六清心抑胆湯ヲ用ベシ。有効。

○婦人癲狂メ發スルニ六清味逍遙散ヲ用ヘシ。癲狂多ハ熱入

血室ニ因テ尤所也。

○熱痰ニ因テ癲狂スル者ニ六清熱導痰湯ニ加減ノ用。牛膽
南星ヲ用テ効ヲ取テ多端也。サレ庄本邦禁殺ノ法得テ牛
膽ヲ用ルナレ。倍益此物ニ換テ用ル。一種アリ可秘。口授心傳
スベシ。

癪症

○癪症ハ卒時三量倒レ咬牙涎沫ヲ吐人吉ヲ不省ノノ声牛馬羊犬ノ鳴ラテ火ノ中ニ癪狂ノモ其乃キ更ヲ不覺ノ類也和俗此病ヲクツチノ病ト云フ多々痰火ナリニ陳湯ニ加減メ清心抑胆湯ヲ用ヘシ有奇効

○癪症ニ滾痰丸ヲ用テ効ヲ取多シ四春痰門清心滾痰丸春門

癪症用王桂也

○癪症常住ニ安神丸四春用ヘシ有効

○癪症ニ毎日藥一貼ヲ煎服又バニ生涯ノ中癪症不發藥アリ啓益此方ヲ用テ効ヲ取ルト多シ何ノ方ニモアレ其證ニ相應スヘキ藥方ノ中ニ或ハニ味ヲ加ヘ或ニ味ニ加フ奇効此

ニ味ノ藥ニアリ口授心傳スレ某人ニ非シ勿傳可秘本不寐

○不寐ノ症ハ多々驚悸怔忡ノ症ヲ兼者アリ皆痰涎ニ沃キ心氣不足ノ所致也或ハ涼劑ヲ服スルト大過ニ此証ヲ發スル也高枕無憂散ヲ用ユヘシ其効速也

○大病後煩燥メ不寐者多シ竹茹溫胆湯ヲ用ヘシ有神効虛弱尤者加味的脾湯ヲ用ヒ或ハ補中益氣湯ニ酸棗仁茯神ヲ加テ用ヘシ有効

○多睡或ハ不寐者ニ共ニ酸棗仁湯四春ニ加減メ用ヨ膽虛ニ不寐寒也酸棗仁ヲ炒末ソ竹茹煎湯ニ服留膽實多睡ス多睡ハ熱也酸棗仁ヲ生ニテ末ニメ茶姜汁ニ調ヘ

○不寐ノ症ニ始々清心抑胆湯ヲ用ヒ後ニハ衆血安神湯

〔回春〕
〔驚〕ヲ用ヒレ有効

○虚煩不眠者或ハ思慮ヲ過レ學文ノタメニ神憊倦スル類ノ
者必有不眠病酸素仁速志石菖蒲茯神人參水煎温服ス
レ有奇効

邪祟

○邪祟ハ衝惡ノ症トテ邪惡鬼魅人類ニ衝犯メ或ハ卒ニ轉
倒レ人更ニ不知或ハ譖言妄語高聲テ歌笑ノノ病也其
脉乍數乍緩乍大乍小或ハ促ノ見シ結ヲ見ス者也其始少傷
寒ニキル者也脉ヲ能ク診メ邪祟ニ極リタクハ金銀花一味

一束水煎ノ用テ見ヨ邪祟ナニ此藥ニテ少シ靜ニナル者ナリ
又ハ生大豆ヲ噉テ見ヘレ邪祟ニテサレハ腥トテ吐出ス
其辨ヘナクヒダト豆ヲ喰フ者也邪祟ニキハリタクハ並覗
浮圖ノ類ニ命メ祈禱シ又ハ藥ヲ服スヘシ回春ノ辟邪丹ヲ用
テ効多シ

○本邦ニチハ多々狐狸大猫ノ類婦人女子ニ妨ラナメ邪祟ト
尤或ハ大病ノ後氣血虛乏ノ時邪氣虛ニ乘ノ入ル也病者虛
羸シ邪氣勝シ則外ス早ノ祈テ邪ヲ退クベレ筑紫ノ方ニハ
河伯ノ邪祟多シ金銀花ノ煎湯ヲ用テ有神効或ハ髮切ト
テ婦人或ハ童男童女ノ髮ヲタカナ風吹来ルト覺テ結節
ヨリ髮ヲツト落メ其跡稠粘テ鳥餅ナドラ付タルヤウニ成テ

卒時絶少ニ至り暫時アリテ甦^{スル}リ寒熱往来シ傷寒三類

スル病アリ關東ノ鍊^{カイ}融^{ウツ}ト云フ惡風ノ類也 小柴胡湯ニ陳湯

ニ合レ遠志石菖蒲辰砂ヲ加テ用ハバ有奇効 周防長門六

大神ト云邪祟土瓶ト云フ邪祟アクテ狐ソキノ如ク三人害ヲ

ナス此邪祟ハ甘李香ヲ火ニ燒キ鼻ヲ薰ベバ立處ニ其邪退^ス

也犬神ト云ハ犬ラ殺レテ邪ラコシラヘタルラム唐土ノ蠱毒ノ類

ノ如キ者カ土瓶ト云ハ小蛇ヲ土瓶ノ中ニ畜ヘ置^ス云此兩種ノ邪

祟ハ甘李香ヲ薰スハ其邪立處ニ退ク也ト周防國八代島ノ往

医青木道說ト云者啓益ニ語リキ啓益木艸甘李香ノ條ヲ考

ニ邪祟ヲ避^スル能アリ啓益狐付ノ者ヲモ此甘李香ニ序薦ズ

ルニ其効如神啓益又青木道說ニ邪祟ニ金銀花ヲ用ヒ下ラ

傳^ス青木氏國ニ飯テ次神主氣ノ邪祟ニ金銀花ヲ用^ス其効如

神ト書翰ヲ通^ス互^ノ謝禮セレ也 邪祟ノ症ト見キハ気牛子ハ

狐^スニモ山猿ノツギタニモ猫^スタテ王甘李香ヲ以テ薰レ

金銀花ノ煎湯ヲ用ヘシ板^サ又浮圓巫覡ニ命メ祈禱スベレ世間ノ

医師ハ多ハ丹溪ノ虛病瘦病邪祟ニ似タルト云ノ論ヲ確守シテ

真ノ邪祟病ヲ知ヌ類アリ故ニ此所ニ委ク辨^スレ置^ス也

○氣血兩^ラ虧^{カケ}テ瘀^シ凝^ス迷^ヒ瘀火上衝ノ神明昏亂シ譖言

妄語^ス者多^シ邪祟ニギル^ス者ナリ清心抑胆湯或^ハ竹茹溫胆

湯ニ加減^ス用ヨ虚甚^シ者ニ加味散脾湯又^ハ加味道遙散ノ

類^ス用^スヘレ此症ノ邪^ラ以^テ治^ス其害不^シ疎^ラ也ヨクノ脉^ヲ診

スベレ証^シ辨^シテ治^スベキ也慎之

卷之三

三

消渴

○消渴ノ症人口常ニ渴ニ飲食ヲ欲スル也上中下ヲ三消共ニ内虚ニ熱アル故也小便不利ノ渴スル者内ニ濕氣也小便利有渴スル者火内ニ燥アル也上消ノ者二八黃芩湯中消八胃火也人參白虎湯下消八腎火也滋陰降火湯四春ヲ用テ治スルト大槩也

○脾胃虛弱ノ消渴心者多ヒ錢氏白木散麥門冬天花粉藕汁ヲ加テ有効

○脾氣下陷津液上升スルト能ヘス消渴スル者六升麻葛根湯品君子湯ヲ合ヒ當歸麥門冬ヲ加シ有奇効

○消渴本症多給腎水枯涸必心腎才氣不交少故也六味丸

麥門冬五味子加葛根芍藥丸ヲ用元其妙如神
○消渴血虛ニ屬火四物湯ニ宣以丹溪少卿也加減卷之四春消渴門ニ見テ考テ治セヨ

○太病ノ後必津液枯竭ノ消渴ヲ發スルヲ有リ補中益氣湯二葛根麥門天花粉ヲ加テ有奇効
○啓益常ニ消渴ヲ治スルニ東垣ノ甘露膏ヲ用テ效ヲ取ツ多端也蘭室此方世医人常ニ采用ノ方也可祕東垣ノ生津甘露湯王奇也

瘡病

○瘡病ハ多氣血虛ニ風痰上り致テ身皮膚ノ身熱ノ足冷卒ニ紫目脉赤及張七脚如火人掌ノ不知和俗フリケリ病日

多ハ治レ難キ者也凡此証ニ湿ニ治之汗又發ト大過瘡毒

ヲ治レ大汗又發或婦人產後及小產後血ヲ去太過或

ハ誤テ傷寒ヲ下スモツ大過スレ必痊病ニ變ズル也又ハ折傷瘡

旦未合風貫瘡口内ニ入レバ必ズ痊病ニ變ズル也名破傷風ナリ

○痊病ノ治方回春ノ參附銀柴湯ヲ王トノ加減ノ用ニ委ク

回春ノ本条ニ見ニ可考

○瘻風ナリ攻テ痊病ヲ發セ先ツ神通ノ振出ヲ用テ後

ニ二陳湯ニ羌活防風木瓜鈎藤鈎子加ヘ或ハ茱萸枳實湯

加減ノ用ヨ有神効

○產後小產後痊病不先ツ苦菜湯ニ鈎藤鈎子加ヘ用回
其後ハ茱萸枳實湯加用ヨ有神効

○破傷風ニ痊病者ハ陳湯ニ羌活防風種益全

蝎南星虎薑枳實桔梗黃芩竹瀝姜汁ヲ加ヘ有効

○痊病ノ類何ニテモ鈎藤鈎木瓜ノ二味ヲ用ヘシ何ノ藥方ニモ
此味ヲ加ヘビ此家傳極祕也此理ノ辨アリ日授心傳ノ秘家
也其人非心傳ナ勿レ

麻木

○麻木ハ不仁也我身ヲ按スニ麻痺ノ身正寛ヘヌ也十指麻
スルモアリ手足麻スルモアリ或ハ手足モ左右ヲ分ツリ渾身
麻スルモノ左ハ血ニ屬スル多ハ血虛也右ハ氣ニ配スル多ハ氣
虛トセヨ其脉多ハ浮ニメ濡也先加味益氣湯ヲ用ヘシ_{回春}麻木其
効多端

○十指麻ニ面目ニ至ル者アリ氣虚也補中益氣湯ニ唐老

活唐防風烏藥木香釣藤鈎木瓜ヲ加テ有神効

○遍身麻スルニ烏藥順氣散八味順氣散ニ木瓜釣藤鈎ヲ

加ヘテ其効多シレ

○左半身麻スルハ血虛也四物湯ニ烏藥順氣散ヲ合ノ用

ヨ有効茯苓補心湯モ可也八味丸最好

○濕痰經絡ニリテ麻痺スルニ陳湯ニ蒼朮烏藥木瓜薏苡仁釣藤鈎天麻南星ヲ加テ其効如神麻下ニ有ハ牛膝ヲ

加ヘ薏苡仁ヲ倍スベシ

○瘡癰瘍瘻之證不外此也

○癆壁人症何ノ藥方ヲ用ヒテ速効者也服尋日ヲ
カサ子手ノ累ノ効ヲ取ヒ心長ク療治スシ尋子細ラ病入
能サトメ藥ヲ服セレバレ

鶴膝風

○脚氣ノ變必鶴膝風ト心多シ或ハ傷寒暑湿ノ邪氣脚膝
二端リ或ハ大病後氣血虛弱足膝ノ氣虛弱風濕ノ邪
虛乘メ此症トナ者多シ或ハ痛風久ク不愈足膝カラナク膝
節腫痛シ脇瘦テ鶴膝ト左類ノ者多シ或太人小兒共ニ病
病後此症多發シ者多シ或小兒病稍久ク不愈復極テ此
症上化者多シタク其病因ヲ考テ治スル如キ

○鶴膝風ト脚ステ膝ノ曲脇痛脚瘦テ柴ノ根三至生絲

大防風湯ヲ用ヒ加減スシ方考大防風湯ノ全下ニ加減委ク
詳スル也多ハ効ヲ取ナリ

○刺後ノ鶴膝風ニ桑花地黃湯ヲ用ヘン有効

○風濕ノ邪勝テ氣血未勝者ハ獨活寄生湯疎經活血湯ニ

加減ノ用

○腎水虛耗ニ或利後大病後ノ人鶴膝風ト患ハ十全大補
湯或八味丸ニ海桐皮蒼朮ニ桑丸穿山甲虎胫骨乾姜牛

膝木瓜鈎藤鈎ノ類ヲ加味メ可用委出方考

○小兒疳癥ノ後鶴膝ニ至者ハ大防風湯ニテ家傳ノ保童
圓ヲ用ヒ其効如神

鬚髮

○鬚髮ノ病云ハ別ニ苦ナレ只鬚髮ノ白ヲ世俗嫌故ニ

諸ノ医書三皆白ヲ變シ黒トナスノ方ヲ載ス然レバ老テ鬚髮ノ白クナ常也何ホト烏髮ノ染及酒藥ノ服ノ王多集麥

不^レ少^レ諸書三白髮ノ深ノ藥方ヲ載セ或ハ藥肆販^レク

其應驗如神サレ^レ深^レ黑^レタル生日水ド經ヒ其髮根^レタ^レ所白者也老テ鬚髮ノ白クナハ血ノ潤沢枯涸スル更ニテ冬ニ成テ草木ノ枯槁スルニヒトシケレバ何ホドノ水ヲ^レキ培養^レ毛久^上粘^レ所草木ニ益ナキニ等シカレ^レシ想テ人父母ヨリ漂^レ後^レ所入移体自然ノ厚薄^レ定者^レ其衰^レ所モ薄キ所ヨリ始^レ者也是故^二或^レ自ヨリ先^レ衰^レ者アリ是^二以テ^レ其鬚^レ者^二自ヨリ先^レ衰^レ髮ヨリ先^レ衰^レ者アリ是^二以テ^レ其鬚^レ

○髮^レ白^レ病平十治^レ不^レ外^レ其^レ也壯年ノ人髮中^レ有^レ白髮必

○生^レ者^レ俗^レ若^レ白^レ髮^レ是^レ不^レ治^レ可^レ也四十計ヨリ鬚^レ

髮白^レ者^レ血虛^レ腎虛^レ屬火^レ味九華^レ用^レ諸^二方^一書^二

○烏髮^レ者^レ藥方載^レ本可^レ參^二方^一書^二

○大病^レ後^レ髮頻^レ脫落^レ者^レ山梔子一味水煎^レノ溫服^レ

○猶^レ更^レ粘^レ者^レ脾胃^レ氣不升^レ故也營益常^レ異物升^レ

○麻鳥根湯^レ合^レ當^レ吸^レ加^レ用^レ其効如神可^レ祕

面糊

○面瘡^レ生^レ於^レ上^レ頸^レ之^レ也清上防風湯^二門^一東垣^レ清上

浮火湯或ハ白芷升麻湯ノ類ヲ用ヘビ面瘡出上者ニハ判

防敗毒散甚キ者ニハ防風通聖散ヲ用ベシ方考本方ノ條ニ

詳文方考

○面瘡久之陽明ノ風熱也升麻附子湯同春面瘡者陽明經也升麻附子湯面瘡黑ノ陽明ノ病也升麻白

芷湯同此等類見合テ用ヘレ

○面粉刺生上者アリ清肺湯同春可用

○十五六歳人童子六月ノ當ニ欲圓日ノ當ニ升ノト欲スルノ時

○面瘡者多ニ滋陰降火湯又用ヘ其効如神

耳病

○耳ノ敷ハ腎也耳病ハ腎ノ病也其内腎虛ト腎火トヲ分ナ

○治スカカリ

○治スカカリ

○治スカカリ

○治スカカリ

○治スカカリ

○治スカカリ

○治スカカリ

○治スカカリ

欽定四庫全書
本草綱目

卷之三十三
耳癰

○齒耳腫痛太火多火風熱也荆防敗毒散或荆芥連翹湯

門加減人用何王細辛少許加白芍也可

○厚味胃火ヲ動レ兩耳聾シ或八耳三瘡ヲ生スル類ノ者二八防

風通聖散三酒燉ノ大黃ヲ加テ用ヨ其効如神

○兩耳聾二疼痛一腫者二清上浮火ノ荆芥用テ効ナキ才六藿

香正氣散一細辛ヲ加テ有神効

○虛火上升一痰氣耳中三蔚滯レ耳鳴耳聾又耳聾二標通明利

氣湯耳門ノ角ヘ有功

○耳聾熱毒耳內脹ヲ生シ惑且鳴耳聾又者二八蔓

荆芥散耳門ノ角有効

○停耳聾症毛蔓荆子散或用テ有効或以防風通聖散下ヲ

○耳鳴耳聾ノ者八多火腎虛ニ屬ス六味丸ヲ用ベニ腎虛一

火燄者二八滋陰降火湯ヲ用ベニ有奇効

○怒氣因于耳鳴耳聾又者二八小柴胡湯三四物湯ヲ合シ

龍胆細辛鈎藤鈎ヲ加テ其効如神

○鼻病

○鼻清涕之流スハ多火風寒ニ感冒不適症子參蘇飲ノ類ヲ

用之其藥三至五寸水陽明火實熱心得下止藿香正

氣散ニ用ヘレ有神効又二升麻葛根湯ヲ用テ効ヲ取リ多江
加様ノ薬衣ヲ用テモ効キ才ハ脾胃虛ノ肺氣耗散ノ心得テ
異功散六君子湯等ノ方ニ二升麻葛根茈胡ヲ加ヘ又補中益氣

湯ニ羌活防風葛根ヲ加ヘレ其効如神

○鼻衄血ノ失血ノ論中ニ詳ニ出入可考者

○鼻漏ノ癰鼻ニ濁湯ヲ出メ不止也荆芥連翹湯回春
鼻門ヲ用

ヘレ有効

○鼻ニ香臭ヲ不聞者ハ肺經ニ風熱アル也麗沢通氣湯回春
鼻門

大柴胡湯ヲ有効如是大方ニ用テモ效キ才ハ肺虛也補中益氣

湯ニ羌活防風白芷芩桂加芍有神効本草綱目卷之四
卷之十

○酒釀鼻ノ酒毒本草綱目卷之三ハ葛花鮮醒湯ヲ用テ清火熱太陰属火

火防風通聖散ニ用テ有神効外ハ三白散ニ輕粉硫黃枯礬ヲ
加シ寒火水或以臘雪人畜參三調テ擦之薰運大黃ヲ加モ最好

○鼻瘻ハ肺火也實火者ハ防風通聖散ニ加減ノ用ヨシ虛弱者
心者ハ升麻葛根湯ニ當歸川芎連翹酒芩ニ防風山梔子ヲ

加ヘヨ有効外ヨリ燐針ノ用テ燒切ヘレ杏仁一皮火ヲ去テノ況
トナレ絹ニ包テ鼻中ニ投入ヨ有神効

口古

○口舌腫痛火盛者或ハ口舌瘻ニ生ハル類ノ者ハ共ニニ焦ノ
實熱也大半皆胃熱ニ屬火分ア之ヲ言ハ舌心ニ屬火ハ心
火トナレ可治只脾胃ニ屬火ハ胃火ニ属レ或然中氣ノ不足
トナレ可治

○口舌瘡ラ生レ咽喉腫痛レ大便閉スル者ハ是三焦ノ實熱
ナリ先ハ用涼膈散加減ヘレ或清胃散用ヨ甚有レ防風通
聖散ノ用ヘ風邪ノ熱滯一久ク咽痛口瘡ラ生セ荆防敗
毒散或ハ柴胡湯ニ連翹防風葛根升麻ノ用ヘ有レ功
○口舌ニ瘡ラ生シ發熱惡寒勞スル寸ハ休倦テ飲食ヲ思サ
ルハ中氣ノ虛熱也補中益氣湯ニ麥門冬、五味子、黃柏ヲ加テ
用ヘ有レ神効或ハ中氣不足ノ口舌瘡ラ生レ口乾キ咽渴一湯
ヲ飲不食大錢或白芷散用ヘ有レ神効
○口舌ハ病先ニ舌ハ炎ラ刺ハ血ヲ出レ其熱毒ヲ油ヲ其
急ニ救人術也泡口舌ハ毒諸人涼藥ヲ用テ効ナク手急用
附子理中湯ニ以ハ黑芍藥、補中益氣湯ニ以ハ白芷散

○口舌瘡ラ生スハ三諸ノ涼藥ヲ用テ効ナク又附子理中湯
ノ溫熱ヲ用テ七効十キ時ニ加味逍遙散ニ連翹桔梗ヲ加ヘテ
用ヨ其効如神
○口舌瘡ラ生スハ三以上ノ藥ヲ用テ七効十キ寸ハ八味丸ヲ用
ベシ是無根ノ虛火也滋陰降火湯ニ有レ神効
○舌瘡ト云病アリテ舌腐爛フレ舌根又ハ舌上巖穴ノ如ニメ
膿ヲ出ス者ハ不可救多々吐血メ火升也此症ハ必固ク詳
メ治スカラス百二生王十キト知ルシ

牙齒

○牙齒ノ病ハ陽明ノ熱也上下ノ牙齒腫痛不可忍寒熱往
來頭腦肩胛牽引レ滿面赤熱不類多汗率熱厚味

物ヲ過食スルノ麥熱也清胃散三宣レ加減委ク方考一載
又可考回春牙齒門ノ清胃散又ハ清胃湯共ニ有効又海謂

湯毛牙齒ノ痛ヲ治ズルト如神

○口ヲ開テ風ヲ呷寸三牙齒疼痛レ口ヲ開テ臭氣不可聞

者ハ腸胃ノ風邪ト腸胃ノ積熱トナリ共ニ當散連翹湯回春牙齒

有効

○蟲食齒痛甚キ者定痛散回春牙齒用ヨ有効想テ齒

ハ胃熱也清胃散ニ加減メ用ヨ小兒ニ多キ症也小兒ノ蟲齒

脾胃之食箭也藿香正氣散ニ葛根連翹ヲ加テ用ヨ虛

弱者小兒ハ七味白朮散ニ陳皮桔梗連翹ヲ加テ用ヨ大人

三王最宜共ニ有神効

○齒齦齒痛甚キ寸丁子ヲ細末メ糊ニテ九シ蟲食人穴中ニ入ヨ

有神効又延齡丹ノ蟲食人穴入ヨ有奇効十ニ大濟堂

○齒ノ縫ヨリ血ヲ虫入者ニ蘇東坡回春牙齒用ヨ有神効

○齒ノ病品多共ニ皆胃中ノ熱也諸ノ医書ヲ考テシクノ

症ニ相當入坐藥ヲ見合テ用ヨ如是ノ治難久東垣ノ神効丸

ヲ煎湯ニ用ヨ有奇効如減効能方考ニ詳也可考

○小兒走馬牙疳和柏ノ子ニ云牙床一時脅腫之不散至江

皆上焦ノ濕熱也消疳散回春牙齒又止血レ有効此症

ハ殊外下急症アレ速ニ治スヘシ防風通聖散ヲ用ヨ有神効

○齒齦之餘火腎三焦熱火ノ火多火宣露齒龈腫

痛落落ス生瘻外房更ニ擴三葉味ヲ禁スヘシ晝行補中

益氣湯夜入六味地黃丸黃柏ヲ加角豆有神効

○齒動搖メ不固者ハ赤辛螺ノ殼中ニ塙ヲ入テ藥研_シ生
三冬火塙ニシケハ塙ノ力大也其時ニ又塙ヲ殼中シソ
ヨニテ又酸蘿蔓モニ汁取リ其力大アリタル時ハ塙ヲ又新
其上ニツメシニ殼中ハイニナリタル時火塙_シヤキテ殼百
タ木ノトナリタル時取出レサシ殼共ニ塙研ニテヲロレ
塙中ニ置キ毎朝此細末ノ粉薬ヲ楊枝ニシケア牙齒
ラスリ磨_カシ歯弱メ楊枝ヲガアリ難ミ指ニツケテ牙齒
ヲスルベシ其後涼水_ミ漱_ク時自然_シ齒固_カ也毎朝
如是_シ此法_シ解_カ生涯_カ歯人病_シ去_カ十_シ大祕良也

眼目

○眼目只相火ノ上衝ニヨル也熱火ヲ清利スヘシ清肝明日湯
ヲ用ヘレ一切ノ風熱因テ赤腫疼痛者ニ有神効俗云風
眼熱ノ類ナシ必老若共ニ此方ヲ用ヘシ

○風眼甚キ者赤腫_シテ其痛不可忍頭腦ニ牽引シ眉後如
裂_シ丸者ハ王字泰ノ羌活勝風湯ヲ用ヒヘシ敗毒敗_シ當吸
芍藥生地黃細辛防風荆芥薄荷ヲ加タル方也其効如神風
眼ノ痛甚キ者ハ必吹破_シテ瞳子損_シテ失明ニ至者多シ是大
夏ノ症心得_シ庸醫心ヲ用ヒ_シ鹿_シ暴ニメ風眼_シタニスキ症
ト思テ治ラズアシニ類多シ風眼赤暴急痛太便秘者ニ防風
通聖散ヲ用ヘシ其効如神

○風眼熱眼ニ八家傳ノ洗藥ヲ以テ頻_シニ洗セヨ當吸川芎

赤芍藥大黃黃連黃柏連翹薄荷各等分紅花桔梗杏仁減

半水煎二洗ア毎度重湯ニテ温テ頻ニ洗ベシ其効如神

○風熱ノ眼病以上ニ速ラ用ヒ熱退キ眼ノ赤ニ薄ク腫消セ

バ頻ニ風藥清熱ノ剤ヲ服スカフ不防風飲子助陽和血湯ノ

類ニ加減ノ用ヘシ有神効

○風眼ニ頻ニ風藥清熱ノ剤ヲ服スルト過度ニ眼液燥ア涙
出ルナク難済ノ開きガタク遠視ニ見サルハ虛眼ノ症也加

味道遙散冲和養胃湯助陽和血湯ニ血藥ヲ加ヘ甚キ者ニ

大補湯ニ肉桂ヲ去リ蔓荆子白豆蔻ヲ加テ用ヨ或ハ晝

ハ補中益氣湯ニ加減ノ角ニ夜ハ六味丸三五味子白豆蔻

ヲ加テ用ヨ其効如神

○内障ノ青盲ノ療治者也惣子内障ノ藥物是難計者
也多為脾腎久虛ニ屬ノ補中益氣湯ニ防風蔓荆子白豆蔻ヲ

加ヘ大補湯ニ肉桂ヲ去リ白豆蔻ヲ加ヘ六味丸ニ加減メ用ヒ冲

和養胃湯壬宜レ外ヨリ眼科針ヲサレテ瞼出テ治スル者多レ眼

科ノ皴手ニ非シ此術酒禁又ヘカノ

○外障ノ症ハ先風藥ヲ血藥ニ配剤メ茶連ノ類少許ヲ加テ用

ヨ効ナキハ加味逍遙散助陽和血湯防風飲子ノ類ヲ用ヘシ

有神効

○拳毛倒睫ハ何本ト其毛ヲキテニ跡ヨリ生スル者也眼

科妙手驗ヨリ血ヲヌキ或ハ眼眶ニ灸火取効用多レ防風

飲子用ヨ其効如神

准目人准目人在多處小兒二三者也小兒才ノ疳氣トナス治スヘシ

家傳保童圓ヨ用ヒ十四五歲童子色欲ヲ過レ准目トアシ中和ホウ和ハ和胃湯ス用ヨ有神ムカシ勁和俗ハシマツ准目ノ症鮑ホウ臭ウニ子シカニ福ラク又アリ

スレ必有功トテ用ル者アリ溫補スル物ナキ神ムカシ勁アリ也可祕入ヒタチ人ヒト鮑ホウ臭ウニ子シカニ福ラク又アリ

人ヒト鮑ホウ臭ウニ子シカニ福ラク又アリ小兒才ノ准目トアシ用丁多ヒテ有神ムカシ勁大人ヒト人ヒト小兒才ノ鮑ホウ臭ウニ子シカニ福ラク又アリ

腸ス用ヒ准目トアシ治スヘシ如神ムカシ准目ノ症黃ホウ疸ダク蓼シモツケ黃ホウ胖タバコ變入トアリ香砂六君子湯スミシヤクロクジンシヨウ補中益氣湯ヒュウヂョウヨクイシヨウ類タケニ用スヘシ有神ムカシ勁

效ヒトツ治ヒトツ眼アヅカニ病ノ初發ハ風藥フウセキ方ヲ發散スヘシ中ヒトツ止ハ風藥フウセキ方ヲ

止ハ血藥スル方ヲ取陽和血湯トキヨウハクセキヨウ加味逍遙散カミジョヨンサン類タケニ宜直攻ヒツコウ時ヒ補中益氣湯ヒュウヂョウヨクイシヨウ大補湯オウブヨウ六味地黃丸ロクミイリヤウ物湯モノヨウ類タケニ加減カジム用自ヒトツ

眼科ノ內ナカニ藥ハ必苦寒ハ用生偏大补脾胃ハ狼ラウ元氣ハ伐ハ類多シ眼病ハ久愈ス東垣トウモン蘭室秘藏ランシキヒツカウ應驗エイセン方ヲ多シ可考カウ眼目ノ論ハ古今醫統カインイツ醫學イキガク綱目カウモド銀海精微ギンハイセイメイ等ノ書ヲ二詳シテ也ハ考カウ治ス施ス眼目ノ方ハ東垣トウモン未シテギハ治ス常ヒタチ二說ハ如ク予カ門ミ游ス眼目ノ方ハ東垣トウモン流ス獨眼病ドクエイボウ云ニ非ス諸ハ病ノ共ニ東垣トウモン治ス方ニ因テ治ス辨惑論ヒンガツロン脾胃論ヒバリロン蘭室祕藏ランシキヒツカウ常ヒタチ誦ス世ハ只シ東垣トウモン医ハ王道ヲノ心得元ハ補シ藥ヲ用ヒテ計ス思ヒ補中益氣湯ヒュウヂョウヨクイシヨウ外ヒテ他ノ方ヲ不知シカニ類タケニ者ハ多シ東垣トウモン血脉ハ不全者ハ可シ矣マリ乎カ東垣トウモン信スル口ヒトツ授ス心傳多シ可シ

咽喉附喉瘻核氣

卷之三

卷之三

廿八

○咽喉腫痛カサハ或ハ瘡カサハ生ル或ハ喉閉塞カサハメ言語ハナシ不能ハナシ能ハナシ尤者ハ俱ハ是風熱瘀火カサハノナク所也清涼散カク春ハ加減カクメ用ハタツシ清胃涼膈散カクノ類ハ見合ハタツテ用ハタツモ吉

○咽閉ハナシテ飲食不進ハタツ不能言語ハナシ急證ハヤシ也其脉兩寸洪溢ハラハラナ化者ハ急ハヤシ不救ハタツ久少商ハシマツ免ハシマツ側ハシマツ太脂ハシマツ内ハシマツアリハシマツ針ハシマツ毒血ハシマツヲ出ハシマツスハシマツ其効如神必瘻涎ハシマツ吐出ハシマツスハシマツ要ハシマツスハシマツ也

○咽喉閉塞ハナシ飲食言語ハナシ不通者急証ハヤシ吹喉散ハシマツ救急方ハシマツ共ハシマツ間春ハシマツノ類ハシマツ用ハタツ速ハヤカ治ハシマツ多々風痰熱火三屬ハシマツ所ハシマツ大清熱化痰ハシマツ剤ハシマツ用ハタツ

○喉痺乳鴛ハシマツ人症咽喉塞不通山豆根ハシマツ細末ハシマツ管ハシマツニハシマツ吹全有神効桔梗ハシマツ細末ハシマツ吹至有効五倍子ハシマツ細末ハシマツ吹モ有

効熊胆甘州寺分布ハシマツテ含ムハハ有神効野猪ハシマツ胆モヨレ

○喉痺候夙人ハシマツ傳ハシマツノ妙方アリ乳香散ト号ス調子乳香莎ハシマツ草紫檀各等分ニ梅干ハシマツ肉三分一加ヘ布三包テ含ム津口ハシマツ中滴ハシマツ吐出スベニ内ノテモヨレ有神効奇妙回松

○喉痛者ハ甘桔湯效也甘艸桔梗各等分水煎ハシマツ服スハシマツ此方藥品少々藥効速也其効如神

○陰虛火動ハシマツ因ハシマツ咽痛者ハ四物湯ハシマツ酒黃芩酒黃連ハシマツヲ加テ可用或ハ滋陰至靈湯降火湯ハシマツ類ハシマツ用ハタツヘニ奇効アリ

○咽痛ノ病ハシマツ清冷解毒丸散ハシマツ剤ハシマツ用ハタツヘ効丁ハシマツ附于理中湯ハシマツ用ハタツ其効如神

咽痛寒甚始六參薦飲二桔梗ヲ倍シ用ヨ或ハ一陳湯二

桔梗黃芩砂仁山梔子薦梗ヲ加テ用ヨ有神効

○梅核氣ノ症二十情氣鬱結不二因テ痰咽喉之間ニアツテ喀出不出喫止不干咽人間ニ梅核ノ如ク丸者アリ或ハ破核ノ如ク丸物アリ上氣喘急者也加味四七湯用ヨ其効如神此三乳香散ヲ合ハシ其効如神此症人婦人肺火多キ人或ハ飲食時惱怒ニケンナ多ハ此症トナヒ開府順氣利膈化痰清肺ノ劑ヲ用ヘヒ心氣飲薦梗ヲ加王最有神効

濁症

○便濁症赤白共ニ濕熱ノ所為也督經虛損ノ濁又城

者多ヒ瘦人八虛火ニヨル肥人八溫痰ニ属ス多ハ思慮ノ人憂財人此症不^レ清心蓮子飲ニ加減ノ用ヘシ有神効

○赤白濁症治之ニ水火分清飲回春濁門ヲ用ヨ有神効

○瘦人ノ濁症二八滋陰降火湯ニ加減ノ有効

○肥人濁症二陳湯ニ草薢蒼朮當歸川芎山梔子赤芍藥ヲ加テ有神効

○白濁督經虛寒ノ者多シ萆薢益智石菖蒲烏藥各等分水煎レ少許塩ヲ入テ空心ニ服ス有効

○脾胃虛寒ノ濁ニハ六味丸ヲ六君子湯ニテ下七脾肺滯二卦六味丸ヲ加脾湯ニテ下七脾肺ノ氣虛ニハ六味丸ヲ補中益氣湯ニテ下七有効

○赤白濁症諸方無効時ニ升麻葛根湯ニ四君子湯ヲ合シ

草薢石菖蒲達志車前子ヲ加テ有神効

○赤白濁症種々ノ藥ヲ用テ至効ナキ時ハ加味逍遙散ニ草

薢石菖蒲車前子ヲ加テ其効如神此奇妙ノ祕方也可

遺精

○遺精ノ疾多ハ心腎不既濟ノ故也或八年少ノ人強丁情慾

ヲ制テ犯満溢スルガ如クナルハ勿藥可也其外ノ症ハ心熱也

先以清心蓮子飲加減レ清心湯同春遺精類心湯同上ノ方後ヲ見

合之加減可用皆有神効多ハ白濁人治方二圖レ参考メ用ヨ

○陰虛火動ニ因テ遺精スルニ滋陰降火湯ニ加減レ保精湯

遺精方用三有効

○遺精不止者諸書人遺精門ヲ考テ添フ用至効ナリ升麻葛根湯ニ四君子湯又合之石蓮子達志防風黃芩酸棗仁當歸

ヲ加テ有神効

○脾胃下陷スレバ必至遺精ス神中益氣湯ニ防風車前子石蓮肉ヲ加テ有神効

○遺精久々不止者人腎虛ニ屬ス六味丸ヲ可用有神効腎ノ陽氣衰弱人遺精元者八味丸ヲ用ヘシ有神効

淋證

○淋症ハ五名アリト雖凡多ハ心小腸ト膀胱トノ變化初發ハ

先づ五淋散ハ正散龍胆泻肝湯ノ類ニ加減ノ用ヨ委ク方考

ニ載ダリ可参考

○熱實ノ淋病ニテ疼痛甚ク血便ヲトス者海金砂散四春法症

用ヨ其効如神

○熱淋症寒熱往來ニハ小柴胡湯ニ滑石沢漏木通ヲ加

テ有効

○三焦ノ實熱ニテ淋病ヲサバ防風通聖散用有効

○食滯久ク不行中院三爵スル淋病ノ發不蘿昔止氣散ニ
木通沢浮ヲ加テ用ヨ有神効或ハ疝氣勝號三枚入テ淋病スル者ニハ
前子ヲ加テ用ヨ有神効或ハ疝氣勝號三枚入テ淋病スル者ニハ
是モ行氣香蘇散ニ疝氣ノ加減ノ可用委ク方考ニ出可参考

○七情ノ氣鬱レ或ハ思慮憂愁ノ人淋病ヲ發ス者ニ八分水

氣飲ス用テ加減スベシ方考ニ詳也釣藤鈎又加ヨ其効如神

○脾胃下陷ノ淋病ヲ發スレバ補中益氣湯ニ加減メ用ヨ又ハ
四君子湯升麻葛根湯ヲ合方ニメ用ヨ共ニ方考ニ詳也釣藤鈎
ヲ加ム其効如神

○淋病ノ症世医多ハ通藥ヲ用テ効ナキ才ハ必術盡テ通藥
未足トメ一向ニ速通ノ利ヲ用テ愈其氣下陷ノ故ニ淋病即時
ニ不愈メ由日ノ上モ效ナキ才ハ月ヲ涉リ年ヲ重ニ不愈ニ至ル
已が術ノ拙莫ヨ不言ノ淋病ハ藥ノキカヌ者上云也可矣淋病ニ
通藥ヲ用テ効ナキ才ハ氣ノ下陷ト知ル東垣ノ升陽益胃湯
ヲ用ヘ卷ク方考ニ出ス此可考升陽益胃湯ノ方後ニ小便罷テ
病増劇ヲ加ヘハ茯苓沢浮ヲ本ベレト云東垣ノ說ヲ曉通セサ
ル者ハ淋病ヲ治ストメ有ヘタラズ又淋病ニ釣藤鈎ヲ加ヘ用ハ

大祕藏人夏也此ニ義久口授平洋ノ秘本也人非人得ル

丁力レ可祕

○淋病五淋ヲ不問諸藥ヲ用テ効事時八道益散ニ酒芩車前子鈎藤鈎フ如テ肝經ラニル才ハ其効如神世医レニラ所也可祕

○淋病諸藥ヲ用テ効方痛甚クノ可忍叫號ノ際ラ久類ノ如ニ黃芩連中湯ヲ用ヨ其効如神甘ハ能急ラ緩急ソ義也此予が發明ニメ世医ノ所不知也可祕

○久淋多火腎虛也六味九八味丸ヲ用ヨ加減金匱腎氣丸モ有効

遺溺

○遺溺ハ多火心腎火氣鬪チ傳送度合失之ノ故ニ外清心蓮子飲ニ加減メ用ヨ有効

○氣虛メ遺溺失禁也外寒ニ姜湯因春遺溺ノ用ヨ有神効補中益氣湯ニ益智石菖蒲酸棗仁山茱萸ヲ加テ用ユベシ有神効

○夏月伏暑ノ勢ニ因テ遺溺セハ人参白虎湯ヲ用ヨ効アリ清暑益氣湯モ可也

○心腎ノ氣不足ノ遺溺不者ハ飯脾湯ヲ呑テ六味丸ヲ用ヨ其効如神

○十歳以前ノ小兒ノ遺溺ハ多火脾胃ノ虛寒也錢氏白朮散益智乾姜草薢ヲ加用ヨ其効如神

老成溺多者、虛寒也附子理中湯ニ益智ヲ加テ用ヒヨ其

効如神

○壯年多溺者虛寒也滋陰降火湯ヲ用ヨ有効

○大人小兒共ニ遺溺失禁小便頻數ナル者腰眼ノ元命

門穴脾俞腎俞膀胱俞ヲ灸スヘシ其効如神

小便閉

○小便不通者ハ多々熱結也通藥ヲ用テ通利スベシ猪苓

湯加味五苓散本条類ヲ可用有効

○渴極小便不利者熱邪上焦分ニ有也清肺飲本条兩

加減メ可用有効

○不渴人小便閉ナル熱下焦ニ分ニ有也通關丸本条ヲ用

ヨ其効如神

○老及瘦人血虛小便閉ルニ四物湯ニ通關丸ヲ用

テ其効如神

○痰喘小便不通者三八二陳湯ニ酒芩山梔子木通桑白

皮木香ヲ加テ用ヨ其効如神

○元氣虛弱ノ人或ハ大病ノ後虛損ノ上ニテ小便不通ニハ

補中益氣湯ニ車前子ヲ加テ用ヨ其効如神

○陰虛火盛ニ小水不通者三八滋陰降火湯加味金匱腎

氣丸ヲ用ヨ有神効

○小便不通ノ症ハ急症ナハ速力ニ治スベシ若嘔氣メ小便

不通者ハ難治下心得メレ若中滿鼓脹ノ病小便不通モ亦難

治癒也歸退人他讓べシ

太便閉

○大便閉熱結属ス多ハ大腸ニ熱アツテ津液枯竭スル之先ツ潤腸湯田春二載加減用王委丸春三載

○老人虛火血虛ノ大便閉者加減潤腸湯田風用テ有神効

○痰中院尙滯不行大便閉者ハ二陳湯ニ升麻葛根ヲ加テ其効如神此丹溪先生ノ妙方也小兒大便閉此方

用ヒ保童圓ヲ下セハ其効如神

○汗出少多々津液枯竭或公產後太過多津液枯竭

○共二大便結燥スル者也四物湯ニ桃仁麻仁人參麥門冬ヲ

加天其効如神

○虛弱ノ人大便結スル數日ニメ諸ノ潤燥活血ノ剤ヲ用テ

モ効半キ時ニ補中益氣湯ヲ以テ備急圓ヲ下スベシ其効如

神大便通セバ前藥ヲヤメテ八物湯ヲ用ヨ

○大便不通ハ外ヨリ蜜導ノ法香油ヲ谷道ニスリ入ハ即時

ニ通ズ其製諸書ニ詳也一方ニ四物湯ニ味噌ヲ藥ノカサホド

入テ水煎シ竹管ニテ肛門ニ吹入レバ必速効アリ可秘

○傷寒熱結大便不通者ハ枳實大黃湯兼氣湯ノ類ノ方

後ニ詳也方考ニ載ス諸書ノ傷寒門ニテ可治

○老人常ニ大便結スル云八物湯ニ桃仁麻仁郁李仁紅花ヲ

加テ服スベシ

辨證錄 大小便閉

○大小便不通者ハ急証也枳實大黃湯、兼氣湯ノ類ニ速
ニ下スヘシ或ニ鐵脚丸顛倒散(田春ノ類ヲ用ヘ)

○太小便不通ニ蝎牛膏最妙也蝎牛膏(カツウガフ)研碎キ泥トナ
レ麝香少許入テ脇中ニ填三紙ニテ上ヲ貼不田螺ヲ以テ右ノ

如タルモ佳也共ニ有神効○桔梗石少許麝香少許脇に入ルモ
吉○琥珀ノ細末ニ麝香ヲ加ヘ糊ミラレセテ脇中ニ填一也

其効如神以上ノ脇入ヒ藥小便不通ニ用モ亦可也

○夏月伏熱ニ因ニ便不通者ニ白虎湯ヲ以テ益元散ヲ用
ヘシ有神効

○冬月寒帯リテ二便不通者ニ五積散ヲ以テ木通ノ細末

ノ服スル其効如神

○痴氣ニ因ニ太小便不通者ニ行氣香薷散(カクシイシヤク)痴氣ノ加減ノ
方ヲ用ヨ有神効神通丸ヲ兼用ルモ佳也方考ニ載ス可考

痔漏

○痔ハ多々酒色過度厚味ノ人必腸澼メ痔トナル也先ツ藜芦防
風湯藜芦皂角湯ノ類ヲ見合テ用ヨ蘭室祕藏ノ中ニ妙方多

シ考テ可用

○新久ノ諸痔肛邊腫痛ニ或ニ瘡生シ痒キ時膿血ヲ出ス
者ニ當故連翹湯(田春ノ類)ヲ用ヨ有効

○痔疼痛ニ不可忍者ニ加味逍遙散藜芦連翹ヲ加テ用ス

其効如神

○新久ノ諸痔肛邊腫痛ニ或ニ瘡生シ痒キ時膿血ヲ出ス

者ニ當故連翹湯(田春ノ類)ヲ用ヨ有効

脾胃虛弱ノ者ノ痔疾脱肛ノ類ノ病ハ下陷ヨリ升提スベレ
提肛散補中益氣湯ニ防風葵井連翹益智仁加用ヨ其効
如神

○痔瘡久ク漏トナツテ肛邊ハニ生シ膿血ヲ出ス者ハ平臍
九回春門ラ用ヨ外ハ驅毒神應膏膏く外科ラ貼スヘニ有神効

○痔漏膿血ヲ出スニ神雪湯回春門ラ用ヨ有神効

脱肛

○脱肛ハ肺之藏ノ虚寒スル故也參芪湯回春門ラ用ヨ有神効

○脱肛久病新久ラ不問提肛散ラ用ヨ有神効

○氣虛及上脾肺ハ氣虛スル方脱肛スルニ補中益氣湯ニ防風

益智連翹芩酒芩葵井ラ加テ有神効

○久痢久泄ノ後必脱肛スル者也補中益氣湯ニ防風茯苓益
智山藥ラ加テ用ヨ其効如神

○小兒泄痢ノ後必脱肛ス錢氏白朮散ニ升麻防風ヲ加テ其
効如神疳疾アリ家傳保童圓ラ兼用ヨ有神効

○老人氣血虛メ脱肛セハ大補湯ニ防風升麻附子ヲ加ニ角ヨ
有奇効八味丸モ佳也

○臨產努力ノ産レ畢テ脱肛スル者アリ保產湯ニ升麻防風
ヲ加テ用ヨ氣弱キ產婦ニハ補中益氣湯ニ川芎防風酒芩葵
子加テ用ヨ共ニ有神効

牛山先生活套卷之中終

牛山先生活卷之下目錄

婦人部一	調經二	經閉二	血崩二
帶下四	虛勞六	求嗣六	妊娠七
小產十	產育三	產後三	乳病六
婦人陰病十八			
小兒總論八	驚風四	疳疾三	癆疾四
小兒雜病六	痘瘡三	麻疹三	
△外科	瘻疽三	瘰疬馬刀三	疔瘡三
便毒二	下疳瘡三	楊梅瘡三	臍瘡四
疥瘡瘡三	癰瘡三	癰瘡三	癰瘡三

折傷 金瘡 破傷風 湯火傷

魚獸傷 中毒 救急丸

牛山先生生活卷之二
用藥之法
婦人部
被髮翁 貞庵 香月啓益 著

牛山先生生活卷之二
用藥之法
婦人部
○婦人之病外感內傷共二男子之病二異只日經之不以
其品種之二別而婦人之病ヲ治セ先ツ日經ノ事ヲ能外
ア治ヲ施スベキ也
○室女其病多クハ氣鬱ヨリ發スレバ鬱ヲ開キ氣ヲ順ス
正氣大香湯ノ類ノ方ニ加減ノ用ミ
○婦人其病欲靜ノ氣順者當ヒ發スル可分心氣鬱
正氣大香湯ノ類ノ加減用ミ

虚弱症婦人逍遙散ニ加減ノ用ヨ

○脾胃虛弱ニノ疲アリ常ニ頭痛眩暈ハ婦人俗ニ血道煩ト云フ半夏白朮天麻湯ニ加減シ六君子湯ニ當飯酒芍藥天麻ヲ加テ有効

○婦人產後ハ氣血ヲ補ヘシ產後大抵氣色モ能ク床ニタクエナラズキアリテ不足レ血ノ道持テ生瘻病者ナル者アリ逍遙散ニ加減シ八物湯ニ加減シ六君子湯ニ加減シ或ハ家傳蕃菜湯ノ類ヲ用ヘシ

○心脾ニ二減常ニ婦人、虛弱スル者ナレ加味酸脾湯ヲ用テ効アリ上ニ載スル所ノ數条先づ婦人平生ノ病也此等之藥ノ用テ逍遙ノ方ナスベシ餘ハツレノ門ニテ可参考

調氣養血
湯方

各附砂仁

葛根

川芎

甘草

桃仁

黃芩

川芎

人參

阿魏

肉桂

國藥

半夏

○婦人諸病ノ起居月經不調是也經水來前或後或然多々或久或久或漏不來某或有時而來某類是皆不調故也調氣養血湯千金調經湯回春調經類ニ加減以用ヨ有奇効

○調經ノ王方逍遙散ニ加減ヘ經水期先來某着益熱也本方ニ酒熟於山梔子酒草川芎生地黃阿膠艾葉加王經水期過了不來痛之半木者血虛有寒也木方二周生酒草用桂枝木通紅花桑枝加王經木來之少痛之半者血實氣滞也本方用芍生地黃熟者連桃仁紅花生川芎柴胡加王經水來

心腹熱病無形ニ者引火者寒血子不正川芎生地
黃桃仁胡索木香大青皮加三經水行子後病止之首本

左而為熟地黃人參日本黑加三經水期過
來生色紫黑人塊ノ成ノ者少氣鬱血滞也本方川芎赤
草牡丹皮大青皮紅花女胡索生地黃ヲ加三經水期過
色變者火疾多生本方川芎湯子合川芎萬生地黃ヲ加
以止火加減調經ノ通治也共三有奇効

○經閉ノ症不經關也此等症十全大補丸之類也此等
症多火氣逼迫血脈故也姜參蜜橘桂枝也先
鬱氣令關外レ止氣太和湯四物湯或合之義參大青皮紅
花蘇木姜索ヲ加テ用ヨ其効如神

○經閉ノ症腹脹滿立者火淫之難之壯盛、婦人白り竇症ノ
人ナフ、面白春、通終元甘露丸等ノ峻劑ニテ抑下之、此等
藥ハ峻急之毒藥也、若湯三用ヒ難之能脉症見詳ニテ此方
ヲ用ヘン虚弱ナル婦人用ハシ古ト然凡有故無損ト云テ病三
中元氣妨害半身者立能病人ヲ診ヒ得ハ峻削ヲ用ル時
其効速疾也ヨリハ工矣又可加川芎也

○婦人虛弱ニノ經閉入火血脉枯竭スル故也通經調氣湯
滋陰百補丸回春經閉ノ類ヲ用テ有効加味道遙散三桃仁紅花
附生室湯加味道遙散三川芎、沙草、陳皮且母紅花ヲ加

用ノ有奇効

婦人經閉積塊ノ者四物調經湯經閉通調湯ノ用ヘシ有効
婦人經閉ノ者加味逍遙散ニ莎草川芎沙参川芎紅花ヲ加テ家

傳神通丸ヲ用ヨ其効如神

血崩

○血崩ノ症虚實新久ノ不同子初ニ發ノ實症ナシ清熱解毒ノ刺角ヨ四物湯ニ黃連解毒湯又合之或八四物

湯ニ涼膈散ヲ合ノ用ヨ有奇効

○崩血不止者六膠艾四物湯ヲ用ヨ其効如神
出崩血不正者血量ノ少事ヲ不殆類ニ牛膝芍药當歸湯ヲ振

出又崩血甚者ニ獨參湯ヲ用テ元氣ヲ無拘有ノ地ニ取

其後ニ膠艾四物湯ヲ用或ニ逍遙散ニ阿膠艾葉地榆側柏葉ヲ加テ用ヨ其効如神

○崩血勢止緩々多々益母湯血崩通調湯ヲ用ヒ或ニ逍遙散ニ地榆阿膠ヲ加テ用ヨ或ニ八物湯ニ黑炒炒炭ノ莎草阿膠地榆ヲ

加テ其効如神

○崩血ノ症面黃三四肢困倦腰脅痛三煩熱メ不安者脾氣不行血ヲ統ルヨアリリ故ニ補中益氣湯ニ防風川芎酒芍藥酒黑炒ノ黃柏ヲ加ヘ或ニ加味啟脾湯ニ阿膠地榆ヲ加ヘ或ニ異功散ニ當归芍藥阿膠地榆側柏葉ヲ加テ有奇効共ニ見合可可用

帶下

○帶下赤白共三月經不調房欲過度ニ因テ發ス或々產後血虛ノ胃中ノ濕痰下流スル故也先づ逍遙散ニ澤淳地榆ヲ加テ用ヨ或ハ八物湯ニ阿膠黑炒乾姜ヲ加テ用ヨ共ニ神効アリ

○帶下赤白共三氣血ノ虛ニ屬ス者不加減八物湯四春ヲ用ヨ其効如神

○帶下濕寒三屬シ及ビ湿痰下流者ハ五積散ニ莎草小茴香吳茱萸ヲ加テ其効如神

○帶下白者不加味道逍遙散ニ白蘿蔔花加用ヨ帶下赤キ者六加味道逍遙散ニ赤蘿蔔冠花ヲ加テ用ヨ共ニ有神効

○帶下久之羸瘦シ四肢無力困倦者脾腎虛弱ト

濕下流スル也補中益氣湯ニ茯苓半夏ヲ加ヘ加味歸脾湯ニ半夏沢浮ヲ加ヘ六君子湯ニ升麻柴胡川芎當歸ヲ加テ用ヘシ共ニ神効アリ

○帶下ノ症ニ腰眼脾俞腎俞命門穴天樞痞根ノ諸穴ヨ灸スシ薰肺ノ法モ可也出于入門可考

虛勞

○婦人ノ虛勞ハ七情ノ氣鬱結ノ相火熾盛或ハ經水不調變テ虛勞ト尤始ハ發熱自汗盜汗咯血漸ニ羸瘦シ咳嗽吐紅ノ不救ニ至ル又產後脫血シ或ハ產後百日ノ中房事ヲ過シ氣血耗散メ前症ニ至ル是ヲ產後ノ蓐勞ト云難治先づ逍遙散ニ加減シ滋陰至宝湯滋陰降火湯

大補湯ノ類ニ加減ノ用ヨ共ニ有神効委方考ニ載可参考

○先風寒ニ感シ咳嗽不止日久ノ勞咳ノ症ト十九ニ先ツ
苓補心湯ヲ用ヨ無効寸ハ黃芪鱉甲湯ヲ用ヨ共ニ有神効
加減委ク方考ニ載ス可参考

○婦人ノ虛勞咳嗽發熱ノ者ニ滋陰ノ制ヲ用テ効十キ六
葵朮朮羸湯ヲ用ヨ有神効此方藥味薄ノ病人滋補ノ
味厚キ藥ニ飽タル時アハ飲ヨキニ因テ多ハ驗ヲトナリ

○室女寡婦怒鬱氣鬱メ虛勞ノ症ニ似テ紛々類多分
心氣飲ニテ家傳神通丸ヲ下セハ胸膈ノ氣舒暢ノ其病
自ラ愈也可

○脾胃虛弱尤婦人虛勞ノ如ク煩于大便不調ハ脾胃虛

勞也補中益氣湯ニ貝母山藥五味麥門益智仁加テ有神
効參苓白朮散モレ六君子湯ニ葵朮朮梗山藥ヲ加ルモ

尤

○產後ノ葵朮勞ニ大補湯ニ貝母桔梗五味子鱉甲葵朮ヲ
加テ其効如神八味丸ヲ常服スヘシ有効

求嗣

○求嗣ノ論及藥方諸書ニ載ストイ(此多ハ虛妄ノモノニ
也啓益豐前ニ在シ時婦人古土富貴草上云双紙ヲ作テ
印行ス今世間ニ行ヒ此書ニ求嗣ノ說委ク論ヲ載ス此書
ヲ見テ求嗣ノトヲ知覺スヘシ故ニ爰ニ畧各ス

○婦人求嗣ノ事ヲ欲セハ先ツ已カ心行ヲ慎ミ第一ニ媒妁

求嗣

卷之二

六

ノ情ヲ發セバ夫婦共ニ和合ノ病アリ。藥ヲ服シ虚損ヲ寔

ハ夫婦共ニ上手ノ醫師ニ診セラレテ其藏府ノ虛損ヲ補

ヒ平日無病在時交合スレバ姪セスト云コナレ

○下部虛寒スル婦人ハ姪ハナレ温泉ニ浴メ子宮煖ヘリ。姪
ム者多シ其國ノ温泉瓦所ニ行テ湯治スレシ其効多シ。

温泉ナキ所ニテハ當飯湯トテ當飯四五斤ヲ大釜ニテ煎レ

居風呂桶ニ入テ浴スレ此方奇ニ妙。

○陰虛シタル婦人ハ六味丸ヲ服シ姪ハナ多シ。

○精血清冷稟賦薄弱尤夫婦共ニ固本健陽丹ヲ服シテ

効ヲ得ルト多シ四春求嗣

○求嗣ノ藥方諸書ニ載スルト夥シ芳合テ用ヘサリナガラ

多損益ヤレ口房夏冬ニ外リ三食ルハ勿ス未婦氣血
充實スル時交合ジム多シ生女子ナキ者仕官ノ人江
戸結婚者人ハ他國へ行方數日逗留シ故國爻交合スル夫
婦共ニ氣血充實スル故ニ必ス娘姪是末以テ知覺スヘレ

姪娘

○姪娘ハ多ハ脉三見レバ者也其脉狀諸書ニ詳也可参考

惣テ若キ婦人一兩月モ經水不來時ハ姪娘アリヤト心ヨ付テ
診脈スレシ姪娘ナハ多ハ脉平和ノ脉狀不疾者也二三月ニ
止ニ惡阻ノ氣サレアリテ恶心嘔吐万ノ食物直莫アリテ好惡
差別アル者也如是脉症共娘胎ニ窮リタゞ大槻ノ病六服
藥スカクス姪娘ノ疑似時驗胎ノ力ヨリ逐月保護胎ノ方

卷之二十一

五月帶々之總て産前諸病ノ議論婦人壽門中 李

載名可参考

○婦婦ノ諸病ノ服藥翠サヌ可也其庄太家富貴久強
テ服藥ナラ望ム者ニハ異功散ニ當取砂仁黃芩ヲ加アルヨ
或回春安胎丸ヲ用ヘレ共ニ奇効アリ

○婦婦素ヨリ虛弱ニ胎孕ヲ榮娘ニ難者ニ補中益氣
湯ニ芍藥川芎砂仁黃芩ヲ加テ有奇効

○婦婦惡阻ノ症トテ月經止上其憊胸心惡ク鼻三物ノ臭
ヨリ甚キ者、嘔吐惡心入多ハ三ヶ月ニ久煩ミ共ラ過
治セサム矣止ム者也人ニヨリ五箇月人比テモ止文者正
多キ藥ヲ用テ毫効ナシ或ハ煎藥ナラタケツ失其妙

○嘔逆者アリ如是尤ニ砂仁ヲ押シテ碎テ粒トナレテホツクト
トツスハ藥ノ始タナリテ能惡阻ノ症ヲ治スル也○惡阻ハ
多ク痰胸膈ニ充故也ニ陳湯ニ黃芩砂仁連翹ヲ加テ用
有神効甚キ者ニ前藥ニ黃連姜製少許ヲ加ヨ其効如
神惡阻ノ藥ハ一貼ヲ七分ホドノ分量ニメ一番煎ハカリヲ用
ヘシ一度ニ少ヒツ、與テ可也藿香ナトノ類物懸テ臭ノ元藥
ヲ用ヒカラズ

○子煩ノ症心神悶亂スル也ニ陳湯ニ半夏ヲ去テ麥門冬
黃芩砂仁竹葉ヲ加テ有効

○子癇ノ症ハ產婦ノ大凶症也口噤三眼目吊鈎也羚羊
角散四春妊娠門ヲ用ヘシ子癇ノ催元時此方ヲ用ハ多
子癇二出ノ

收也。○子瘤ノヨキ症ハ癲瘤ノ病ノ如反吊ニ痰喘急促
頻ニ歯ヲ咬ミ口噤眼目吊鉤スニ類ニ先ツ其標ヲ治メヘレ
家傳神通ノ振藥ヲ用ヒ一陳湯ニ姜製ノ黃連釣藤鈎ヲ
用ヘシ其効如神痰喘退キ其病勢少ク收リタハ時ニ羚羊角
散ヲ用ヘシ子瘤ノ治方ニ六種ニ手段多シロ授心傳ノ大祕
也子瘤ノ症ニ頻ニ歯ヲ鼓シ牙ヲカニ古ヲ出シ病勢ヲヨキ者
舌ヲカニ切テ火スルアリ如是キヒシキ症ニ木綿ノ小手拭
ヲカマセテ置ヘシ必ズ舌ヲクニ切ノ患ナレ何程勢ヲヨキ子瘤
ノ症壬子產ルハ必收ルモノナレ何トクニテ子ヲ生ズル手段
ヲナスベレ是ニ至テ口授心傳アリ其人ニ非サレハ傳牛子
カレ可祕

○子懸ノ症トテ胎動ニヨリ心胃脹痛スル也紫蘋和氣飲
ヲ用ヨ懸テ產前ノ諸病六此方ニ因テ可加減
○子脾ノ症ハ妊娠ノ面目虛浮スル也多ハ脾胃虛弱ニ属ス
ル也補中益氣湯ニ黃芩ヲ沢浮砂仁ヲ加テ用ヨ或ハ六君子湯
ニ黃芩砂仁沢浮ヲ加テ用ヨ共ニ有神効
○子氣ノ症ハ兩足浮腫也夏月ノ妊娠ハ十三メハ九六腰足
必腫者也皆脾氣虛弱尤故也補中益氣湯ニ車前子沢
浮ヲ加ヘ或異功散ニ當岐升麻車前子ヲ加ヘ或回春子氣
ノ主方モ可也共ニ有神効

○子淋ハ小便澁少也二味安胎飲白朮ニ赤茯苓木通車

子麥門冬淡竹葉ヲ加テ有奇効此方ヲ四五貼用テ

効ナクハ紫蘿和氣飲ヲ用ヒ是ニ至効方ハ胎氣下墜
メ膀胱ノ妨危故也升提ノ利宜シ補中益氣湯ニ唐防風

茯苓車前ヲ加シ或ハ升陽益胃湯ニ加減シ或ハ升麻葛根

湯ニ四君子湯ヲ合シ此胡山施子防風ヲ加テ用ヨ元氣上升

小便自ラ快通スル也是大秘要也議論委ク方考升陽

小便自ラ快通スル也是大秘要也議論委ク方考升陽

益胃湯ノ条ニ載ス可参考

○胎動丸ニ因テ妊娠ノ諸病ヲ生ス紫蘿和氣飲ヲ用テ

胎動丸ニ因テ妊娠ノ諸病自ラ愈セリ

○轉胞ハ卒ニ小便不下不得也二味ノ安胎飲ニ冬葵子

木通滑石ヲ加テ用ヨ其効如神田春人轉胞ノ主方モ可也

如是ニメモ通ニ難ニハニ陳湯ニ瓜蒂ヲ加テ煎服シ鳥羽ヲ喉

口授心傳ノ祕アリ其人ニアズバ六傳トナカレ可秘

○妊娠ノ崩漏ハ虛ニ属ス血卒ニ漏下スル也芎釈湯ヲ用ヘシ或

ハ膠艾四物湯ノ類ヲ用ヨ共ニ有神効甚者ハ人莫ラ不知口

噤スル也獨參湯ヲ用テ元氣ヲ無カツ可有ノ地ニカヘベシ此手段ニ

妊娠ノ諸病夫ニニ因テ治スベシ但胎禁ノ藥物ニシテ付テ治

シ施スベシ妊娠ノ傷寒妊娠ノ瘺妊娠ノ食傷ノ類ハ剛暴ノ病ナ

ハ胎禁ノ藥ヲ厭テ治ヲ緩ミスル却テ邪勢ノ為ニ胎ヲ落サ

ル更十六日其門ノノ藥方ノ条ヲ考テ治スベシ素問ニ故アハ

無損トテ能此理ヲサリテ治スレ姉婦五月一二胎落
安キ者モバ必ス胎禁ノ藥物ヲ斟酌スシ六月後ヘ胎モ健
在ヘ胎禁ノ藥三中テモ墮胎ノ患ナレ殊ニ況マ産月ノ時ニ胎
禁ノ藥ト云フ子レ然モ大毒ノ類ノ藥物ハ斟酌スレ是口授
心傳ノ秘也

小產

○小產六五ヶ月ニテノ中ニ必ス保養ノ法ニ背夫或ハ虛弱ノ人
其胎ヲ保ジタヌアス也古人云小產ハ大產ヨリ重ニ大產
父葉ノ熟メ自晚入少ニシ小產ハ生葉ヲ採テ其皮壳ヲ破リ其
根蒂ヲ斷カ如ノ自然ニ更ニアラベト云テ大切ニ対す才セリ
保養特息大產ヨリ十倍スベシ

○小產氣虛ニ血下更不止モ人曰春補氣類血湯ヲ用ヘシ
此其大概也

○小產瘀血アツ心腹疼痛惡寒發熱スルニ八補血定痛湯
ヲ用ヘシ此二方小產ヲ治スル常法也

○小產血下ルト過多チハ人更ノ不省口噤癱瘓瘡瘍天吊
メ瘡病ノ如ク破傷風ノ如シ如是在守ハ先ツ薺菜湯龍王湯
白朮散十五味湯ノ類ニ入參ヲ倍加シ見合テ用ヘシ血量ヤ
三瘦飛ヤニ補氣類血湯ヲ用ヘシ虛甚ク前証ヲ見サク獨
參湯ヲ用ヒ薺菜湯ト互ニ用ヘ正氣服ノ其効如神

○小產ノ後血瘀アツテ不止或ハ寒熱往來セバ增損四物湯
ヲ用ヨ其効如神

○小産下血四五日モ不^レ止者ニ膠艾四物湯ヲ用ヘシ其効如神

○誤テ毒物ヲ食シ或^レ毒藥ヲ服^ス胎^ヲ墮^ス者腹痛メ不可忍或^レ其胎未墮者口噤手強自汗癥似中風者毒物致^ス所也九死一生ノ病也世醫多ク不識風トナシテ之ヲ治^ス必^ズ放^スル也白扁豆一味濃煎メ用^ス其病立處ニ愈ル也是大祕藏ノ車也啓^ス益經驗人靈方ニシテ医ノ不知处ナリ此一味ノ應驗微妙ノ義理存^ス口授心傳^ス大祕車也

○小產後諸症退^ムテ氣血ヲ補^ヘハ物湯大補湯ノ類ニ加減^ス用^ヨ又ハ逍遙散ニ加減^ス用^ヨ脾胃虛弱ノ婦又ハ毒藥毒物ニヨツテ小產タル後ハ補中益氣湯ニ白扁豆ヲ加^テ

調理冬シ
○小產後腹痛泄浮^ス三八六君子湯ニ白扁豆砂仁ヲ加^テ用^ヨ又ハ東垣升陽湯ヲ用^ヨ其効如神

產育

○產育ハ臨產事諸書ニ詳也婦人壽艸ニ委^ク其手段ヲ書載^{タリ}常ニ此書ヲ讀^テ其事ヲ究メ置^{ヘキナリ}

○產婦ヲ^ス医ニ委^ク子賴^ス時ハ臨月ニ入^スハ預^クノ藥ヲ調合メ病家ニ畜^ヘサセ置^ヘシ背^ノ湯紫蘋和氣飲苦參湯安神散等ノ藥方ニレ^クノ用ヒヤラス^ス用^ス時節ヲモ^ス上包^{カキツケシテ}ニ書付^シ置^{ヘシ}出產ノ夜^ハ昼夜^ヲ不^レ寐者十六賴^ス委^ク子タル医在宿セサル時此藥ヲ用^ヒ其間ニ^ス医モ飯^{カキツケシテ}來^ステ其手^ヲ芳^ヒ能アリ朝鮮ノ

好人參ヲ病家ニ調へ置スミ也

○產婦臨月ニ腰腹痛アリ先ツ紫蘿和氣飲ヲ用テ見合スレシ脉六至已上ヲ胎谷道ノ邊ニ來リ疼痛頻テ漿水破レ下ス。芎藭湯ヲ用ヒ。產下スル也是平產也。

○催生ノ方ハ產セシト。胎產門ニ來リ至リ兒ノ頭ヲ見ハソ少時モ出難キ時三平胃散三滑石冬葵子ヲ加テ用ヨ。忽ニ產下スル也。和俗ハ產ノ氣付クト其ノ医ニ催生藥ヲ乞ヘ。压卒尔ニ催生ノ劑ヲ用ル。無レ催生ノ方ハ兒ノ頭產門ニ至ラズシハ用ル。ナカレ。姑婆ノ類頻ニ催生ノ方ヲ乞。望ナス。紫蘿和氣飲ヲ用テ見合スベシロ。授心傳人秘也。

○妊娠産セント欲メ痛疎カニソ三四日モ產セズ。破水先ツ下

○生產十症ト云フ。諸医書ニ詳ニ載ス。可参考。

○難產ニ變レシ横產側產ノ類ニ紫蘿和氣飲入參ヲ倍加メ用ヨ。蛇脫衣一錢焙テ細末ノ酒ニテ可用有効。

○難產外胎不下者ニ麝香五分官桂三分細末ノ黃酒ニテ用ヒ。其功如神。

○胎腹中三处ア疼痛ノ母然下欲ニ鹿角ノ黑燒ヲ酒ニテ

服其効如神。○又一方熊胆五分水煎服之。其効如神。
難產二伏龍肝百草霜滑石冬葵子甘草細末菖蒲散湯二
テ服ス。其効如神。

産後

○産後人脉緩滑沈細不宜。實大弦牢濶疾皆危也。
○産後ノ症先虛實ノ不問古考散湯ヲ用ヘ。陳皮人參ヲ加
紅花少許ヲ加用ヨ。其効如神。產後ハ何ホ不容易ノ產ニテモ
血脫スレバ產落不ト其一考散湯ヲ用ヘ。人參ヲ加テ氣血補
トヒ陳皮ヲ加テ藥滌ヲタグラヒ紅花少許ヲ加用ヘ。瘀血多
キ順次ニ因テ此方ノ藥驗如神。

○產二考散調血飲ヲ用ヘ。古考散湯ヲ用ル。一日許ニ後

三考散調血飲ヲ用ヘ。加減季々考散湯ヲ用ル。可参考。

不可參考

○產弱婦人ノ產後散木保產湯三加減用之。一方考散
トヒ

○產後血暈二先ノ虛實ノ不問古考散湯ヲ振出ア用ヨ。或ハ
白朮十五味湯龍王湯類ノ見合ノ脈出ア用ヘ。又東垣ノ
全生活血湯ヲ煎テ用ヨ。此五種ノ藥方ハ用二日傳多ヒ。產後
血暈ニ世医多ハ童便ヲ用ヘ。血熱者下火ト云。推ヘテ童便角
也。血熱實三屬火者可也。虛寒三屬土者全生活血湯ヲ用
ヘシ。委テ此議論方考散載可参考。

○產後太陰血色ノ血暈不知人事者必以火急ニ救ヘ。火料
獨參湯ヲ用ヘ。若口噤牙牙不開藥汁不入獨參湯ヲ

鼻元吸合ノ間ニ通テ則難可也。此ニシムハ人多アリ

是故ニ産前ニ獨參湯ヲ前置。ニ産下メ時ニ時間上
大脛血之必不血量ノ多ハ言語レカラ即外ノ不救ノタレ
此時火大料、獨參湯三分量、火大料半量別ニ治方ノス。陽

旺火ヒ陰長シ氣固于血生ノ只擔心傳ノ哉。論アリ夫久非

旺火ヒ陰長シ氣固于血生ノ只擔心傳ノ哉。論アリ夫久非

六傳牛丸可祕

○產後胞衣不下ノ症急症也。產下大便半日水ト過テ下
ヨレ一時、余モ不下時、八草飯湯ニ同桂加素用是有効者也。或一
兩日モ不下セアリ一時ノ余モ不下ハ八草飯湯ニ平胃散ヲ合シ滑石
百霜草、冬葵子、柏子仁、抑制木ノ各如是。先之腰帶ヲ
断テ服藥入ヘ此治法緩ヘテ腹脹滿心胸ニ御上テ喘急

急三至ル胎盤帶ヲ断テ後王不下者ハ、王後急變症出
牛丸ニ產婦ニ司テ胞衣不下數日ノ瘀血下、從火水母ナ
ナ上火剤三丸如之ナリテ下者アリ。產母ニヨリ教ヘサヘノ。安
國ト知レメテ補氣養血ノ剂ヲ用テ置時ハ自然二下ル也。

○胞衣不下心腹疼痛火燒入脾ノ動々類者ニ熊胆五分
或一或水煎服スヘシ。立チ處ニ下ル也。奇ニ妙ニ可祕

○產後火見枕痛ハ失笑散ニ温水三斗服スヘシ。或苦菜湯
二紅花蓼木乳香沒藥玄胡赤加用ヨ有神効

○產後惡露不盡腰腹少腹疼痛者ニ八草飯湯ニ玄胡
玄蒲黃乳香沒藥五靈脂烏藥紅花ヲ加用ヨ其効如神

○產後崩漏不止者ハ膠艾四物湯ヲ服スヘシ。有神効

○産後寒熱往來其寒熱如火在人增損四物湯
ヲ用ヨ其効如神

○産後血熱不止者ニ増損四物湯ヲ用ヨ不正者曾候補
血湯ノ用ヘ其効如神如是方ヲ用テ効于半時八全生活

血湯之貼服ス其効如神可秘

○産後或人小產後四五日人後寒熱往來諸言妄語病邪
氣似火者其熱入血室ノ症也四物湯ニ小此胡湯ヲ合シ

桃仁紅花ヲ加用ヨ其効如神

○産後血熱ニ並ニ增損四物湯全生瀋血湯保元湯一名當歸
補血湯
火類火熱合テ用ヒ其熱大半退キ余熱乃ハ養陰火下
欲愈者二加味導逆散ヲ用ヒ峻安散火之滋陰至堂湯ヲ用ヒ

共ニ有神効

○産後腹痛ハ多ハ衆血也瘀血ノ退退ノ剤ヲ用干止
時當吸建中湯ヲ用ヨ其効如神外ニ陳艾ヲ土器ヲ以テ燒
乾レ絹二包ニテ臍上ヲ熨スレアニ氣口中ニ通ジテ其痛立
即止也經驗此方頻ニ試テ有効可祕

○産後泄泻ノ脾胃虛也芎藭湯豆子湯ヲ合ヒ白扁豆
乾姜ヲ加用ヨ有奇効無効ハ東垣ノ升陽湯ヲ用ユベレ其効

如神

○産後中風眼喝斜手足牽引火氣血虛ノ風ニ中ルナリ
四物湯ニ烏梅順氣散ヲ合ノ用ヘ七奏丸地黃湯ヲ用ル亦
有効○產後小產後血虛ノ瘡病トナルモ又前ノ二方ニ加減

用當有神功

○產後血虛竭、太便秘結者、四物湯、枳殼、麻仁、桃仁、厚朴、紅花、烏藥、黃芩ヲ加テ用之其効如神。
○產後尿祕ノ不通ニ去白、陳皮、細末ヲ温酒三合ニテ一二匙ヲ服ス、即通々奇^{ク妙}可^レ秘^レ張^ス不^レ愚^カ方^ナ。此^レ方^ナ、
○產後浮腫ハ多^シ脾胃中ノ血虛也、補中益氣湯^ヲ於^テ車前子木香砂仁加テ其効如神、補中治濕湯^モ可^レ也。如是ノ方ヲ用^ス至^ル妙^{アリ}事^ト時^ハ加減金匱要略氣力^ヲ用^ク其効如神。
○產後十九症^ト云^{アリ}、^{回春}此^レ更^ニ常^ニ能^ス考^レ讀^ス覓^ス議^ス論^ス極^ム、^{シテ}婦人壽草^ト、產後卷^ヲ常^ニ讀^ス覺^ス諸手段^ヲ能^ス心得^テ産後ノ療治ヲ^{ナスベ}不可忽^セ也。

○產後諸病、丹溪^ノ說^フ如^ク氣血^ヲ補^ハシテ本^ト人余^ノ雜症^ヲ以^テ治^ス、^レ是故^ニ亦^シ調^ハ血飲^ヲ加減メ用^ベシ。回春ニ委^ク加減ヲ載^タリ。日本保產湯^キ亦有^シ、壽世保元^ニ加減ヲ委^ク載^タリ。一方井三真氏^ガ方^ナレ、^レ其^中保產湯^ハ虛弱稟賦^ノ婦人^ニ宜^シ、^レ調^ハ血飲^ヲ實^シ、婦人^ニ宜^シ。此^ニ一方加減メ用^ベル時^ハ雖^シ不^レ中^心不^レ遠^シ義^也。余^ノ雜病^ハ、^{シテ}ノ門^ニ因^テ子見合^シ可^レ施^ハ也。

乳病

○婦人ノ乳病、多^シ肝經ノ怒火ヨリ發^ス也。乳汁不通、結核自成也。此結核久^ニ不消^ス、^{シテ}乳癌^トナ^シ。初^ニ結核^ヲ才^ニ寒熱^ヲ發^セ、^ハ速^ニ採^ヤウラゲ^ヲ散^ハバ、乳汁亦通^テ結核自^ラ。

消氣也

○乳汁不逕寒熱性未結核生也。少耗胡湯。白芷青皮木通赤芍藥連翹貝母天花粉ヲ加用。其効如神。

○乳汁不逎先ツ不問虛實。木梳ヲ以テ頻ニ乳房ヲカキ刮

○瀉泉散ヲ服ス〔回春乳門〕

○乳病結核ニテ乳癌トナリ。飲者三分白芷根甘二味細末。溫酒三合送リ下スベシ。其効如神。

○乳癰初發三青搗葉白芷防風黃芩連翹生甘草節各等分水煎温服。外用生天南星黃柏細末糊二坤子膏貼。

冬青葉如神。

○乳癰之症。小兒口氣吹之元腫痛癥生也。貝母、細末。服

○又鼻中吹入六立處三効有り。○半夏ヲ細末酒ニテ服スレバ

立効アリ。鼻中ニ吹入モ可也。外ニテ葱白ヲ搗テ餅トナリ。指

ノ厚サ乳ノ上キヒロゲテ灰火ヲ用テ葱ノ上ヲ熨ス。須臾ニメ汗

出テ腫痛立處ニ消ス。

○婦人乳汁不出ニ露。蜂房熟地黃各等分黑燒二ノ糊三

丸梧桐子ノ大升ニシテ毎服五十九大麥煮タル湯三合用。ハ二七日

中ニ乳汁出テ如湧。奇ニ妙ニ可祕此方啓益常ニ用テ取驗也。

紫陽ノ野人所傳也。

○婦人氣血ニサニ盛ニ乳房腫痛シ或小兒久メ乳ヲ飲フアヌ。或乳母ヲ置テ寶母ノ乳ヲ小兒飲フ。紫陽明實ノ乳房腫

痛スル也。麥芽一味每一錢五分水煎ノ服スレバ其乳腫立處ニ

消也奇妙也。其時小產後或產後三日其兒外斯ハ乳汁ヲ断ノヲ欲必
其時ハ腫痛ヲナス也。乳汁ヲアゲテラモ其時ニ麥芽一味一升水
煎服スハ長久乳汁ヲ断也。

○乳癰乳岩ノ症初發六十六味流氣飲ヲ用ヘシ多々消散ベル
也破元後岩凹ノ如丸六加味逍遙散連翹青皮ヲ加味用ヨ或
八清肝益榮湯茈胡清肝湯ヲ用ヨ或五積散ヲ用ヨ共三者奇
効無効すハ加味飯脾湯ニ連翹青皮ヲ加テ有奇効。

○婦人陰病

○婦人陰中瘡生ハ男子下疳瘡同シ多々龍胆泻
肝湯ニ加減メ用ベシ甚キ者ハ陽風通聖散ニ加減メ用エベシ

○血海頻疼痛者アリ東垣ノ烏藥湯ヲ用ヨ其効如神
○陰門腫痛者ニ龍胆泻肝湯ヲ用ヒ外ハ小參朴硝白
礬五倍子葱白等分水煎シ頻ニ洗ヘシ其効如神
○陰門痒者濕熱ニ虫ヲ生テ陰戶ヲ蝕也小茈胡湯ニ山
梔子龍胆連翹ヲ加テ有効外ハ蛇床子白礬ヲ水煎メ頻ニ洗
ヘシ或ハ泥蘭枯礬ヲ用テ水煎メ洗ヘシ有効又加味飯脾湯ヲ
用ヒモ有奇効。

○陰門痒疼痛三不時水ヲ出スハ加味飯脾湯ニ宣シ有奇効
○陰門寒冷ニメ帶下ヲ生スル者ニハ味丸料ヲ用ヨ有神効
○陰門ヨリ一つ肉ヲ挺出スル病アリ陰挺ノ證ト名ク先ツ龍
胆泻肝湯ヲ用テ濕熱ヲ去リ後ニ加味飯脾湯ヲ用ヒ或ヒ補

中益氣湯テ山梔子テ牡丹皮テ茯苓テ川芎テ黃柏テ加テ用ヨ其肉
自ラ消スル也

○婦人交接スル無血ラ出シ痛ヲ子症アリ此肝經久虛脾

ヲ動ク血ヲ攝止トシテノノ血ヲ出ス也補中益氣湯ニ五味藥

川芎防風ヲ加テ用ヒ或ハ加味峻脾湯ヲ用ヨ共ニ有神効

○婦人陰門時々有聲轉朱氣久如火燒之陰吹之名リ此症

久シ帶下ヲ患ヒ或ハ產後血脫後必多半症也加味峻脾

湯ヲ用ヘヒ有神効啓益常ニ此症ヲ治ス生升麻葛根湯三四

君子湯ヲ合シ當歸川芎遠志防風黃芪ヲ加テ用奇効アリ

大祕丸也医按李氏遊豐司命錄載之可參考

○婦人陰氣外溢及男子交接スル異氣男子之陰毛傳染

身中ニ小豆クリ髮毛冒生テラ食落及失風形々如空到
ル者也婦人此症乃系草烏頭一味水煎シ頻テ陰門ヲ洗ヒ難
黄ノ細末ヲ絹三包ニ陰門内敷テ半日許ホトヅ置ヒ一七日
ナレバ其氣多ハ外スル也男子傳染セタ生毛草烏頭煎湯
テ洗ヘシ其後ニ沉香マツラ南香類ニテ黃芩ベシ其氣忽ハ不
也奇妙ノト也

小兒總論

○小兒三歳ヨリ以下ハ脉ヲ診スルアラズ病アラハ男子ハ左ノ
女子ハ右ノキノ虎口ノニ關ヲ見テ其病ヲ知ルヘシ二關ト六手ノ
第二指見ルニ第一節ヲ風關ト名ク第二節ヲ氣關ト名ク
第三節ヲ命關ト名ク此ニ關ニ見ル所ノ筋紋ノ色ヲ見テ

病ヲ知ル也紫火六熱三屬ニ經土者火寒ニ屬青者驚風
白者瘡黑キ者ハ中惡黃流者脾胃ノ因也若風關ニ見
火者火其病輕ヒ氣關ニ見火者火其病重ヒ命關ヲ過者
ハ治シ難ト知ベレ

○小兒三歳以上ノ医ノ一指ヲ用テ寸關尺ノ三部ヲ按レ診ス
ヘシ常二六七至ヲ以テ法トス小兒火純陽ノ者十六火其脉至テ
急速ナリ者也六七至ヨリ增少ナリ熱ト減少ナリ寒トレ浮
洪火風熱盛也數十火之驚風沈遲ヲ虛トシ沉實ノ積トス
也此其大槩也諸之方書ノ小兒門ニテ可考

○初生ノ小兒ニ黄連甘草散火根各等分紅人絹包三テ熱
湯一斗ダレ其汁ヲ飲メ又乳マメイクニスウヒヘ裹分予ガ著所

ノ小兒育艸詳ニニルス也平日此書ヲ讀テ初生ノ小兒ノ類育
ノ法ヲ知ルベシ

○小兒初生十四五日ノ後吐乳スルアヌ病ノキサト知テニ味湯
黃連丁子連翹ヲ加テ用ヘ

○小兒火太小便サヘ滯リナリヒタト通スハ病ナレト知ルベシ少ニテ
モ大小便ノ通ジ滯ルナスハ病アリト知ルベシ小兒科ノ家傳ニハ時々
下シラ用テ大便ヲ通スル者アリ是モ亦一術ナリ

○小兒大小便通スルカタク腹脹止者三升發二陳湯ニ加減シ
用ヨニ陳湯ニ升麻茈胡ヲ加ヘタル方也此丹溪ノ妙方也

○小兒吐乳火先ツニ陳湯ニ砂仁連翹黃連ヲ加テ用ヨ吐乳

ニ連翹ヲ加ル火大祕密ノ火也其理意味深長ナリ其人ニ

非不傳牛十カト

○小兒ノ諸病六多々乳食ヨリ發スル知ヘレ小兒情別ニテ
飲食ノヨリ外他ノトキ是故皆食ニ破ル病ト心得ベキ也

○小兒六無病ナレ庄家傳ノ保童圓ヲ用ルト一ヶ月二十日力
十五日力用ヒ食ヲ化シ疳蟲ヲ除キ満月所ノ臓垢ヲ除キテ
病ナキナリ

○小兒ノ病ニハ始ニ論ス化如ク食ヨリ發ソ瘞ヲ兼ルト多ケハ
二陳湯ニ加減ノ用ヒ或ヒ神通丸保和丸等ヲ用エキナリ

○小兒諸病多々大人ニ同ジケバ其門ニ依テ見合テ治ヲ施
スシ但利ノ多少アリ加減アリ是ニ口授心傳多シ可祕

驚風

○驚風ノ症ニ二種アリ急驚風アリ慢驚風アリ急驚風ノ症
ハ牙關緊急熱甚々煩亦々上竄直視ニ涎潮ノ如ク涌出ル瘞
喘急速ニ牟足搐搦又張顫動ニ唇白紅ヒニ眉眼引ツリ口中
燒が如ク大小便閉結シ其脉浮洪數緊也是陽症ニメ内實熱
アト風ヲ挾ム者ハ先以敗毒散^{回春息}ノ加減ヲ用テ風ヲ驅テ搐搦
自ラ收ル也瘻熱ニ因テ急驚ヲ見サバ二陳湯ニ牛胆南星天麻
釣藤鈎ヲ加ヘテ用ヨ或ヒ靈砂丹^{回春}ヲ用或ヒ方億丸ヲ用テ下メ
利ヲ得ルト多シ小兒科其家ニ傳ル所ノ方ニ奇妙ナル多シ
万億丸ハ回春小兒ノ通治ニタリ

○瘡疹或ヒ痘瘡出シト欲ス前亟大熱ヲ發シ搐搦又張ス
斗度ニテ急下ノ利アリ下時ハ熱解利シ其疹自ラ出テ熱

解ノ擇定也

○下ノ方一銀鉢全蝎巴豆半胆南星朱砂牛黃麝香龍腦姜
桑夜明砂ヲ細末ノ錠子トナシ或ノ丸トナレ金箔ヲ衣トノ用其妙奇
奇妙ハシメ言難シ分量口傳アリ

○急驚下ノ後或ノ風ヲ驅テ後急症退ニ陳湯ニ南星砂仁扁
豆ヲ加テ用ヘシ懲テ毒藥ノ用テ病ヲ退ニ後ノ調理ノ必扁豆
ノ用ヘシ此我家ノ大祕支也

○慢驚風ノ症ハ或ノ病後吐泻ノ次第藥餌ニ用ヒテ脾胃虛損シ
四肢逆冷口鼻ノ氣微ニ至ル足療瘧ノ昏眩ノ晴ク露ス此脾虛
ノ風生ス無陽症ニ中氣虛損不足ノ病也故ニ急驚風ハ急
危在レバ實ニ屬スレバ治ニ安キナリ慢驚風ハ緩ニ之症ニ

急二宣文症ハ心不足ニ属スハ治ニ難キ也

○慢驚風ヲ治セハ醒脾散四春出三加減ノ用ヘシ

○慢驚風ヲ治スニ殊益常ニ錢氏白木散ニ陳皮砂仁扁豆天
麻鈎藤鈎ヲ加テ此煎湯ニテ家傳保童圓ヲ送リ下セヨ天麻鈎
藤鈎ヲ加シ妙アリ脾胃甚弱者ハ四君子湯ニ黄耆天麻
ヲ加ヘ甚虛弱者ハ補中益氣湯ニ天麻鈎藤鈎ヲ加テ共三家傳
保童圓ヲ用ヨ奇妙也

○懃テ急驚風ニテモ慢驚風ニテモ病退テ後ノ調理スヘシ六

君子湯ニ天麻砂仁當散ヲ加ヘ或ノ補中益氣湯或ノ異功散ヲ

用ヘシ小兒ノ調理ニ四君子湯異功散ノ類ニ薬味ノ品スク

ナキガニキ也小兒ノ藥ハ少服ナム蒸品多キ方ノ藥氣タクレテ

効ヲ取り難キ也是極秘矣也京師ノリ大医或公家衆
小兒人脹滿ヲ治スニ時二十四味流氣飲ヲ用ヒラタナリ
可矣

疳疾

○小兒疳疾五種アリ皮黃肌瘦髮直尿白肚大ニ青筋ア
好テ食ヲ欲シ泥土炭茶生木類ヲ好食或シ吐或泄或
大便堅硬祕塞腹内積塊アリ諸病ナニ怪病ナス也
是皆乳母攝餵法シ其摶乳之飲ム六疳虫之生ニ怪
症アリ也又久々吐乳之久浮久痢久咳下血久瘡
ノ後皆津液之濕熱ノ生ニ其濕熱ニ依リ虫ヲ生メ怪病トナ
リ漸々飲食ヲナス時至乃チ酒肉油膾ノ物生冷硬物涼水

西瓜甜屁紅柿橘米砂糖饅頭ノ類ヲ過食レ脾胃二積テ久キ
時ハ濕熱外ナリアリ疳虫ノ生ベルナリ先ツ大柴胡春ノ消疳丸一
加減ノ用ヒ消疳丸四春二出家傳保童圓ヲ用ヘシ其効如神

○小兒ノ疳疾ニ多ハ肥兒丸四春二出四味肥兒丸ヲ用ヘシ多ク煎

湯ヨリ丸藥ニ利コト

○疳疾ハ多ハ脾胃ノ實熱ナリ如何ホトニ瘦マタリ氏補藥三
益アリ只虫ヲ殺ス剤ヲ用ヘシ蜈蚣赤蜘蛛抑ノ虫常山ノ虫
山蚕桑葉此桑葉製法口傳三棱莪朮胡黃連牛黃糞此製法山查肉口傳丁子參使君子ヲ調合分量瓦器三入黑燒ニシテ鹽屋ノ煤
ヲ加テ細末シ丸シ用ヨウハ土用烏ノ黑燒ヲ加ルモコレ此方ハ奇
妙ノ方也志士虛症ノ小兒ニ用ヒガタシ能く見合テ用ヘシ

村上一味斎力傳也

○疳疾ハシキ多々保童圓ハシキヨウエンヲ用テ吉也眼三疳氣ハシキノクエアレ赤腫臉

赤カ類ヒメ保童圓ハシキヨウエンラ異功散ヒメコウサン煎湯センヨウテ用六神効アリ

○疳疾咽渴ハシキイハク湯水ヨウスイヲ多く飲者ヒカルハ錢氏白木散ヒンジホウモクサンニ保童圓

用三有神効

○疳疾形体柴瘦ハシキセイテイセイスウし眼赤アカク或ハ白膜眼ホウモクエンヲ瘻ハリ者ハルニ保童圓

ヲ細末ハシモツニ鱠臭ハタタケウ肉ナツヲ炙アツテ此細末ハシモツニ鱠臭ハタタケウニシケテ二三切ホド

ヲ食スベシ或ハ鱠臭ハタタケウ肉ナツヲ醬油ヤウユ三五煎サンゴウセンテ食セムル王具効

如神

○疳疾ハシキ乳哺慎ハラホマン少ハラハラ因之積聚ハシキ致久所ハシキ也此症ハシキ六兩股

○疳疾ハシキ乳哺慎ハラホマン少ハラハラ因之積聚ハシキ致久所ハシキ也此症ハシキ六兩股

如神

○疳疾

○積癰ハシキノ寒熱往來ハシキ飲食減少ハシキ淨府湯ハシキヨウニ加減メ用之有神効

○此症毛治法大聚ハシキ疳疾ハシキ向ハシキ脾胃ハシキ十九瘡積圓揭ハシキ保童圓

膏丸千金消疳丸ハシキ類ヒメ見合ハシキテ可用

○總テ疳疾ハシキ六小兒科其家ハシキニ傳ル所ハシキ消疳ハシキノ藥ハシキアリ多矣

峻急ハシキ毒藥也全蝎班貓蠍蟲硝砂紅卿子水蛭ハシキナトハシキノ類ヒメヲ用
ル也是ホドノ症ハシキ三小兒科二委ハシキニ治スヘシ加様丸症ハシキ虚實ハシキ不問此等ハシキ人ハシキ強剤ハシキ過服ハシキ脾胃虛損ハシキメ散ハサウ至ハシキル如
是ハシキ強剤ハシキ三ハシキ脾胃虛損ハシキセバ朝ハシキニ補中益氣湯ハシキ六君子湯ハシキノ類ヒメ
加減ハシキメ用之久ハシキ保童圓ハシキヨウエン千金消疳丸ハシキ類ヒメヲ用ベシ有奇ハシキか或
ハ強剤ハシキ過服ハシキ脾胃虛損ハシキセバ朝ハシキニ補中益氣湯ハシキ六君子湯ハシキノ類ヒメ
加ハシキテ其効如神

○小兒夜寐疾寒熱アツテ或ハ間日二發シ或ハ毎日發ス者アリ是ヲ和俗力タクナト名ク淨府湯或ハ七味清脾湯ニ加減メ用ヨ其効如神家傳神通丸ヲ用テ奇ニ妙。

小兒雜病

○小兒ノ病弄舌トテ頻ニ舌ヲ出メビロツカスヒ有是皆心熱ノ致ス所也ニ陳湯ニ黃連薄苛ヲ加テ用ヨ或ハ錢氏白木散ニ黃連桔梗ヲ加テ用ヨ有神効。

○小兒時ステ發熱シ天吊スルニ鈎藤鈎散四春小兒ヲ用ヨ

有神効

○小兒夜啼不止ハ心熱ニ属ス黃連朱砂ノ細末ヲ水三合用ヨ或ハ乳頭ニ右ノ細末ヲツテ児ノ口ニテ吹シメテ有神効小兒

夜啼不止

潮熱

异古

戎口瘡

○夜啼六夜啼鬼トテ鬼祟アルニ似名ノ必祝由科因即止也不可疑諸ノ医書ニモ其術ヲ載タリ和俗ニモ種々ノ術ヲ覺テ祝由スル也医書ニ載タリト雖凡医師タラン者必ス祝由ノ術ヨスヘカラズ祝由六本朝ニモ一科另テ主之可慎也
○驚口瘡ハ和俗舌シトキト云小兒ノ口中白ノ驚ノ口ニ似色ハ也是胃熱也清胃散ニ加減メ用ヨ又ハ牛黃散四春三百シニ或ハ升麻葛根湯ニ桔梗黃連連翹ヲ加テ其効如神又小兒ノ口瘡ニ治スルニ黃連ノ細末ヲ蜜ニ調テ貼之或ハ黃連ノ細末ヲ寒中ノ雪水ニテ解テ付ス其効如神寒中ニ雪降時其雪ノ盛器ニ押付テ入テロラ封ノ蓄ハ水トナリ其水ヲ取テ用ヒ多ヒ医師多ニ者必畜ヘ置ヘキ也

重舌

○重舌ノ症ハ和俗小舌ト云舌ノ下ニ又舌ノ形ノ如クナレ肉ヲ生
る也是病心脾ノ熱也重舌出来レ必唇口ノ兩傍ニ齶ニ生
ベリアリ又木舌ノ症トテ舌硬腫テ桑子ヲサルヤリ是亦心
脾ノ實火ナリ二病共ニ當取連翹湯ヲ用ヨ共ニ有神効或ハ黃連
解毒湯防風通聖散ヲ用ヨ其者ハ黃連
濕ニテ解テ重舌ノ上ニスルベシ或ハ黃連石羔ノ末ヲ雪水三
解キヌルベシ或ハ蒲黃ノ末ヲスルベシ或ハ百草霜滑石芒硝
末ヲスルベシ或ハ紫雪ヲ舌上吉ヌルベシ何レ此手ヲ不停メスルヘ
シ術アリ腮ノ下ノ眞中ニ艾灸スルノ四五壯スレ即重舌縮セ

走馬瘧

○小兒ノ牙腫テ涎ヲ流シ口臭メ鼻ヲ掩フニ至ル甚キ者六齒

赤莊丹毒

○齦脱落シ頬腫腐爛メ不救ニ至ル其速カナリ如支禹故ニ走馬
瘧瘧ト名ツ和俗ハクダト云清胃升麻湯春東垣ノ神効散三厘
香蘭葉ヲ煎テ頻ニ口中ニ含ムヘシ其効如神
○小兒好ニ泥土炭生米ノ類ニ食良スハ脾疳也清胃艱胃湯春ヲ
用ヨ或ハ平胃散ニ黃芩砂仁ヲ加テ煎服シ保童圓ヲ送リ下スベシ其
効如神
○小兒丹毒ノ症トテ遍身所ニ赤腫アリ其丹毒アナタコナタ外
所ニカニテ赤ラ見ス者アリ此次外ニ行ル也和俗赤ノ子ト云犀角消
毒飲春黄連解毒湯升麻葛根湯ニ犀角連翹ヲ加テ用ヨ其
効如神○赤遊丹毒トテ身ノ内ヲ走リ廻リ赤ノ腫ルノ症アリ伏
龍肝ヲ鷄子清ニ解テ久シ其効如神

○小兒咽喉腫痛ノ風熱ノ毒ノ也會歇エイ兩方腫ハ雙乳スル鷦チヂム云治シヤウ易シ二傍腫ハ單乳スル鷦ト云治シヤウ難シ皆喉痺ハ甘桔湯ミツカクヨウニ宜シ四春小兒雜門ニ出ス所シ甘桔湯ミツカクヨウ方カタモ吉

○小兒眼目腫痛ノ六熟地黃リョクセキヨウ一兩ヲ新汲水シンク浸ミ搗爛ツキル脚心ハラニ貼ツバテ布ハタニテ包ハサウ三置シテケハ有シ奇効エイ○小兒ノ眼ノヲ赤キ者ハ虫氣ノ症シ也保童圓ハシマツ錢氏白木散ハシマツ煎湯シヤンヨウニテ送スル下シセヨ其効如神

○小兒耳腫痛セバ藿香正氣散ハツカクジョウキサンニ烏藥細辛ハナウツクヲ加タ細辛ハナウツク頭痛耳鳴ハ腸胃ノ生スル所シ太陽明ハ發スルハ自ラ愈ヒ也家傳玉樞丹ハツウドンヲ刻用ハサフルモヨシ○停耳ハノ病ハ耳中ヨリ脰ウツ出ス或ハ水ヲ出ス藿香正氣散ハツカクジョウキサンヲ用ヨ外ハ五倍子ハニ細末ハニ

○耳中ニ吹ス金五倍子ハニ黑燒尤妙アタマ也鷄子ハニヲアタマニ出ス丸卵ヲ壳カタヲ炒ツバテ黃色ミズナ香油ヲ調ツバテ貼ツバタルモ吉也

○耳聾ハ多ハ停耳ハ後ニ發ル者ハ棗ハツヲ食ス燒スル火ヲ上ニ置ステ蒸スルレ其肉ヲ取ステ木綿ハニ二捻ハシナリソシケテ長ハシナラシ其ヲ耳中ニサレテ半時ヲ一時ヲ一日ヲ三兩三度スル其効如神可秘

○大人小兒共ニ耳聾ノ症ニ鷄鳩ハシマツ油ヲ磁石麝マグマツ香ヲ少許ヲ含ムト三五度ハシナ其効如神右ノ鍊子ハ綿ハニ裹ハシナタルモ吉レ右ノ方ハ本草綱目ハ鷄鳩ハシマツ条ノ發明ニ見タリ鷄鳩ハシマツ脂ヲ日本ニチレ中華ヨリ長崎ニ來ル甚稀ハシナ也河內國ニ鷄鳩ハシマツアリト云人ハシナドモ其實否ハシナ此方ハ耳聾ヲ治ス凡ニニスハ丸ヲ治ス先師エイシ益

鷄鳩

一名天信鳥

老人此油ヲ薦ヘテ耳聾ヲ治スル名ヲ得其後此油ヲ求得ズ
石龜ノ泉ヲ取テ麝香ヲ加ヘ右ノ方ノ如シテ口中ニ鐵ヲ含スレバ其効
如神是亦一奇方也可秘

○小兒ノ頭瘡ハ熱毒ナリ或ハ胎毒ニヨツテ也和俗クサトム多
下シテ利ヲ得ル也保童圓ヲ用テ舌口也荆防敗毒散ヲ用モ吉虛
属元者ハ四君子湯三升麻葛根湯ヲ合シテ連翹ヲ加ヘテ用ヨ
有奇効胎毒ニヨツテ瘡痕遍身ニ出来者ニモ治方右ノ如用テ
ヨレ○小兒科ノ家ニ胎毒下ノ弁ノ類ノ妙方多シ祕メ不出紫
陽ノ野人一方ヲ傳フ白屈菜ヲ陰乾ニ文黒燒ニ貼之甚有奇
効

○臍瘡ハ風濕也小兒臍帶ヲ断トキ不慎ハ落スレバ其跡

目ヨリ水濕入於腑瘡ト在甚時ハ肺風撮口ノ症トナシ不救ニ
至ル也又肺胃ニ濕熱ニ至ル腑中ヨリ水又出也膽火出也真氣掩
翼王ノ引錢氏白本散ニ連翹酒芩ヲ加ヘテ用ヨ外ハ黃柏ノ
末龍骨ノ末ヲ肺中ニ入シ瓊ニ合有奇効

○諸ノ虫痛ノ胃氣ノ傷ノ濕熱ヨリ蟲ヲ生テ痛也使君子

換榔ノ二味水煎レ用ヨ家傳保童圓神通丸肥兒丸ノ類及魂

丹玉樞丹ノ類之用ヘ其効速ナリ

○小兒蛔虫ヲ吐シ或ハ殺道ヨリ蛔虫ヲ下ス三練陽湯四春ニ用テ
有効○冬月蛔虫ヲ吐ス大多ハ是胃寒胃虛ノ症也錢氏白

述散三十子ヲ加テ用ヨ有神効

○小兒ノ疝氣陰囊腫痛又不可忍者此寒氣ニ齧セ元也

五倍子ノ黒焼ノ酒三テ方可セラ用ヨ其効如神。○小兒陰囊腫
太半生蠅退半兩水一大碗煎湯三テ腫处ヲ洗フ一度ナハ其腫
立止也。魚蟻ノ類ニ咬ヒテ腫痛スミ前方甚妙也。

○小兒ノ脫肛ノ大腸ノ氣虛也提肛散三宣シ刺後トドニ必入肛
門腔元多シ補中益氣湯三昧丸防風ヲ加テ用ヨ

○小兒ノ遺尿失禁或ノ睡中不自覺メ尿充類ノ多ハ虛寒也
破故紙散桂肝丸^{四春}用ヨ多ハ小兒夜起牛ラ懶ク急テ床
上直^{レキ}溺シ共ナ習テ久トナリテ此症チナ多シ腰眼ノ児命
門ノ穴尾骨三灸ラスビ此症愈也。

○小兒尾骶骨痛者アリ此陰虛ナリ補陰降火湯^{春或入有}
級丸左取丸^{アシテ}用テ其効甚多也。

○小兒額顎六頭門ト牛頭ノ縫ノ不合也此元虛也八
物湯^{八味丸}左取丸補中益氣湯^二類ニ加減^ス用ヒ
其間^ニ六保童圓^シ用ヨ有奇効

○行遲ノ者八元氣不足也調元散三宣シ^{春或}ハ補中益氣湯ニ
石菖蒲ヲ加テ用ヨ髮遲者齒遲者共ニ此方ニヨシテ加減スベレ

○語遲者八邪丸^ニ也蒲黃丸三宣シ
○涎多者皆脾濕也涎出^ス不正涕出不正其鼻涕涎沫^ニ
クテ鼻下口ノ兩傍赤^ク爛^シ者アリ和俗ニテ赤口云又ハニタ云
多々無病ノ小兒アリ七八歳ニテ自愈者也平胃散^ニ連翹草
前子^ヲ加テ用ヨ外六黃連ノ細末ラ寒入膏水ニテ貼セヨ其効
如神

○小兒ノ亀胸八胸多クノ掌ラ腹が如シ亀胸丸宣春

○亀背分和俗ニセムント云亀背丸ニ宣春○亀胸亀背共二

腎氣ノ弱損アリハ故九加減角ヨ有効

○鶴節ハ血氣不充ノ症也必大病ノ後或ハ刺後瘧疫後三足

筋痺テ如鶴膝當灸地黃丸^四或ハ太陽風湯ノ用テ其病愈也

大人必有此症後ハ難治ニ至ル可慎

痘瘡

○小兒ノ痘瘡ノ症ハ發熱甚ス風邪ノ病ニ紛ル者也疑似ノ
間ニ先づ升麻葛根湯或ハ杏仁散葛根ヲ加ヘ或蜜雀香正
氣散參蘇飲類ヲ見合テ可用痘瘡ノ熱ハ何程甚キヒテモ
耳ノ未ス手申指冷半水ノ如ク腮亦少眼ノ内亦少時々父仰

之驚怖レ搔撫スルラ以テ此症ト知ルベシ其見ヤツ委不 小兒養
州ニ著シ置也可考

○痘瘡發熱アラワレニ日ヲ過テ痘瘡額ノククリ^カ白スノ
コトナ色好アラヘルラ寂上ノ好痘瘡ト知ヘレ發熱ノ覺ニト其ニ
一痘出見レ或ハ坐日ノ中ニ痘出ハ後ニ必患症ニ變スル者也
油断スベカラズ加味敗毒散^{田春}或ハ升麻葛根湯ニ加減メ用
ヘレ共ニ山查子^ラ加ヨ山查子^ラハ治痘毒ノ聖藥也

○痘瘡ノ本病ニ發熱甚ク眼天吊ス者多シ或ハ搾搾上竈
人驚風ニ似者アリ是佳兆也必痘少ク出テ其後ハ苦ナレ升
麻葛根湯ニ連翹蟬脫山查子^ラ加テ用コ^{保赤塗}或ハ和解散

ニ加減メ用ベ

九味神功散

痘出ニ毒氣甚ク血紅一片ニ地界ヲ不分者ニハ神功散春
ノ用ベレ熱甚者ニ夢連ヲ加ヘ驚怖忍ノハ蝉脱連翹ヲ加テ用
ヘシ山查子ヲ加フ妙ナス又解毒疏痘湯ニ山查子ヲ加テ有神功或
入參羌活湯王有奇効共ニ見保赤全書也

○痘出テ三日ノ内ニ痘頭黑陷スル者、鹿ニクナル也火盛ニ
也九味神功散ヲ用テ其火毒ヲ退クレ有効

○痘瘡起脹ノ時節ニ瘡勢弱ノ瘡色白メ頂陷者、虛症也
十全大托散ニ丁子肉桂穿山甲ヲ加テ用ヘニ有神功或保元
湯保赤子内桂川芎當歸穿山甲ヲ加テ有神功共ニ見保
赤全書

○痘瘡出後ハ閨中ニ乳查ヲ焼シ奇妙也

○痘出有ノ後三日ラ大事ノ時分ト知ヘレ好痘ハ膿水ナ分ニ滿
テ少ラ上元也其次六七分膿漿也凡ソ痘ハ膿漿有無ニテ生
死判者也膿有ル時ハ毒外ヨリ散ス故ニ生ル也膿子キ才入毒外
ニ攻ム故ニ外スル也拔膿引テ瘡癒厚者好痘ナリ酒薄者ハ
其次ナリ

○痘色紅紫耽枯カクニ焦黒尤者ハ毒熾ニ血凝也清毒活血
湯三宣ニ痘色淡白ニメ尖圓ナラズ根ニ紅暈ナキ者ハ氣虛メ
血縮ル也參葛鹿茸湯或保元湯三宣ニ其方共ニ活忽法
ニ出タリ可考

○痘瘡大便實スル者ハ宣ニ大便泄石者、脾氣虛ニ肌肉ノ
根ナキ故ニ多ハ惡症ニ變化者ナリ加味四苓散參木散錢

氏白木散三扁豆砂仁山楂子ニ加エ可用活絡湯ニ出ス

○痘瘡寒戰咬牙ノ見ルラ思症トニ虚ニ属ス也建中湯活

心保元湯補中益氣湯ニ加減ノ用ヨ

○痘瘡生速ス者ニ陳湯ニ合升麻葛根湯加連翹山楂子其効如神

○痘毒咽喉中ニ出テ腫痛ニ飲食通リ分夕キ六利咽解毒

湯活幼ニ連翹山楂子ヲ加テ其効如神

○痘瘡餘毒必腕股等ニ漏リ膿生ニ骨ノ中ニ腐リ入
ニ手足不舉類ノ者多レ太連翹飲之用ベシ或于金内托散
又角ヨ共ニ活絡法云出ナリ

○痘瘡甚痒キ者ハ表症乍知ベシ保元湯ニ加減ノ或ハ黃蓍

實表湯活幼ヲ用ヘレ其効如神

○九痘瘡、瘡疥ノ類ヲ始ニ煩ヒ又ハ疥癬ノ類未愈ニ痘瘡ヲ

患者ハ多ハ痒塌^{イキクム}メ危症ニ變ズル者也和俗ニ之ヲクサケ交

ト云テ甚惡症トス大連翹飲ニ宜シ

○痘瘡ニ麻疹ヲ夾ム者アリ甚危症也玄參升麻湯活幼ヲ
用テ其効如神

○憇テ痘瘡ノ次第俗用ノ手段予ガ著ス所ノ小兒育艸ニ
詳ナリ可考

○痘瘡ニ和俗米泔水^{イカニスイ}ヲ沸湯トナレテ落加^{ラカ}ノ時ニ沐浴スルト
アリ中華ノ書ニ此事アリトラ未得考痘瘡色惡ク尤時ニ水

楊煎湯ニテ瘡ヲ洗ヒ三豆湯ニテ浴えノ類諸書ニ見ヘタリ

セレドモ日本人ノ如ク推レナベテ俗習トスルヲナレ多ハ十五六日
ノ後三洗フベシ危症ノ痘瘡六日數ニカハルカラズ三十余日或五
十日ヲモ過テ洗ベシ是日本ノ俗習也ハ之ニ從ベシ朝鮮國ノ医鄭
萬里ニ此車ヲ朝鮮ニテモナスマト筆談レケレモ朝鮮ニテ此車
ナレト答タリ農旦ト同事ト見タリ

○惣ノ痘瘡ノ治方ヲ考ルニハ保赤全書痘疹全書活幼心法
ノ三書ニ委ク備ル也之ニテ考ヘテ己が識分次第ニ治ラ施スレ
○今時痘瘡ノ治方寒熱虛實ヲ不問始ヨリ多ハ參薯ノ類
ヲ用ル者多シ虛ニ屬スル者ニハ甚効アリ然レニ痘瘡初發ノ熱
毒甚シ風藥ノ類ヲ以テ發散スルハ痘毒癸出ノ事レ補藥ヲ用
テ補住其邪熱メ實ヲ實スルヲナクレ近代補藥ノ人ノ命ヲ失フ

車カキリナレ可慎丁也

麻疹

○夫麻疹ハ痘瘡ニ比スレハ甚カロキ者ナレニ其症六有ヨリラツ
テ陽症ニメ暴急ノ症也夫ニヨリテ和俗ノ諺ニ痘瘡ハ美目定
麻疹ハ命定メト云テ甚大切ノイツル也其子細ハ急病十九日以テ
療治法少ク急ルスハ其變掌ヲ返カ如クナハナリ

○麻疹ハ發熱スル二三日出脹共二三日ニメ出テ没スル也没ニ
又出モアリ其發リハ傷寒感冒ノ弊ノ如レ去レバ此症ハ咳嗽甚
クテ咽喉ノ間呼吸短息ニメ不利之ニ因テ咽ノ中ハシカキニ因テ和
俗ハシカノ病ト名ヅクル也升麻葛根湯ニ宜レ咳甚久ニ陳湯
ヲ合シ桔梗蘿梗ヲ加ヘ或ハ參蘿飲ニ連翹ヲ加ヘ或葛根

湯ニ小此胡湯ヲ合レ或ハ黃連解毒湯ヲ用ヒ或ハ涼膈散ヲ用テ見合テ療治スレ

○麻疹ノ症多ク咽不利咽渴スルニ因テ飲水多キ故ニ必痢病ニ麥スル者也又ハ麻疹之毒内ヨリ下ル者モアリ何ノ道ニモ大友ハ麻後ニ必痢病トナル者也升麻葛根湯ニ山楂子扁豆砂仁ヲ加ヘ虛スル者ニハ錢氏白朮散ニ連翹白扁豆砂仁升麻ヲ加テ其効如神

○麻疹ノ毒氣流注メ痢ト丸者ニハ清熱導瘀湯ニ宜シ方八活幼心法ニ出ル也

○麻疹ノ症四ノ大忌アリ是ヲ犯ストナカレニハ薑腥生冷ノ物食フトカレ風寒ニ中ルト勿レニハアウテ、寒涼之藥刑ヲ用

ルト勿レ黃連解毒涼膈ノ類是也

○桂枝湯ノ類又差活麻黃ノ類是也四ニハ補溫ヲ用ヘガス

油痢ノ症アス加味四苓散ニ加減メ用ヒヨ訶子肉豆蔻參芪ノ

類ヲ禁ズベシ此四大忌ヲ犯ス其禍如焚掌可慎

補遺

○宝永戊子ノ秋三月冬ニ至リ明治己丑ノ歲ノ春ニ日本六
十餘州ヲナクテ麻疹流行メ男女老少ヲ不問ニ般ノ疫麻
也貴士ノ賤トナク此患ニテ必スル者多シテ予京師（高倉）
旅館ニアリテ此病ヲ治ス者五六十人也其内一人モ歿スル
者ナリ治之ヲ治至シ医或ハ寒涼ヲ過ヒ或ハ辛熱ヲ用ヒ或
補藥ヲ用テ其害夥シ予一方ヲ製ス者根連翹湯よりシ

葛根連翹升麻白芍藥酒。芷胡酒黃芩當歸桔梗。山楂。蘋梗。山梔子各等分。甘艸減半。水煎服。紅点出。力大者二、三味。防風牛房子ヲ加へ泄痢者六。扁豆砂仁木通車前子ヲ加へ咳嗽甚者六。桔梗甘艸倍。前胡。白皮ヲ加フ。熟其半。酒黃柏酒。黃連少許ヲ加へ或ハ淡竹葉ヲ加へ口甚渴者亦麥門冬石羔ヲ加へ血乾テ大便祕スルニ。川芎。生地黃。紅花。大黃少許ヲ加フ。此方ヲ用ニ三百發百中奇妙。其効不可言也。

外科

瘡疽

臍瘻

○瘡疽臍瘻多生四十日上久久發不者也。先發者之次第也。後發者之次第也。

外外科ノ専門ニ任スレサエ毎度腫物ノ善惡ヲ見ノ知ベシ。初發六荆防敗毒散追風通氣散ノ類ヲ用ヘ漸漬大膿血出テ八千金内托散ニ加減角ベシ。

○瘡疽膿血多脫去スレハ氣血甚虛耗ス或ハ八物湯或ハ十全大補湯補中益氣湯ニ加減角ベシ。

○瘡疽ヲ治スルニ經絡ヲ分テ治スベシ。頭瘡ノ類ニ芷胡清肝湯清肝益榮湯ノ類ヲ可用。

○瘡疽ノ治方ハ追風通氣散ニ悉ク加減ス。出之ヲ見合テ用其効多キ也。

○瘡疽ノ外治ハ腫物ノ、ワリラ關藥ニテフセグヘシ。此關藥家ノ祕方多レ外科ニモ關藥ヲ膏藥ニテセクレ。厄惡キ也。字細

膏藥六身三貼テ温マリワタバ膏藥ヲ持チ起メセキカヌ者
也黄柏榆皮大山椒葉ヲ陰乾レ右三味細末メ等分水三斗
解腫物ノウリヲセキテ上六枚原紙ヲサキテ覆フヘレ或酢テ
解免モヨレ此閑藥ヲ用ヒ一夜ノ内ニ腫物腫レ起ルナリ奇
妙ノ事ナリ

○外治ノ夏南蠻流鷹取流ノ針ヲ以撲闊スル也其上三艾灸
ヲスル切リテ血ヲ出レ膿ヲ出スガ故ニ治スルト早レサレニ虛弱ナル
人ハ元氣ヲ撲シ阿蘭陀流ハ切クヲ不用艾灸バカリニ木綿
ヲ以テ腫ヲ卷テ温ル也膏藥モ專温散ノ剤ヲ用ルニ因テ老人虛
人ニ宣レセキ實症ノ腫物ヲ木綿ニテ卷ハ實熱ヲ急シ籠テ急ギ
也勿論瘡疽氣血ノ虛ヨリ生ズバ實ニ属スル者少希ナド也

其内熱毒ノ深キ腫物也經曰謂實者病邪也是ヲ
以テ可憎

瘡瘍馬刀

○瘰疬ノ症肝經ニ生ズル者也耳後ニ累シトメ生ズ多ハ肝鬱
ノ症ニメ癥結ノナス所也或ハ氣鬱ヨリ生ズルナビ十六味流氣
飲加味逍遙散此胡清肝湯清肝益榮湯分心氣飲加味飯
脾湯益氣養榮湯廣茂潰堅湯ノ類ニ加減メ用ジ其効如神

疔瘡

○疔瘡ハ手足面部ニ生ズル者也皆多ハ厚味ノ人ニ生ズ者也
殊外尤急症也先づ灸火ヲ用ベシ痒キハ灸メ痛ムニ至ル痛ハ
灸メ痒キニ至ルト云テ灸ニ宜キ也内藥ハ追疔奪命湯ニ加

減角外六蟾酥丹貼ヨ又ハ疔毒ト云又ハ郡藥小云藥
敷クレ^{疏酒}上大夫家ノ藥 五八霜 櫻木皮黒燒

熊胆 各等分ニノ細末シ猪ノ油ニテキ火ニアタメテ薦^ス上

二貼ハ汗出其處、治スル也其効如神

○疔瘡ノ類ニ青筋ノ症トテ急症アリ知ラズバ有ベカラニ青筋出テ胸咽ノ間ニ攻入ナリ日本俗ハ日腫ト云此症ヲ治セハ先シ病人ノ尺澤^ニ穴ヨ見テ針ヲ以テ筋ヲ断切ル寸ハ黒糸ヲ出テ神効アリ又紙燭ヲ以テ脊及ヒ手足ヲ見ルニ粟粒許ノ赤点アヌ針ヲ以テ断破スル有神効此ニア手段奇妙也

便毒

○便毒ハ和俗ニ横根ト云フ兩腿ノ合縫ノ間ニ生スハ腫物也

○初發ノ時ニ實^ス者ニ高麥鈎大黃各等分^細末メ酒ニテ

毎服二爻^ヨ用ベレ小便ヨリ毒下ル也奇妙

○便毒潰^ステ後ハ實^ス者ハ防風通聖散ニ加減スベレ虛症者ハ加味逍遙散ニ加減メ用ベレ何ヒモ釣藤鈎ヲ加テ妙トス可秘又

茈胡清肝湯三加減角ベレ釣藤鈎可有口傳手

下疳瘡

○下疳ハ多ハ姪亂^{アソブ}人娼妓ノ類ニ交接^ス其臭穢ノ氣ニ撲^ステ生スル者也初發ハ消疳敗毒散^{田春}ニ加減メ用ヨ或ハ龍胆浮肝湯防風通聖散ノ類ヲ見合テ用ベレ虛症清肝益榮湯茈胡清肝湯逍遙散ヲ見合テ用ヨ或ハ八物湯^ス小此胡湯ヲ

合レ連翹金銀花ヲ加氣虛スル者六補中益氣湯ニ連翹防
風青皮ヲ加テ用ヘシ痛甚ク何ノ方ヲ用テモ不止痛苦難忍者
ニ黄芪建中湯ヲ二貼用ハ其効如神

○外ヨリ蒼木紫蘿黃芩鮑麻子艾葉當歸等分水煎蒼
牡蛎ノ白燒葛根天花粉ノ三味各等分極細末ノ用也平田
道仙が家ノ祕方ノ白藥ト云ハ三白散ニ龍腦ヲ加^タル者也傳
曰此白藥ヲ娼妓ノ類ニ交タル時^{自己}小便ニ^タ陰莖ヲ洗ヒ
其上ヲ温水ニテ洗ヒテ貼ヒ^タカ瘡毒ニ中ル^タシ因テ此藥ヲ瘡毒
ヨリ^タ去^フ可^リ

○下疳ノ藥ヲ外治ノ医ハ洗フ^タラ禁^スル者多ニサレ瘡愈無

ル寸ハ洗藥ニテ洗テ粉藥ヲ貼クヘレ膏藥ソ類ハ春^ス秋^ス熟^スレ
惡シ痛強ク瘡口大ナフ、三白散或ハ白藥ヲ乳^タシ^タ没藥ヲ加
テ麻油ヨテ煉^タシ貼クヘレ下疳ノ貼藥ハ隨分極細末ス^タ粉藥
龜末^タハ害多シ^タ陰頭ハ其皮薄^クア^ス肌^タハ粗^キ粉ニ^タ思
ヒアハヌ者也此大祕良也

楊梅瘡

○楊梅ハモト下疳瘡ヲ傳染^シタル人之ヲ耻^チテ治スル^タ溼滯メ
一變メ便毒トナリ便毒一變ノ楊梅瘡ト在京都江戸大坂等
都會ノ所ニ多キ煩也鄙野ノ地ニハ尼^タ少シ京ニ^タ人濕氣ト云
何レモ娼妓ニ文構メ傳染スルノ病也初發^タ荆防敗毒散消風
敗毒散^{四春}二十四味風流飲^同上^タ加減^タ用ヘ

壽世保元

亦出之

○楊梅瘡經日不愈者或鼻爛鼻柱朽落レ口臭ク唇
缺ケ或腕ノ折目腫中ニアリ、リ毒氣膿ヲナレ或總体ノ瘡
乾テ總身疼痛レ或ハ骨ウキニリ或ハ眼ニ毒入り或ハ耳聾レ
種ニ変化スル因テ其人終ニ廢人トナ者ナリ之ニ固テ人之ヲ
惡三嫌フ大風ニ類ス也此等ノ類ニハ春ノ通仙五寶丹ヲ
用ヘレ此方王范泉が廣東ヨリ傳來ル妙方也此瘡中華ニモ
ト云トナレ唐ト東ト音同キ故カ此五寶丹ニ王家ノ祕方多
ルト痘疹全書^九作ニ見ヘタリ和俗此瘡ヲ唐瘡トモ廣東瘡
ト云トナレ唐ト東ト音同キ故カ此五寶丹ニ王家ノ祕方多
レ何ノ方ニテモ真珠ノ真ヲ用ヒ廿二其効ナ

○楊梅瘡日久ク不愈ニ防風通聖散ヲ五分カリ水^利半升
亦用

仙人飯

仙人飯

鮮鮑三箇
合一錢或一錢半
荳首毫
合一錢或一錢半
冬筍地沈
合一錢或一錢半
丸正通
合一錢或一錢半
三十三味

効ヲ尤ト多シ又奇驗方トテ近來阿蘭陀外科ノ用方アリ何
モ山飯来ノ入タル大料也是モ紅毛流其家ノ祕方多々可考
キトセ予カ家ニ傳所ノ奇驗方ノ祕方 土茯苓^{七錢或}當歸
皂角刺 皂夾子 蕃藶仁 白芷各一錢半 木瓜 木通
白鮮皮 金銀花 連翹 防風各一錢半 甘草^{五錢或} 茯苓
芍藥 何首烏 黃芩 人參 川芎 生地黃 沈香各
或二分
主味 右調合メ一劑五錢或六七錢或六十錢或十五錢ニシ煎
法次第アリ口傳用ヒ様モ口傳アリ又山玄湯トテ予カ家ノ名方
アリ 山玄^{五錢日本ノ山飯来イテ莖也} 二月既三足有半トナリ 山飯來^{半升} 黃連

黃芩 人參 當歸 防風 桔梗 川芎 生地黃

萬葉集

卷之二

芍藥 羌活 荆芥 木通 各一分 蟬蛇 隅千立毛無子 津蟹
ノ黒燒五十六味 右調合メ七貼三分方蝮蛇陰子津蟹ノ黒燒六後
三貼三分ケテ入ル也一日ニ一貼ヲ用ヒ也飲毎ニ鷄ラ冬リタル
一切レツヘ食テ藥ヲ服スベシ煎法用法口傳アリ

○楊梅瘡年經久年テ愈カヌルニ涎藥トテ丸薬アリ 輕粉二分
上茶一又 梅干黑燒半分 土茯苓一又 波砂五分 右細末レテ
丸スルニ梧桐子ノ大サニメ研茶ヲ衣トス用ル寸ニ歯ニ中ラサル
ヤウニ用ヒ齒齦ヨリ血出テ咽爛テ病人歟スホトニ苦辛雖
モ七日ヲ過ヘ食氣出テ本復不ル者十居多ハ二三日ニノ病人肝
ヲツメ飲得ナシテ虛弱ナシ必ス久ス者也易ニ固難
キ方也又輕粉ノ毒中リ内ニ滞リ骨肉キニガル者能ヒ

瘡毒深キト見分テ用ニシ用ヒト其夜ヨリ涎出咽爛レ痛
三飲食不入言語不聞者也生歟ニツ者カト思ハシ
ハ不可用

○楊梅瘡年久久年臭藥ト云ノ方アリ爭か家ノ祕方ニ永銀
光明朱火候一又 鈺二又 百草霜見合右ノ藥物ノ細末シ百草霜
ノ細末三八合火候セ合セテ厚紙三テ袋ヲコレラス其袋ノ中ニ右ノ藥
ヲ入テ隨分カタクツテ長サセオニ一日ニ寸宛カキ申スヤウ
ニ上ニ刻火候ヲ付テ置キ此藥ニ火ヲ付テ其煙氣ヲ鼻三嗅火候
眼ヲ塞ギ口中ニ冷水ヲ含テ嗅ハシテ煙ノ外ニ出ヌヤウニ覆ヒラ
カクベシ其コレラヘヤウ嗅火候マロ傳多シ一方ニ沈香一又ヲ加フ
尤好ニ北方ハ奇ニ妙ニ靈方也又涎藥トソヤウニ申ス

モ無キナリ惣ノ楊梅瘡ハヤシキ療治ニテ大ケバ治シ難ヒ
知ルベシ故ニ諸ノ秘方ヲ此ニシルスナリ

臍瘡

○臍瘡ハ和俗ニハギ瘡ト云ヒ又雁瘡ト云毎年八九月ヨリ發リテ二三月ニ愈ルヲ以テ雁ノ肉來ニ因テ名付ル也愈カスル者也此瘡ヲ治セント思ハニ三年ホドヤハ根ヲ切ル者ナリ次第ハ瘡発スルト基ニ荆防敗毒散ヲ四五十點用テ後白芷升麻湯ニ准メ紅茶加テ用テヨシ其辨方考ノ白芷升麻湯ノ条不ニ有リ可考如是スレハ來歲ハ前歲ノ半分ホド發スル也又次ノ年モ如是スレバ又其次歲三分ノニ太也三年ホド癒治セ根ヲ切ル也初年ハソヨリヨク發スル者也根又年五治

六病根ヲ断ト云コトノ病人ニモトクドニ云聞セテ後可治一也外治ハ少シ瘡名曰瘡スナリタルニ平胃散ノ粉葛根輕粉三分ニ加テ上ヨリ每度アリスルベシ惣テ汁ノ多ク出ル瘡ハ瘡也平胃散ノ粉ヲ用ハシ是乎が家ノ祕事也可秘此中之物

○臍瘡四五月中比愈テ後足ノ三陰交ニ灸スベシ奇く妙也

疔瘡癰瘡

○疔瘡ハ分テ云ハ疔ハ皮膚ニアリテ浮淺ナリ多ハ熱ニ属ス
瘡ハ深沉ニメ多々濕ニ属ス故ニ痒クメ濕ナリ班赤点生スル也
瘡ハ痒メ血膿アリ共ニ血熱ノ症也血分熱燥ノ風毒ヲ挾ム也和俗ノ云ノ肥瘡也初癆ニ荆防敗毒散ヲ用テ發散スレ冬キ寸六荆防敗毒散ニ四物湯ヲ合シ酒芩酒連ヲ加テ用ヘシ

癪風解毒湯

歲末薑茶沉沉
赤木通
鹽水各
免角膏分以七時
外科抱要去防風加華
散名換肌消毒散
祛熱禮虎欽瘻

年冬キハ防風通聖散ニ宜シ

○風瘡癬ニ去熱搜風湯四春ヲ用ヘシ

皮膚鱗ノ如ク立テ痒キ者ニ浮萍散四春ヲ用ヨ

○鴛掌風瘡トテ手角剛四春ノ成テ鴛掌ノ如ク成ニ症アリ
多ハ虫ヲ生ズル者ナリ和俗ハサク口ト云諸ノ方書三洗藥ヲ出
考合テ用ベ内樂八防風通聖散或ハ荆防敗毒散ニ宜シ病人

虛弱ナラズ白芷升麻湯ニ宜シ

○鴛掌風ニハ朝腦樟腦枯礬明礬各等分石灰半分酢ニテ
トキ貼テ宜シ又川芎川芎香ノ如ク燒テ毎日三度掌ヲ烘火シ則
芎芎燒トキ煙ヲ鼻ニ入ラヌヤウニスノ鼻子紙ニテ塞シ

癰瘍

○癰瘍ハ和俗云ラモト云ノ小兒ニ多キ症也陥亨ノ知ハ多
久不治愈ハ也純陽ノ熱毒也荆防敗毒散又ハ防風通聖散
ニ加減メ用ヨ多公内藥ナレニ貼藥ニテ愈ハ也四春ノ掃雪膏冬青膏
ナ貼テ其効如神又ノ奇方アリ松ノ青キ松葉松葉ノ黑燒アセミ
ハ馬醉マゼ不乾不乾各等分細末ノ雄黃大黃半分ヲ加テ麻油テ解
テ瘡ヲ刺刀ニテコブイテ其上ニ貼ル奇妙
○癰瘍又小兒ニ足ノ腫腫目ノ橫矢横矢ノ内廉内廉ニ灸之ナ各十壯
或半立壯又其効如神紫陽ノ野人傳也

癬風

○癬風ハ和俗ナゾト云白癬風ハ治シ難シ和俗ハ白癩ト云テ
天刑病中ニ云ハ也汗斑ハ治シヤスキ也多ハ夏ノ生花也醫陀ニフタ

僧ヲ酢ミテ解貼テ宜シ又「奇方」爐灰硫黃雄黃樟腦各分
酢ミテキ貼ヘレ其効如神

癩風

○癩風一名癩風又名大風和俗カタトイ云此病人間ノ中
天道ニモ放タル病ニフ佛氏所謂過去ノ因果ノ惡キ故ニ今
病ヲ生ズト云フ孫真人曰癩風ハ天刑ノ病ニテ治方ナレトシハ其
根ヲ切リ難キ病也其人色慾ニ断テ臭肉塩味ヲ断テ保根ス
ニハ生涯見惡ニ不至顔ツキ少シイ十者ト人ノ云少シテ走
者也三黃湯上子黃芩黃連黃柏煎湯ニテ當九黃辛ヲ粉
ニテ右ノ飲沫ニテ用ヒ者アリ其効如神

○癩風ノ藥多公奇怪之藥物ニテ治ス者多シハ一脉ノ兼

治ヨク覺ヘタル者ナリ或ハ下シテ虫ヲ取り或ハ手足面部
針メ立ニ血ヲ出シ或ハ灸治ヲ用下シテ治スナリ多ハ中古
(南蠻人)渡海時習傳ヘタル家傳人多シ妙方ニ有者也諸ノ医
書ニモ藥方ノス考合ベシ大抵ハ防風通聖散ニテ爵金大黃
苦辛皂角子連翹雷丸各等分ヲ粉藥ナシテ一度ニ二爻
施用テ治ス其効如神

折傷

○折傷ハ才身ノ類多シ皆瘀血凝滯スル也打身重キ時ハ大
小便不通心腹ヲ攻テ外ニ至シトガ先づ通導散田春ヲ用テ大
小便ヲ利スルヲ以テ度半スベシ又「奇方」芎藭湯ニ蘇木紅花ヲ
如テ用ベニ又「奇方」當歸二爻大黃一爻水煎服ス何モ右ノ方

牛山源本

卷之三

四三

孕婦小兒虛人勿用

○打撲打傷先溫菴菜湯方勝龍王湯同法派出ノ用之シ
又青箱子陰子レテ花共三分人參二分ヲ加テ振出ノ用其効
如神

○諸ノ方畫接骨ノ治方多シ考合テ用ヘシ外ヨリハ楊梅皮
木瓜各等分粉ニ紺屋糊ニテ推セ痛處ニ貼スベシ其効如神
又奇方鷄巢子スリ碎ア貼モヨシ何モ上三枚原紙引キテ
覆スレ

○打身ノ妙藥三石見川ト云アリ川骨著葉赤小豆半升
各二兩石見川生根根也小石見川也人參一兩白芍藥蒲黃石
菖蒲百草川芎五味子各一兩右細末ノ一度三丸ツ酒

(三)角ニ之ヲ打身ノアシト和俗ニ云也產後ノ血量半金瘡二
毛用サナリ香月無部少輔經考ノ家方ナリ予力傳來ス

○高ヨリ墜下メ打撲甚ク瘀血流胸下疼痛不可忍ニ復元
活血湯ヲ用エ酒大黃芷胡當散各一錢桃仁紅花各三分天花粉
穿山甲各七分甘草三分水煎レテ服ス其効如神此方古之医
統ニ出タリ啓益常ニ用ヒ取驗多シ可秘

金瘡

○金瘡先苦菜湯龍王湯石見川芎散湯ノ間ヲ見合テ疵
ノ多少病久勇怯ヲハカワテ治スヘシ血脫ルノ多キ時ハ先ツ大料
獨參湯ニ又ヨリヲ用ヘシ陽長火大陰長火ノ義ナシハ先火氣

○無何有ノ鄉ニ引致スレ隨分手足の衰弱渴死其餘水ヲタマルノ物ヒ外治ノ医生負ナシ切見符名者チラテ書記元ノアヌリス之國外科ソ医氣勇剛者ニ宣レ

○金瘡先ツ燒酒或ハ溫酒ヲ以テ洗フヘシ其後鷄子清ヲスリテ縫合スレ馬膏ヲメリクガヨレ血不止ハ酒ニテヒタト洗スシ小疵、血留ニ止ヘシ太ナル手負ハ血留三ツ、血甚者二ツナシ能ヒ可心得也

○血留ノ方土用ノ中ノハシテト烏取テ首羽毛足当去耳腸ヲ出レ其中ニ當岐川芎蒲黃各二兩人參二本紅花一又入

○四春人正痛寒肌散本條西漢太尉所著

○少キ切疵ノ血留ニハ鉄蕉ノ木、綿ニ蒲黃ヲモミ入テ加熱ニ貼テヨシ革屋ノ革ノカニタスニ蒲黃ヲモミ入テモヨシ人腸ト云者モヨレ海蜘蛛七ヨリ刻炮艸ヲ貼トヨシ何モ常ニ止者ニ急ニ備ヘ易ヒ重宝ナシ也何モ可祕

破傷風

○破傷風トハ金瘡ノ口ニ膏藥ヲ不貼其瘡口ヨリ風邪入テ經脉ニ中リ善テ行テ數々變互ニ因テ及腰痙攣ノ狀痙病ノ如其死生在項刻急ヒニ治スベシ先ツ恙活防風湯本條二回春加減メ可用又ハ苦菜湯龍王湯ノ類ヲ可用

○破傷風裏ニ邪氣入才小疎導ノ剂ヲ用日太芎黃湯回春

本條二加減メ用ヨ

湯火傷

○湯火傷二六蛤蠣壳ヲ灸リ舊ニ黄色ニ細末又麻油三方貼ヘ其効如神

雷火傷之者創面
九丈二除臭否ヲ加
用是或家方也有

湯火傷共大ノ当
突破リ薦賣孙
ヲ頻ニ陰アケレハ久
氣消シ火毒治ス一
口云火度ナ西夏
佳也是亦不外家
傳也常用テ驗
現矣

○湯火傷共三痛甚々大小便不通者火毒下焦ニ傳フ四物湯
メ麻油二テ貼ヨ其効如神
○湯火傷共三痛甚々大小便不通者火毒下焦ニ傳フ四物湯
二黃連木通山梔子赤茯苓連翹ヲ加テ用ヨ其効如神

○湯火傷共二肉壞ニ痛甚半者三分四物湯二人參黃芩白
芷連翹甘草ヲ加テ用ヨ數劑ニメ新肉生不

蟲獸傷

宋傳一方水銀
之方アリチ金不
與之彼藏古セ

○狗咬楊二杏仁甘草ヲ白ニテ咬碎テ痛處貼ヨ

一方銀杏ヲ研碎テ貼ヨ又一方草麻子ヲ新汲水ニスリテ貼ヨ

又一方薑茸葉ヲ煎テ洗ヒ甘草ヲ細末ヲ貼ヨ

○狗咬タルニ倉卒ニ魚藥末入小便ヲ以洗ヒ百草霜ヲ麻油二

テトキ貼ヨ或ハ牛糞ヲ以貼之

○馬咬タルニ八寒水石雄黃ヲ細末ヲ之ヲ貼ヨ其効如神

又一方馬齒莧ヲ杵キ爛テ煎服又外ニ益母草ヲ杵テ貼ヨ

○猫咬タルニ薄荷ヲ煎湯三テ洗ヒ紫金錠万金丹玉

樞丹ノ類ヲ用ヨ

○鼠咬タルニ八寒水石雄黃ヲ燒テ貼ヨ麝香少許加テ妙也又一
方茄葉ヲ煎テ洗テ妙也又一方紫蘇ヲ煎湯三斤洗テ妙ナリ

牛山古集

卷之二

四十一

益吉之行人鳥嶺
ノ村年又鳥嶺
ノ里ノ所
在川壁其日候言
ウテ此物レシ故
在時風城里
葛者和能跨
置局モ集テカキ
夕賀シテ爲夫
又各標尚モ有
ニ乞本誠也

蛇ノ咬タルハ雄黃五靈脂等分細末ヲ貼ヨ又芳目母ヲ
好酒テ服レタリ佳去心細末メ用也又湯白芷人細末ヲ麥門
冬湯ニテ服ス

蛇ノ咬タルニ日本ニ云所ノ椿ノ葉燒丁以汁三冬レテ其汁ヲ
モツテ洗フヘン腫漸ヘニ引ナリ板蛇咬冬所三蠅子殺五
頭糊ニラレセテ貼レバ咬タル口目ヨリ汁出テ痛止腫消充
ナリ奇妙

蛇ノ咬タルニ藥無キ所ニハ蒜ノ實ニテ七又葉三十枚又
白芷二十枚爛ニテ貼ニ錠子ノ如冬メ其上ニ艾灸ス
ベシ下ニ火氣通ス尔ドヌキ也

蜘蛛ノ咬タルハ雄黃細末メ麝香ヲ加テ貼テ良也

○蜈蚣ノ咬タルハ雄黃南星半夏ヲ細末メ貼テ宜シ方五
倍子阿仙藥細末メ津漆以テ潤メ貼ヨ其効如神一方ニ先ツ
塩湯ニテ痛處ヲ洗ヒ吳茱萸嚼爛メ貼之或井底ノ泥ヲ貼モ
宜シ

○蜂ノサレタルハ小便ヲ以テ洗ヒ拭ヒ乾メ香油ヲ塗テ金テ宜シ又
一方雄黃末ヲ貼テ吉レ又蜂房ノ末ヲ搽テ其効如神

○蜥蜴壁虎ノ咬タルハ大黃雄黃ノ細末ヲ醋ニ磨クノ貼ヨ又白
礬ヲスリタ生モヨシ

○蚯蚓ノ毒ニ中リ或ハ此物ニ小便ヲ仕タクレバ陰莖腫痛シ或
ハ大風ノ狀ノ如ク眉落至ル也石灰ヲ熱湯ニ炮シテ冷メ患ル所ヲ
洗ヘ治ス浸之久ク佳也小兒多々此毒ニ中リハ陰莖陰囊

共二腫テ水炮ノ如ク者アリ鳴ノ血ヨ金六立外消スニ左
塩湯三テ流ス其勢如神
○蚕咬タニハ苧葉ヲ搗テ貼之奇妙ト
バジコニ雄薦
ラ押テ高ト
為付ニ而毒虫
傳高高是
一行

共二腫テ水炮ノ如ク者アリ鳴ノ血ヨ金六立外消スニ左
塩湯三テ流ス其勢如神
○蚕咬タニハ苧葉ヲ搗テ貼之奇妙ト
バジコニ雄薦
ラ押テ高ト
為付ニ而毒虫
傳高高是
一行

○總ニ虫獸ヲ咬タルニハ雄黃ヲ貼タルカヨシ或ハ紫金鍊玉樞丹
万金丹錦袋子ノ類ヲ貼ヘニ山家又野陳人時ハ雄黃毒者曰
畜ニ身ニ帶ヘシ邪惡ノ虫獸ノ毒ヲ避半奇妙ト可秘
中毒村臭骨體

○諸中毒ニ中リ先ニハ先ツ白扁豆一味ヲ煎服スヘシ多ハ解ス
○中毒ニハ紫金鍊玉樞丹錦袋子万金丹等之藥ヲ服スヘシ
五倍子阿仙藥雄黃ノ類毒ヲ解スル聖藥也
○諸中毒ニハ甘艸黑豆蒙豆ヲ用テ解スヘシ方本草モヨク

毒ヲ解スルノ藥也
○硫石毒ニ中リタハ黃丹來銀青黛蒙豆焰硝名寺分細末
人調下ス
○誤テ針ヲ呑ム者ニハ蚕豆一名ヲ煮熟レ葷菜ト同名吃下
セキ針菜ト同ク大便引出ル也
○誤テ金銀銅鉄ノ物ヲ呑テ不能化者ニハ砂仁濃煎湯ヲ服
スニ其物自下ル
○誤テ水蛭ヲ呑者ニハ蜜ヲ食スヘシ即化水ト也又濃茶
ヲ多服スレバ又効アリ
○誤テ木屑ヲ呑ミテ不下ハ外有須臾鉄斧ヲ用テ
磨水灌下セハ立處ニ効アリ

是皆熟毒アサヒ
于皂金汁或人
金箇角又破粉
佳七何生品
已然瓦石真良品
飲見人此光感
七佳丁乙子

○誤ミス多稻タチノ芒針刺末屑金銀銅鉄ノ類或鷄臭ヲ食テ
骨咽喉體及腫痛イニシテ死在須臾ムシムシ回春中毒門白衣
丸ヲ用ヨ其妙如神

○河豚臭惣ナガラテ臭毒ニ中リタニ撒擲カキ之煎湯ヲ服入スル山
查砂仁サカニ煎湯モ奇妙也玉樞丹紫金錠ノ類ヲ用ニハ其効
如神

○茸毒三八黒豆汁ヲ用ニ奇也紫金万金玉樞丹尤有効

○諸臭ノ骨軟カニニ神仙釣菖丹カニ用ニ効大取也タク多也

○骨軟カニニ砂仁甘艸カニヲ絹三包三テ含ミタルガヨレ

○骨軟カニニ骨鳥カニト云フ鳥深山角ニ有鳥毛カニ毛白而柔
骨ノ如羽毛カニ山鳥カニノ如山家ノ獵士ハヨク知也カニ鮑三丁殺

○暴死卒死五絶類半復人未黃豆大許鼻中吹入
即摸生死也

○自ラ縊ヨミテ死スル者ハ俄ニ繩カニ断ルヘカラス衣物ニテ頂上谷道
トラキビレク厚タクニ抱へ起テ後繩カニ解ヘシ極其項痕カニアト探
和ケ鼻カニニ子リ其兩耳カニ吹テ氣微カニ回ラ禦冠カニ血カニ刺テ口
中ニ滴六即摸生死也

死後者
死後者皆
火候温
火候温
急見白
急見白
未石也

水弱者
竈中灰ヲ取り而垣ニ埋之從頭足ニ至ル如是
ソバ水を窓ヨリ出ル也又皂角ノ末ヲ撒ケ下部入レハ須臾ニシテ
水出テ甦生スナリ又急ニ繩ノ人ノ衣帶ヲトキ腰中三絆各ニ之
即術アリ

○冬月凍死ノ者又ハ水ニ墮テ凍死スル者ハ先ツ火ヲ用テ冬火
火シ或ハ布袋ニ熱灰ヲ盛リ心頭ニ放ラシ令火即熱ス
眼ヲ開テ待テ温酒姜湯ヲ用ヘシ

○夏月暑ヲ挾テ死スル者又冷水ヲ以テ冷サヒシ方レ熱湯
ヲ以テ其心腹ヲ摩リ洗ヘン即甦生スナリ或ハ旅途ノ中ニ死ラ
急切車至る路上ノ糞糞ヲ取テ眼脇ノ間ニ置ケ申ニ死ラ
ナ若夫人ヲ更シ其脇牛ニ小便セシムヘシ忽甦生ス

○鬼

二臘テ死スル者ハ皂角ノ末大豆許鼻中吹入ハ
蘇生スル也

牛山先生活套卷之下終

牛山先生活套後叙

國朝

夫醫之為道也大而其書亦博矣
香月先生尤為醫林瓊枝也嘗著
數篇書其藪蓋於世術亦神焉茲
有活套方考二書繕寫而未槩一
日書肆何某過予曰膾炙人口久
矣不若與衆嗜之乎請校正而以

公之予愧短才以固辭之海猶不
許夫以如庸醫不能衷論文意則
不知奏其功也值片言隻字而難
曉則失其病可救也繇此加國字
以使易解而便于昧者也若博覽
士覽之而有奧魯之差則非先生
罪予肉袒以謝焉肯安永成冬

泉州後學木村桂菴書於平安第

五街之家塾



平安 南窗 武聖軒畫

青陽堂山崎文亮藏



牛山方考嗣出

安永八己亥年仲冬吉旦

高麗橋丁子日

浪速

佛光寺寺町西入丁

淺野弥兵衛

京師

寺町五條上九町

山田三良兵衛

堀川佛光寺下丁

葛西市良兵衛

五條橋通高倉東今丁

河南四良右衛門

寺町通靖恭師下丁

北村四良兵衛

山本平左衛門

