九州大学学術情報リポジトリ Kyushu University Institutional Repository

CD44v3, 8-10 is essential for Slug-dependent vimentin gene expression to acquire TGF - β 1 - induced tumor cell motility

邱, 仕超

https://hdl.handle.net/2324/4795539

出版情報:九州大学, 2022, 博士(医学), 課程博士

バージョン:

権利関係:(c) 2022 The Authors. Cancer Science published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of Japanese Cancer Association. This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License.

氏 名: 邱 仕超 (Shichao Qiu)

論文名: CD44v3,8-10 is essential for Slug-dependent *vimentin* gene expression to

acquire TGF- β 1-induced tumor cell motility

(特定のCD44バリアントは、Slugに依存したビメンチン遺伝子発現に必須であ

り、腫瘍細胞のTGF-β1誘導性運動能獲得に寄与する)

区分: 甲

論文内容の要旨

要旨:CD44は多くの細胞種で発現が確認されている、多様な形を持つ接着分子で発生やがんの進展に関わる様々な機能を持っている。そのmRNAが選択的スプライシングを受け、複数のCD44バリアント(CD44v)アイソフォームが産生されるが、それぞれのCD44vアイソフォームの機能についてはまだ完全に解明されていない。本研究では、CD44vがTGF- β 1により誘導される上皮間葉移行(EMT)におけるvimentinの発現誘導において重要な役割を果たすことを示す。胃がん細胞株NUGC3で発現する複数のCD44vアイソフォームの中で、CD44v8-10とCD44v3,8-10がTGF- β 1により誘導されるEMTに伴なう遊走能と浸潤能獲得に寄与していた。また、CD44v3,8-10のみがEMT転写因子Slugによるvimentin遺伝子の転写誘導に寄与していた。胃癌患者から採取された原発巣腫瘍検体において、CD44v9 [バリアントexon 9 を含有するCD44vアイソフォームの総称] 発現とEMT形質発現 [E-cadherin(-)vimentin(+)] は有意に相関しており、CD44v9発現とEMT形質発現を合わせ持つ症例では、がんの浸潤能や転移能を反映する腫瘍浸潤深達度、リンパ節転移、および病理学的ステージの評価が有意に高く、予後不良であった。これらの結果は、胃がんにおいて特定のCD44vアイソフォームの発現がEMT形質発現に伴なうがん細胞の遊走・浸潤能や転移能を促進することを示しており、CD44v3,8-10がこのような臨床的特徴の獲得に貢献している可能性を示すものである。

